

Academic Reference Dictionaries




# DICTIONARY OF NEUROLOGY

مكتبة اقرأ الثقافية  
www.iqra.ahlamontada.com

English - Arabic

Dr. Sadek Al-Hilali



World Health Organization  
Eastern Mediterranean Regional Office

ACADEMIA

**Academic Reference Dictionaries**

# **DICTIONARY OF NEUROLOGY**

**English-Arabic**

**Dr. Sadek Al-Hilali**



World Health Organization  
Eastern Mediterranean  
Regional Office

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

# معجم طب الأعصاب

انكليزي - عربي

الاسناد الدكتور صادق الهلالي



مَنْظَرُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ

المكتب الاقليمي لشرق المتوسط



أكاديمية

**أكاديميا** هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال للنشر والطباعة

**ACADEMIA** is the Trade Mark of Academia International for  
Publishing and Printing

**معجم طب الأعصاب**  
**Dictionary of Neurology**

**ISBN: 9953-3-0061-5**

حقوق الطبعة العربية © أكاديميا إنترناشيونال 2002

تم التأليف تحت رعاية وإشراف  
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

أكاديميا إنترناشيونال Academia International

ص.ب. P.O.Box 113-6669

بيروت، لبنان Beirut, 1103 2140 Lebanon

هاتف Tel 800811-862905

فاكس Fax 961 1 805478

بريد إلكتروني E-mail academia@dm.net.lb

جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب،  
أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو،  
وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية  
أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك،  
إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما.



## المحتويات

6	تقديم الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري ...
8	مقدمة المؤلف .....
10	مقدمة الناشر .....
11	كيفية استخدام المعجم
13	المعجم A-Z
631	مسرد عربي - إنكليزي

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تقديم

الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري  
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

هذه خطوة أخرى على درب تعريب العلوم الطبية والصحية، غايتها الخلاص من واقع مؤلم في المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان العربية، يتمثل في اتخاذها من اللغات الأجنبية وسيلة للتدريس والتدريب. في الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى التزام اللغة الوطنية في نقل المعلومات ضماناً لحسن الاستيعاب لدى المتلقي، وتوفيراً لوقت المعلم والمتعلم، وتيسيراً لمشاركة المجتمع الذي لا بد من مشاركته إذا أريد تحقيق الصحة للجميع.

ولقد اضطلع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - إيماناً منه بضرورة وحتمية التدريس باللغة الوطنية - ببعض الواجب في هذا الشأن، فأصدر الطبعة الثالثة للمعجم الطبي الموحد، بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الأطباء العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكان لهذا المعجم كبير فائدة في توحيد المصطلح المستعمل في مشارق الأقطار العربية ومغاربها وفي تيسير التأليف والتدريس بالعربية من خلال توفير التعبيرات العلمية التي تفي بحاجة المعنى وتكون في الوقت نفسه مقبولة سهلة الاستعمال. والمكتب الآن على وشك إصدار الطبعة الرابعة لهذا المعجم بعد تنقيحه وتوسيعه أضعافاً مضاعفة، بحيث يستوعب كل ما يحتاج إليه الدارس والباحث والمعلم والمتعلم.

غير أن المكتب قد رأى من البداية أن يواكب إصدار المعجم الطبي الموحد، وهو مسرد للمصطلحات باللغة الأجنبية مشفوعة بما يقابلها باللغة العربية، إصدار عدد من المعجمات التي تشتمل على شرح وافٍ ومختصر في الوقت نفسه لكل مصطلح، وبذلك لا تقتصر مهمة المعجم على مجرد تسجيل التعبير المستعمل، وإنما تتعدى ذلك إلى التعريف به في إيجاز غير مُخلٍ، تعريفاً يسهل على القارئ تكوين فكرة واضحة عن المعنى المراد، ولو أنه لا يغني المختص عن الرجوع إلى أمهات كتب الاختصاص للتعلم في الموضوع العلمي.

و«معجم الأعصاب» هذا هو الحلقة الثالثة - بعد «معجم العين وأمراضها» و«معجم الوراثة» والعلوم البيولوجية والجزيئية» - في سلسلة من المعاجم التخصصية في مختلف العلوم الصحية باللغة العربية، يصدرها المكتب الإقليمي أو يساعد على إصدارها، راجياً بذلك أن يسهم في سد الثغرة المحسوسة في الوقت الحاضر، من جراء حقبة من الركود الفكري الذي أدى إليه ذلك الفصام بين لغة التفكير ولغة التعبير.

وقد قام بإعداد هذا المعجم عالم فاضل استفرغ الجهد في التنقيب عن التعبير الصحيح السهل، والعمل على وضع التعريف الواضح الموجز، مع الالتزام بما تم توقيده من المصطلحات وشفع النص المكتوب بعدد من الصور الإيضاحية التي زادت في نفع المعجم.

وإننا لنأمل أن يلقي هذا المعجم ما يستحقه من اهتمام ونقد، وأن يؤلف لبنة مباركة في بنيان  
الصرح الصحي الجديد الذي نأمل أن نراه شامخاً في هذا الإقليم، وأن يكون عاملاً من العوامل التي تدفع  
الباحثين والدراسين إلى التشمير عن ساعد الجدّ، والإقبال على التأليف والتدريس والكتابة باللغة العلمية  
العربية.

والله من وراء القصد...

محمد بن عبد الله

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## المقدمة

بدأ التعليم الطبي الحديث في العالم العربي في أوائل القرن الماضي في مصر باللغة العربية وتقدّم تقدماً ملحوظاً أشارت به المعاهد العلمية العربية والأجنبية وساهم فيه الرعيل الأول من أعلام الطب المصري الحديث. ودام ذلك لمدة ناهزت الستين عاماً. ثم بدأ التعليم الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت في النصف الثاني من القرن الماضي باللغة العربية أيضاً ودام ذلك حوالي عشرين عاماً قبل أن تغير لغة التعليم في هذين المعهدين إلى اللغة الإنكليزية بتأثير التدخل الأجنبي. وعندما بدأت الكليات الطبية الحديثة في دول العالم العربي في أوائل هذا القرن كان التعليم فيها بلغة المستعمر فاستعملت اللغات الفرنسية والإنكليزية وحتى الإيطالية ولم تنج من ذلك إلا كلية الطب في دمشق التي راحت تعلم بالعربية بكل كفاءة وإقدام وإصرار ونجاح حتى يومنا هذا.

وقد أُلّف خلال هذه الفترات التعليمية الأولى العديد من الكتب والمراجع الطبية الموثوقة واستُحدث الكثير من المصطلحات الطبية وعُرّب العديد منها حتى غطت الساحة العلمية بل فاضت عن ذلك وتعددت مما استوجب توحيدها فجاءت طبقات المعجم الطبي الموحد بجهد كبير في ذلك وقامت به بكفاءة مرموقة.

وقد جلب انتباهي بعد إتمام مرحلة الدراسات العليا في اللغة الإنكليزية والتي سبقها دراساتي الطبية الأولية في مرحلة ما قبل التخرّج، والتي كانت في الإنكليزية، ثم دراستي ما بعد التخرّج في إنكلترا أن تمكّني من هذه اللغة كان دائماً أضعف من تمكّن أصحابها منها. وعند إجراء تجاربي الدقيقة وجدت أن سرعة قراءتي لها حتى في مواضيع اختصاصي لا تزيد على نصف سرعة قراءة الطلاب الإنكليز لها وربما بفهم أقل منهم. وبالمقارنة مع ذلك، ما هو حال الطالب خريج مدارسنا الثانوية مع ضعف تعليم اللغة الأجنبية فيها؟

ولما مارست تعليم مادتي في كليّاتنا الطبية باللغة الأجنبية كنت ألاحظ أحياناً صعوبة استيعاب الطلاب لبعض فقرات المحاضرة فاضطر إلى إعادتها بأسلوب أبسط وبالرغم من ذلك كان بعضهم يسألني عنها بعد المحاضرة وخارج قاعاتها فأبادر بشرح الموضوع لهم باللغة العربية ببعض الجمل البسيطة فيستوعبون بها بكل سهولة. وكان الكثير من طلابنا يطلبون الإجابة في الامتحانات الشفوية باللغة العربية لسهولة التعبير والتفكير بها.

دفعتني كل هذه التجارب إلى كتابة مواضيع محاضراتي عن الجهاز العصبي في كتاب «فلسجة الجهاز العصبي» بالعربية الذي وضعته في متناول الطلاب فتلقفوه بشوق وزادت رغبتهم في تعلّم هذا الموضوع وتضاعفت نسبة نجاحهم فيه أضعاف زلائهم السابقين الذين لم يستعملوا هذا الكتاب، حتى إن الطالب الأول المتميز بينهم قال بعد مطالعته له «كنت أتصور بأنني كنت قد فهمت هذا الموضوع فهماً جيداً ولكنني في الواقع لم أفهمه وأستوعبه إلا بعد قراءتي له بالعربية» وصار البعض من خريجينا الذين يواصلون دراساتهم العليا باللغة الإنكليزية في الخارج يرجعون إلى هذا الكتاب لدراسة موضوعه بالعربية بطريقة سهلة وسريعة وبمستوى أعمق يساعدهم في تأدية امتحاناتهم.

وقد جلب انتباهي مؤخراً أن الأطباء خريجي الكليات الطبية التي تعلّم بالعربية أحرزوا نتائج أفضل من الكثير من زملائهم الذين تعلموا علومهم بغير العربية في امتحانات الدراسات العليا في الغرب لعمق فهمهم لمعلوماتهم الطبية.

وبعد كل هذا فلماذا نعلم علومنا الطبية بغير لغتنا ولماذا لا نعلمها بلغتنا العربية القوية لغة الآباء والأجداد واللغة التي درجنا عليها؟

وقد قام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مشكوراً وعلى رأسه قادة أكفاء مؤمنون بأهمية التعليم والتعلم باللغات الوطنية، بجهود كبيرة في سبيل العمل الجاد لتحقيق ذلك فسعوا إلى إصدار الطبعة الرابعة للمعجم الطبي الموحد (التي تضم قرابة حوالي 150 ألف مصطلح)، والعديد من المعاجم التخصصية، والكتب الطبية الدراسية والمرجعية، وكل ذلك إيماناً منهم بأن هذا سيرفع المستوى الصحي في المنطقة.

ولما كان المعجم الطبي الموحد في وضعه الراهن يقدم المصطلحات الأجنبية ومقابلاتها العربية مجردة عن أي شرح أو تعريف، فقد لوحظ بأن ذلك لا يكفي أحياناً بل يحتاج المصطلح أيضاً إلى شرح وافٍ ودقيق لإيضاح مدلوله العلمي الخاص واستعمالاته المتعددة أحياناً في الفروع العلمية المختلفة. والنية أن تعمل المنظمة في المستقبل القريب على إضافة شرح بسيط لكل مصطلح ليدل على معانيه المختلفة كخواصه التشريحية أو الوظيفية أو المرضية أو العلاجية أو غير ذلك.

والجهاز العصبي أوسع أجهزة الجسم كافة ولقد لاحظت خلال عملي في تعليم وظائفه أن مصطلحاته معقدة ويستعمل الكثير منها بمعانٍ غير دقيقة شائعة فتستعمل كلمة cerebrum مثلاً أحياناً للدلالة على الدماغ كله وأحياناً أخرى على المخ فقط وهناك اختلاف كبير بين المعنيين فلا بد من شرح كل ذلك وتوضيحه. كما أن مصطلحات هذا الجهاز كثيرة جداً وللكتّيب منها مقابلات متعددة ترد في مواضيع متفرقة مثل استعمال «البصلة» أو «المنخ» أو «النخاع المستطيل» مقابل medulla oblongata فلا بد من استعمال مقابل واحد يوحدنا ويحتاج كل ذلك لشرح بسيط لها. وعسى أن يساعد هذا المعجم في ذلك وأن يقرّبنا من هدفنا في تعريب التعليم الطبي.

وهذا المعجم الذي بين يديك هو واحد من سلسلة المعاجم التخصصية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وقد استعملت في تأليفه مصطلحات المعجم الطبي الموحد فقط، وبهذا نكون قد خطونا خطوة أخرى نحو تعريب التعليم الطبي في بلداننا العربية. وبهذه الجهود الخيرة للمنظمة التي وفرت المصطلح والكتب الدراسية والمرجعية، نكون قد اقتربنا من هدفنا الخير هذا، فعسى أن يوفقنا الله ويهدينا إلى ذلك مع بداية القرن القادم.

وفي الختام لا بد لي من تقديم أخلص آيات الشكر إلى معالي الدكتور حسين الجزائري لاهتمامه المتواصل بمشاريع التعريب وتشجيعه الدائم للعاملين في حقله. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور محمد هيثم الخياط لإرشاداته الدائمة ولملاحظاته القيمة ومتابعاته المستمرة للجهود المبذولة في هذا الحقل. مع أخلص الشكر والتقدير لكافة الإخوة الذين ساعدوا في إخراج هذا المعجم. والله ولي التوفيق.

**صادق الهلالي**

## مقدمة الناشر

المعاجم العلمية والتكنولوجية من مقتضيات العصر الحديث. الدافع الأساسي لها هو الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا. المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها. فقد زادت العلوم اتساعاً وتخصصاً وتشابكاً حتى بات من الصعب تصنيفها جميعها في معجم «شامل» واحد، لا بد أن ينطوي تبويبه على تحدٍّ كبير، ولا بد أن يكون من الضخامة بحيث يرهق مستخدميه من طلاب وأساتذة وكافة المشتغلين بالعلم.

لذلك عمد قسم المعاجم في «أكاديمية» - بعد دراسة متأنية لحاجات المشتغلين بالعلم في الوطن العربي - إلى وضع خطة لإصدار سلسلة من «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» تقوم على الأسس التالية.

1 - إصدار حوالي 24 معجماً متخصصاً في كافة العلوم، النظرية والتطبيقية، المتفرعة من العلوم الأساسية: الرياضية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والهندسية.

2 - أن يضم كل معجم من هذه المعاجم بضعة آلاف مصطلح تشكّل الجسم الأساسي للغة التخصص العلمي الذي يغطيه المعجم، ويُجمع عليها أهل الاختصاص فيه، وتستوفي شروط التمايز قدر الإمكان، مع تعريف علمي دقيق وموجز لكل مصطلح.

3 - أن تكون هذه المعاجم بالإنكليزية والفرنسية والعربية ما أمكن ذلك، وذلك وفقاً لمتطلبات برامج التعليم وحاجات التصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي. وأن يضاف إلى كل معجم مسردان [كشافان]: فرنسي - إنكليزي، وعربي - إنكليزي.

4 - أن تكون هذه المعاجم مراجع غنية بشتى فروع العلوم الحديثة، كل في مجال تخصصه.

5 - التقيد ما أمكن بالمصطلحات التي أقرتها مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية، ومراعاة ما رشحته مؤتمرات التعريب واللجان المتخصصة في العلوم المختلفة.

انطلاقاً من ذلك جاءت سلسلة «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» فريدة من نوعها وتضمنت أحدث المصطلحات المستخدمة في العلوم. وربما كان أهم ما فيها أنها تخاطب القطاع العريض من الأساتذة والطلاب والفنيين، وتستجيب لأهمية العلم والتكنولوجيا في العصر الحديث، وتعتبر مصدراً للمعلومات التي تهمهم، وعوناً لهم لفهم المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

وهذا المعجم هو ثمرة من ثمار التعاون بين أكاديمية انترناشيونال والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تضاف إلى سلسلة الكتاب الطبي الجامعي التي تضم: «المرجع في الفيزيولوجيا الطبية»، «الغذاء والتغذية»، «وطب المجتمع»، «وأساسيات الباثيات»، «والتعليم من أجل تعلم أفضل»، «والمارشِد في الطب النفسي». والأمل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية العلم والمعرفة في وطننا العربي المتطلع إلى موطىء قدم في عصر تحديات العلم والتكنولوجيا.

وقد قام السيد محمد حسان ملص بالتحضير العلمي لهذا المعجم وتصحيحه وتنسيق جميع مداخله، ثم قام السيد الدكتور محمد دبس بالإشراف على هذا المعجم ومراجعته مراجعة شاملة من الوجهتين العلمية واللغوية.



## كيفية استخدام المعجم

1 - رُتبت مداخل هذا المعجم حسب الترتيب الأبجائي الإنكليزي للمداخل البسيطة. أي المؤلفة من كلمة واحدة. وإذا كان المدخل مركباً، أي مكوناً من كلمتين أو أكثر، اعتبر مدخلاً فرعياً ووضع تحت الكلمة الأساسية مسبقاً بشرطة وبحرف أصغر من حجم حرف المدخل الأساسي. واقتصرت الكلمة الأساسية على الحرف الأول، مثل:

غِيَاب، غَيْبُوبَةٌ. فقدان الوعي لفترة **absence**  
قصيرة كما يحدث في نوبة الصرع الصغير.

غِيَاب سَلْسِي. نوبة صرع صغير **a. enuretic** -  
يرافقها سلس البول وفقدان الوعي.

غِيَاب رَمَعِي عَضَلِي. نوبة صرع **a. myoclonic** -  
صغير تترافق مع رَمَعٍ عضلي بالجانبين وفقدان الوعي.

وإذا اجتمع تحت الكلمة الأساسية غير مدخل فرعي واحد، رُتبت تلك المداخل بترتيب الفبائي وفقاً للكلمة الأولى.

- 2 - في بعض المداخل، كتبت المرادافات بين هلالين بعد المدخل ووضعت أمامها علامة «يساوي».
- 3 - إذا كان المدخل مركباً ووجدت فاصلة بين الكلمتين، تكون الكلمة الأساسية مقدمة على الصفة ويقراً على أساس أن الصفة تسبق الموصوف.
- 4 - وإذا كان للمدخل الإنكليزي غير معنى واحد، أعطي لكن معنى رقم متسلسل.
- 5 - **الإحالات:** تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرف في مكان آخر.
- 6 - **الأشكال والصور:** ورد في المعجم عدد من الرسوم والصور التي تكمل التعريفات وتوضحها.
- 7 - أضيف إلى المعجم مسرد عربي - إنكليزي مرتب وفقاً لحروف الهجاء العربي. وقد أهملت في هذا الترتيب لام التعريف وعُدّت الهمزة ألفاً كيفما وردت في الكلمة.

# A

- abalienation** 1. خُبال 2. شذوذ عقلي.
1. فقدان أو نقصان القوى العقلية 2. أي شذوذ عقلي.
- abaptiston** متعذب لا مختبر. متعذب الحقائق.
- الذي لا ينفذ إلى الدماغ عند ثقب الحف بغيره.
- abarognosis (= baragnosis)** غفلة الوزن.
- فقدان حس الوزن.
- abasia** تعذر المشي. عدم المقدرة على المشي أو الخطو.
- تعذر المشي (astasia-abasia) = a. astasia
- والوقوف. نه توارس.
- a. atactica** تعذر المشي الزنجي. حالة من تعذر المشي.
- choreic a.** تعذر المشي الرقصي. حالة من تعذر المشي.
- paralytic a.** تعذر المشي الشللي. حالة من تعذر المشي.
- paroxysmal a. (= trepidant a., = spastic a.)** تعذر المشي التشنجي. حالة من تعذر المشي.
- spastic a.** تعذر المشي التشنجي. حالة من تعذر المشي.
- trembling a.** تعذر المشي الارتعاشي. حالة من تعذر المشي.
- a. trepidans** تعذر المشي الارتعاشي. حالة من تعذر المشي.
- abasic** متعلق بتعذر المشي. يتصف بتعذر المشي أو متعلق به، أو يعاني من صعوبة المشي.
- abatement** خفّة الأعراض. نقصان حدة الألم.
- abatic** مصاب بتعذر المشي.
- abasia, trembling** تعذر المشي.
- abdomen** بطن. قسم الجسم الذي يقع بين الصدر والخصر.
- abdominal** بطني. متعلق بالبطن.
- abducens** مُبْعِد. ما يبعد الجزء عن العضو أو عن الجسم.
- nervous a.** تنبيهه إلى إبعاد المقلّة.
- a. oculi** مُبْعِدَةُ الْمُقْلَةِ. اسم قديم للعضلة مبعدة المقلّة عن وضعها المركزي.
- abductor** المُبْعِدَةُ. العضلة المبعدة للمقلّة.
- abepithymia** شلل الضفيرة الشمسية.
- aberrant** زائغ. منحرف عن موقعه أو منجول.
- a. root** جذر زائغ. جذر نخاعي منحرف عن موضعه.
- aberration** زَيْغ. 1. انحراف عن الموقع أو المجري أو الحالة الطبيعية 2. انكسار الضوء غير المتساوي عند مروره خلال العدسة فيولد صورة بصرية مشوهة.
- chromatic a.** زَيْغ لَوْنِي. تفاوت انكسار الموجات الضوئية المختلفة عند مرورها خلال العدسة فتولد حالات ملونة على حواف الصورة المولدة.
- chromosome a.** زَيْغ صِبْغِي. شذوذ في عدد أو بنيات الصبغيات مما يولد تشوهاً خلقياً في الجنين.

تأويله هو أن

- emotional a. زَنَعٌ عَاطِفِيّ. شذوذ الانفعالات  
ال عاطفية. **سوزة** **تحويمو**

- mental a. زَنَعٌ نَفْسِيّ. انحراف مرضي لإحدى  
الفعاليات النفسية للمصاب، وعادة ما يطلق على  
انحراف فعالية واحدة لدى شخص غير مصاب بغيرها.

abeyance تعلّق. توقّف أحد أعمال أو  
وظائف الجسم الطبيعية. **بەگەستەن، پراگرتەن**

abient مُجْتَنِبُ الْمُتَبَيّن. ما يتحرك مبتعداً عن  
مصدر التنبيه. **دوو پەر رتزی، گادار کردو،**

abirritant مُلَطِّفُ التَّهَيُّج: تَلطِيف. عامل أو  
دواء يزيل تهيج المصاب أو يقلله **دەروەنەکانە کە تەبەج ناکرێت، دەو**

ablatio retinae انفصال الشبكية. **تۆرە جیا یووێو**

ablepharia إخفاء العين: انعدام الجفن.  
انظر cryptophthalmos. **بەتەبەتەو ریتە**

ablutomania هوس الغسل. هوس وسواسي  
بالغسل والاستحمام، وهو عرض في الاختلال  
الهوسي القسري. **شور و شەقە و تۆوانە**

abnormal الوظيفة أو البنية أو الشكل أو الموقع أو السلوك أو  
القواعد الطبيعية. **نا ئاسایی**

abnormality 1. شذوذ. 2. تشوّه. الحالة أو  
الشكل غير السويّ. **نا ئاسایی**

aboulia فقد الإرادة. انظر abulia. **بەتە سەرتە**

abreaction تنفيس. التعبير عن تجربة  
سابقة بعد التحرّر من بعض العواطف المكبوتة  
المرافقة لها والتي منعت إظهارها

- motor a. تنفيس حركي. التعبير عن التجربة  
المكبوتة بفعل حركي أو تعبير عضلي. **فەشکەرە نوێ،**

abscess خُراج. (ج. خُرَاجَات). تجمّع موضعي  
لمواد قيحية تتولد من تقيح في داخل أحد الأنسجة  
أو الأعضاء أو حيز محدود في الجسم.

- brain a. خُراج الدماغ. خراج يتولد في الدماغ.  
يمتد إليه من عدوى في منطقة مجاورة (كالتهاب الأذن  
الوسطى) أو عن طريق الدم.

- cerebral a. خُراج المخ. خراج دماغي يتوضع  
في المخ. **مەشکەرە دوو**

- epidural a. خُراج خَارِجِ الجَافِيّة. انظر  
abscess, extradural. **دوو لى سەرتۆرە پەرە**

- extradural a. خُراج خَارِجِ الجَافِيّة. خراج  
في الرأس يتوضع بين الجافية وعظم القحف. **دوو لى سەرتۆرە**

- intracranial a. خُراج دَاخِلِ القُحْف. خراج  
دماغي. **دوو لى نێو کاسە سە**

- intradural a. خُراج دَاخِلِ الجَافِيّة. خراج  
يتوضع بين طبقات الجافية. **دوو لى نێو تۆرە پەرە**

- intramedullary spinal a. خُراج دَاخِلِ النُخاع. خراج  
يتوضع داخل النخاع الشوكي. **دوو لى نێو مەدەلە**

- subdural a. خُراج تَحْتَ الجَافِيّة. خراج دماغي  
يتوضع تحت الجافية مباشرة. **دوو لى تۆرە پەرە**

- subtentorial a. خُراج تَحْتَ الخِيَمَة. خراج  
دماغي يتوضع تحت الخيمة مباشرة. **دوو لى بێخادری،**

- supratentorial a. خُراج فَوْقِ الخِيَمَة. خراج  
دماغي يتوضع فوق الخيمة مباشرة. **دوو لى سەرتۆرە**

absence غِيَاب. غَيْبُوبَة. فقدان الوعي لفترة  
قصيرة كما يحدث في نوبة الصرع الصغير. **تاوان بەهۆر، پورە**

- enuretic a. غِيَاب سَلْسِيّ. نوبة صرع صغير  
يرافقها سلس البول وفقدان الوعي. **پورە نوێ، مەزە خۆر**

- myoclonic a. غِيَاب رَمْعِيّ عَضَلِيّ. نوبة صرع  
صغير تترافق مع رَمْعٍ عضلي بالجانبيين وفقدان  
الوعي. **پورە نوێ، مەزە خۆر**

- a. seizure صَرْعٌ صَغِير. نوبة صرعية تنصف  
بانقطاع مؤقت للوعي وللسلسلة تفكير المصاب  
وفعالتيه وتترافق مع موجات دلتا وسفاهة في التخطيط  
الكهربائي للدماغ. **نۆرە فەقێ، بێجۆرە**

absentia epileptica غَيْبُوبَة صَرْعِيّة. انظر  
absence. **فەقێ پورە نوێ**

absent mindedness شُرُودُ الذَّهْن. عدم  
الانتباه للظروف المحيطة أو الملابس الطارئة في  
محيط المصاب. **زەین نا ئاساوە، دەربەدەرە ئاساوە**

absolute مُطلَق. متحرر من دون حدود أو  
ارتباط. **پەرە**

- a. refractory period فَتْرَة الجَزَانِ المُطلَق. انظر  
period. **مەوێ پەرسا سە پەرە**

- a. sensory threshold عَتَبَة الحِسِّ المُطلَق. **مۆلە نوێ، پەرە**

abstinence, alimentary صِيَام. الامتناع  
عن الأكل والشرب أو الجوع أو المخمصة. **پەرە نوێ، پورە**

**abstinence syndrome** مُتَلَاَزِمَةُ الْإِمْتِنَاعِ.  
أنظر syndrome. كَوْنُ نِشَانٍ مِنْ خَوْفِ كَرْتِن

**abstract** 1. مُجَرَّد؛ تَجَرِيدِي 2. مُلَخَّص.  
1. مجرد عن كل الاعتبارات أو التقاليد 2. ملخص  
بحث علمي أو مقالة أو كتاب (دأما لين) هو حصة  
تفكير مُجَرَّد. تفكير مجرد عن  
الاعتبارات التقليدية. يكرر منه وهو دأما لين  
- a. thinking  
- a. thought  
فكرة مُجَرَّدة. فكرة مجردة عن  
الاعتبارات التقليدية. كهرزى هو حصة

**abulia** فَقْدُ الْإِرَادَةِ. فقد الإرادة على القيام  
بعمل أو اتخاذ قرار مناسب. بيزو. سلاق

**social a.** فَقْدُ الْمُبَادَرَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ. فقدان القدرة  
على المشاركة في أية مبادرة أو عمل اجتماعي كَوْنُ دَرَجَةٍ  
**acalculia** تَعَدُّرُ الْحِسَابِ. عدم المقدرة على  
القيام بالعمليات الحسابية حتى البسيطة منها. نازمير

**acanthesthesia** جَسُّ التَشْوُك. حس شاذ  
بالشعور بالوخز بألة حادة. ديكه صسن، صسيفي

**acarophobia** رُهَابُ الْحَلَم. الخوف من  
السُّوس والعث أو الأدوات المسننة أو الواخزة  
كالدبابيس والإبر. تالوشر ترسن

**acatalepsia** قَلَّةُ الْفَهْم. قلة الفهم والإدراك  
أو ضعف التفكير. كهم عتريته ريشديتي

**acatalepsy** قَلَّةُ الْفَهْم. انظر acatalepsia  
**acataleptic** 1. قَلِيلُ الْفَهْم؛ بَلِيد 2. مُتَرَدِّد؛  
مُتَشَكِّك. مَنْ يَتَّصِفُ بِقَلَّةِ الْفَهْمِ أَوْ مِنْ يَكُونُ مُتَرَدِّدًا  
فِي أَعْمَالِهِ أَوْ مُتَشَكِّكًا مِنْ نَتَائِجِهَا كهم عتريته ريشديتي

**acatamathesia** 1. عَجْزٌ لُغَوِي 2. عَجْزٌ  
إِدْرَاكِي. 1. فقدان أو ضعف في فهم أو إدراك  
معنى الكلام المسموع 2. فقدان أو ضعف  
المدركات العامة بسبب آفة مركزية كهم عتريته ريشديتي

**acataphasia** حُبْسَةُ نُطْقِيَّة. حبسة تعبيرية  
حيث لا يتمكن المصاب بها من التعبير عن أفكاره. نوزو  
شذوذ. انحراف عن ما هو سوي  
**acatastasia** وطبيعي، أو عدم انتظام الشكل أو الوظيفة. ناباو ريتو

**acatastatic** شَاذٌ. غير منتظم ومنحرف عن  
السوي. ناباو

**acathexis** فَقْدُ الْإِهْتِمَامِ؛ تَشَتَّتُ الطَّاقَةِ

الفكرية. انفصام بين الأفكار والعواطف وعدم  
الاهتمام بها.

**acathisia** قُمَاصُ؛ تَعَدُّرُ الْجُلُوسِ.  
انظر akathisia. به بيوتو. بوترسن، تالوشر ترسن

**acceleration** تَعْجِيلُ؛ تَسَارُعُ. ازدياد  
السرعة كسرعة النبض أو التنفس. تالوشر ترسن، غير

**angular a.** تَسَارُعُ زَاوِي. تسارع دوراني. كهم عتريته ريشديتي  
**linear a.** تَسَارُعُ خَطِّي. تسارع في خط مستقيم. كهم عتريته ريشديتي

**accessory** إِضَافِي؛ مُسَاعِد. عضو أو عامل  
إضافي لآخر أو مساعد أو مكمل له. يارمر تيمور

**accident** طَارِئٌ؛ حَادِثَةٌ. حادثة غير متوقعة  
أو غير مقصودة تؤدي إلى إصابة جسمية أو إلى  
الموت. بلرمز، به بيرل، يورور

**cerebrovascular a. (= stroke)** طَارِئٌ  
وعائي دِمَاعِي؛ سَكَّةٌ. اضطراب دماغي مفاجئ ينتج  
عن خلل وعائي كاحتشاء الوعاء أو عن خثار شرياني

أو وريدي أو نزف في المخ أو المخيخ أو جذع الدماغ  
أو في الحيز تحت العنكبوتية. بلرمز، يورور

**a. neurosis** عَضَابُ الطَّوَارِيءِ. عَضَابٌ يَتَلَوُّ  
الإصابة بطارئ. دهم مار سسزي به بيرل،  
تَكْنِيفُ. إحكام يناسب

**accommodation** التَغْيِيرَاتُ الطَّارِئَةُ، مثل تكيف العين للإبصار  
للمسافات المختلفة. كوكبمون

**ocular a.** تَكْنِيفُ الْعَيْنِ. تكيف العين للرؤية  
للمسافات المختلفة. كوكبمون، بوترسن، يورور

**acedia** سَوْدَاوِيَّةٌ خُمُولِيَّة. حالة الخمول  
والاكتئاب. دوشدأمانى دلتة نكيان

**acenesthesia** فَقْدُ جَسُّ الْوُجُودِ؛ فَقْدُ حَسِّ  
الراحة. عدم الشعور الطبيعي بالصحة والراحة  
والسعادة. له ريشديتي صسكرون، بوترسن، يورور

**acephalia** انْعِدَامُ الرَّاسِ. عدم وجود الرأس  
خلقياً. بوترسن، ريشديتي، بوترسن

**acephalobrachia** انْعِدَامُ الرَّاسِ وَالذَّرَاعَيْنِ.  
عدم وجود الرأس والذراعين خلقياً. نه بوترسن، يورور

**acephalobrachius** عَدِيمُ الرَّاسِ وَالذَّرَاعَيْنِ.  
مسيخ من دون رأس وذراعين. بوترسن، ريشديتي

**acephalochiria** انْعِدَامُ الرَّاسِ وَالْيَدَيْنِ.  
عدم وجود الرأس واليدين خلقياً. نه بوترسن، يورور

- acephalochirus** عَدِيمُ الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ. مسيخ من دون رأس ويدين. **acephalopodia** اِنْعِدَامُ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ. عدم وجود الرأس والقدمين خلقياً. **acephalopodius** عَدِيمُ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ. مسيخ معدوم الرأس والقدمين. **acephalus** عَدِيمُ الرَّأْسِ. مسيخ معدوم الرأس خلقياً. **acervulus** زُقْلُ الدِّمَاغِ. حُصَيَاتُ كَلْسِيَّةٍ تتولد في الأعمار المتقدمة في الجسم الصنوبري أو بالقرب منه وفي الضفيرة المشيمية وبعض الأقسام الأخرى من الدماغ. **acetylcholine** أَسِيْتِيلُ كُولِينٍ. ناقلة كيميائية كولينية الفعل تعمل كناقلة عصبية في التشابكات العصبية الذاتية (الودية واللاودية). وبعض التشابكات المركزية، وعند الموصل العصبي العضلي، وفي نهايات الأعصاب اللاودية وبعض الأعصاب الودية. **acetylcholinesterase** أَسِيْتِيلُ كُولِينِيزَازُ. أنزيم يوجد في المادة السنجابية للأنسجة العصبية وفي التشابكات الكولينية وفي كريات الدم الحمراء وفي الموصل العصبي العضلي ويعمل على تحطيم الأسيتيل كولين. **achalasia** تَعَدُّرُ الْأَرْخَاءِ. فشل ارتخاء ألياف العضلات الملساء في الجهاز الهضمي عند مصرات أقسامه المختلفة وخصوصاً المصرة المريئية المعدية عند بلع الطعام، وينتج ذلك عن تنكس العصبونات العقدية الموجودة في جدران العضو. **ache** 1. وَجَعٌ. 2. تَوَجُّعٌ. 1. ألم ثابت مستمر. 2. يعاني من ألم مستمر. **achillodynia** وَجَعُ الْغُرْقُوبِ. وجع في عرقوب القدم خصوصاً في منطقة جرابه الأمامي. **achluophobia** رُهَابُ الظَّلَامِ. خوف غير طبيعي من الظلام أو الليل. **acid taste** طَعْمٌ حَامِضٌ. مذاق المواد الحامضة التي توضع في الفم. **acinesia (= akinesia)** تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ. هَلَسٌ سَفْعِيٌّ. تولم سماع الأصوات كالرنين أو القرع. **acoasma (= acousma)** فَقْدُ حِسِّ الْعَافِيَةِ. انظر **acenesthesia** حسَّية تدور دون سق كزركون **aconative** عديم العزم. عديم الرغبة في العمل. **acorea** اِنْعِدَامُ الْحَذَقَةِ. انعدام حدة العين. **acoria** نُهَامٌ؛ تَعَدُّرُ الشَّيْعِ. نوع من النهم ينتج عن انعدام حس الشبع فيستمر المصاب بتناول الطعام ويحصل ذلك بالرغم من عدم زيادة شهيته للأكل. **acousmatamnesia** فَقْدُ ذَاكِرَةِ الْمَسْمُوعَاتِ؛ نِسَاوَةٌ صَوْتِيَّةٌ. فشل الشخص في تذكر الأصوات. **acoustic** صَوْتِيٌّ. نسبة للصوت أو متعلق به. **acousticophobia** رُهَابُ الصَّوْتِ. الخوف من سماع الأصوات. **acquired** مُكْتَسَبٌ. ما يكتسب من المحيط وهو غير الذي يكتسب بالوراثة. **acrasia** تَعَدُّرُ ضَبْطِ النَّفْسِ. عدم المقدرة على السيطرة على النفس. **acroagnosis (= acragnosis, = acroagnosia)** غَمَّةُ الْأَطْرَافِ. عدم إدراك حس الأطراف. **acroanesthesia** خَذَرُ الْأَطْرَافِ. فقدان الحس بالأطراف. **acrocephalia** تَسَنُّمُ الرَّأْسِ. انظر **oxycephaly**. **acrocephalic** مُسَنَّمُ الرَّأْسِ. انظر **oxycephalic**. **acrocephalography** تَصَوِيرُ سِنَامِ الرَّأْسِ. تصوير القسم العلوي من الرأس. **acrocephalosyndactyly** تَسَنُّمُ الرَّأْسِ وَارْتِفَاقُ الْأَصَابِعِ. تشوه خلقي يتصف بتضيق الرأس ويزداد قمته للأعلى وارتفاع الأصابع. **acrocephalous** مُسَنَّمُ الرَّأْسِ. انظر **oxycephalic**.

**acrocephaly (= oxycephaly)** تَسَنُّمُ  
الرَّاس.

**acrocinesis** فَرْطُ الْحَرَكَةِ. فرط حركة  
أقسام الجسم.

**acrocinetic** مُفْرِطُ الْحَرَكَةِ. مصاب بفرط  
الحركة.

**acrocontracture** تَقَفُّعُ الطَّرَف. تقفع  
عضلات اليد أو القدم ومقاومتها للتمديد.

**acrodynia** وَجَعُ النِّهَائِيَّات. مرض يصيب  
الأطفال ويتصف بألم وتورم أصابع اليدين  
والقدمين مع احمرارها.

**acroesthesia** 1. تَحَسُّاسُ الْأَطْرَاف 2. أَلَمُ  
الأطراف. 1. فرط تحسس الأطراف. 2. وجع في  
الأطراف.

**acrognosis** مَعْرِفَةُ الْأَطْرَاف. إدراك وجود  
الأطراف ومعرفة أقسامها وعلاقات بعضها ببعض.

**acrognesis** مَعْرِفَةُ الْأَطْرَاف.  
انظر acrognesis.

**acrokinesia** فَرْطُ الْحَرَكَةِ. أنظر  
acrocinesis.

**acromegaly** ضَخَامَةُ النِّهَائِيَّات؛ عَرُظْلَةٌ.  
مرض ينتج عن فرط إنتاج النخامي لهرمون النمو  
فيسبب ضخامة نهايات الجسم كأصابع اليدين  
والقدمين والأنف والأذن والفك السفلي.

**acromion** الْأَخْرَم. امتداد شوكة عظم  
الكتف حتى مفصل المنكب مكوّنة أعلى نقطة في  
المنكب.

**acromyotonia** تَقَفُّعُ نِهَايَاتِ الْأَطْرَاف.  
توتر عضلات اليدين والقدمين مما يولد فيها تشوهاً  
تشنجياً لعدم إمكان تمديددها.

**acromyotonus (= acromyotonia)** تَقَفُّعُ  
نِهَايَاتِ الْأَطْرَاف.

**acroneurosis** عُصَابُ الْأَطْرَاف. اعتلال  
عصبي في الأطراف.

**acroparalysis** شَلْلُ الْأَطْرَاف. شلل يصيب  
الأطراف.



acromegaly

ضخامة النهايات كما تظهر في مريض مصاب بضخامة الغدة  
النخامية مظهراً ضخامة الأصابع والأنف والفك السفلي.



1. مَذَلُ الْأَطْرَافِ acroparesthesia

2. تَنَمُّلُ الْأَطْرَافِ الْمُؤَلِمِ. 1. شذوذ حسي مؤلم أو محرق أو واخز في نهايات الأطراف ينتج من انضغاط الأعصاب أو التهابها 2. مرض يصيب الأطراف يتصف بنوبات تنمل أو نخز مع تشنج أقسامها وأحياناً مع ألم فيها وشحوب الجلد الذي يغطيها أو ازرقاقه.

acropathy اعتلال الأطراف. أي مرض يصيب الأطراف.

acrophobia رُهابُ المَرْتَفَعَات. الخوف من البقاء في المرتفعات كالجبال أو البنايات المرتفعة.

acrosclerosis تَصَلُّبُ النِّهَايَات. تصلب نهايات الأطراف والأصابع والرقبة والوجه.

acrostealgia التهاب نُتُوَات الْأَطْرَافِ المؤلم. ألم نتوءات عظام الأطراف الالتهابي.

acrotrophodynia وَجَعُ الْأَطْرَافِ الإِغْتِذَائِي. اضطراب تغذوي مع التهاب الأعصاب يولد إحساسات غير طبيعية في الأطراف بسبب تعرضها للبرد والرطوبة اللذين يسببان خللاً تغذوياً فيها.

1. فِعْلٌ 2. قَانُونٌ. 1. عمل يقتضي فعالية act

حركية أو بدونها 2. قانون تصدره سلطة تشريعية.

فِعْلٌ إِنْعَكَاسِيٌّ. استجابة نمطية معينة reflex a.

تتولد عن تنبيه قوس منعكسي معين بمنبه خاص ومن دون تأثير من المراكز العصبية العليا.

فِعْلٌ. القيام بوظيفة أو بتحريك الجسم action

أو أي عضو من أعضائه.

فِعْلٌ تَرَاكُمِيٌّ. فعل يزداد شدة، cumulative a.

كالذي يشاهد عند إعطاء عدة جرعات من دواء معين فيزداد تأثيره تدريجياً بسبب تراكم كميات قليلة من الجرعات الأولية من الدواء.

فِعْلٌ مُسْكَارِيْنِيٌّ. مادة أو تنبيه muscarine a.

له نفس تأثير المسكارين.


فِعْلٌ نِيْكَوْتِينِيٌّ. مادة لها نفس تأثير nicotinic a.

النيكوتين.

جُهِدُ الْفِعْلِ. الفعالية الكهربائية التي a. potential



تتولد في العصب أو العضلة عند فعاليتها ومن الممكن إثارتها بتنبيه العصب أو العضل بأي من المنبهات الوظيفية أو بمنبه كهربائي، ويتكون من الاستجابة الوظيفية والجهد السفاتي على مخطط كهربية العصب

والجهد التلوي السالب والجهد التلوي الموجب.



action potential

جهد فعل مركب لعصب جلدي في الجسم يبين ارتفاعات جهود مختلف أنواع أليافه العصبية المختلفة.



action potential

جهد الفعل. (أ) تسجيل جهد الفعل من ليف عصبي بواسطة مقياس العصب بوضع المسرى الكهربائي G1 على قسمه الفعال السليم ووضع المسرى G2 على قسمه المخرب المصاب فيولد جهد فعل أحادي الطور عند مرور نبضة زوال الاستقطاب تحت المسرى G1 المنبهة. (ب) مراحل تسجيل جهد فعل ثنائي الطور عند وضع المسرين على منطقتين سليمتين وعند تنبيه الليف العصبي بمنبه كاف.

- جَهْدُ الْفِعْلِ** - compound a. potential  
المُرْكَب. جهد الفعل الذي يسجل من مجموعة من الألياف العصبية في أحد الأعصاب أثناء فعاليته.
- جَهْدُ الْفِعْلِ ثَنَائِي** - diphasic a. potential  
الطَّوْر. جهد الفعل ثنائي الطور الذي يسجل من ليف عصبي بوضع مسارين كهربائيين على قسمين سليمين متقاربين منه عند مرور نبضة عصبية فيه.
- جَهْدُ الْفِعْلِ الْمُسْتَنَار** - evoked a. potential  
جهد الفعل الذي يتولد في العصب أو العضلة عند تنبيههما.
- جَهْدُ الْفِعْلِ** - monophasic a. potential  
أَحَادِي الطَّوْر. جهد الفعل أحادي الطور الذي يسجل من ليف عصبي بوضع مسار كهربائي على قسم سليم منه وآخر على نهايته المقطوعة عند مرور نبضة عصبية فيه.
- فِعْلٌ مُنْعَكِسٌ**؛ فِعْلٌ اِنْعِكَاسِيّ. - reflex a.  
استجابة تنتج من مرور جهد الإثارة من المستقبل إلى العضلة أو الغدة خلال سلسلة عصبية وعادة خلال الجهاز العصبي المركزي ومن دون ضرورة للإرادة في توليدها.
- فِعْلٌ مُؤَلَّدٌ لِلْحَرَارَةِ**. فعل - thermogenic a.  
الغذاء أو الدواء الذي يحفز توليد الحرارة في الجسم أو يرفع درجتها فيه.
- رُعَاشُ الْحَرَكَةِ**. - a. tremor (= kinetic tremor)  
انظر tremor.
- فِعْلُ الزِّنَاد**. فعل يطلق طاقة في الجسم - trigger a.  
لا علاقة لها بالعملية التي حفزت توليدها فيه.
- نَشِطٌ**. ما يحفز الفعل أو ينشطه. - activate
- تَفْعِيلٌ**؛ تَنْشِيطٌ. عملية تحفيز - activation  
الفعل أو تنشيطه.
- مُنَشِطٌ**. عامل يحفز الفعل - activator  
أو ينشطه.
- 1. فَاعِلٌ؛ فَعَالٌ 2. نَشِيطٌ**. ما - active  
يتصف بالفعالية والنشاط وهو عكس المنفعل.
- تَعْبِيرٌ فَعَالٌ**. تعبير إرادي - a. expression  
يظهر لدى الشخص نتيجة فعاليته، أو تعبير يرافق بعض الفعاليات الجسمية.
- حَرَكَةٌ نَشِيطَةٌ**. انظر movement. - a. movement
- عُصَابٌ حَقِيقِيّ**. - actual neurosis  
انظر neurosis.
- اِبْرِيّ**. (سابقة). - acu-
- حُبْسَةٌ عِبَارِيَّة**. انظر aphasia. - aculalia (= syntactical aphasia)
- الْوَحْزُ الْإِبْرِيّ**. أسلوب علاجي - acupuncture  
صيني تفرز فيه إبر في مواضع معينة من سطح الجسم لأغراض علاجية أو لإزالة الألم أو للتخدير الجراحي الموضعي.
- حَادٌ**. مرض أو اعتلال شديد يبدأ - acute  
سريعاً ويدوم لفترة قصيرة نسبياً.
- تَلَاوُمٌ**. 1. تكيف الكائن الحي - adaptation  
للتغيرات التي تطرأ في محيطه 2. تناقص الدفعات العصبية التي يولدها العصبون أو المستقبل عند استمرار تنبيههما.
- تَلَاوُمٌ سَمْعِيّ**. تناقص حدة - auditory a.  
السمع عند استمرار المنبه السمعي.
- تَلَاوُمٌ لَوْنِيّ**. تساؤل شدة لون - color a.  
المرئيات عند استمرار النظر إليها.
- التَلَاوُمُ لِلْظَّلَام**. تلاؤم العين للإبصار - dark a.  
في الظلام.
- التَلَاوُمُ لِلضَّوْء**. تلاؤم العين للإبصار - light a.  
في الضوء الشديد أو لضوء الشمس.
- تَلَاوُمُ الشَّبَكِيَّة**. تلاؤم مستقبلات - retinal a.  
الشبكية لمختلف شدات الضوء.
- مُدْمِنٌ**. شخص اعتاد تناول المخدرات - addict  
أو الكحول أو العقاقير ولا يمكنه الامتناع عن استعمالها لأسباب فيزيولوجية أو نفسية.
- إِدْمَانٌ**. حالة التعود على استعمال - addiction  
المخدرات أو العقاقير وصعوبة الانقطاع عنها.
- إِدْمَانُ الْكُحُول**. الكحولية التي تؤدي - alcohol a.  
إلى زيادة تحمل المصاب للكحول وظهور الأعراض الخاصة عند الانقطاع عنه.
- إِدْمَانُ الْأَدْوِيَّة**. حالة التعود والاعتماد على - drug a.  
استعمال العقار للحد الذي يزيد من تحمله له وظهور أعراض عضوية أو نفسية شديدة عند الانقطاع عنه.
- الْإِدِيسُونِيَّة**. مجموعة أعراض - addisonism  
وعلامات تترافق مع داء السل تتصف بانصباب

الجلد والضعف وهي حالة تشابه مرض أديسون.

**ademanian** اِكْتِنَابٌ هَيَاجِيّ. انظر depression, agitated.

**adenalgia (= adenodynia)** ألمُ الغُدّة. ألم في إحدى الغدد.

**adenohypophysis** النُخَامِي الغُدِّيّة. النخامى الأمامية وهي القسم الأمامي للغدة النخامية.

**adenoma** وَرَمٌ غُدِّيّ. ورم حميد، له شكل غدي، يتكون من الظهارة الغدية أو من خلايا غدية أساسية.

**adenosine** اِدِينُوزِين. نوويد دوري يعمل كناقل وسيط داخل الخلايا لعمل العديد من الهرمونات المولدة من الببتيدات أو الحموض الامينية مثل الكاتيكولامين.

**adequate stimulus** مُنبَئَةٌ وَافٍ. منه كافٍ لتوليد استجابة العضو أو المستقبل.

**adhesio interthalamica** اِلْتِصَاقُهُ بَيْنَ المِهَادَيْنِ. كتلة من المادة السنجابية تربط المهادين عبر الخط الوسطي للبطين الثالث.

**adiadochocinesia** تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ. انظر adiadochokinesia.

**adiadochocinesis** تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ. انظر adiadochokinesia.

**adiadochokinesia** تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ. عدم المقدرة على القيام بحركات تناوبية سريعة.

**adiadochokinesis** تَعَدُّرُ تَنَاقُوبِ الحَرَكَاتِ. انظر adiadochokinesia.

**adiaphoria** تَعَدُّرُ الاستجابة. عدم الاستجابة للمنبه بسبب التعرض السابق لمنبهات مماثلة.

**adient** مُنَاحِي المُنْبَهِ؛ مُتَجَذِبٌ لِلْمُنْبَهِ. منجذب نحو مصدر التنبيه.

**adiposalgia** أَلَمٌ شَحْمِيّ. حالة اعتلال عصبي تتصف بانتشار مناطق مؤلمة تحت الجلد.

**adiposis (= obesity)** سَمَنَةٌ؛ شَحَامَةٌ. زيادة وزن الجسم بسبب تراكم الشحم فيه أكثر من حاجة الجسم أو أكثر مما يتحمّله هيكله العظمي.

**a. cerebrealis (= cerebral adiposity)** شَحَامَةٌ مُخَيَّة.

**a. dolorosa** شَحَامَةٌ مُؤَلِمَةٌ. مرض يتصف بتراكم كتل شحمية موضعية مؤلمة مع آفات عصبية، وغالباً ما يصيب النساء ويؤدي إلى الموت.

**adiposity (= adiposis, obesity)** سَمَنَةٌ؛ شَحَامَةٌ.

**cerebral a.** الشَحَامَةُ المُخَيَّةُ المنشأ. شحامة جسمية بسبب داء مخي كالإصابة بآفة في الوطاء، مثل الحثل الشحامي أو التناسلي.

**pituitary a.** الشَحَامَةُ النُخَامِيَّةُ المنشأ. شحامة عامة كان يعتقد بأنها تتولد عن عدم كفاءة النخامى ولكن المعروف حالياً أنها تتسبب عن داء في الدماغ المتوسط.

**adiposogenital syndrome** المُتَلَازِمَةُ الشَحَامِيَّةُ التَّنَاسِلِيَّةُ. انظر syndrome.

**adjustment** إِحْكَامٌ؛ تَعْدِيلٌ. 1. عملية تحويل شكل جزء أو بعض منه استجابة للتغيرات التي تحدث في محيطه. 2. عملية تكيف الشخص لاحتياجاته حسب ظروف محيطه.

**adolescence** يَفَعٌ؛ مُرَافَقَةٌ. فترة حياة الشخص التي تبدأ منذ ظهور الخواص الجنسية الثانوية والتي تدوم حتى تكامل نموه الجسمي، وهي تمتد عادة بين سن 11-19 سنة من العمر.

**adolescent** يَافِعٌ؛ مُرَافِقٌ. فرد في سن المراهقة.

**adrenaline** أَدْرِينَالِين. انظر epinephrine.

**adrenergic** أَدْرِينَالِينِيّ الفِعْل. 1. عضو أو نسيج ينشط أو ينبّه بالأدرينالين أو يولده ويفرزّه. 2. عامل أو مادة تعمل عمل الأدرينالين (الأبينيفرين).

**adrenin, adrenine (= adrenaline)** أَدْرِينَالِين.

**adrenoceptor** مُسْتَقْبِلَةٌ أَدْرِينَالِينِيَّة. انظر receptor, adrenergic.

**adrenolytic** مُخَصِّرُ الأَدْرِينَالِين. مادة تثبط عمل الأعصاب الأدرينالينية الفعل أو تثبط الإستجابة للأدرينالين.

**adrenoreceptor** مُسْتَقْبَلَةُ أَدْرِينَالِينِيَّة. أنظر receptor, adrenergic.

**adversive** عَكْسِيّ الْإِتِّفَات؛ اِبْتَعَادِيّ الْقُدُور. يتصف بدوران الرأس والعينين إلى الجهة المعاكسة للإصابة المخية المهيّجة للمنطقة الحركية البصرية (8).

**adynamia (= asthenia)** وَهْن. نقص أو فقدان الفعالية الحيوية.

**a. episodica hereditaria (= periodic paralysis)** وَهْن وِرَاثِيّ نَوْبِيّ. شلل دوري.

**adynamic (= asthenic)** وَاهِن. المصاب بالوهن.

**aelurophobia** رُهابُ الْهَرَّة. أنظر ailurophobia.

**aerasthenia** وَهْن الطَّيَارِين؛ عُصَابُ الطَّيَارِين. أنظر aeroasthenia.

**aeroasthenia (= aeroneurosis)** عُصَابُ الطَّيَارِين. عصاب أو وهن عصبي يصيب الطيارين عند الطيران.

**aerophagia** بَلْعُ الْهَوَاء. بلع الهواء المفرط اللاشعوري الذي يرافق القلق ويسبب انتفاخ البطن والتهوُّع مما يؤدي إلى الاعتقاد بأنه ناتج عن مرض عضوي.

**aerophagy (= aerophagia)** بَلْعُ الْهَوَاء.

**aerophobia** رُهابُ الْهَوَاء. الخوف من الريح أو نسمات الهواء العليل مع الاعتقاد بأنه قد يجلب المرض للشخص.

**affect** عَاطِفَة؛ وَجْدَان. التعبير المظهري للعاطفة والمقترن بالأفكار والانطباعات الفكرية عن الحوادث أو المنظورات.

**- blunted a.** وَجْدَانٌ بَلِيد. نقص أو انعدام العاطفة. وهو عَرَضُ عام في الفصام.

**- flat a.** وَجْدَانٌ مَكْبُوت. قلة أو انعدام التعبير عن العاطفة.

**affection** 1. عَاطِفَة؛ وَجْدَان 2. عِلَّة. 1. الشعور والحس بالعاطفة 2. عِلَّة أو مرض.

**affective** عَاطِفِيّ؛ وَجْدَانِيّ. منسوب للعاطفة أو للوجدان أو يتصف بهما.

**a. disorders** اِضْطِرَابَات وَجْدَانِيَّة. اضطرابات تتصف بخلل العاطفة أو بتغيرها وعدم انسجامها.

**- a. psychosis (= mood disorder)** دُهان عَاطِفِيّ. اضطرابات المزاج.

**- a. reaction** اِسْتِجَابَة عَاطِفِيَّة. استجابة عاطفية للمنبهات المحيطية أو الداخلية.

**- a. sensibility** تَحَسُّسٌ عَاطِفِيّ. حس عاطفي للمؤثرات الخارجية.

**- a. state** حَالَة عَاطِفِيَّة. حالة هياج عاطفي.

**affectivity** الْعَاطِفِيَّة. حالة التأثر بالمنبهات العاطفية.

**affectomotor** عَاطِفِيّ حَرَكَيّ. فرط العاطفة والحركة كما يحدث في الهوس.

**afferent** وَارِد؛ مُورِد. متجه نحو المركز أو ناقل للدفعات العصبية نحو المركز كالعصب الوارد.

**affinity** 1. شَغَف أو علاقة متأصلة 2. انجذاب نحو عضو أو مادة أو بنية معينة.

**afteraction** فِعْلٌ تَلَوِّيّ. تأثير يحدث بعد توقف المنبه المولد له.

**afterbrain** الدِّماغُ التَّالِيّ. أنظر metencephalon.

**aftercurrent** تَيَّارٌ تَلَوِّيّ. التيار الذي يتولد في العضلة أو العصب بعد توقف التيار الكهربائي المصاحب للدفعة العصبية أو الحركية.

**afterdepolarization** زَوَالُ اِسْتِقْطَاب. التَلَوِّيّ. زوال استقطاب العصب أو العضلة بعد استقطابهما أثناء مرور الدفعة العصبية أو الحركية.

**afterdischarge** تَفْرِيعٌ تَلَوِّيّ. الجزء من استجابة العصب الحسي للتنبيه الذي يستمر لفترة بعد توقف التنبيه.

**afterhyperpolarization** فَرْطُ اِسْتِقْطَاب. التَلَوِّيّ. فرط استقطاب العصب بعد مرور الدفعة العصبية خلاله والذي يتلو زوال الاستقطاب التلوي.

**afterimage** صُورَة تَلَوِّيَّة. إدراك بصري يدوم لفترة قصيرة بعد زوال المنبه الذي ولد الصورة البصرية الحقيقية الأصلية.

- **negative a.** صُوْرَةٌ تَلَوِيَّةٌ سَلْبِيَّةٌ. صورة تلوية معكوسة، إذ تدرك النقاط التي كانت مضيئة في الصورة الأصلية مظلمة والنقاط التي كانت مظلمة مضيئة.

- **positive a.** صُوْرَةٌ تَلَوِيَّةٌ مُوجِبَةٌ. صورة تلوية تشبه الصورة الحقيقية الأصلية بالوانها وإضاءتها.

**afterimpression** جِسْمٌ تَلَوِيٌّ. **afterimpression** أنظر

**afterloaded** تَلَوِيَّةُ التَّحْمِيلِ. عضلة يتولد فيها الجهد أو الشد بعد بدء تقلصها.

**afterloading** تَحْمِيلٌ تَلَوِيٌّ. حدوث الجهد أو الشد في العضلة بعد بدئها بالتقلص.

**aftermovement** حَرَكَةٌ تَلَوِيَّةٌ. تقلص عضلات الذراع اللاإرادي الذي يتلو تقلصها عند الضغط الشديد بالذراع على جسم صلب مما يؤدي إلى رفعه تلقائياً.

**afterpains** طَلْقٌ تَلَوِيٌّ. الآلام التشنجية الشديدة التي تحس بها الوالدة بعد الولادة بسبب تقلص الرحم.

**afterperception** إِدْرَاكٌ تَلَوِيٌّ. إدراك الحس الذي يُولد بعد فترة من زوال المنبه.

**afterpotential** جُهْدٌ تَلَوِيٌّ. الجهد الكهربائي الذي يسجل من العصب بعد انتهاء الجهد السفاتي.

- **negative a.** الجُهْدُ التَلَوِيُّ السَّالِبُ. **afterdepolarization** أنظر

- **positive a.** الجُهْدُ التَلَوِيُّ المُوجِبُ. **afterhyperpolarization** أنظر

**afterimpression** الجِسْمُ التَلَوِيُّ. الحس الذي يدوم لفترة بعد زوال المنبه المولد له.

**aftertaste** مَذَاقٌ تَلَوِيٌّ. تذوق يستمر لفترة بعد إزالة المادة المولدة له من الفم.

**aftervision** صُوْرَةٌ تَلَوِيَّةٌ؛ رُؤْيَةٌ تَلَوِيَّةٌ. **afterimage** أنظر

**age** 1. عُمر 2. سِنٌ. 1. مدة حياة الفرد منذ تاريخ ولادته 2. درجة أو مرحلة تطور بعض

خصائص الفرد بالنسبة إلى تطورها لدى الشخص السوي.

- **achievement a.** مَدَى إِنْجَازٍ. الغُمْرُ التَّحْصِيلِيٌّ. الطفل في تعلمه بالمقارنة مع نفس الإنجاز لطفل سوي في سن معينة.

- **emotional a.** مَدَى تَطَوُّرٍ. الغُمْرُ الْإِنْفِعَالِيٌّ. عواطف الفرد بالمقارنة مع تطورها في شخص سوي في سن معينة.

- **mental a.** الدَّرَجَاتُ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا الشَّخْصُ فِي اخْتِبَارِ الذِّكَاءِ وَتَقَاسِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْعُمُرِ الزَّمَنِيِّ لِشَخْصٍ سَوِيٍّ يَمَاطِلُهُ فِي دَرَجَةِ الذِّكَاءِ.

**agenesia** عَدَمُ التَّخَلُّقِ. أنظر **agenesis**

- **a. corticalis** عَدَمُ تَخَلُّقِ الْقَشْرَةِ. عدم تكون قشرة المخ خلقياً خصوصاً الخلايا الهرمية فيها مما يولد الشلل والعتة.

**agenesis** عَدَمُ التَّخَلُّقِ. 1. عدم تكون أحد الأعضاء خلقياً 2. العقم.

- **callosal a.** عَدَمُ تَخَلُّقِ النَّفْنِ. عدم أو نقص في تكون الجسم النقي خلقياً.

- **cerebral a.** عَدَمُ تَخَلُّقِ الْمُخِّ. أنظر **agenesia corticalis**

**agent** عَامِلٌ؛ عَمِيلٌ. أية قوة أو مادة يمكن أن تحدث تغييراً كيميائياً أو فيزيائياً أو حيوياً.

- **adrenergic blocking a.** عَامِلٌ مُحْصِرٌ لِلْأَدْرِينِيَّاتِ. مركب يحصر الاستجابة للدفعات العصبية الودية أو للمواد الأدرينالينية الفعل أو للكاتيكولامين.

- **adrenergic neuron- blocking a.** عَامِلٌ مُخْصِرٌ لِلْعَصْبُونِ الْأَدْرِينَالِينِيِّ. عامل يثبط تحرير النورادرينالين من النهايات العصبية للألياف بعد العقدية.



- **blocking a.** عَامِلٌ مُخْصِرٌ. عامل يثبط استجابات الأعضاء المستفعدة للدفعات العصبية للجهاز العصبي الذاتي ويمكن أن يكون عاملاً محصراً للفعل الأدريناليني أو محصراً للفعل الكوليني.

- **cholinergic blocking a.** عَامِلٌ مُخْصِرٌ لِلْكُولِينِيَّاتِ. عامل يحصر أو يبطل عمل الأسيتيل كولين.

- **ganglionic blocking a.** غَامِلٌ مُحَصِّرٌ عَقْدِيّ. عامل يحصر مرور الدفعات العصبية عبر التشابكات العقدية أو العصبية العضلية.
- ageusia, ageusia** اِنْعِدَامُ الذَائِقَةِ. ضعف أو غياب حس الذوق.
- aggregate** كُدَاسَةٌ. تَجَمُّعٌ كثيف ومزدحم.
- aggregation** تَكْدُّسٌ. تجمع كثيف ومزدحم.
- aggression** عُدْوَانٌ. نوع من السلوك الذي يستهدف إثبات الذات والذي يمكن أن يتولد عن دوافع ذاتية أو كرد فعل للخيبة والفشل، ويمكن أن يظهر بصورة سلوك اعتدائي تخريبي أو بصورة شعور عدواني مكبوت أو بصورة حوافز نفسية للتسلط على الآخرين.
- aggressive** عُدْوَانِيّ. شخص مصاب بالسلوك العدواني.
- **a. behavior** aggression. انظر العدوانية.
- **a. psychopath** مُعْتَلٌّ نَفْسِيّ عُدْوَانِيّ. مريض مصاب باعتلال نفسي يتصف بالسلوك العدواني.
- agitation** هَيْجَاجٌ. حالة من القلق تترافق مع اضطراب حركي.
- agitographia** كِتَابَةٌ هَزُولِيَّةٌ. سرعة الكتابة مع إسقاط بعض الحروف أو الكلمات منها من دون وعي.
- agitolalia** تَكَلُّمٌ هَزُولِيّ. انظر agitophasia.
- agitophasia** تَكَلُّمٌ هَزُولِيّ. سرعة مفردة في التكلم مع إسقاط بعض المقاطع أو الكلمات من دون وعي مما يشوه النطق.
- agnea (= agnosia)** عَمَّةُ الإِدْرَاكِ؛ عَمَّةُ المَرَثِيَّاتِ. عدم المقدرة على التعرف على الأشياء الاعتيادية المَرَثِيَّة.
- agnosia** عَمَّةٌ. عدم المقدرة على التعرف على المنبهات الحسية.
- **acoustic a. (= auditory a.)** عَمَّةٌ سَمْعِيَّةٌ. عدم المقدرة على التعرف على دلالات الكلمات أو الأصوات المسموعة.
- **apraxic a.** عَمَّةُ الأَدَاءِ؛ تَعَدُّرُ الأَدَاءِ. انظر apractognosia.
- **body image a. (= autotopagnosia)** عَمَّةُ صُورَةِ الجِسْمِ. عدم المقدرة على التعرف على مختلف أقسام الجسم أو توجيهها التوجيه الصحيح.
- **chromatic a.** عَمَّةُ الأَلْوَانِ. عدم مقدرة المصاب على التفريق بين الألوان بالرغم من رؤيتها لها جميعاً بصورة طبيعية.
- **developmental a.** عَمَّةٌ تَنْمُوِيَّةٌ. عَمَّةٌ تنموي يتصف بعدم اكتساب المصاب القدرات التي تمكنه من إدراك المنبهات الحسية وتفهمها.
- **digital a.** agnosia, finger. انظر الأصابع.
- **finger a.** عَمَّةُ الأصَابِعِ. عدم مقدرة المصاب على التعرف على أصابعه أو أصابع الآخرين.
- **a. for faces** عَمَّةُ الوُجُوهِ. انظر prosopagnosia.
- **geometrical a.** عَمَّةٌ هَنْدَسِيَّةٌ. عدم مقدرة المريض على إدراك الأبعاد الهندسية للأشياء فلا يمكنه رسمها ولا يمكنه استنساخ أو رسم الصور أو الخرائط.
- **ideational a.** عَمَّةُ إِفْتِكَارِيَّةٍ. عدم المقدرة على إدراك الأفكار والربط بينها لتكوين فكرة عامة مترابطة عن المَرَثِيَّاتِ أو المسموعات أو المقروئات.
- **localization a.** عَمَّةُ التَّوْضِيْعِ. عدم المقدرة على توضيح المَرَثِيَّاتِ في الساحة البصرية.
- **music a.** عَمَّةٌ مُوسِيقِيَّةٌ. عدم المقدرة على إدراك الأنغام والربط بينها.
- **spatial a.** عَمَّةٌ حَيَازِيَّةٌ. انظر visuospatial a.
- **symbolic visual a.** عَمَّةٌ بَصَرِيَّةٌ رَمَازِيَّةٌ. عدم المقدرة على إدراك معاني الرموز المَرَثِيَّة كرموز الحروف أو الأرقام المكتوبة.
- **tactile a.** عَمَّةٌ لَمْسِيَّةٌ. عدم المقدرة على التعرف على المراد والأشياء الاعتيادية باللمس والتحسس.
- **taste a. (= taste blindness)** عَمَّةُ التَّذَوُّقِ. عدم المقدرة على التعرف والتفريق بين الأذواق المختلفة للأطعمة والمشروبات.
- **time a.** عَمَّةُ الزَّمَنِ. عدم المقدرة على إدراك توالي الأحداث أو تسلسلها أو مددها.
- **topographical a.** عَمَّةٌ طُبُوغَرَاْفِيَّةٌ. عدم المقدرة على التعرف على الطريق حتى في المناطق الاعتيادية المعروفة.



- **visual a.** عَمَة بَصَارِي. عدم المقدرة على التعرف على الأشياء والمواد الاعتيادية بمجرد النظر إليها.
- visuospatial a.** عَمَة بَصَارِي حَيَزِي. نوع من العمه البصري لا يتمكن المصاب به من إدراك موضع جسمه أو أقسام منه أو موضع المواد والأشياء في محيطه ولا يتمكن من التفريق بين اليمين واليسار فيؤدي ذلك إلى فقدان البصر التجسيمي وطُبوغرافية المحيط.
- agnosic, agnostic** عَمَهِي. منسوب للعمه أو مصاب أو متصف به.
- agonist** نَاهِضَة. (ج: نَاهِضَات). 1. عضلة تعمل بمفردها أو بالتعاون مع أخريات لتولد حركة العضو، وعادة ما يولد تقلصها هذا ارتخاء أو انبساط العضلات الضادة 2. دواء له القدرة على تنبيه فعالية فيزيولوجية بتأثيره على المستقبلات الخلوية التي عادة ما تنبهها مواد فيزيولوجية طبيعية.
- agony** 1. أَلَم شَدِيد 2. إِخْتَصَار؛ نَزْع. 1. أَلَم أو معاناة شديدة 2. نزعات الموت
- agoraphobia** رُهَابُ السَّاح. الخوف اللامسبب من الساحات والأفضية المفتوحة وخصوصاً عند وجود المصاب فيها بمفرده فيبقى المصاب به في بيته حيث تنتابه نوبات قلق شديد بمجرد التفكير بوجوده في الساحات.
- agrammaphasia** حُبْسَة عِبَارِيَّة. انظر aphasia, syntactical.
- agrammatica (= agrammatism)** حُبْسَة نَحْوِيَّة؛ حُبْسَة لُغَوِيَّة.
- agrammatism** حُبْسَة نَحْوِيَّة؛ حُبْسَة لُغَوِيَّة. عدم المقدرة على التكلم بطريقة لغوية صحيحة بسبب آفة أو مرض دماغي.
- agrammatologia (= agrammatism)** حُبْسَة لُغَوِيَّة.
- agranular cortex** القَشْرَةُ اللَّامُحْبِبَة. انظر cortex.
- agraphia** تَعَذُّرُ الْكِتَابَة. عدم المقدرة على التعبير عن الأفكار بالكتابة بسبب آفة أو مرض في القشرة المخية.
- **absolute a.** تعذر الكتابة المطلق. عدم المقدرة حتى على كتابة حرف واحد.
- **acoustic a.** تعذر الكتابة السَّمْعِيَّة. عدم المقدرة على كتابة الكلام المسموع.
- **a. amnemonica** تعذر الكتابة الرَّاطِنَة. القدرة على كتابة الحروف والكلمات ولكن دون ترتيبها بنظام يدل على معنى أو فكرة معينة.
- **a. atactica (= absolute a.)** تعذر الكتابة المَطْلَقَة.
- **cerebral a. (= mental a.)** تعذر الكتابة المَخِيَّة.
- **jargon a. (= a. amnemonica)** تعذر الكتابة الرَّاطِنَة.
- **literal a.** تعذر الكتابة المَطْلَقَة. عدم المقدرة على كتابة الحروف اللفبائية.
- **mental a.** تعذر الكتابة العَقْلِيَّة. عدم المقدرة على وضع الجمل والمقاطع للتعبير عن الأفكار.
- **motor a.** تعذر الكتابة الحَرَكِيَّة. عدم المقدرة على الكتابة بسبب ضعف التنسيق الحركي لليد والاصابع.
- **musical a.** تعذر الكتابة المَوْسِيقِيَّة. عدم المقدرة على كتابة النغمات الموسيقية.
- **optic a.** تعذر الكتابة البَصَرِيَّة. عدم المقدرة على استنساخ الكلمات المقروءة مع عدم تأثر المقدرة على كتابة الكلمات المسموعة.
- **sensory a.** تعذر الكتابة الحِسِّيَّة. عدم المقدرة على الكتابة لعدم فهم لغة الكلمات.
- **verbal a.** تعذر الكتابة الكَلِمِيَّة. المقدرة على كتابة الحروف منفصلة ولكن دون المقدرة على ضمها لبعضها لتكوين الكلمات وكتابتها.
- agraphic** متعلِّق بتعذر الكتابة. ما ينسب إلى تعذر الكتابة أو الإصابة بها.
- agromania** هَوَسُ الْإِنْفَرَاد. هوس الانفراد والتجول في الحقول وحيداً.
- agrypnia (= insomnia)** أَرْق. عدم القدرة على النوم.
- agrypnocoma** سُبَاتٌ سَهْرِي. وَسَنٌ مع اليقظة والهديان.
- agrypnocoma** مَوْقِظ. عامل يسبب اليقظة.
- agrypnocoma** مَوْقِظ. عامل يسبب اليقظة.



#### agraphia

منظران للوجه الجانبي (ا) وللوجه الإنسي (ب) للمخّ يبينان بعض باحاته (المرقمة بأرقام باحاته التي تقوم بوظائف الكلام فيه) وتظهر فيهما الأعراض التي تتولد عند إصابة هذه المناطق أو تلفها:

تعذر الكتابة (agraphia) التلغيف أمام المركزي إلى الإمام من باحة اليد والأصابع.

تعذر القراءة (alexia) عمه الكلمات (word blindness)

صمم الكلمات (word deafness)

حبسة تعبيرية (expressive aphasia) في منطقة بروكا للكلام

**agyiophobia** رُهَابُ السَّاحِ.  
انظر agoraphobia.

**agyria** اِنْعِدَامُ التَّلَافِيفِ. سوء تكون تلافيف الدماغ وشقوقه مع صغر الدماغ.

**ahylognosia** عَمَةُ اللَّفْسِ. عدم المقدرة على معرفة تكوين المواد والأشياء باللمس.

**ahypnia (= ahypnosis)** سَهَار.

**ahypnosis** سَهَار. الأرق الشديد وعدم المقدرة على النوم.

**aichmophobia** رُهَابُ الْمُسَدَّدَاتِ. رهَابِ الأدوات والأجسام الحادة.

**aid** عَوْن. (ج: أَعْوَان). المساعدة التي توفرها أية آلة أو جهاز لتحسين أو تقويم أي من وظائف الجسم.

**- first a.** الإِسْعَافُ الْأَوَّلِي. العناية الأولية التي تقدم للمصاب في حالات الطوارئ أو الإصابات بالنباتات المرضية.

**- hearing a.** عَوْنٌ سَمْعِي. آلة تستعمل لتحسين السمع بتضخيم الصوت للأشخاص الصم.

**- speech a.** عَوْنٌ لُفْظِي. آلة أو علاج يستعمل لتقويم النطق.

**ailurophilia** هَوَسُ الْهَرَّةِ. الحب المفرط للقطط.

**ailurophobia** رُهَابُ الْهَرَّةِ. الخوف المفرط من القطط.

**air encephalography** تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الْهَوَائِيِّ. انظر encephalography.

**akatamathesia** تَعَدُّرُ الْفَهْمِ. عدم الاستطاعة على الفهم والإدراك.

**akatanoesis** تَعَدُّرُ فَهْمِ الذَّاتِ. عدم استطاعة المريض على فهم نفسه.

**akathisia (= acathisia)** 1. قُمَاصُ 2. تَعَدُّرُ الْجُلُوسِ. 1. حالة عدم استقرار حركي تدفع المريض إلى الحركة الدائمة وعدم التوقف أو الجلوس 2. عدم المقدرة على الجلوس إذ يولد ذلك قلقاً شديداً للمصاب.

**akatizia** قُمَاصُ؛ تَعَدُّرُ الْجُلُوسِ. انظر akathisia.

1. تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ: الأَلْحَرَكِيَّةُ 2. شَلْلُ الْحَرَكَةِ. 1. عدم المقدرة أو ضعف الحركة 2. شلل العضلات المؤقت الذي يولده زرق البروكاتين فيها.

تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ الْأَلْمِي. نوع من الهستيريا - a. algera يتصف بالعم عند أي حركة للجسم أو أقسامه.

تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ النَّسَاوِي. عدم الحركة بسبب عدم استعمال العضلات. - a. amnestica

تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ الْمُخِّي. عدم المقدرة على الحركة بسبب آفة مخية. - cerebral a.

تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ الْإِنْعَكَاسِي. فقدان الحركات الانعكاسية. - reflex a.

تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ النَّخَاعِي. عدم المقدرة على الحركة بسبب آفة في النخاع الشوكي. - spinal a.

تَعَدُّرُ الْحَرَكَةِ. - akinesis (= akinesia)

فقدان حس الحركة. فقدان حس وإدراك الحركات. - akinesthesia

متعلق بتعذر الحركة؛ لا حَرَكَِي. منسوب إلى تعذر الحركة أو متصف بها أو مسبب لها.

ذَاتَوِيَّةُ تَعَدُّرِ الْحَرَكَةِ. انظر autism. - a. autism

صَرَعُ تَعَدُّرِ الْحَرَكَةِ. انظر epilepsy. - a. epilepsy

صُمَاتُ تَعَدُّرِ الْحَرَكَةِ. انظر mutism. - a. mutism

النَّهْمُ؛ اللَّاشَبَعِيَّةُ. انظر acoria. - akoria

جَنَاح. بنية تشريحية شبيهة بالجنح. - ala

الجَنَاحُ الْأَبْيَضُ الْإِنْسِي. الباحة الدهليزية. - a. alba medialis (= area vestibularis)

الجَنَاحُ الْمُخَيَّي. جناح الفصيص المركزي. - a. cerebelli (= a. lobuli centralis)

الجَنَاحُ الرَّمَادِي. مثلث العصب المبهم. - a. cinerea (= trigonum nervi vagi)

أَجْنَحَةُ اللَّسَيْنِ الْمُخَيَّي. - alae lingulae cerebelli

جَنَاحُ الْفُصَيْصِ الْمَرْكَزِيِّ لِلْمُخِيخِ. الامتداد الوحشي نصف الكروي للفصيص المركزي للمخيخ. - a. lobuli centralis cerebelli

بَكَامَةُ. ضعف القدرة على النطق. - alalia

**- a. cophica (= deaf mutism)** بَكْم. عدم المقدرة على الكلام الذي يترافق مع الصمم.

**- a. physiologica (= deaf mutism)** بَكْم؛ بَكَامَةٌ فِيزِيُولُوجِيَّة.

**- a. prolongata** بَكَامَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ. تأخر مقدرة الطفل على النطق.

**alalic** أَبْكَم؛ بَكَامِي. شخص مصاب بالبكامة أو ما يتعلق بها.

**alar** جَنَاحِي. متعلق بالجنح أو شبيه به.

**alcholemla** وجود الكحول في الدم.

**alcoholic** كُحُولِي. متعلق بالكحول أو مصاب بالكحولية.

**alcoholism** الكُحُولِيَّة. اضطراب مرضي يتصف بسوء استعمال الكحول مما يولد اختلالاً اجتماعياً ومهنياً للمصاب به.

**- acute a.** الكُحُولِيَّةُ الحَادَّة. السكر الشديد الناتج عن تعاطي كميات كبيرة من الكحول فيولد اللاتناسق العضلي والتخليط العقلي.

**- chronic a.** الكُحُولِيَّةُ المُزْمِنَةُ. حالة مرضية تتولد عن تعاطي الكحول لمدة طويلة فتسبب القهم وضعف الشامية والإسهال وفقدان الوزن وتتكس الكبد واضطرابات شديدة في الجهاز العصبي.

**alcoholomania** هَوَسُ الكُحُول. الهوس المستمر في تعاطي الكحول.

**alcoholophilia** وَلَعُ الكُحُول. الهوس المستمر في الرغبة في تعاطي الكحول.

**alemmal** لَاغْمَدِي. ليف عصبي غير مغمد.

**alert** يَقِظ؛ مُنْتَبِه. متحسس للمتغيرات في المحيط.

**alertness** يَقِظَةٌ؛ اِنْتِبَاه. التحسس بالمتغيرات في المحيط.

**alethia** عَدَمُ النِّسْيَان. عدم نسيان بعض الحوادث أو الذكريات بالرغم من رغبة الشخص في نسيانها.

**alexia (= word blindness)** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ؛ حُبْسَةُ الْقِرَاءَةِ. نوع من الحبسة التي تتصف بعدم المقدرة على قراءة الكلمات المكتوبة بسبب آفة مخية.

**- agnostic a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الْعَمَهِي. لا قرائية تتسبب عن عدم مقدرة المصاب على فهم معاني الكلمات المكتوبة أو المطبوعة أو الرموز.

**- aphasic a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الْحُبْسِي. لا قرائية تتصف بمقدرة المريض على قراءة الكلمات ولكن من دون إدراك أو فهم معانيها.

**- cortical a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الْقَشْرِي. نوع من الحبسة الحسية التي تنتج عن آفة في التلفيف الزاوي الأيسر.

**- motor a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الْحَرَكي. لا قرائية تتصف بقابلية المريض على فهم الكلمات المكتوبة أو المطبوعة ولكن من دون المقدرة على قراءتها بصوت عالٍ.

**- musical a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الْمُوسِيقِي. عدم المقدرة على قراءة النغمات الموسيقية.

**- occipital a. (= word blindness)** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الْقَذَالِي. اللا قرائية القذالية.

**- optic a. (= word blindness)** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ؛ عَمَى الْقِرَاءَةِ. اللا قرائية البصرية.

**- semantic a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ الدَّلَالِي. اللا قرائية التي يتمكن المصاب بها من القراءة بصوت عالٍ من دون أن يفهم دلالة الكلمات التي يقرأها.

**- sensory a. (= word blindness)** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ؛ عَمَى الْقِرَاءَةِ. اللا قرائية الحسية.

**- subcortical a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ تَحْتَ الْقَشْرِيَّة. اللا قرائية التي تتولد عن انقطاع الاتصال بين المراكز البصرية والتلفيف الزاوي للمخ.

**- tactile a.** تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ اللمسي. عدم مقدرة الأعمى على قراءة كتابة بريل.

**alexia** متعلِّقٌ بِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ. متعلق أو مصاب باللا قرائية.

**alexithymia** تَعَذُّرُ التَّغْيِيرِ العاطفي. عدم مقدرة الشخص عن التعبير عن عواطفه بالكلام.

**alganesthesia** تَسْكِين. أنظر analgesia.

**algesia (= hyperesthesia)** تَأَلْم؛ فَرْطُ حِسِّ الأَلْم. تحسس ألمي مفرط.

**algesic** مُؤَلِم.

**algesichronometer** مِقْيَاسُ زَمَنِ التَّأَلْم.

آلة تستعمل لقياس الزمن اللازم لإدراك حس الألم بعد التنبيه. ويسمى أيضاً مقياسية الألم.

**algesimeter** مقياس الألم. آلة تستعمل لقياس درجة الحساسية للألم الذي يولده وخز بأبرة حادة.

**algesimetry** قياس الألم. قياس الألم بمقياس الألم.

**algesiogenic** مؤلم؛ مؤلّد الألم. عامل يولد الألم.

**algesiometer** مقياس الألم. أنظر algesimeter.

**algesthesia** حس الألم؛ الألم. أنظر sensation, pain.

**algesthesis** حس الألم؛ إدراك حس الألم. أنظر algesthesia.

**algetic** مؤلم. ما يولد حس الألم.

**algiomotor** حركي ألمي. ما يولد حركة مؤلمة مثل التشنج العضلي.

**algiomuscular** عضلي ألمي. ما يولد حركة عضلية مؤلمة.

**algiovascular** وعائي ألمي. فعل وعائي يتولد عن تنبيه مؤلم.

**algoceptor** مستقبل الألم.

**algogenesis (= algogenesis)** توليد الألم؛ إيلاّم. عملية توليد الألم.

**algolagnia** شبق ألمي. اضطراب جنسي نفسي يتصف بالتلذذ بالألم أو بإحداث الألم النفسي أو الجسدي للشريك الجنسي.

**- active a.** السادية. أنظر sadism.

**- passive a.** المازوخية. أنظر masochism.

**algology** علم الألم. العلم الذي يبحث موضوع الألم.

**algometer (= algesiometer)** مقياس الألم. مقياس الألم.

**algophilia (= masochism)** المازوخية. ولع الألم.

**algophily (= algophilia)** المازوخية.

**algophobia** رهَابُ الألم. الخوف المبالغ من الألم.

**algopsychalia (= psychalgia)** ألم نفسي. ألم في الرأس عادة يدرك بأنه ألم عاطفي المنشأ والذي يترافق مع أفكار مؤلمة ووساوس أو أهلاس. وعادة ما يوصف بأنه ألم نفساني المنشأ أو هستيري.

**algospasm** تشنّج مؤلم. تشنّج عضلي مؤلم.

**alienation** تغرّب؛ غربة. 1. التغرّب عن المجتمع وشعور المصاب بأنه غريب عنه ومنبوذ منه. 2. التغرّب عن الذات وفقدان الهوية الشخصية لها. 3. انفصام العواطف عن الشعور والأفكار الذاتية للمصاب.

**- mental a.** شدوّذ عقلي. أي نوع من أنواع الشذوذ العقلي.

**aliquorrhea (= hypoliquorrhea)** قلة السائل الدماغي النخاعي. النقص المزمن للسائل الدماغي النخاعي.

**allachesthesia (= allesthesia)** حسّ نازح.

**allele** الليل. الشكل البديل للجين الذي يمكن أن يحتل موقعا معينا في الصبغي. ويوجد في صبغيات الإنسان الضعفانية أليلان واحد من كل منهما على أحد الصبغيين الضعفانيين.

**allergen** مُستأرج. مادة مستضدية تتمكن من توليد نوع مباشر من فرط الحساسية أو الأرجية.

**allergic** أرجي. متعلق بالأرجية أو مؤلّد عنها أو مصاب بها أو ذات طبيعة أرجية.

**allergy** أرجية. حالة فرط الحساسية المستحثة بالتعرض للمستضد (الأرج) مما يولد استجابة مناعية ضارة عند التعرض لها في مرات لاحقة.

**allesthesia** حسّ نازح. حالة الشعور بالحسّ وإدراكه في منطقة بعيدة عن النقطة المنبهة.

**alleviant (= palliative)** مُسكّن. دواء أو مادة تهدئ الألم.

**alliteration** حُبسة جناسية. خلل التلفظ الذي يستعمل فيه المصاب كلمات تحوي مقاطع متماثلة أو تبدأ بحروف متماثلة.

- allochesthesia** حسّ نَارَح. أنظر allesthesia.
- allochiria** حسّ مُقَابِلِ التَّوَضُّع. حالة الحس في أحد الأطراف عند تنبيه الطرف المعاكس له.
- allocinesia** حَرَكَه مَرَاتِبَةٌ. حالة تحريك المريض لطرف معاكس للطرف الذي وجهت إليه الإشارة الإرادية.
- allocortex** القَشْرَةُ العَرِيقَةُ. قشرة المخ الأولية الأصلية التي تشمل القشرة البدائية والقشرة القديمة.
- allodynia** وَجَعٌ جَلَافِي. ألم يتولّد عن التنبيه بمنبه غير مؤلم وغير مؤذ عادة.
- alloeroticism (= alloerotism)** شهوانية الغير؛ شَبَقٌ جِلَافِي. حس جنسي موجه لشخص آخر مرافق.
- alloesthesia (= allesthesia)** حسّ نَارَح.
- allograft** طُعْمٌ مِثْلِي. غرس طعم نسيجي (أو عصبي) ينقل بين أفراد من نوع واحد ولكنهم ذوي أنماط جينية متباينة.
- allokinesis** حَرَكَه مَرَاتِبَةٌ. حركة أحد الأعضاء لا إرادياً ولكنها تتم بصورة انعكاسية أو بصورة منفصلة في أحد الأطراف مقلدة حركة الطرف المقابل.
- allolalia** خَلَلُ النُّطْق. خلل النطق الناتج عن آفة مركزية.
- allophasia (= delirium)** هَذَرٌ؛ هَذْيَان. كلام غير مترابط.
- allopsychosis** دُهَانٌ إِدْرَاقِي. خلل إدراك المحسوسات الخارجية من دون أي خلل حركي في العضلات بصورة خاصة.
- all or none law** قَانُونُ الكُلِّ أَوِ العَدَمِ. القانون الذي ينص على أن الليف العصبي الواحد إما أن يستجيب للمنبه بأقصى قابليته أو أن لا يستجيب له بالمرّة. وينطبق هذا القانون على العضلة القلبية أيضاً.
- allotriogeusia** غَرَابَةُ المَذَاق. شذوذ في حس الذوق.
- alogia** صُمُاتٌ؛ خَرَسٌ. عدم المقدرة على النطق بسبب آفة مركزية.
- alpha adrenergic receptor** مُسْتَقْبِلَةُ ألفا الأدرينالينية الفِعل. أنظر receptor.
- alpha motor neuron** عَصَبُونُ ألفا الحَرَكَي. أنظر neuron.
- alpha receptor** مُسْتَقْبِلَةُ ألفا. أنظر receptor.
- alpha rhythm** نَظْمُ ألفا. أنظر rhythm.
- alpha wave** مَوْجَةُ ألفا. أنظر wave.
- alveus communis** القُرْبِيَّة. أنظر utriculus.
- alveus hippocampi** شَكْوَةُ الحُصَيْنِ، غَالِيَةُ الحُصَيْنِ. الطبقة الرقيقة من المادة البيضاء التي تغطي سطح بُطين الحصين.
- alysmus** قَلَقُ المَرَض. القلق الذي ينتاب المريض حول مرضه.
- amacrine cell** خَلِيَّةٌ لَا مِخْوَارِيَّة. أنظر cell.
- amantadine hydrochloride** هيدزوكلووريد الأمانتادين. دواء يستعمل في علاج داء باركنسون لأنه يحفز إفراز الدوبامين المضاد لخلل الحركة.
- amathophobia** رُهَابُ الغُبَار. فرط التخوف من الغبار.
- amaurosis** كُمْنَةٌ. (ج: كُمْنَات). عمى خصوصاً ذلك الذي لا يترافق مع آفة في العين.
- central a.** كُمْنَةٌ مَرْكَزِيَّة. كمنة تتسبب عن آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- cerebral a.** كُمْنَةٌ مُخَيَّة. كمنة تتسبب عن مرض قشرة المخ أو الدماغ.
- a. fugax** كُمْنَةٌ عَابِرَةٌ. عمى تام أو جزئي وقتي في إحدى العينين يدوم لبضعة دقائق.
- hysterical a.** كُمْنَةٌ هِسْتِيرِيَّة؛ كُمْنَةٌ هُرَاعِيَّة. كمنة في إحدى العينين أو في كليهما من دون سبب عضوي ظاهر.



**amaurotic idiocy** عَمَة كُفْيِي. انظر idiocy.

**amaxophobia** رُهابُ العَرَبَات. الخوف من ركوب المركبات أو التنقل بها.

**ambidexter** أَضْبَط. شخص يتمكن من القيام بالأعمال الدقيقة باليدين بطريقة متساوية.

**ambilateral** بِالْجَانِبَيْن. متعلق بالجانبين أو يؤثر بهما سوية.

**amblyopia (= diplopia)** شَفَع: إزدواجُ الرؤية. إبصار مزدوج للأجسام المرئية.

**ambisexual** 1. ثُنَائِي الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّة 2. متصل بالجنسين. 1. من يمتلك الصفات الجنسية الثانوية المشتركة بين الجنسين كشعر العانة. 2. من له ميل جنسي للذكور والإناث.

**ambivert** مُتَكَافِيءُ المِرَاج. شخص وسط بين المنبسط والمنطوي على ذاته.

**amblyaphia** ضَعْفُ اللَّمْس. ضعف حس اللمس.

**amblygeusia** ضَعْفُ الذَّائِقَة. ضعف حسن الذوق.

**amblyopia** غَمَش. ضعف أو انعدام البصر من دون وجود آفة ظاهرة في العين.

**ambosexual** 1. ثُنَائِي الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّة 2. متصل بالجنسين. انظر ambisexual.

**ambulant** سَائِر. ماشي أو يمكنه المشي.

**ambulation** السَّيْر. عملية المشي.

**ambulatory** سَائِر؛ سَيْرِي. انظر ambulant.

**amenomania** هَوَسٌ مَرَحِي. الطور الهوسي في داء الزهان الهوسي الاكتئابي.

**amenorrhea** ضَهْي. انقطاع الحيض الشاذ.

**- hypothalamic a.** ضَهْي وَطَائِي المَشْأ. انقطاع الحيض بسبب آفة أو اضطراب وطيائي.

**ament** أَهْمِل. شخص مصاب بالهبل أو بالتخلف العقلي.

**amentia** هَبْل. 1. تخلف عقلي شديد 2. المرحلة الانتهازية من الخرف التنكسي.

**amiculum olivare** كُسْنَة الرُّيْتُونَة. محفظة مكونة من ألياف مغمدة تحيط بالنواة الزيتونية الدنسية.

**amimia** تَعَذُّرُ الإيماء. فقدان قدرة التعبير بالإشارة أو الإيماء.

**- amnesic a.** تَعَذُّرُ الإيماء النَّسَاوِي. المقدرة على الإيماء والإشارة من دون معرفة معانيها ودلالاتها.

**- receptive a.** تَعَذُّرُ الإيماء الإدراكي. عدم معرفة أو فهم معاني الإيماءات أو الإشارات أو التعبيرات التي تصدر من الآخرين.

**amitriptyline hydrochloride**

هَيْدُزوكُلُورِيد الأَمِيتْرِپْتِيلِين. دواء مضاد الاكتئاب يؤخذ بالفم أو يزرق بالعضل.

**Ammon's horn** قَرْنُ آمُون؛ الحُصَيْن. انظر hippocampus.

**amnalgesia** تَسْكِينٌ إِنْسَائِي. طريقة معالجة لا يترك فيها مجال للمريض لتذكر أي ألم أو ضائقة تتولد له خلالها، وذلك باستعمال المسكنات أو المخدر أو التنويم.

**amnemonic** نَسَاوِي؛ مُفَقِّدُ الذَّاكِرَة، فَاقِدُ الذَّاكِرَة. انظر amnesic.

**amnesia** نَسَاوَة؛ فَقْدُ الذَّاكِرَة. عدم المقدرة على تذكر التجارب السابقة.

**- affective a. (= elective a.)** فَقْدُ الذَّاكِرَة العاطفي.

**- anterograde a.** فَقْدُ ذَاكِرَة لَاحِق؛ فَقْدُ الذَّاكِرَة القدامي. نساوة التجارب والذكريات للامور التي تحدث بعد بدء نوبة النساوة وعدم المقدرة على تكوين ذكريات جديدة عنها.

**- anteroretrograde a.** فَقْدُ الذَّاكِرَة القدامي والرجعاني؛ نَسَاوَة اللَّاحِق والسَّابِق. نساوة الاحداث التي تلحق بإصابات الرأس أو آفات المخ التي تولد النساوة مع نساوة الاحداث التي تسبق الإصابة مباشرة.

**- auditory a.** حُبْسَة سَمْعِيَّة؛ فَقْدُ الذَّاكِرَة السمعِي. انظر word deafness.

**- autohypnotic a.** فَقْدُ الذَّاكِرَة الذَاتِي؛ نَسَاوَة ذَاتِيَّة. كبت بعض الذكريات المحفوظة بالذاكرة لا شعورياً.

- **Broca's a.** فقد الذاكرة بإصابة فص بْرُوكَا. عدم المقدرة على تذكر معاني الكلمات.
- **catathymic a.** فقد الذاكرة والشعور؛ نَسَاوَةٌ لاشْعُورِيَّة. نساوة لاشعورية لكل شيء عن حادثة معينة.
- **circumscribed a.** فقد الذاكرة المحدد؛ نَسَاوَةٌ مُحدَّدة. نساوة لكل الأحداث التي حدثت في فترة معينة محددة.
- **continuous a.** فقد الذاكرة المستمر؛ نَسَاوَةٌ مُستَمِرَّة. نساوة لكل الأحداث التي حصلت بعد طارئ معين وتستمر حتى الآن.
- **elective a.** فقد الذاكرة الانتخابي؛ نَسَاوَةٌ إِنْخِبَائِيَّة. نساوة لبعض الأحداث الخاصة بالمعينة وهي نوع من النساوة الهستيرية.
- **emotional a.** فقد الذاكرة الانفعالي؛ نَسَاوَةٌ إِنْفِعَالِيَّة. نساوة عاطفية المنشأ كالتي تحدث في الحالات الهستيرية بعد التعرض لكرب عاطفي شديد.
- **episodic a.** فقد الذاكرة العارض؛ نَسَاوَةٌ عَارِضَة. نساوة لفترة عارضة أو لجزء من تجربة معينة.
- **fixation a.** فقد الذاكرة التثبيتي؛ نَسَاوَةٌ تَثْبِيَّتِيَّة. نساوة لأحداث قريبة لعدم التمكن من تثبيتها بالذاكرة.
- **generalized a.** فقد الذاكرة العام؛ نَسَاوَةٌ عَامَّة. نساوة لكل الأحداث والتجارب التي مرت بحياة الفرد.
- **graphokinetic a.** فقد ذاكرة الكتابة؛ نَسَاوَةٌ الْكِتَابَة. نساوة الحركات الكتابية مما يؤدي إلى تعذر الكتابة.
- **hysterical a.** فقد الذاكرة الهراعية؛ نَسَاوَةٌ هُرَاعِيَّة. نَسَاوَةٌ هِسْتِيرِيَّة. نساوة لا تتولد عن مرض دماغي عضوي أو عن اختلال الوظائف الدماغية، بل تتولد عن الهستيريا والرغبة اللاشعورية للهروب من حالة مرهقة.
- **incomplete a. (=lacunar a.)** فقد الذاكرة الناقص؛ نَسَاوَةٌ نَاقِصَة.
- **infantile a.** فقد الذاكرة الطفلي؛ نَسَاوَةٌ طِفْلِيَّة. النساوة الطبيعية لحوادث وتجارب الطفولة الأولى للشخص.
- **lacunar a.** فقد الذاكرة الفتري؛ نَسَاوَةٌ فَتْرِيَّة. نساوة جزئية لبعض الحوادث أو لأجزاء منها أو لفترات متقطعة.
- **localized a. (=circumscribed a., lacunar a.)** 1. فقد الذاكرة المحدد؛ نَسَاوَةٌ مُحدَّدة. 2. نَسَاوَةٌ فَتْرِيَّة.
- **logophonic a.** فقد الذاكرة اللفظي؛ نَسَاوَةٌ لِفْظِيَّة. نساوة بعض الكلمات فتؤدي إلى حبسة الكلمات.
- **mimokinetic a.** فقد الذاكرة الإيمائي؛ نَسَاوَةٌ إِيْمَائِيَّة. نساوة التعبير عن العواطف بالإيماء فتؤدي إلى اللاإيمائية.
- **olfactory a.** فقد الذاكرة الشمي؛ نَسَاوَةٌ شَمِّيَّة. نساوة روائح بعض المواد.
- **organic a.** فقد الذاكرة العضوي؛ نَسَاوَةٌ عُضْوِيَّة. نساوة تتولد عن مرض عضوي.
- **patchy a. (= lacunar a.)** فقد الذاكرة الفتري؛ نَسَاوَةٌ فَتْرِيَّة.
- **phonokinetic a.** فقد الذاكرة التلفظي؛ نَسَاوَةٌ تَلْفَظِيَّة. نساوة حركات التلفظ فتؤدي إلى حبسة حركية.
- **postconcussional a.** فقد الذاكرة التالي للارتجاج؛ نَسَاوَةٌ تَالِيَّة لِلْإِرْتِجَاج. نساوة تتولد عن ارتجاج الدماغ.
- **posthypnotic a.** فقد الذاكرة بالتنويم؛ نَسَاوَةٌ بِالتَّنْوِيم. نساوة التجارب التي يمر بها الشخص أثناء تنويمه.
- **post-traumatic a.** فقد الذاكرة التالي للرضح؛ نَسَاوَةٌ تَالِيَّة لِلرُّضْح. النساوة التي تتولد بعد ارتجاج الدماغ أو بعد رضوح الرأس وإصاباته.
- **psychogenic a.** فقد الذاكرة النفسي؛ نَسَاوَةٌ نَفْسَانِيَّة. نساوة فجائية لبعض الأحداث الشخصية الهامة، وهي عادة انتخابية ومحددة وغير مستمرة ولا تتسبب عن مرض عضوي أو عقلي ولكنها قد تتلوه بعض الاضطرابات النفسية أو الكرب الشديد ويستعيد في العادة المصاب ذاكرته بعد فترة.
- **retarded a.** فقد الذاكرة بالتعويق؛ نَسَاوَةٌ بِالتَّعْوِيق. عدم المقدرة على الاحتفاظ ببعض

- الذكريات عن حوادث أو أفكار حصلت أثناء فترة شواش وتخليط فكري.
- **retroactive a. (= retrograde a.)** فقد ذاكرة السابق؛ نَسَاوَةُ السَّابِقِ، فقد الذاكرة الرجعاني.
- **retroantegrade a.** فقد ذاكرة السابق واللاحق؛ نَسَاوَةُ السَّابِقِ وَالْأَحَقِّ. نساوة الأحداث التي سبقت الإصابة أو المعارضة المخية وبعض الأحداث التي تلت ذلك.
- **retrograde a.** فقد ذاكرة السابق؛ نَسَاوَةُ السَّابِقِ. نساوة الأحداث والتجارب التي اكتسبت قبل بدء نوبة النساوة.
- **selective a.** فقد الذاكرة الانتقائي؛ نَسَاوَةُ إِنْتِقَائِيَّة. نساوة بعض الأحداث وليست كل الأحداث التي حدثت في نفس الفترة.
- **systematic a.** فقد الذاكرة النظامي؛ نَسَاوَةُ نِظَامِيَّة. نساوة مجموعة معينة من الأحداث.
- **tactile a. (= astereognosis)** فقد الذاكرة اللمسي، نساوة لمسية.
- **transient global a.** فقد الذاكرة الشاملة العابرة؛ نَسَاوَةُ شَامِلَةٍ عَابِرَةٍ. نساوة شاملة لفترة قصيرة قد تدوم بضع ساعات مع عدم وجود أية أعراض أو علامات أخرى لأي مرض عضوي أو اختلالات عصبية ولا يعرف سببها الذي قد يكون نوبة صرعية أو إقفار دماغي وقتي.
- **traumatic a. (= post-traumatic a.)** فقد الذاكرة التالي للرضح؛ نَسَاوَةُ تَالِيَةٍ لِلرَّضْحِ.
- **verbal a.** فقد الذاكرة اللفظي؛ نَسَاوَةُ لَفْظِيَّة. نساوة بعض الكلمات.
- **visual a.** فقد الذاكرة البصري؛ تَعَذُّرُ الْقِرَاءَةِ. أنظر alexia.
- amnesiac** فَاقِدُ الذَّاكِرَةِ؛ نَسَاوِي. شخص مصاب بالنساوة.
- amnesic** فاقِدُ الذَّاكِرَةِ؛ نَسَاوِي. شخص مصاب بالنساوة أو ما يتصف أو يتعلق بالنساوة.
- amnestic (= amnesic)** نَسَاوِي. فاقِدُ الذَّاكِرَةِ، مفقد الذاكرة.
- amorphognosia** عَمَّةُ الشَّكْلِ. عدم المقدرة على معرفة شكل الأجسام.
- amorphosynthesis (= amorphognosia)** عَمَّةُ الشَّكْلِ.

- amphetamine** دواء ينبه الجهازين العصبي المركزي والمحيطي، فهو يرخي العضلات القصية ويهبط الضغطين الانبساطي والتقلصي ويقلص مصرة المثانة ويقلل الشهية.
- amphithymia** اِرْدَوَاجِيَّةُ الْمَرَّاجِ. حالة نفسية تتصف بالاكتئاب والهوس.
- amphotony** اِرْدَوَاجِيَّةُ التَّوْتَرِ الْعَصْبِيِّ. حالة تتصف بالتوتر الودي والمبهمي مع فرط توتر كل الجملة العصبية الودية.
- ampulla** امْبُولَةٌ. (ج: امبولات). مصطلح تشريحي عام يدل على انتفاخ حوجلي الشكل لبنية نببية.
- **anterior membranaceous a.** الامْبُولَةُ الْغِشَائِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ. انتفاخ في إحدى نهايتي القناة الهلالية الامامية.
- **a. canaliculi lacrimalis** الامْبُولَةُ نُفَيْقُ الدَّمْعِ. توسع في القنية الدمعية قبل انفتاحها في الكيس الدمعي.
- **posterior membranaceous a.** الامْبُولَةُ الْغِشَائِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ. انتفاخ في إحدى نهايتي القناة الهلالية الخلفية.
- amuck (= amok)** سَعَارُ الْقَتْلِ؛ عُموك. إعتلال ذهني يتصف بفترة اكتئاب تتلوها محاولة قتل الآخرين وثم الانتحار.
- amusia** عَمَّةُ الْمَوْسِيقِي. عدم المقدرة على توليد الانغام الموسيقية أو إدراكها.
- **motor a.** عَمَّةُ الْمَوْسِيقِي الْحَرَكَِي. عدم المقدرة على توليد الانغام الموسيقية.
- **sensory a.** عَمَّةُ الْمَوْسِيقِي الْحِسِّي. عدم المقدرة على إدراك الانغام الموسيقية.
- amyasthenia (= amyosthenia, myo-athenia, myathenia)** وَهْنٌ عَضَلِي. ضعف العضلات.
- amyasthenic** وَاهِنُ الْعَضَلِ. مصاب بالوهن العضلي.
- amychophobia** رُهابُ الْخَدَشِ. رهاب الخمش أو الخدش بمخالب القطط والحيوانات.

**amyelencephalia** إِنْْعِدَامُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ. حالة انعدام الدماغ والنخاع الشوكي خلقياً.

**amyelencephalus** عَدِيمُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ. مسيخ من دون دماغ ونخاع شوكي.

**amyelia** إِنْْعِدَامُ النُّخَاعِ. حالة انعدام النخاع الشوكي خلقياً.

**amyelic** عَدِيمُ النُّخَاعِ. مسيخ من دون نخاع شوكي خلقياً.

**amyelinic** عديم الميالين: عديم الغمد النُّخَاعِيْنِي. بنية أو ليف عصبي من دون غمد نخاعيني.

**amyelonic** 1. عَدِيمُ النُّخَاعِ 2. عَدِيمُ النِّقْيِ. 1. عديم النخاع الشوكي 2. عديم نقي العظام.

**amyelotrophy** ضُمُورُ النُّخَاعِ. ضمور النخاع الشوكي.

**amygdala** لَوْزَةٌ. مصطلح تشريحي للدلالة على بنية شبيهة باللوزة، ويستعمل أحياناً للدلالة على الجسم اللوزي في الدماغ.

**- accessory a. (= tonsilla lingualis)** اللُّوزَةُ الإِضَافِيَّةُ. اللوزة اللسانية.

**- a. of cerebellum** لَوْزَةُ المُخَيِّخِ. انظر tonsilla cerebelli.

**amygdaloid body** الجِسْمُ اللُّوزِي. انظر corpus amygdaloideum.

**amyloid** نَشَوَانِي. شبيه النشا.

**amyloidosis** نَشَاءُ: الدَّاءُ النَشَوَانِي. ترسب مواد نشوانية في أقسام مختلفة من الجسم.

**- senile a.** نَشَاءٌ شَيْخُوخِي. ترسب مواد نشوانية في أقسام مختلفة من الجسم وفي الدماغ عند الشيخوخة.

**amyoesthesia** فَقْدَانُ الحِسِّ العَضَلِي. فقدان أو قلة الحس العضلي.

**amyoplasia** قُصُورُ التَّعَضُّلِ. قصور التكون العضلي.

**- a. congenita** قُصُورُ التَّعَضُّلِ الخَلْقِي. قصور التكون العضلي العام مع تقلص العضلات وشوه المفاصل خلقياً.

**amyostasia** رُغَاشُ العَضَلِ. رعاش العضلات الذي يشاهد بصورة خاصة في الرنح التحركي.

**amyostatic** مُرْتَعِشُ العَضَلِ. المصاب برعاش العضل.

**amyosthenia** وَهْنٌ عَضَلِي. انظر amyasthenia.

**amyotaxia** رَنْجٌ. انظر ataxia.

**amyotaxy** رَنْجٌ. انظر ataxia.

**amyotonia (= myatonia)** وَثَنٌ عَضَلِي. حالة فقدان التوتر العضلي.

**amyotrophia (= amyotrophy)** ضُمُورٌ عَضَلِي. ضمور عضلي.

**- neuralgic a. (= neuralgic amyotrophy)** ضُمُورٌ عَضَلِي عَصَبِي مُؤَلِم.

**- a. spinalis progressiva** ضُمُورٌ عَضَلِي نُّخَاعِي مُتَرَقٍّ. ضمور عضلي بسبب آفة في النخاع الشوكي يزداد بمرور الأيام.

**amyotrophy** ضُمُورٌ عَضَلِي. ضمور العضلات.

**- diabetic a.** ضُمُورٌ عَضَلِي سَكْرِي. ضمور العضلات المسبب عن داء السكري.

**- neuralgic a.** ضُمُورٌ عَضَلِي عَصَبِي مُؤَلِم. ضمور عضلي يصاحبه ألم عصبي في المنكبين والذراعين العلويين مع شلل عضلات حزام المنكب.

**- syphilitic a.** ضُمُورٌ عَضَلِي زَهْرِي (إِفْرَنْجِي). الضمور العضلي الناتج عن داء الإفرنجي.

**amymous** مُغَوِرُ العَضَلِ: فاقد العضل. عضوفه عضل قليل أو معدومه.

**anabolism** إِبْتِنَاءُ. العمليات الاستقلابية التي تحوّل المواد الأولية إلى مركبات معقدة يحتاجها الجسم في فعالياته الحيوية أو في بناء أنسجته.

**anacatesthesia** جِسْمٌ الحَوْمِ. الإحساس بالحوم والطوفان في الفضاء.

**anaclisis** إِتْكَالٌ أُمُومِي: إِتْكَالٌ. 1. اعتماد الطفل المادي والعاطفي المفرط على رعاية أمه له مما يؤثر على تطوره، وقد يؤدي حرمانه من ذلك إلى أثر عكسي 2. إتكال الشخص على عطف الآخرين نحوه.

**anacritic** إِنْكَالِيْ أُمُوْمِيْ. طفل يتصف بالانكسال الأمومي أو شخص يتصف بالانكسال العاطفي على الآخرين.

**anacusia (= anacusic)** وَقَر. الصمم التام.

**anadipsia** سَهَاف. العطش الشديد.

**anagnosasthenia** صُعُوْبَةُ الْقِرَاءَةِ. الصعوبة التي يعانيها الشخص العُصابي عند القراءة.

**anagoge, anagogy** امثولة النَّفْس، الضمير؛ قدوة النفس. الناحية الوجدانية المثالية للنفس، المتعلقة بالقيم المثالية والروحية.

**anagogic** مُتَدَيِّن؛ مِثَالِي. شخص متمسك بالقيم المثالية والروحية.

**anakatesthesia** جِسُّ الْحَوَم. انظر anacatesthesia.

**anakusia (= anakusis)** وَقَر. انظر anacusia.

**analeptic** مُنْعِش. دواء يعمل كمادة منبهة كالكافين والأمفيتامين.

**analgesia** 1. تَسْكِين 2. بُطْلَانُ الْأَلَم. 1. التفريغ عن الألم من دون فقدان الوعي 2. غياب حس الألم وخصوصاً عند التنبيه بمنبه مؤذ.

**- a. algera (= a. dolorosa)** أَلَمُ الْجُزْءِ الْمُخْذَر. الشعور التلقائي بالألم في منطقة من الجسم مخدرة أو مزالة الاعصاب.

**- conduction a.** بُطْلَانُ الْأَلَمِ التَّوَصِيلِي. غياب الألم في منطقة من الجسم بتخدير العصب الحسي الذي يغذيها بمخدر.

**- continuous caudal a.** تَسْكِينٌ دَنِييٌ مُسْتَمَر. التفريغ عن ألم الطلق والولادة بالإرواء المستمر للصفيرتين العجزية والقطنية في الحيز فوق الجافية بمحلول مادة مخدرة.

**- a. dolorosa** أَلَمُ الْجُزْءِ الْمُخْذَر. انظر analgesia algera.

**- electrical a.** تَسْكِينٌ كَهْرَبَائِي. استعمال تيار كهربائي جيبى واطيء الفلطية لتنبيه بعض الاعصاب عبر الجلد لتسكين بعض المتلازمات المؤلمة.

**- epidural a.** تَسْكِينٌ حَوْلَ الْجَافِيَّة. تسكين

ألم أو تخدير قسم من الجسم بحقن مادة مخدرة في الحيز خارج الجافية في القناة الفقارية.

**- hysterical a.** بُطْلَانُ الْأَلَمِ الْهِسْتِيرِي. فقدان حس الألم في منطقة من الجسم لسبب هراعي من دون وجود أية آفة عضوية.

**- infiltration a.** تَسْكِينٌ إِرْتِشَاحِي. تخدير بعض النهايات العصبية برشح محلول مخدر تحت الجلد في منطقة المداخلة الجراحية.

**- narcolocal a.** تَسْكِينٌ مُوَضِعِي. التسكين الموضعي الذي يتولد في منطقة محددة قبل تبنيجه بسبب المداواة قبل التبنجية المسبقة.

**- a. panaris** دَاحِسٌ مُخْذَر. داحس غير مؤلم في إصبع المصاب بتكهف النخاع.

**- paretic a.** بُطْلَانُ الْأَلَمِ الْخَرْلِي. فقدان حس الألم الذي يترافق مع الشلل الجزئي.

**- perineural a.** تَسْكِينٌ حَوْلَ الْعَصَب. تسكين بترشيع محلول مخدر حول العصب الحسي.

**- permeation a. (= surface a.)** تَسْكِينٌ سَطْحِي؛ تسكين بالاختراق.

**- relative a.** تَسْكِينٌ نِسْبِي. نوع من التبنيج العام غير التام يحتفظ فيه المريض بوعيه مع انعدام حس الألم أو نقصه لحدّ محتمل.

**- spinal a.** تَسْكِينٌ نَحَاعِي. انظر epidural analgesia.

**- surface a.** تَسْكِينٌ السَّطْح. تخدير سطحي بوضع مادة مخدرة على غشاء مخاطي كالعين والأنف والبلعوم والحنجرة والإحليل.

**analgesic** مُسْكِن؛ 1. عامل مفرج أو مخفف للألم 2. غير حساس للألم.

**analgetic (= analgesic)** مُسْكِن، مبطل الألم.

**analgia** بُطْلَانُ الْأَلَم. انعدام حس الألم.

**analgic** بَاطِلُ الْأَلَم. غير حساس للألم.

**analgognosia** عَمَةُ الْأَلَم.

**anality** الشَّرْجِيَّة. مجموع الصفات النفسانية الحسية والسلوكية الشخصية المستمدة من مرحلة التطور الجنسي النفساني الشرطي.

- analysis** .psychoanalysis .تَحْلِيل. انظر
- analyst** .مُحَلِّل. من يقوم بتحليل النفسي أو غيره. أنظر psychoanalyst.
- anamnesis** 1. إِذْكَار. 2. ذَكَار. 1. تَذَكَّر 2. التاريخ المرضي الذي يصفه المريض وخصوصاً عن تاريخه الصحي قبل بدء المرض الحالي.
- associative a.** إِذْكَارٌ اِرْتِبَاطِيّ. طريقة للحصول على التاريخ المرضي النفسي بمحاولة تمكين المريض من ربط أعراضه المرضية مع حالاته العاطفية وعلاقاته الشخصية مع الآخرين في محيطه.
- anamnestic** إِذْكَارِيّ. متعلق بالإذكار.
- ananastasia (= astasia)** تَعَدُّرُ الْوُقُوف؛ اللاؤُقُوفِيَّة. عدم المقدرة على الوقوف أو القيام من المقعد.
- anancastic** وَسْوَاسِيّ قَسْرِيّ. أنظر obsessive-compulsive.
- anandia** صُمَات. أنظر aphemia.
- anaphia** اِنْعِدَامُ حِسِّ اللَّمْس. نقص أو انعدام حس اللمس التام.
- anaphrodisia** إِجْفَار. فقدان الرغبة الجنسية.
- anaphrodisiac** مَجْفُورَة. عامل أو دواء يثبِّط الباه أو الرغبة الجنسية.
- anaplasia** كَشَم. فقد التمايز الخلوي.
- anaptic** فَاقِدُ حِسِّ اللَّمْس.
- anarithmia** فَقْدُ مَقْدَرَةِ الْعَدِّ. انعدام المقدرة لى الحساب أو العد بسبب آفة مركزية.
- anarthria** تَعَدُّرُ النُّطْق؛ عُقْلَة. رتة أو عسر التللف الشديد.
- a. literalis** تَأْتَأَة. انظر stuttering.
- anastomosis, crossed nerve** مُفَاعَرَة عَصْبِيَّة تَصَالُبِيَّة. قطع عصبين وربط القسم المركزي من كلٍ منهما مع القسم الطرفي للعصب الآخر.
- andromania** غُلْمَة. فرط الرغبة الجنسية عند النساء. أنظر nymphomania.
- androphile, androphilic** 1. مُجِبّ 2. البَشَر. 1. تفضيل البشر على باقي الحيوانات 2. الرغبة الجنسية نحو الذكور.
- androphobia** رُهابُ الذُّكُور. الخوف من الذكور أو بغضهم.
- anelectrotonus** تَوَثُّرٌ مَضْعُودِيّ. نقص هَيُوجِيَّة العصب تحت منطقة المصعد عند مرور الدفعة العصبية في العصب.
- anemophobia** رُهابُ الرِّيح. الخوف الشديد غير المبرر من الرياح.
- anencephalia** اِنْعِدَامُ الدُّمَاغ. أنظر anencephaly.
- anencephalus (= anencephalous)** عَدِيمُ الدُّمَاغ. شذوذ خلقي يتصف بانعدام قبو القحف ونصف كره المخ أو بوجود آثار قليلة لهما ملتصقتان بقاع القحف.
- anepithymia** اِنْعِدَامُ الشَّهْيَةِ. انعدام الشهية للطعام.
- anerethisia** قِلَّةُ الْهَيُوجِيَّة. قلة هَيُوجِيَّة البنية الهیوجة.
- anergia** اِسْتِغْفَال. تعطل.
- anergic** عَاطِل. 1. غير فعال 2. واهن 3. تعطل.
- anergy** اِسْتِغْفَال. وَهْنٌ، قلة الطاقة والتعطيل.
- anesthesis, anesthesis** فَقْدَانُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَة. فقدان الحس والقدرة على الحركة.
- anesthesia** 1. تَبْنِيَج؛ تَخْدِير 2. خَدَر. فقدان الإحساس أو الحس بصورة عامة ويستعمل المصطلح بصورة خاصة لفقدان حس الألم والذي يولد للتمكن من القيام بالمدخلات الجراحية.
- angiospastic a.** خَدَرٌ بِانْقِبَاضِ الْأَوْعِيَّة. خدر يتولد عن تشنج الاوعية الدموية.
- balanced a.** تَبْنِيَجٌ مُتَوَازِن. تبنيج يولد باستعمال عدة مبنجات بكميات كافية من كل منها لإحداث التأثير الامثل من دون استعمال كميات كبيرة من احدها تجنباً لأضراره غير المرغوبة.
- basal a.** تَبْنِيَجٌ أَسَاسِيّ. تخدير اولي

- تبنيج غازي تمرر المادة المبنجة فيه خلال أنبوب يوضع داخل الرغامى.
- **block a.** تَبْنِيجُ إِخْصَارِيّ. تبنيج موضعي. يتم بإحصار العصب الحسي المغذي للمنطقة المبنجة.
- **bulbar a.** خَدَرٌ بَصَلِيّ. نقص الإحساس الذي يتولد عن آفة في الجسر.
- **caudal a.** تَبْنِيجٌ عَجَزِيّ. تبنيج يولد بحقن المبنج في القناة العجزية.
- **central a.** خَدَرٌ مَرْكَزِيّ. نقص الإحساس الذي يتولد عن آفة مركزية في الجهاز العصبي.
- **cerebral a.** خَدَرٌ مُخَيّ. نقص الإحساس الذي يتولد عن آفة في المخ.
- **closed a.** تَبْنِيجٌ مُغْلَقٌ. تبنيج إنشاقى بإعادة تنفس الغاز المبنج خلال جهاز مغلق يضاف إليه الأكسجين ويمتص منه ثاني أكسيد الكربون المولد.
- **colonic a.** تَبْنِيجٌ قَوْلُونِيّ. تبنيج يولد بحقن المبنج في المستقيم وإلى القولون.
- **combined a. (= balanced a.)** تَبْنِيجٌ مُتَوَازِنٌ.
- **compression a.** خَدَرٌ انْضِغَاطِيّ. خدر يتولد عن انضغاط العصب الحسي.
- **conduction a. (= regional a.)** تَبْنِيجٌ نَاجِيّ.
- **crossed a.** خَدَرٌ شِقِيّ مُتَصَالِبٌ. انظر hemianesthesia cruciata.
- **dissociated a.** خَدَرٌ مُتَفَارِقٌ. فقدان بعض الحواس مع بقاء بعض الحواس الأخرى بحالة سليمة.
- **dissociation a. (= dissociated a.)** خَدَرٌ مُتَفَارِقٌ.
- **doll's head a.** خَدَرٌ رَأْسِ الدُّمِيَّةِ. خدر يصيب الرأس والرقبة والقسم العلوي من الصدر فقط.
- **a. dolorosa** خَدَرٌ مُؤْلِمٌ. ألم في منطقة خدراء.
- **electric a.** تَبْنِيجٌ كَهْرَبَائِيّ. تبنيج يولد بإمرار تيار كهربائي في المنطقة.
- **endobronchial a.** تَبْنِيجٌ دَاخِلُ الْقَصْبَةِ. تبنيج غازي تمرر المادة المبنجة فيه خلال أنبوب يوضع داخل إحدى القصبات الهوائية.
- **endotracheal a.** تَبْنِيجٌ دَاخِلُ الرُّغَامِيِّ.
- **epidural a.** تَبْنِيجٌ خَارِجُ الْجَافِيَّةِ. تخدير يولد بحقن المبنج في الحيز حول الجافية.
- **facial a.** خَدَرٌ وَجْهِيّ. فقدان الحس في الوجه، يتولد عن آفة في العصب الوجهي.
- **frost a.** تَبْنِيجٌ بِالتَّغْلِيحِ. تخدير يولد بتبريد المنطقة برشها بنفثات شديدة من غاز طيار.
- **gauntlet a.** خَدَرٌ قَفَازِيّ. خدر يصيب اليد والمعصم بتوزيع قفازي الشكل.
- **general a.** تَبْنِيجٌ عَامٌ. تبنيج الجسم كله مع فقدان الوعي وحس الألم من كل أنحاء الجسم مع ارتخاء العضلات التام أو الجزئي.
- **girdle a.** خَدَرٌ حِرَامِيّ. خدر يصيب المنطقة المحيطة بالحوض.
- **glove a. (= gauntlet a.)** خَدَرٌ قَفَازِيّ.
- **gustatory a.** خَدَرٌ ذَوْقِيّ. فقدان حس الذوق.
- **hypnosis a.** تَبْنِيجٌ تَنَوِيْمِيّ. تبنيج يولد بعملية تنويم المريض.
- **hypotensive a.** تَبْنِيجٌ خَافِضٌ لِلضَّغَطِ. تبنيج يولد مع خفض ضغط الدم للتقليل من النزف.
- **hypothermic a.** تَبْنِيجٌ تَبْرِيدِيّ. تبنيج يولد بتخفيض درجة حرارة الجسم بصورة مقصودة.
- **hysterical a.** خَدَرٌ هُرَاعِيّ؛ خَدَرٌ هِسْتِيرِيّ. فقدان حس اللمس الذي يرافق بعض أنواع الهستيريا، ومن الممكن تشخيصه لعدم موافقة مواضعه مع مواضع انتشار العصب الحسي للمنطقة.
- **infiltration a.** تَبْنِيجٌ إِرْشَاحِيّ. تبنيج موضعي يولد برش محلول المخدر حول نهايات العصب الحسي للمنطقة.
- **inhalation a.** تَبْنِيجٌ إِنْشَاقِيّ. تبنيج يولد باستنشاق مبنج طيار أو غازي.
- **insufflation a.** تَبْنِيجٌ نَفْخِيّ. تبنيج يولد بنفخ مزيج من غازات مبنجة أو من أبخرة مبنج طيار خلال أنبوب يدخل إلى المجاري التنفسية.
- **intercostal a.** تَبْنِيجٌ وَرَبِيّ. تبنيج يولد بإحصار أحد الأعصاب الوربية (بين الضلعية).

1. **تَبْنِيَجْ** - **intraspinal a. (= spinal a.)** نُخَاعِي 2. **خَذَرٌ نُخَاعِي**.
- **intravenous a.** **تَبْنِيَجْ وَرِيدِي**. تنبيج يولد بحقن المبنج داخل الوريد.
- **local a.** **تَبْنِيَجْ مَوْضِعِي**. تنبيج موضع محدد من الجسم.
- **lumbar epidural a.** **تَبْنِيَجْ قَطْنِي خَارِجَ** **الْجَافِيَةِ**. تنبيج يولد بحقن المبنج خارج الجافية في المنطقة القطنية للنخاع.
- **mental a.** **خَذَرٌ ذَهْنِي**. فقدان القدرة على التعرف وإدراك الإحساسات.
- **mixed a. (= balanced a.)** **تَبْنِيَجْ مُخْتَلِط**.
- **muscular a.** **خَذَرٌ عَضَلِي**. فقدان الحس العضلي.
- **nausea a.** **فَقْدَانُ حَسِّ الْغُلْيَانِ**. عدم الإحساس بالغثيان الذي تهيجه عادة المنبهات المؤذية أو المقرزة.
- **nerve blocking a. (= regional a.)** **تَبْنِيَجْ** **بِالْإخْصَارِ الْعَصَبِي**؛ **تَبْنِيَجْ نَاجِي**.
- **olfactory a.** **خُسَامٌ**. خدر شَمِي. أنظر anosmia.
- **open a.** **تَبْنِيَجْ مَفْتُوح**. تنبيج إنشافي عام مفتوح.
- **paraneural a.** **تَبْنِيَجْ حَوْلَ الْعَصَبِ**. تنبيج ارتشافي بحقن المبنج حول العصب الحسي.
- **partial a.** **خَذَرٌ جُزْئِي**. خدر موضعي مع الاحتفاظ ببعض الإحساسات.
- **peripheral a.** **خَذَرٌ مُجِيطِي**. فقدان الحس في منطقة من الجسم بسبب تغييرات أو آفة العصب الحسي المحيطي.
- **permeation a.** **تَبْنِيَجْ السَّطْحِ**. تنبيج سطح الجسم أو العضو بوضع المبنج عليه مباشرة وعادة ما يوضع على سطح الغشاء المخاطي.
- **pressure a.** **تَبْنِيَجْ ضَغْطِي**. تنبيج يولد بمبنج موضعي يضغط في النسيج.
- **rectal a.** **تَبْنِيَجْ مُسْتَقِيمِي**. تنبيج يولد بحقن المبنج داخل المستقيم.



anesthesia, local

التخدير الموضعي: طريقة التخدير الموضعي بإحصار عصب إصبع اليد وإبهام القدم بحقن المخدر حول العصب المغذي لهما.



- **refrigeration a.** تَبْنِيجٌ تَبْلِيجِي. تبنيج يولد باستعمال العاصبة وتبريد المنطقة لدرجة الانجماد تقريباً.

- **regional a.** تَبْنِيجٌ نَاجِي. تبنيج منطقة من الجسم بإحصار عصبها الحسي بطريقة حقن موضعي حول العصب.

- **segmental a.** خَدَرٌ قَطْعِي: خَدَرٌ جَذَرِي. خدر يتولد بقطع الجذور النخاعية.

- **spinal a.** 1. تَبْنِيجٌ نُخَاعِي 2. خَدَرٌ نُخَاعِي. 1. تبنيج يولد بحقن المبنج حول النخاع في الحيز تحت العنكبوتي 2. فقدان الحس بسبب آفة النخاع الشوكي.

- **splanchnic a.** تَبْنِيجٌ حَشَوِي. تبنيج يولد بحقن المبنج حول العقدة الهلالية.

- **subarachnoidal a. (= spinal a.)** تَبْنِيجٌ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة.

- **surface a. (= permeation a.)** تَبْنِيجٌ السَّطْح.

- **surgical a.** تَبْنِيجٌ جِرَاحِي. تبنيج عميق لدرجة يسمح بالمداخلة الجراحية من دون إيلام المريض.

- **tactile a. (= anaphia)** خَدَرٌ لَمْسِي. فقدان حس اللمس.

- **thermal a. thermic a.** خَدَرٌ حَرَارِي. فقدان حس الحرارة.

- **topical a. (= surface a.)** تَبْنِيجٌ سَطْحِي.

- **total a.** خَدَرٌ شَامِل. فقدان كل أنواع الحس في المنطقة.

- **traumatic a.** خَدَرٌ رَضَحِي. خدر ينتج عن إصابة رضحية للعصب.

- **twilight a. (= twilight sleep)** خَدَرٌ غَلَسِي: نَوْمٌ غَلَسِي.

- **unilateral a. hemianesthesia** خَدَرٌ شَقِي. انظر

- **visceral a.** خَدَرٌ حَشَوِي. فقدان الحس الحشوي.

**anesthesimeter (= anesthesiometer)**

1. مَقْيَاسُ التَّبْنِيجِ 2. مَقْيَاسُ الْخَدَرِ. آلة لقياس عمق التبنيج 2. آلة لقياس درجة الخدر.

1. بَنْجٌ: مُبْنَجٌ. (ج: مُبْنَجَات) **anesthetic** 2. تَبْنِيجِي: تَخْدِيرِي. 1. عامل أو دواء يستعمل لإزالة حس الألم. 2. متعلق بالتبنيج أو مولد له.

- **general a.** بَنْجٌ عَامٌ. عامل أو دواء يولد التبنيج العام

- **local a.** بَنْجٌ مُوَضْعِي. دواء يولد تبنيجاً في موضع محدود من الجسم ويتم ذلك بحصر العصب الحسي للمنطقة.

- **topical a.** بَنْجٌ سَطْحِي. مبنج يوضع على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي مباشرة.

**anesthetospasm** تَشْنُجٌ خَدَرِي. تشنج المنطقة مع خدرها.

**aneurogenic** عَدِيمُ التَّعْصِيبِ. يتصف بعدم تولد الأعصاب فيه.

**aneurysm** أُمُّ الدَّمِ. (ج: أمّهات الدم). كيسة تتولد من تمدد جدران الشريان أو الوريد أو القلب مولدة ورماً نابضاً.

- **berry a.** أُمُّ الدَّمِ التَّوتِيَّة. أم دم كيسية صغيرة في أحد الشرايين الدماغية وعادة ما تكون عند اتصال الأوعية في دائرة ويليس وغالباً ما تنفجر وتولد نزفاً تحت العنكبوتية

- **brain a. (= berry a.)** أُمُّ الدَّمِ الدِّمَاغِيَّة.

- **cerebral a. (= berry a.)** أُمُّ الدَّمِ الْمُخَيَّة.

- **intracranial a.** أُمُّ الدَّمِ دَاخِلُ الْقُحْفِيَّة. أي من أمّهات الدم التي تتولد داخل القحف.

- **suprasellar a.** أُمُّ الدَّمِ فَوْقَ السَّرْجِيَّة.

أم الدم في الشريان السباتي الباطن والتي تتوضع فوق السرج التركي.

**angialgia** أَلَمُ الْوَعَاءِ. ألم في أحد الأوعية الدموية.

**angina** ذَبْحَةٌ. ألم تشنجي خانق خصوصاً الذبحة الصدرية.

- **a. capitis (= headache)** ذبحة راسية: صُدَاع.

**angiodynia (= angialgia)** أَلَمُ الْوَعَاءِ.

**angiography, cerebral** تَصْوِيرُ الْأَوْعِيَّةِ الدِّمَاغِيَّة. التصوير الشعاعي لأوعية الدماغ بعد حقنها بمادة مبيّنة.

**angioneuralgia** أَلَمٌ عَصْبِيٌّ وَعَائِي. حالة تنصف بالمرحوق في أحد الأطراف مع الوذمة والاحمرار.

- angioneurectomy** اسْتِنْصَالُ عَصَبِيٍّ وعائي. قطع عصب ووعاء إحدى المناطق.
- angioneuropathy** اِعْتِلَالُ عَصَبِيٍّ وَعَائِيٍّ. اعتلال عصبى يؤثر غالباً على الاعصاب الوعائية فيؤدي إلى تشنج الأوعية أو شللها أو شلل المحرك الوعائي.
- angioneurotic** عُصَابِيٍّ وَعَائِيٍّ. متعلق بالاعتلال العصبي الوعائي.
- a. edema (= angioedema)** وَذَمَةٌ عَصَبِيَّةٌ وذمة موضعية تنتج عن توسع الشعيرات وزيادة نفوذيتها.
- angle** زَاوِيَّةٌ.
- cerebellopontine a.** الزَاوِيَّةُ الْمُخَيَّخِيَّةُ الجسريَّة. الزاوية المكونة بين المخيخ والجسر.
- iridial a. (= iridocorneal a.)** الزَاوِيَّةُ الفُرْجِيَّةُ القرنيَّة. الزاوية المكونة بين قرنية العين وقرنيته.
- angophrasia** نُطْقٌ مُتَقَطِّعٌ؛ فَرْتَنَةٌ. كلام بطيء ومتعب يحصل في الخزل العام.
- anhaphia (= anaphia)** اِنْغِدَامُ جَسَنِ اللَّمَسِ.
- anhedonia** اِلْتِلَافٌ. عدم الشعور باللذة أو السعادة حتى في الاعمال والحالات المبهجة.
- anhidrosis** اِنْقِطَاعُ التَّعَرُّقِ. غياب أو قلة التعرق.
- thermogenic a.** اِنْقِطَاعُ التَّعَرُّقِ الحَرِّيِّ. وفن انقطاع التعرق يحدث في المناطق الحارة.
- anilingus** لَاعِقُ الشَّرْجِ. تهييج جنسي للشرج بالشفيتين واللسان.
- animal, decerebrate** حَيَوَانٌ مَفْصُولُ الْمُخِّ. حيوان تجريبي نزع منه الدماغ المقدم أو المخ.
- animal, spinal** حَيَوَانٌ نُخَاعِيٍّ. حيوان تجريبي قطع نخاعه وفصل عن دماغه.
- animal, thalamic** حَيَوَانٌ مِهَادِيٍّ. حيوان تجريبي قطع جذع دماغه فوق مستوى المهاد مباشرة.
- aniridia** اِنْغِدَامُ القُرْجِيَّةِ. غياب قرنية العين.
- aniseikonia** تَفَاوُتُ الصُّوَرَتَيْنِ. تباين الصورتين المولدتين في العينين للجسم المنظور بهما في الحجم والشكل.
- anisoaccommodation** تَفَاوُتُ التَّكْيُفِ. تباين قابلية تكيف العينين.
- anisocoria** تَفَاوُتُ الحَدَقَتَيْنِ. تباين سعة حدقتي العينين.
- anisometropia** تَفَاوُتُ اِلِنْكَسَارِ. تفاوت درجة انكسار العينين.
- anisophoria** حَوْلٌ مُتَفَاوِتٌ. خلل توازن عضلات العينين فتتولد فيهما صورتان بمستويين مختلفين.
- anisopia** تَفَاوُتُ اِلْبَصَارِ. تباين الإبصار بالعينين.
- ankle** كَاخِلٌ. جزء الطرف السفلي الذي يعلو القدم مباشرة.
- a. clonus** رَمَعُ الكَاخِلِ. انظر clonus.
- a. jerk** نَفْضَةُ الكَاخِلِ. انظر jerk.
- ankylocheilia** اِلْتِصَاقُ الشَّفَتَيْنِ. التصاق الشفتين ببعضهما البعض.
- ankyloglossia** اِلْتِصَاقُ اللِّسَانِ. التصاق اللسان الذي يحدد حركته ويؤدي إلى خلل التلفظ وصعوبته.
- ankylophobia** رُهَابُ القَسْطِ. الخوف من القسط في حالات كسور العظام أو التهابات المفاصل.
- anociassociation** اِبْطَالُ التَّدَاعِيَاتِ المؤذية. في التخدير هو حقن السكوبولامين والمورفين قبل إجراء العملية بساعة واحدة لمنع الصدمة الجراحية ثم إحصار حس الألم بحقن المسكنات المحصورة له حول منطقة العملية بعد إجرائها للتقليل من الصدمة الجراحية.
- anociation (= anociassociation)** اِبْطَالُ التَّدَاعِيَاتِ المؤذية.

**anocithesia (= anociassociation)**

إِبْطَالُ الدَّاعِيَاتِ الْمُؤَذِّةِ.

**anodal block**

إِحْصَارٌ مُصْعَدِي. إحصار الدفعة العصبية عند مرورها تحت المسرى المصعدي الموضوع على الليف العصبي.

**anodal closure contraction**

تَقْلُصُ الْغَلْقِ الْمُصْعَدِي. انظر contraction.

**anodal opening contraction**

تَقْلُصُ الْفَتْحِ الْمُصْعَدِي. انظر contraction.

**anode**

مَصْعَد. القطب الموجب في الدائرة الكهربائية أو في البطارية الكهربائية.

**anodmia**

انعدام الشم؛ خُشَام. انظر anosmia.

**anodyne**

مُسَكِّن. دواء يخفف أو يزيل الألم.

**anodynia**

إِنْْعِدَامُ الْأَلَم. عدم وجود الألم.

**anoia (= insanity)**

هَبْلٌ؛ عَتَّة. الجنون أو التخلف العقلي الشديد.

**anomaly**

شَذُوذ. (ج: شَذُوذَات). انحراف كبير عن المقياس السوي خاصة عندما يتسبب من عيب خلقي.

**- developmental a.**

شَذُوذٌ نِمَاطِي. شذوذ يتولد عن سوء تطور الجنين.

**anomia**

فَقْدُ التَّسْمِيَةِ. عدم المقدرة على تسمية المواد والأشياء أو عدم المقدرة على تذكر أسمائها.

**anorexia**

قَهَمٌ. فقدان الشهية للطعام.

**- a. nervosa**

قَهَمٌ عَصَابِي. اضطراب نفسي يصيب الإناث غالباً ويبدأ عند سن البلوغ ويتصف بالخوف من السمعة ورفض الاحتفاظ بادننى وزن قياسي والاعتقاد بانهن مفراطات الوزن حتى عندما يكن هزيلات فينقطعن عن الطعام ويؤدي ذلك إلى انقطاع الحيض لديهن.

**anorexigenic (= anorexiant)**

مُقَهِم. عامل يقلل الشهية للطعام.

**anosmia**

خُشَام. انعدام حس الشم.

**- a. gustatoria**

خُشَامٌ تَذْوِقِي. انعدام حس شم الطعام.

**- preferential a.**

خُشَامٌ نَوَعِي. انعدام حس الشم لبعض الروائح فقط.

**- a. respiratoria**

خُشَامٌ تَنْفُسِي. انعدام حس الشم لانسداد الأنف.

**anosmic**

مَخْشُومٌ؛ خُشَامِي. مصاب بالخشام أو منسوب إليه.

**anosognosia**

عَمَّةُ الْعَاهَةِ. عدم المعرفة أو رفض الاعتراف بالإصابة أو بالمرض العصبي كالشلل مثلاً.

انعدام الشم؛ **anosophrasia (= anosmia)** خُشَام.**ansa**

عُرْوَةٌ. (ج: عُرَى). مصطلح تشريحي يدل على بنية عروية الشكل.

**- a. cervicalis**

العُرْوَةُ الرَّقَبِيَّةُ. عروة عصبية في الرقبة تغذي العضلة تحت اللامية تتكوّن من الياف من الجذرين الرقبين الأول والثاني وتتصل بالعصب تحت اللساني والجذرين الرقبين الثاني والثالث.

**- a. hypoglossi**

العُرْوَةُ تَحْتَ اللِّسَانِيَّةِ، العُرْوَةُ الرَّقَبِيَّةُ.

**- a. lenticularis**

العُرْوَةُ الْعَدْسِيَّةُ. سبيل عصبي صغير يبدأ من الكرية الشاحبة للنواة العدسية ويمتد حول الحافة الإنسية للمحفظة الداخلية ويختلط مع الياف الحزمة العدسية وتتشابك بعض أليافه مع النوى تحت المهادية وتمتد الألياف الأخرى حتى المهاد.

**- ansae nervorum spinalium**

عُرَى الأعصاب النُخَاعِيَّةِ. عرى الياف عصبية تتصل بالجذور الأمامية للأعصاب النخاعية.

**- a. peduncularis**


العُرْوَةُ السُّوَيْقِيَّةُ. مجموعة من الياف عصبية تربط النواة اللوزية والباحة الكمثرية والقسم الأمامي من الوطاء والعديد من النوى المهادية ببعضها البعض، وتمر حزماتها العصبية تحت المحفظة الداخلية.

**- a. subclavius**

العُرْوَةُ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّةِ. خيوط عصبية تمر أمام وخلف الشريان تحت الترقوي لتكون عروة تربط العقدين الرقبين الوسطية والسفلية.

**- a. Vieussens (= a. subclavius)**

العُرْوَةُ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّةِ.



anorexia nervosa

القهم العُصابي: اضطراب عصابي ذهاني واعراضه وعلاماته: (1) كراهية الطعام النفساني المنشأ (2) البقظة والعدوانية (3) قصور الموجة النخامي للغدة التناسلية بسبب السغب (4) عدم ضمور الثدي (5) هبوط ضغط الدم (6) التثبيط النفساني المنشأ للمراكز الوطائية الموجهة للغدة التناسلية العنيفة للشاهية (7) هبوط الهرمون المنبه للغدة التناسلية (8) انقطاع الطمث (9) هبوط معدل الاستقلاب القاعدي (10) الهبوط السوي لتركيز اليود (11) بقاء شعر الإبط والعانة سوياً (12) بقاء اليود المرتبط بالبروتين سوياً (13) 17- هيدروكسي كورتيزون البول سوي (14) السغب الشديد.

- a. vitellina** الغرورة المَحْيَة. وريد جنيني يبدأ من الكيس المحي ويمر إلى الوريد السري.
- antagonist** مُنَاهِضَة.
- associated a's.** مُنَاهِضَاتٌ مُتَرَابِطَةٌ. عضلات تعمل على أجزاء مختلفة ولكنها تعمل سوية لتحركها باتجاهات متوازية.
- direct a's.** مُنَاهِضَاتٌ مُبَاشِرَةٌ. عضلات تعمل على نفس الجزء من الجسم ويؤدي عملها المشترك إلى تثبيت واستقرار الجزء.
- narcotic a.** مُنَاهِضَةُ المُخْذَر. عامل مضاد لعمل المخدرات على الجهاز العصبي.
- antalgic** مُسَكِّن: مُسْتَبْعِدُ الأَلَم.
- antalgic** أنظر antalgic.
- antalgic** مُسَكِّن: مُسْتَبْعِدُ الأَلَم.
1. عامل أو عمل يقاوم أو يجنب الألم، مثل اتخاذ وضع معين أو القيام بمشية خاصة تقلل الألم.
2. مسكِّن.
- antanalgesia** قَرُطُ حَسِّ الأَلَم. زيادة حساسية الألم بسبب استعمال بعض الأدوية التي تهبط عتبه.
- antasthenic** مُضَادُّ الوَهْن. عامل أو دواء مضاد للوهن يعيد النشاط للجسم.
- antephialtic** مُضَادُّ الكَابُوس. عامل أو دواء يمنع حدوث الكابوس والأحلام المزعجة.
- anterograde amnesia** نَسَاوَةٌ الأَلْحَق. أنظر amnesia.
- anterotic (= antaphrodisiac)** مُجَفِّر. عامل مضاد للشهوة الجنسية.
- anthophobia** رُهَابُ الزُّهُور. كراهية الزهور والتخوف منها.
- anthropophobia** رُهَابُ المُجْتَمَعَات. التخوف من المجتمعات البشرية.
- antiadrenergic** مُضَادُّ الفِعْلِ الأَدْرِينَالِينِي. عامل يضاد عمل الدفقات العصبية المنقولة في الألياف العصبية الودية بعد العقدة الأدرينالينية الفعل 2. عامل مضاد لفعل الأدرينالين أو النورادرينالين.
- antianxiety** مُضَادُّ القَلَق. دواء مضاد للقلق.
- antiapoplectic** مُضَادُّ السَّكْتَةِ. دواء يفرج عن السكتة أو يمنعها.
- antibiotic** مُضَادُّ حَيَوِي. مادة كيميائية يولدها حي مجهري لها القدرة على تثبيط تكاثر أو قتل أحياء مجهرية أخرى.
- antibody** المُضَدَّ. جزيء غلوبلين مناعي ذو نسق حمض أميني خاص يمكنه من التفاعل مع المستضد الذي حفز توليده.
- anticathexis** كَبْتُ الأفكار. الطاقة الضرورية للأناء كي يتمكن من كبت الأفكار غير المرغوبة.
- anticephalgic** مُضَادُّ الصَّدَاع. ما يعالج أو يمنع الصداع.
- anticholinergic** مُضَادُّ الفِعْلِ الكُولِينِي.
1. عامل يحصر مرور الدفقات عبر نهايات الأعصاب اللاودية 2. عامل مضاد لفعل الأسيتيل كولين.
- anticholinesterase** مُضَادُّ إِسْتِيرَاز الكُولِين. دواء يمنع حلمة الأسيتيل كولين بإنزيم إسترزاز الكولين مما يتيح له العمل لمدة طويلة وبفعالية عالية.
- anticoagulant** مانع التَخَثُّر. دواء يمنع تخثر الدم يستعمل للوقاية من الخثار أو في معالجته.
- anticonvulsant** مُضَادُّ الإِخْتِلَاج. دواء يعالج الاختلاج أو يفرج عنه.
- antidepressant** مُضَادُّ الإِكْتِنَاب. دواء يعالج الاكتئاب أو يفرج عنه ويحسن مزاج المريض.
- antidromic** مُعَاكِسُ المَسِيرَةِ. توصيل الدفقات العصبية باتجاه معاكس للاتجاه السري كما يتم أحياناً في عصبونات الجذور الخلفية.
- antiemetic** مُضَادُّ القَيْء. دواء يعالج الغثيان والتقيؤ أو يمنعهما.
- antiepileptic** مُضَادُّ الصَّرَع. عامل يقاوم الصرع.
- antifibrillatory** مُضَادُّ الرُّجْفَان. دواء يعالج الرجفان العضلي وخصوصاً رجفان القلب.

- antihallucinatory** مُضَادُّ الهَلَس. عامل يوقف الهلس.
- antihypnotic** مانع النَّوْم. عامل يمنع النوم.
- antihysteric** مانع الهِسْتِيرِيَا. عامل يمنع أو يوقف الهستيريا (الهراع).
- antikinesis** مُقَاوِمَةُ التَّدْوِير. نزعة الكائن لمقاومة الحركة إذ ينحني جسمه باتجاه معاكس لحركة دورانه مثلاً.
- antinarcotic** مُضَادُّ الخُدَار. دواء يقاوم تأثير المخدر.
- antineuralgic** مُضَادُّ الأَلَم العَصْبِي. دواء يضاد الألم العصبي.
- antineuritic** مُضَادُّ التَّهَاب العَصَب. عقار يضاد التهاب الأعصاب.
- antineurotoxin** مُضَادُّ ذَيْفَان العَصَب. مادة تضاد ذيفان العصب.
- antiparalytic** مُضَادُّ الشَّلَل. ما يفرج عن الشلل.
- antiparasymphathomimetic** مُضَادُّ مُحَاكِي اللأَوْدِي. ما يولد تأثيراً مشابهاً لقطع أو حصر العصب اللاودي.
- antiparkinsonian** مُضَادُّ البَارْكِنْسونِيَّة. عامل مؤثر في علاج الباركنسونية.
- antipathy** تَنَافُر. شعور سلبي تجاه شخص آخر أو شيء ما وخصوصاً الشعور الشديد بالبغض والكراهية تجاههما.
- antipsychomotor** مُضَادُّ التَّحْرَاك. النَّفْسَانِي. ما يبطل أو يثبط الظواهر الحركية للفعاليات النفسية أو المخية.
- antipsychotic** مُضَادُّ الذُّهَان. دواء يعالج الذهان.
- antisocial** مُعْتَدِلٌ إجْتِمَاعِيًّا. 1. سلوك إجرامي ينتهك حقوق الآخرين. 2. شخص يتصف بسلوك لا اجتماعي.
- antispasmodic** مُضَادُّ التَّنَشُّج. دواء يفرج عن التشنج العضلي وخاصة العضلات الملساء في الشرايين والقصبات والأمعاء وقناة الصفراء والحالب والمصبرات كما أنه يفرج أيضاً عن تشنج العضلات الهيكلية.
- antispastic** مُضَادُّ التَّنَشُّج. دواء يفرج عن التشنج العضلي خصوصاً العضلات الهيكلية.
- antisymphathetic** مُضَادُّ الْوُدِي. مادة تولد تأثيراً شبيهاً بتأثير قطع أو إحصار الودي.
- antitoxin** تَزْيِاق. 1. مادة ضد الذيفان 2. مصل ضدي يستعمل كعامل تمنيعي لا فاعل ليقاوم ذيفاناً جرثومياً معيناً.
- antitritismus** ضَرْزَرٌ عَكْسِي. تشنج يمنع غلق الفم الضرزي.
- antrodynia** وَجَعُ الْغَار. وجع أحد الأغوار.
- antronalgia** أَلَمُ الْغَار. ألم الجيب الفكي.
- anxiety** قَلَق. شعور بغيض يتضمن الحس بخطر محقق أو حالة عدم استقرار في الرأي أو توقع حدوث أمر هام، ويترافق كل ذلك مع انفعالات واستجابات فيزيولوجية استعداداً لذلك كالحرقان وارتفاع ضغط الدم والتوتر العضلي والرعاش وتسرع التنفس والتعرق والضعف والإعياء. وخلافاً للشعور بالخوف فإن القلق يتولد عن أخطار خيالية أو غير حقيقية أو غير موجودة أصلاً.
- automatic a.** قَلَقٌ تَلَفَافِي. قلق يتولد عن حالة رضحية نفسية عند ارهاق الجهاز النفسي بمنبهات كثيرة أكثر مما تتحملها النفس.
- castration a.** قَلَقُ الْخِصَاء. الخوف من فقدان الأعضاء التناسلية أو من إصابتها.
- ego a.** قَلَقُ الْأَنَا. القلق المولد من تهديد المخاطر الذاتية المنشأ للأنات والتي تحاول اختراق حدود الكبت لديه.
- eighth month a.** قَلَقُ الشَّهْرِ الثَّامِن. القلق الذي ينتاب الحوامل في الشهر الثامن من الحمل حول آلام الولادة أو فيما إذا كان الوليد ذكراً أم أنثى أو سليماً أو معيباً.
- examination a.** قَلَقُ الْإِمْتِحَان. القلق الذي ينتاب الطلاب أيام امتحاناتهم.
- fixed a.** قَلَقٌ ثَابِت. قلق يتعلق بفكرة أو موضوع معين كالرهاب من حالة أو شيء معين.

- **free-floating a.** قلقٌ عائِمٌ. قلقٌ عامٌ شديدٌ غير مرتبط بأي موضوع أو حالة أو فكرة معينة.
- **neurotic a. (= anxiety)** قلقٌ. قلقٌ عصائبي.
- **organic a.** قلقٌ عضوي. قلقٌ يترافق مع إصابةٍ والم في بعض أجزاء الجسم.
- **pathologic a.** قلقٌ مرضي. قلقٌ شديدٌ يستمر لفترة طويلة فيؤدي إلى اضطرابات جسمية.
- **phobic a.** قلقٌ رهائبي. قلقٌ يتولد عن التعرض للحالة أو للموضوع أو للشئ المسبب للرهاب منه لديه.
- **separation a.** قلقٌ الإفتراق. قلقٌ ينتاب الطفل عند افتراقه عن أمه أو عن بديلتها ويتصف بالبكاء والهيجية وبعض علامات الاحتجاج والرفض.
- **situation a.** قلقٌ الحالة. القلق الذي ينتاب الشخص عند تعرضه لموقف صعب أو مهيئ.
- **stranger a.** قلقٌ الغريب. القلق الذي يصيب الطفل عند رؤيته شخصاً غريباً للمرة الأولى.
- anxiolytic** مُزيلُ القلق. عامل يخفف القلق أو يزيله.
- anxious** قلق. شخص يعاني من القلق.
- apallesthesia** فقدانُ حسِّ الإهترَاز. انظر pallesthesia.
- aparalytic** لا شللي. غير مصاب بالشلل أو من دون شلل.
- apastia** صُوم. الامتناع عن تناول الطعام كعرض مرضي عصبي.
- apathetic** خامل؛ فائز الشعور. شخص غير مهتم ولا مبال بما يدور حوله من أحداث.
- apathic** خامل. شخص بطيء الاستجابة للمنبهات.
- apathism** خمول. حالة بطء الاستجابة للمنبهات.
- apathy** خمول؛ فتور الشعور؛ لا مبالاة. حالة اللامبالاة وقلة الشعور للأحداث التي تدور في محيط الشخص.
- apertura** فتحة. (ج: فتحات). مصطلح تشريحي يدل على فتحة.
- **a. lateralis ventriculi quarti** الفتحة

- الوَحْشِيَّة لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ. فتحة في نهاية الرذبة الوحشي للبطين الرابع توصله بالحيز تحت العنكبوتية تسمى أيضاً فتحة لوشكا.
- a. medialis ventriculi quarti** الفتحة
- الإنسيَّة لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ. فتحة ناصفة في القسم السفلي من سطح البطين الرابع توصله بالحيز تحت العنكبوتية. تسمى أيضاً فتحة ماجندي.
- apesthetic** عديم الحواس. فاقد الحواس.
- aphagia** إمتناع عن الطعام. الامتناع عن تناول الطعام.
- **a. algera** الإمتناع عن الطعام الألمي. الامتناع عن تناول الطعام بسبب الألم الذي يولده.
- aphagopraxia (= dysphagia)** عسر البلع. صعوبة بلع الطعام أو الشراب.
- aphakia** إنعدام العدسة. عدم وجود عدسة العين بسبب خلقي أو رضحي.
- aphasia** حُبْسَة. (ج: حُبْسَات). عيب أو فقدان المقدرة على التعبير بالكلام أو بالكتابة أو بالإيماء أو فهم الكلام المنطوق أو المكتوب بسبب إصابة أو مرض المراكز العصبية.
- **acoustic a. (= auditofoy a.)** حُبْسَة سَمْعِيَّة. عدم المقدرة على التعبير عن حس الذوق بالكلمات.
- **ageusic a.** حُبْسَة مذاقيَّة. عدم المقدرة على التعبير عن حس الذوق بالكلمات.
- **amnemonic a.** حُبْسَة نَسَاوِيَّة؛ حُبْسَة التسمية. نسيان الكلمات الذي يؤدي إلى الحبسة.
- **amnesic a. (= amnestic a, anomic a. nominal a.)** حُبْسَة التسمية؛ حُبْسَة نَسَاوِيَّة. عدم المقدرة على تذكر بعض الكلمات أو أسماء بعض المواد أو الأشخاص مع تمام المقدرة على الفهم وتكرار الكلمات المسموعة ولكنه يتوقف عن الكلام عند محاولة تذكر الأسماء ثم يعتذر ويقدم وصفا للكلمة المنسية.
- **anomic a.** حُبْسَة التسمية. عدم المقدرة على تذكر الكلمات وخصوصاً أسماء الأشخاص والمواد.
- **anosmic a.** حُبْسَة شَمِيَّة. عدم المقدرة على التعبير بالكلمات عن حس الشم.
- **associative a.** حُبْسَة التَّرابُط. حبسة تتولد عن اختلال الترابط بين أقسام القشرة المخية.

- ataxic a. (= expressive a.) حُبْسَةُ رَجَحِيَّة؛ حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّة.
- auditory a. (= Wernicke's a. = word deafness) حُبْسَةُ سَمْعِيَّة. عدم فهم الكلمات المسموعة بسبب علة في الباحات السمعية في القسم الخلفي للتلفيفين الصدغيين الاول والثاني في نصف كرة المخ السائدة.
- Broca's a. (= expressive a.) حُبْسَةُ بَرْوَكَا؛ حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّة.
- central a. (= global a.) حُبْسَةُ مَرْكَزِيَّة.
- central sensory a. (Wernicke's a.) حُبْسَةُ حِسِّيَّة مَرْكَزِيَّة. حبسة فرنيكا.
- color name a. حُبْسَةُ تَسْمِيَةِ الْأَلْوَان. عدم المقدرة على تسمية الألوان المنظورة.
- combined a. حُبْسَةُ مَرْكَبَة. إصابة الشخص بعدة أنواع من الحبسات في نفس الوقت.
- commissural a. حُبْسَةُ صَوَارِيَّة. حبسة تتولد عن آفة في الجزيرة التي توصل مراكز الكلام الحركية بمراكزه الحسية.
- complete a. حُبْسَةُ تَامَّة. حبسة تتولد عن إصابة كل المراكز الكلامية في الدماغ وعدم المقدرة على التواصل مع الآخرين بأية طريقة.
- conduction a. حُبْسَةُ التَّوَصِيل. حبسة الشخص الذي يتكلم بطلاقة ولكنه يكرر بعض الكلمات أو المقاطع المغلوطة في سياق كلامه.
- cortical a. (= global a.) حُبْسَةُ قَشْرِيَّة.
- expressive a. حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّة. حبسة تتصف بعدم المقدرة على التعبير سواء نطقاً أو كتابة أو إيماء بسبب آفة في مراكز الكلام القشرية، ويتمكن المصاب من فهم الكلام الذي يسمعه أو يقرأه ويمكنه تكوين الأفكار التي يريد أن يقولها ولكنه لا يتمكن من التعبير عنها.
- expressive-receptive a. (= global a.) حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّةِ اسْتِقْبَالِيَّة؛ حُبْسَةُ شَامِلَة.
- fluent a. حُبْسَةُ طَلِيْقَة. حبسة يتكلم المصاب بها كلاماً فصيحاً وصحيحاً لغوياً ولكن دون أي معنى أو محتوى.
- frontocortical a. (= expressive a.) حُبْسَةُ قَشْرِيَّة جَنْهِيَّة؛ حُبْسَةُ تَغْيِيرِيَّة.
- frontolenticular a. (= commissural a.) حُبْسَةُ جَنْهِيَّة عَدَسِيَّة؛ حُبْسَةُ صَوَارِيَّة.
- functional a. حُبْسَةُ وَظِيفِيَّة. حبسة تتولد عن اضطرابات هستيرية شديدة.
- gestural a. تَعَدُّرُ الْإِيْمَاء؛ حُبْسَةُ إِيْمَائِيَّة؛ الأِيْمَائِيَّة. انظر amimia.
- gibberish a. (= jargon a.) حُبْسَةُ رَاطِنَة.
- global a. (central a.) حُبْسَةُ شَامِلَة. حبسة عامة تشمل كل جوانب وظيفة الكلام والتواصل بسبب آفة مركزية شاملة لكل مناطق.
- graphomotor a. حُبْسَةُ حَرَكَيَّة كِتَابِيَّة. حبسة لا يتمكن المصاب بها من التعبير بالكتابة.
- impressive a. (= sensory a.) حُبْسَة انطباعية؛ حُبْسَة حِسِّيَّة.
- intellectual a. (= true a.) حُبْسَة فِكْرِيَّة؛ حُبْسَة حَقِيقِيَّة؛ حُبْسَة ثَقَافِيَّة.
- jargon a. حُبْسَةُ رَاطِنَة. حبسة إدراكية يرافقها ترديد مقاطع أو كلمات غير ذات معنى.
- Kussmaul's a. حُبْسَةُ كُوسْمَاوُل. حبسة تتصف بالامتناع الإرادي عن الكلام كما يحدث في الجنون.
- lenticular a. (= commissural a.) حُبْسَة عَدَسِيَّة؛ حُبْسَة صَوَارِيَّة.
- a. lethica (= amnemonic a.) حُبْسَة نَسَاوَة الْكَلِمَات.
- mixed a. (= global a.) حُبْسَة مُخْتَلِطَة؛ حُبْسَة شَامِلَة.
- motor a. (= expressive a.) حُبْسَة حَرَكَيَّة؛ حُبْسَة تَغْيِيرِيَّة.
- nominal a. حُبْسَة التَّسْمِيَة. حبسة تتصف بسوء استعمال الكلمات للدلالة على المواد والأشياء.
- nonfluent a. حُبْسَة لَا طَلِيْقَة. حبسة تتصف بالنطق بكلام قصير وببطء شديد بسبب آفة في باحة بروكا.
- optic a. حُبْسَة بَصَرِيَّة. عدم المقدرة على تسمية المواد والأشياء المنظورة بسبب آفة تقطع الاتصال بين المركزين البصري والكلامي.



- **parieto-occipital a.** حُبْسَةٌ جَذَارِيَّةٌ قَذَالِيَّة. تُعَدُّ القراءة والاداء.
- **pathematic a.** حُبْسَةٌ التَّهْيَب. حبسة تتولد عن الخوف أو التهيب.
- **pictorial a. (= global a.)** حُبْسَةٌ شَامِلَةٌ.
- **psychosensory a. (= receptive a.)** حُبْسَةٌ نَفْسِيَّةٌ جِسْمِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّة.
- **pure motor a.** حُبْسَةٌ حَرَكِيَّةٌ صَرَفَةً. عدم المقدرة على التعبير بالكلام مع الاحتفاظ بالمقدرة على التعبير بالكتابة أو إدراك الكلام المقروء أو المسموع.
- **receptive a.** حُبْسَةٌ اسْتِقْبَالِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّة. عدم المقدرة على فهم الكلام المقروء أو المسموع أو الرموز الكلامية اللمسية بسبب مرض مراكز الكلام السمعية والبصرية.
- **semantic a.** حُبْسَةٌ الدَّلَالَةِ. حبسة تتصف بفقدان المقدرة الكاملة على التعرف على معنى دلالة الكلمات والمقاطع مع تساوة معنى بعضها.
- **sensory a. (= receptive a.)** حُبْسَةٌ جِسْمِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّة.
- **subcortical a.** حُبْسَةٌ تَحْتَ القَشْرِيَّة. حبسة تتسبب عن آفة تقطع السبل الواردة لمراكز الكلام السمعية.
- **syntactical a.** حُبْسَةٌ عِبَارِيَّة. حبسة تتصف بعدم مقدرة المريض على ترتيب الكلمات بصورة صحيحة فيبدو كلامه هذراً.
- **tactile a.** حُبْسَةٌ لَمْسِيَّة. عدم المقدرة على تسمية الأشياء بمجرد اللمس.
- **temporoparietal a. (= receptive a.)** حُبْسَةٌ صُدْغِيَّةٌ جَذَارِيَّة؛ حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّة.
- **total a. (= global a.)** حُبْسَةٌ شَامِلَةٌ. انظر global a.
- **transcortical a.** حُبْسَةٌ عِبرَ القَشْرَةِ. حبسة تتكون عن آفة تقطع الاتصال بين المنطقة الكلامية والمراكز القشرية الأخرى.
- **true a.** حُبْسَةٌ حَقِيقِيَّة. حبسة تتولد عن آفة تصيب أحد مراكز الكلام المركزية.
- **verbal a. (= expressive a.)** حُبْسَةٌ تَعْبِيرِيَّة؛ حُبْسَةٌ لَفْظِيَّة.
- **visual a. (= alexia)** حُبْسَةٌ بَصَرِيَّة؛ تُعَدُّ القراءة، اللأَقْرَائِيَّة.
- **Wernicke's a. (= receptive a.)** حُبْسَةٌ إِدْرَاكِيَّة.
- aphasiac** أَحْبَس. شخص مصاب بالحبسة.
- aphasic** أَحْبَس. شخص مصاب بالحبسة أو بما يتعلق بها.
- aphemesthesia (= alexia)** تُعَدُّ القراءة، اللأَقْرَائِيَّة.
- aphemia** صُمَات. فقدان المقدرة على الكلام بسبب آفة مركزية.
- aphephobia (= haphephobia)** رُهَابُ اللَمْس. خوف الشخص من أن يلمسه أحد.
- aphonia** فَقْدُ الصَّوْت. عدم المقدرة على التصويت.
- **a. clericorum** فَقْدُ الصَّوْتِ الخُطَابِيِّ. فقد الصوت أو صعوبته كالذي يصاب به الخطباء الذين يتكلمون لفترة طويلة كالقساوسة.
- **hysteric a.** فَقْدُ الصَّوْتِ الهِسْتِيرِيِّ. فقد الصوت بسبب هستيري ومن دون أي مرض أو آفة عضوية.
- **a. paralytica** فَقْدُ الصَّوْتِ الشَّلَلِيِّ. فقد الصوت بسبب مرض شللي لأعصاب الحنجرة.
- **spastic a.** فَقْدُ الصَّوْتِ التَشْنُجِيِّ. اختلال التصويت بسبب تشنج عضلات الحنجرة.
- aphonic** فَاقِدُ الصَّوْت. مريض مصاب بفقد الصوت.
- aphonogelia** تُعَدُّ القَهْقَهة. عدم المقدرة على الضحك بصوت عالٍ.
- aphotesthesia** قَلَّةُ حِسِّ الضَّوْء. نقصان التحسس بالضوء بسبب التعرض الطويل لضوء الشمس.
- aphrasia** حُبْسَةُ الجَمَل. عدم المقدرة على تكوين الجمل الكلامية أو فهم ما يسمعه المصاب منها.
- aphrenia** خَرْفٌ. تخلف عقلي.
- aphrodisia** بَاةٌ؛ الرَغْبَةُ الجَنَسِيَّة. فَيَاج جنسي.

**aphrodisiac** بَاهِي. مهيج الغرائز الجنسية.

**aphrodisiomania** هَوَسُ الْغُلْمَةِ؛ هَوَسُ الْعِشْقِ. erotomania. أنظر

**aphronesia** خَرَفٌ. أنظر dementia.

**aphronia** قَلَّةُ التَّعَقُّلِ. قلة التفكير بسبب الخرف.

**aphthongia** حُبْسَةُ تَصْوِيتِيَّةٍ. حبسة بسبب تشنج عضلات الكلام.

**apokamnosis** سُرْعَةُ التَّعَبِ. سرعة الشعور بالتعب مع النمل وثقل حركة الأطراف وخصوصاً في داء الوهن العضلي.

**apoplectic** سَكَّتِي. منسوب إلى السكتة أو مرتبط أو مصاب بها.

**apoplectiform** شَبِيهِ السَّكَّةِ. حالة شبيهة بالسكتة.

**apoplexia (= apoplexy)** سَكَّةٌ.

**apoplexy** سَكَّةٌ. 1. خلل عصبي مباشر ينتج عن اضطراب وعائي دماغي محدد ينتج أحياناً عن نزف داخل القحف أو في أحيان أخرى عن آفة تتولد من انسداد وعاء دماغي.

**- asthenic a.** سَكَّةٌ وَهْنِيَّةٌ. سكتة تتولد عن الوهن والضعف العام.

**- bulbar a.** سَكَّةٌ بَصْلِيَّةٌ. سكتة تتولد عن نزيف في الجسر.

**- capillary a.** سَكَّةٌ شُعْبَرِيَّةٌ. سكتة تتولد عن انفجار أوعية شعيرية في الدماغ.

**- cerebellar a.** سَكَّةٌ مُخَيَّجِيَّةٌ. سكتة تتولد عن نزيف في المخيخ.

**- cerebral a. (= cerebral hemorrhage)** سَكَّةٌ مُخَيَّةٌ. نزف مخي.

**- delayed a.** سَكَّةٌ أَجَلَةٌ. نزف مخي يحدث بعد بضعة أيام من إصابة الرأس.

**- embolic a.** سَكَّةٌ صِمِّيَّةٌ. متلازمة سكتية تتولد من انسداد الشريان المعخي بصمة.

**- fulminating a.** سَكَّةٌ خَاطِفَةٌ. نزف دماغي يؤدي إلى سقوط المصاب فجائياً مع فقدان الوعي التام.

**- heat a.** ضَرْبَةٌ حَرَارِيَّةٌ. أنظر heat stroke.

**- ingravescent a.** سَكَّةٌ مُتَفَاعِمَةٌ. شلل مترق بسبب تسرب دموي خفيف ومستمر من وعاء دماغي.

**- neonatal a.** سَكَّةٌ الْوَلِيدِ. متلازمة سكتية تصيب الوليد حديث الولادة.

**- ovarian a.** سَكَّةٌ مَبِيضِيَّةٌ. تسرب دموي كبير في المبيض.

**- pancreatic a.** سَكَّةٌ بَنَكْرِيَّاسِيَّةٌ. نزف دموي شديد في البنكرياس يشاهد في خذلان القلب وفي فرط الضغط العالي.

**- pituitary a.** سَكَّةٌ نُخَامِيَّةٌ. تنكس واسع ومفاجيء في الغدة النخامية يترافق مع ورمها ويؤدي إلى صداع مفاجيء مع العمى والنعاس والتخليط ومن ثم السبات.

**- pontile a. (= bulbar a.)** سَكَّةٌ جَسْرِيَّةٌ؛ سَكَّةٌ بَصْلِيَّةٌ.

**- renal a.** سَكَّةٌ كُلَوِيَّةٌ. حالة مميتة تتولد عن تمزق شريان كلوي داخلي.

**- spinal a.** سَكَّةٌ نُخَاعِيَّةٌ. نزف في مادة النخاع الشوكي.

**- thrombotic a.** سَكَّةٌ خَثَارِيَّةٌ. سكتة تتولد عن خثار يصيب أحد الشرايين الدماغية.

**- traumatic a.** سَكَّةٌ رَضَحِيَّةٌ. نزف دماغي يتلو إصابة الرأس وتظهر أعراضه بعد عدة أيام أو أسابيع من الإصابة.

**appalesthesia** فَقْدَانُ جِسِّ الْإِهْتِرَازِ.

**apperception** إِدْرَاكٌ شُعُورِيٌّ. إدراك واع والتعرف على المنبهات الحسية وإدراكها.

**apperceptive** إِدْرَاكِيٌّ شُعُورِيٌّ. شخص يدرك المنبهات الحسية.

**appersonification** تَكْوَانُ الذَّاتِ؛ تَشَاخُصٌ. عدم معرفة المرء لذاته وتعريفها أو اعتقاده بأنه شخص آخر.

**appestat** نَاطِلُ الشَّهْيَةِ. مركز ينظم الشهية للطعام يوجد في الوطاء ويحدد كمية الطعام التي يتناولها الشخص.

**appetite** شَهْيَةٌ. رغبة الإنسان الطبيعية لتناول الأطعمة.

**appetition** تَرُغْبٌ. تركيز الرغبة نحو هدف أو موضوع معين واحد.

**appetitive** اندفاعي. سلوك اندفاعي مثير.

**apprehension** 1. فهم 2. توجُّس.

1. إدراك وفهم الحواس والمدرجات 2. توجُّس وتوقع الخوف والقلق.

**apractic** مصاب بتعذر الأداء. متعلق بتعذر الأداء أو متصف بها أو مصاب بها.

**apraxia** تعذر الأداء؛ اللأداءية. فقدان المقدرة على أداء الحركات الإرادية القصدية مع عدم وجود أي شلل أو خلل حركي أو حسي.

تعذر الأداء الحركي. عدم القدرة على القيام بالحركات التلقائية.

**amnesic a.** تعذر الأداء بفقد الذاكرة. عدم القدرة على أداء الحركات التي يطلب من الشخص القيام بها بسبب عدم تذكره أمر الحركة بالرغم من استطاعته القيام بالحركة لو تذكر الأمر.

**classic a. (= ideokinetic a.)** تعذر الأداء الافتكاري الحركي؛ اللأداءية المعهودة.

**constructional a.** تعذر الأداء البنائي. عدم المقدرة الحركية على نسخ الصور أو تركيب قطع اللعب أو الآلات.

**cortical a. (= motor a.)** تعذر الأداء القشري.

**dressing a.** تعذر الارتداء. عدم مقدرة المريض على ارتداء ملابسه بالرغم من عدم وجود مرض عضوي أو حركي أو حسي آخر.

**ideational a. (= ideatory a., sensory a.)** تعذر الأداء الافتكاري.

**ideokinetic a. (= ideomotor a.)** تعذر الأداء الافتكاري الحركي. انقطاع الارتباط بين مراكز التفكير ومركز حركة الأطراف فيتمكن المصاب من القيام بحركات بسيطة ولكنه لا يتمكن من القيام بالمعقدة منها.

**innervation a. (= motor a.)** تعذر الأداء التعصبي.

**Liebmann's a.** تعذر الأداء لبيمان. عدم المقدرة على القيام بحركات متناسقة في الأذرع من دون وجود أي شلل فيها.

**limb-kinetic a. (= ideokinetic a.)** تعذر الأداء الافتكاري الحركي.

**motor a.** تعذر الأداء الحركي. عدم المقدرة على استعمال الآلات والأدوات للقيام بعمل نافع بالرغم

من معرفة المصاب بطبيعتها وفوائدها وطرق استعمالها.

**sensory a.** تعذر الأداء الأحسي. عدم المقدرة على استعمال الآلات والأدوات للقيام بعمل نافع لعدم معرفة المريض بطبيعتها وفوائدها وطرق استعمالها.

**transcortical a. (= ideokinetic a.)** تعذر الأداء الفكري الحركي.

**apraxic** مصاب بتعذر الأداء. أنظر apractic.

**aprosexia** عجز التركيب. عجز التركيز على العمل أو التفكير.

**aprosody** رتابة الكلام. كلام يستمر على وتيرة واحدة.

**apselaphesia** ضعف حسّ اللمس. نقص حس اللمس وضعفه.

**apsithyria** فقدان الصّوت الهستيري. فقدان القدرة على التصويت حتى ولا همساً بسبب هستيري (هراعي).

**apsychia** قصور الوعي. نقص الوعي أو فقدانه بصورة تامة.

**apsychognosia** عمّة الذات. 1. عدم إدراك الشخص لحالته النفسية 2. عدم الإحساس والشعور بتأثير الشخص وسلوكه على الآخرين.

**apsychosis (= stupor)** ذهول. العجز عن التفكير.

**aptitude** ليّاقة؛ استعداد. القابليات والمهارات الشخصية في مختلف الحقول.

**aquaphobia** رهَابُ الماء. الخوف من الاقتراب من الماء أو السباحة فيه.

**aqueduct** مَسَال. ممر أو قناة في أحد الأعضاء أو البنيات.

**cerebral a.** مَسَال الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط. أنظر aqueductus mesencephali.

**cochlear a.** مَسَال القَوَعة. أنظر aqueductus cochleae.

**fallopian a.** نَفَقُ الوُجْهي. أنظر canalis facialis.

**a. of mesencephalon (= aqueductus mesencephali)** مَسَالُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط.

- a. of midbrain مَسَالُ الدُّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. انظر aqueductus mesencephali.

- a. of Sylvius مَسَالُ الدُّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. انظر aqueductus mesencephali.

- ventricular a. (= aqueductus cerebri) مَسَالُ الْمُخ. انظر aqueductus cerebri.

- a. of vestibule (= aqueductus vestibuli) مَسَالُ الدِّهْلِيلِ. انظر aqueductus vestibuli.

aqueductus (= aqueduct) مَسَالُ. انظر aqueductus.

- a. cerebri (= a. mesencephali) مَسَالُ الْمُخ: مسال الدماغ المتوسط.

- a. cochlea مَسَالُ الْقَوَاقِع. قنية صغيرة تربط سقالة الطبلة مع الحيز تحت العنكبوتية (وتسمى أيضاً قناة اللمفا المحيطة).

- a. endolymphaticus قَنَاقَةُ اللَّفِّ الْبَاطِن. انظر duct, endolymphatic.

- a. mesencephali مَسَالُ الدُّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. قنية ضيقة في الدماغ المتوسط تربط البطينين الثالث والرابع ببعضهما.

- a. vestibuli مَسَالُ الدِّهْلِيلِ. 1. قنية تمتد من دهليز الأذن الداخلية لتفتح على السطح الخلفي للجزء الصخري من العظم الصدغي 2. قناة اللمفا الباطنة.

1. مَائِي 2. الْخَلْطُ الْمَائِي. aqueous 1. مائي أو يحضّر مع الماء 2. الخلط المائي للعين.

رُهَابُ arachnophobia, arachnophobia الْعَنَاقِبُ. الخوف من العناكب.

التهاب arachnitis (= arachnoiditis) الْعَنْكَبُوتِيَّة.

1. عَنْكَبُوتِي 2. الْعَنْكَبُوتِيَّة. arachnoid الغشاء الرقيق الذي يتوسط بين الأم الجافية والأم الحنون.

- a. of brain, cranial a. عَنْكَبُوتِيَّةُ الدُّمَاغِ. العنكبوتية التي تحيط بالدماغ.

- a. of spinal cord (= spinal a.) عَنْكَبُوتِيَّةُ النُّخَاعِ. العنكبوتية التي تحيط بالنخاع الشوكي.

arachnoidal عَنْكَبُوتِي. متعلق بالعنكبوتية.

arachnoidea الْعَنْكَبُوتِيَّة. الغشاء الرقيق

الذي يتوسط بين الأم الجافية والأم الحنون ويفصله الحيز تحت العنكبوتية عن الأم الحنون.

- a. encephali (= a. mater encephali) عَنْكَبُوتِيَّةُ الدُّمَاغِ. العنكبوتية التي تحيط بالدماغ.

- a. spinalis (= a. mater spinalis) عَنْكَبُوتِيَّةُ النُّخَاعِ. العنكبوتية التي تحيط بالنخاع.

arachnoiditis الْتِهَابُ الْعَنْكَبُوتِيَّة. التهاب غشاء العنكبوتية.

- chronic adhesive a. الْتِهَابُ الْعَنْكَبُوتِيَّةُ الْغَزْمَنُ لِلصُّوقِي. تتخّن عنكبوتية الدماغ والنخاع والتصاقها بالأم الحنون. وينتج عن التهاب سابق في السحايا أو رضحها أو أية إصابة أخرى فيها أو حقن مادة غريبة في الحيز تحت العنكبوتية. وتعتمد الأعراض والعلامات على مدى اتساع الإصابة.

arachnopia (= leptomeninges) الْعَنْكَبُوتِيَّةُ الْحَنُونَةُ: العنكبوتية الرقيقة. اعتبار الغشاءين العنكبوتي والحنون كوحدة وظيفية واحدة.

سَوْءُ الرِّفَاءِ dysraphia. انظر araphia.

arborization تَشَجُّر. 1. الفروع الانتهازية لبعض الألياف العصبية 2. نهايات متفرعة لبعض الألياف العصبية الحركية التي تنتهي فروعها عند الألياف العضلية.

arbor medullaris vermis (= arbor vitae cerebelli) الشجرة النخاعية للدودة: شجرة الحياة الْمُخَيَّخِيَّة.

arbor vitae cerebelli شَجَرَةُ الْحَيَاةِ الْمُخَيَّخِيَّة. الفروع الشجرية للمادة البيضاء المخيخية التي تظهر في المقطع الناصف للمخيخ.

arbor vitae of vermis (= arbor vitae cerebelli) شجرة حياة الدودة المخيخية: شجرة الحياة الْمُخَيَّخِيَّة.

قَوْس. بنية أو سبيل عصبي على شكل قوس arc منحني.

- neural a. قَوْسٌ عَصَبِيَّة. سلسلة من عصبونين أو أكثر توصل بعض المستقبلات مع المستقبلات، كالعضلات والغدد، وتكون السبيل للاستجابات والمنعكسات العصبية.

- reflex a. قَوْسٌ إِنْعَاسِيَّةٌ. القوس العصبي الذي تمر خلاله الدفعات العصبية الواردة والمتجهة نحو المركز العصبي والذي تصدر منه الإجابة التي تمر دفعاتها الصادرة خلاله أيضاً لتتجه نحو العضو المستقل.

- sensorimotor a. (= neural a.) قَوْسٌ حَسِّيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ: قَوْسٌ عَصَبِيَّةٌ.

archaeocerebellum المَخِيخُ البدائي. القسم التطوري القديم من المخيخ، وهو يشمل العقدة النذفية العقدية واللسين وتغذيها الياف قوقعة دهليزية بصورة رئيسية كما يستلم اللسين بعض الألياف النخاعية المخيخية أيضاً.

archaeocortex القشرة البدائية. قسم قشرة المخ الذي يتطور مع القشرة القديمة بالترابط مع الجملة الشمية وهي أقدم تطورياً من القشرة الحديثة ولا تحتوي على بنيات طبقية.

archencephalon الدماغ البدائي. الدماغ البدائي أمام الحبل الظهر الذي يتطور منه الدماغ المتوسط والدماغ الأمامي.

archeocerebellum المَخِيخُ البدائي. انظر archaeocerebellum.

archeocortex القشرة البدائية. انظر archaeocortex.


archeokinetic (= archeocinetic) حَرَكِيَّةٌ بدائية. آلية العصب الحركي البدائية التي تشاهد في الجهاز العصبي المحيطي والعقدي.

archipallium القشرة البدائية. البالة البدائية. انظر archaeocortex.

archistriatum المَخَطُّ البدائي. الجسم المخطط البدائي الذي يمثل في الإنسان الجسم اللوزي.

ardanesthesia فَقْدَانُ حِسِّ الحَرَارَةِ. انظر thermanesthesia.

area بَاحَةٌ. حيز محدود، ويستعمل الاصطلاح تشريحياً ليدل على موضع محدد أو منطقة وظيفية محدودة.




arc, reflex

القوس الانعكاسية: (1) منطقة الجلد المنبّه والعصب الحسي (2) السبيل العصبي الوارد (3) العقدة الشوكية (الخلية العصبية الحسية) (4) الجذر الخلفي (5) خلية عصبية دماغية (6) السبيل المحيطي للانعكاس الدماغي (7) العصبون الحركي للقرن الأمامي (8) الجذر الأمامي (9) السبيل العصبي الصادر (10) تنبيه عضلات الذراع وانفثاءها.

- acoustic a. (= a. acoustica, vestibular a.) البَاحَةُ السَّمْعِيَّةُ: البَاحَةُ الدَّهْلِيَّةِيَّة.
- amygdaloid a. (= a. amygdaloidea anterior) البَاحَةُ اللُّوزِيَّة.
- a. amygdaloidea anterior البَاحَةُ اللُّوزِيَّة الأَمَامِيَّة. منطقة عبورية ضعيفة التمايز في القسم القشري الإنسي للجسم اللوزي تتصل عبره النوى مع المناطق المجاورة.
- association a's. بَاحَاتُ تَرَابُطِيَّة. باحات قشرة المخ التي تترايط مع بعضها البعض ومع المهاد الجديد بواسطة ألياف عديدة تمر خلال الجسم الثفني والمادة البيضاء لنصفي كرة المخ وتتم في هذه المناطق الكثير من الوظائف الدماغية العليا كالوظائف العقلية والعاطفية والفكرية والذاكرة والتعلم.

- auditory a. (= vestibular a.) البَاحَةُ السَّمْعِيَّةُ: البَاحَةُ الدَّهْلِيَّةِيَّة.
- Betz cell a. (= motor a.) البَاحَةُ الحَرَكِيَّة: بَاحَةُ خَلَايَا بَتْز.
- Broca's motor speech a. بَاحَةُ بَرُوكَا الكَلَامِيَّة الحَرَكِيَّة. باحة تشمل أجزاء من القسمين الوصادي والمثلثي للتلفيف الجبهي السفلي وتؤدي إصابتها إلى حبة حركية.
- Broca's parolfactory a. (= a. subcallosa) البَاحَةُ تَحْتَ الثَّنْفِيَّة.
- Brodmann's a's. بَاحَاتُ بَرُودَمَان. باحات القشرة المخية المختلفة والتميزة باختلافات ترتيب طبقاتها الخلوية الست مما يعطي كلاً منها رقماً خاصاً بها.


القشرة الحسية الحركية للمخ



areas, cerebral

رسم يبين الباحات الحسية والحركية في قشرة المخ امام وخلف الشق المركزي.

- a. centralis      البَاحَةُ المَرْكَزِيَّةُ. بقعة الشبكية.  
انظر macular retinae.
- cingulate a.      البَاحَةُ الحِزَامِيَّةُ. الباحة  
التي تشمل التلفيف الحزامي والبرزخ.
- a. cochleae      البَاحَةُ القَوَاقِعِيَّةُ. القسم الامامي  
من الجزء السفلي من قاع الصماخ السمعي الباطن  
بالقرب من قاعدة القوقعة.
- a. cribrosa media (= a. vestibularis  
inferior)      البَاحَةُ المِصْفَوِيَّةُ الإنْسِيَّةُ.  
باحة الدهليز السفلية.
- a. cribrosa superior (= a. vestibularis  
superior)      البَاحَةُ المِصْفَوِيَّةُ العُلَوِيَّةُ.  
باحة الدهليز العلوية.
- dorsal hypothalamic a. (= regiohyp-  
othalamica dorsalis)      المِنطَقَةُ الظَّهْرِيَّةُ  
للوطاء.
- entorhinal a.      البَاحَةُ الشَّمْنِيَّةُ الداخلية.  
جزء القشرة المخية للتلفيف جنيب الوطاء وعلى الجهة  
الإنسية للشق الشمي.
- excitable a.      بَاحَةُ مُسْتَنَارَةٍ. أية باحة في  
القشرة المخية تولد عند استثارتها استجابات حركية.
- excitomotor a. (= motor a.)      بَاحَةُ استنارة  
حَرَكَية.
- eye a.      البَاحَةُ العَيْنِيَّةُ. باحة الساحة العينية  
في الفص الجبهي التي تسيطر على حركة العينين.
- frontal a's.      البَاحَاتُ الجَبْهِيَّةُ. باحات قشرة المخ  
التي توجد أمام الشق المركزي وتشمل تلك الموجودة  
على المنطقة الحجاجية والوجه الإنسي للفص الجبهي.
- fronto-orbital a. (= prefrontal a.)      البَاحَةُ  
أَمَامَ الجَبْهِيَّةُ؛ البَاحَةُ الجَبْهِيَّةُ الحَاجَاجِيَّةُ.
- gustatory a.      البَاحَةُ الذَّوْقِيَّةُ. باحة القشرة  
الدماغية التي تستلم حس الذوق وهي مختلفة عادة في  
الشق الوحشي من مخ الإنسان.
- a. hypothalamica dorsalis (= regi-  
ohypothalamica dorsalis)      باحة الوطاء  
الظهرانية؛ نَاحِيَّةُ ظَهْرُ الوطاء. البَاحَةُ الوِطَائِيَّةُ.
- a. hypothalamica lateralis      بَاحَةُ الوِطَاءِ  
الوَخْشِيَّةُ. باحة في منطقة الوطاء المتوسطة على  
الجهة الوحشية من القبر ومن الحزمة الحلمية  
المهادية.
- insular a.      بَاحَةُ الجَزِيرَةِ. قشرة الجزيرة.



areas, cerebral


المناطق الدماغية القشرية (والدماغية الشمية) المتعلقة بالانفعالات العاطفية والوظائف الحشوية المستقلة: (1) الباحة الحركية 4 (2) الباحة الحسية الجسدية (3) الجسم الثفني (4) الحصين (5) التلفيف الحصيني (6) الباحة البصرية 17 (7) الجهاز الشمي 1 (8) المعقد اللوزي (9) الجهاز الشمي 2 (10) الجهاز الشمي 3 (11) القشرة الحجاجية (12) البصلة الشمية (13) الجسم الحلمي (14) الباحات أمام الجبهية 10، 11، 12 (15) المهاد (16) القبر (17) التلفيف الحزامي (18) الباحة أمام الحركية 6.

- language a. **بَاحَةُ اللُّغَةِ**. إحدى مناطق قشرة المخ في نصف الكرة السائد التي تتحكم وتسيطر على إدراك اللغة والكلام.
- macular a. **بَاحَةُ البِقْعَةِ؛ بُقْعَةُ الشَّبَكِيَّةِ**. انظر macular retinae.
- motor a. **البَاحَةُ الحَرَكِيَّةُ**. منطقة القشرة المخية الواطئة العتبة ذات فترة الكمون القصيرة للمنبهات الكهربائية التي تولد الاستجابات الحركية العضلية.
- motor speech a. (= Broca's motor speech a.) **بَاحَةُ الكَلَامِ الحَرَكِيَّةِ**.
- a. nervi facialis **بَاحَةُ العَصَبِ الوَجْهِيِّ**. جزء قاع الصماخ السمعي الباطن من حيث يدخل العصب الوجهي إلى القناة الوجهية.
- olfactory a. **البَاحَةُ الشَّمِّيَّةُ**. 1. منطقة واسعة تشمل البصلة الشمية والسبيل والمثلث الشميين والجزء الأمامي من التلفيف الحزامي والمعقف 2. المادة المثقبة الأمامية.
- a. opaca **البَاحَةُ المَعْفَقَةُ**.
- parolfactory a. of Broca (= a. subcallosa) **بَاحَةُ بروكا حول الشَّمِّيَّةِ؛ البَاحَةُ تَحْتَ الثَّنْفِيَّةِ**.
- a. perforata (= substantia perforata) **البَاحَةُ المثقبة؛ المَادَّةُ الْمُثَقَّبَةُ**.
- peristriate a. **البَاحَةُ حَوْلَ المُخَطَّطِيَّةِ**. باحة في القشرة القذالية للمخ تحيط بالقشرة البصرية المخططة.
- piriform a. **البَاحَةُ الكُمُثْرِيَّةُ الشَّكْلُ**. باحة في الدماغ الشمي تشمل التلفيف الشمي الوحشي وعتبة الجزيرة والمعقف وجزء من التلفيف جنيب الوطاء. وهي عادة شبيهة بشكل الكمثرى.
- postcentral a. **البَاحَةُ خَلْفَ المَرْكَزِيِّ**. الباحة الحسية التي تقع بالخلف من التلم المركزي لنصف كرة المخ وهي منطقة الإدراك الحسي الأولي العام.
- a. postrema **البَاحَةُ خَلْفَ الحَافَةِ**. باحة صغيرة شبيهة باللسان تقع على الجدار الوحشي للبطين الرابع بين الحبل الفاصل والحديبة الناحلة ومن الممكن أن يحور فيها الحاجز الدموي الدماغي.
- postrolandic a. (= postcentral a.) **البَاحَةُ بَعْدَ المَرْكَزِيِّ**.
- precentral a. (= motor a.) **البَاحَةُ الحَرَكِيَّةُ**. البَاحَةُ أَمَامَ المَرْكَزِيِّ.
- prefrontal a. **البَاحَةُ أَمَامَ الجَبْهِيَّةِ**. قشرة الفص الجبهي أمام القشرة قبل الحركية مباشرة وهي منطقة تختص بالوظائف الارتباطية بصورة عامة.
- premotor a. **البَاحَةُ أَمَامَ الحَرَكِيَّةِ**. قشرة الفص الجبهي التي تقع مباشرة أمام التلفيف قبل المركزي.
- preoptic a. (= a. preoptica) **البَاحَةُ أَمَامَ البَصْرِيَّةِ**. مجموعات متعددة من الخلايا تقع في المستوى الناصف مباشرة تحت الصوار الأمامي للدماغ الانتهازي وهي مرتبطة وظيفياً بالوطاء.
- pretectal a. (= a. pretectalis) **البَاحَةُ أَمَامَ السَّقْفِيَّةِ**. باحة تقع عند اتصال الدماغ المتوسط والدماغ البيني وتمتد من موقع ظهري وحشي لصوار فوق المهاد نحو الأكمة القحفية حيث تتوضع فيها النواة أمام السقفية.
- primary a's. **البَاحَاتُ الأُولِيَّةُ**. باحات القشرة المخية التي تشمل الباحات الحركية والحسية.
- primary receptive a. **بَاحَةُ اسْتِقْبَالِيَّةِ أُولِيَّةٍ**. باحة القشرة المخية التي تستقبل الإسقاطات المهادية لأنواع الحواس الأولية كالبصر والسمع واللمس وما شاكل.
- projection a's. **البَاحَاتُ الإسْقَاطِيَّةُ**. باحات القشرة المخية التي تستقبل الإسقاطات الحسية الأولية المباشرة من أنحاء الجسم.
- psychomotor a. (= motor a.) **البَاحَةُ الحَرَكِيَّةُ**.
- pyriform a. (= piriform a.) **البَاحَةُ الكُمُثْرِيَّةُ الشَّكْلُ**.
- receptive a. (= primary receptive a.) **بَاحَةُ اسْتِقْبَالِيَّةٍ**.
- rolandic a. (= motor a.) **البَاحَةُ الحَرَكِيَّةُ**.
- sensorimotor a. **البَاحَةُ الحَسِّيَّةُ الحَرَكِيَّةُ**. القشرة المخية قبل وبعد التلم المركزي وتشمل التلفيف بعد المركزي (الباحة المستقبلية الأولية) والتلفيف قبل المركزي (الباحة الحركية).
- sensory a. (= primary receptive a.) **البَاحَةُ الحَسِّيَّةُ؛ البَاحَةُ الاسْتِقْبَالِيَّةِ الأُولِيَّةُ**.



- **septal a.** البَاحَةُ الحَاجِزِيَّة. الباحة الموجودة على نصفي كرة المخ وتشمل الباحة جنب الشمية (الباحة تحت التقنية) والمنطقة المناسبة من الحاجز الشفاف. وتصل هذه الباحة ارتباطات من المناطق الشمية والوطائية والحسينية.
- **silent a.** بَاحَةٌ صَامِتَةٌ. منطقة دماغية تحدث فيها مرضية للمصاب.
- **somatic sensory a. (= somatosensory a.)** بَاحَةُ الحِسِّ الجَسَدِيِّ. باحة الإسقاط القشرية المخية في التلفيف بعد المركزي تستقبل المعلومات التي تبدأ عند تنبيه مستقبلات الجلد والمفاصل والعضلات والاحشاء وهي تشارك في الإدراك الواعي للحواس.
- **a. striata (= cortex, straita)** البَاحَةُ المَخْطُطَةُ: القَشْرَةُ المَخْطُطَةُ.
- **strip a.** البَاحَةُ الشَّرِيطِيَّة. منطقة ضيقة طولانية تفصل الباحة الحركية عن الباحة قبل الحركية ويعتقد بأنها منطقة مثبطة.
- **a. subcallosa (= subcallosal a.)** البَاحَةُ تَحْتَ الثَّقَنِيَّة. باحة صغيرة على السطح الإنسي لقشرة نصف كرة المخ أمام التلفيف تحت الثقني مباشرة.
- **supplementary a's.** البَاحَاتُ الإِضَافِيَّة. باحات حركية أو حسية تكمل الباحات الأولية.
- **suppressor a's.** بَاحَاتُ كَاطِبَةٍ. باحات في قشرة المخ تثبط أو تمنع الحركات الجسمية.
- **vagus a. (= trigonum nervi vagi)** بَاحَةُ المِغْهَم؛ مُثَلَّثُ العَصَبِ المِغْهَم. الباحة في قاع البطن الرابع من حيث تبدأ ألياف العصب المبهم.
- **vestibular a.** البَاحَةُ الدِّهْلِيْزِيَّة. حدة دائرية مثلثة تقع بالجهة الوحشية لنقرة البطن الرابع وتمر من فوقها السطور البصلية وهي تمتد إلى الرقب الوحشي حيث تكون الحدية السمعية.
- **a. vestibularis inferior** البَاحَةُ الدِّهْلِيْزِيَّةُ السُّفْلِيَّة. القسم السفلي من قاع الصماخ السمعي الباطن.
- **a. vestibularis superior** البَاحَةُ الدِّهْلِيْزِيَّةُ العُلْوِيَّة. القسم العلوي من قاع الصماخ السمعي الباطن.


- **visual a.** البَاحَةُ الإِبْصَارِيَّة. القشرة المخية المخططة وحول المخططة في الفص القذالي.
- **visuopsychic a.** البَاحَةُ الإِبْصَارِيَّةُ النَّفْسَانِيَّة. باحة القشرة المخية المتخصصة في ترجمة وإدراك الحواس البصرية.
- **visuosensory a.** البَاحَةُ الإِبْصَارِيَّةُ الحِسِّيَّة. باحة إسقاطية في قشرة المخ تستقبل الدفعات الحسية التي تبدأ من شبكية العين وهي باحة تحيط بالشق المهادي وتقوم بإدراك الحواس البصرية الواعية.
- **Wernicke's a.** بَاحَةُ فَرْنِيكَّة. الباحة التي تشمل مركز الكلام في القسم الخلفي من التلفيف الصدغي العلوي والتلفيف فوق الهامشي والزواوي.
- **areflexia** فَقْدُ المُنْعَكَسَات. فقدان المنعكسات.
- **argamblyopia** غَمَشُ الإِهْمَال. غمش يتولد لعدم استعمال العين لفترة طويلة.
- **arhigosis (= arrhigosis)** فَقْدَانُ حَسِّن. عدم المقدرة على إدراك حس البرد.
- **arhinencephalia (= arhinencephaly)** إِنْغِدَامُ الدِّمَاغِ الشَّمِيِّ. الغياب الخلقي للدماغ الشمي.
- **arithmomania** هَوَسُ الحِسَاب. هوس عد الخطوات عند المشي مثلاً أو عد درجات السلم أو أعمدة الكهرباء وما شاكل ذلك وهو عرض في الاضطراب الوسواسي القسري.
- **arousal** 1. تَهَيُّجٌ جِنْسِيٌّ. 2. حالة التيقظ والاستجابة للمنبهات الحسية 2. هيجان جنسي.
- **arrector pili** مَفْعَةُ الشَّعْرَةِ. عضلة جلدية صغيرة ملساء تلتصق بالغمد النسيجي الضام لجريب الشعرة يؤدي تقلصها إلى وقوف الشعرة وانتصابها، ويغذيها عصب ودي.
- **arrhaphia (= status dysrrhaphia)** خَلَلُ الإِرْتِفَاء. خَالَةُ سُوءِ الرُّفُو.
- **arrhinencephalia (= arhinencephalia)** غِيَابُ الدِّمَاغِ الشَّمِيِّ.
- **arteralgia** أَلَمٌ شَرِيَانِيٌّ المَنْشَأ. ألم يتولد عن إصابة الشريان مثل الصداع الذي ينتج عن التهاب الشريان الصدغي.
- **arteria (= artery)** شَرِيَانٌ. (ج: شرايين). اسم تشريحي للشريان.



#### arteria

شرايين وأوردة الوجه وفروة الرأس: (1) الشريان والوريد الصدغيان (2) الشريان الوجهي الحجاجي (3) الشريان وفروة الوجهين المستعرضان (4) الشريان والوريد فوق الحجاج (5) الشريان والوريد فوق البكري (6) الوريد الأنفي الجبهي (7) الشريان الأنفي الظهري (8) الشريان والوريد الزاويان (9) الوريد الوجهي العميق (10) الوريد الوجهي الأمامي (11) الشريان الوجهي (12) الشريان والوريد الوجهين (13) الشريان السباتي الظاهر (14) الشريان السباتي الباطن (15) الشريان قسطنطين (16) الوريد الوداجي الباطن (17) الوريد الوجهي الخلفي (18) الوريد الوجهي الأصلي (19) الشريان القذالي (20) الشريان الوداجي الظاهر (21) الشريان والوريد خلف الأنفي (22) الوريد القذالي (23) الشريان القذالي (24) لفرع قسطنطين للشريان القذالي (25) الوريد الخشائي المشبوري (26) الوريد والشريان الصدغي السطحي و (27) فرعها الجداري و (28) فرعها الجبهي (29) الوريد الجداري المشبوري (30) الخوذة (مقطوعة).


- a. auditiva interna (= a. labyrinthi)  
الشَّرَيَانُ الْأُذُنِيُّ الْبَاطِنُ. الشريان التيهي.
- a. basilaris (= basilar artery) الشَّرَيَانُ الْقَاعِدِيُّ.
- a. carotis communis (= common carotid artery) الشَّرَيَانُ السَّبَاتِيُّ الظَّاهِرُ.
- a. carotis interna (Internal carotid artery) الشَّرَيَانُ السَّبَاتِيُّ الْبَاطِنُ.
- arteriae centralis anterolaterales  
الشَّرَايِينُ الْمَرْكَزِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ. شرايين تبدأ من القسم الوتدي للشريان المخي الوسطي وتعطي مجموعتين من الفروع الإنسية والوحشية وتتوزع إلى النواتين العدسية الامامية والمذنبية والمحظفة الباطنة للدماغ.
- arteriae centralis anteromedialis  
الشَّرَايِينُ الْمَرْكَزِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ. القسم قبل الموصل من الشريان المخي الامامي ولا يعطي أية فروع ويغذي الجسمين المخططين الامامي والإنسي.
- a. centralis brevis الشَّرَيَانُ الْمَرْكَزِيُّ الْقَصِيرُ. شريان مركزي طويل من القسم قبل الموصل للشريان المخي الامامي.
- a. centralis longa الشَّرَيَانُ الْمَرْكَزِيُّ الطَّوِيلُ. شريان مركزي طويل وهو فرع من القسم قبل الموصل للشريان المخي الامامي.
- arteriae centralis posterolateralis  
الشَّرَايِينُ الْمَرْكَزِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ. القسم بعد الموصل من الشريان المخي الخلفي ولا يعطي أية فروع ويغذي السويقة المخية والمهاد الخلفي والاكيمتين والاجسام الركبية والصنوبرية.
- arteriae centralis posteromedialis  
الشَّرَايِينُ الْمَرْكَزِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ. القسم بعد الموصل من الشريان المخي الخلفي ولا يعطي أية فروع ويغذي المهاد الامامي والجدار الوحشي للبطين والكرة الشاحنة للنواة العدسية.
- a. cerebelli inferior anterior (= inferior anterior cerebellar artery) الشَّرَيَانُ الْمُخَيَّي السُّفْلِيُّ الْأَمَامِيُّ.
- a. cerebelli inferior posterior (= inferior posterior cerebellar artery) الشَّرَيَانُ الْمُخَيَّي السُّفْلِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. cerebelli superior الشَّرَيَانُ الْمُخَيَّي الْعُلَوِيُّ. شريان يبدأ من الشريان القاعدي ولا يعطي أية فروع ويتوزع إلى المخيخ العلوي والدماغ المتوسط والجسم الصنوبري والصفيرة المشيمانية للبطين الثالث.
- a. cerebri anterior (= anterior cerebral artery) الشَّرَيَانُ الْمُخَيَّي الْأَمَامِيُّ.
- a. cerebri media (= middle cerebral artery) الشَّرَيَانُ الْمُخَيَّي الْوَسْطِيُّ.
- a. cerebri posterior (= posterior cerebral artery) الشَّرَيَانُ الْمُخَيَّي الْخَلْفِيُّ.
- a. choroidea anterior (anterior choroidal artery) الشَّرَيَانُ الْمَشِيمَاثِي الْأَمَامِيُّ.
- a. communicans anterior cerebri (= anterior cerebral communicating artery) الشَّرَيَانُ الْمُوَصِّلُ الْمُخَيَّي الْأَمَامِيُّ.
- a. communicans posterior cerebri (= posterior cerebral communicating artery) الشَّرَيَانُ الْمُوَصِّلُ الْمُخَيَّي الْخَلْفِيُّ.
- a. ethmoidalis anterior (= anterior ethmoidal artery) الشَّرَيَانُ الْغِزْبَالِيُّ الْأَمَامِيُّ.
- a. ethmoidalis posterior (= posterior ethmoidal artery) الشَّرَيَانُ الْغِزْبَالِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. frontobasalis lateralis (= latera frontobasal artery) الشَّرَيَانُ الْجَبْهِيُّ الْقَاعِدِيُّ الْوَحْشِيُّ.
- a. frontobasalis medialis (= medial frontobasal artery) الشَّرَيَانُ الْجَبْهِيُّ الْقَاعِدِيُّ الْإِنْسِيُّ.
- a. gyri angularis (= angular gyrus artery) شَرَيَانُ التَّلْفِيفِ الزَّائِي.
- a. hypophysialis inferior (= inferior hypophyseal artery) الشَّرَيَانُ النَّخَامِيُّ السُّفْلِيُّ.
- a. hypophysialis superior (= superior hypophyseal artery) الشَّرَيَانُ النَّخَامِيُّ الْعُلَوِيُّ.



#### arteria cerebri


شرايين الوجه الوحشي الأيسر للدماغ: (1) الفرع الصدغي الخلفي للمخي المتوسط (2) الفرع الصدغي الأوسط للمخي المتوسط (3) الفرع الصدغي الأمامي للمخي المتوسط (4) الشريان السباتي الباطن (5) الشريان المخي الأمامي (6) الشريان الموصل الأمامي (7) الشريان المخي الأمامي (8) الشريان المخي المتوسط (9) الفروع الانتهازية للمخي الأمامي (10) الفرع الحجابي الجبهي للمخي المتوسط (11) الفرع الجبهي للمخي المتوسط (12) الفرع أمام الرولاندي للمخي المتوسط (13) الفرع الرولاندي للمخي المتوسط (14) الفرع الجداري الأمامي للمخي المتوسط (15) الفرع الجداري الخلفي للمخي المتوسط (16) الفرع الجداري القذالي (الزاوي) للمخي المتوسط (17) الفروع الانتهازية للمخي الخلفي.






#### arteria cerebri

شرايين قاعدة الدماغ: (1) الشريان الموصل الأمامي (2) الفرع الراجع للمخي الأمامي (3) السباتي الباطن (4) المخي الأمامي (5) المخي المتوسط (6) الشريانان المخططان الإنسي والوحشي (7) الشريان المشيموي الأمامي (8) الشريان الموصل الخلفي (9) الشريان المخي الخلفي (10) الشريان المخيخي العلوي (11) الشريان القاعدي (12) الشريان السمعي الباطن (13) الشريان المخيخي العلوي الأمامي (14) الشريان الفقري (15) الشريان النخاعي الأمامي (16) الشريان المخيخي السفلي الخلفي (17) الشريان النخاعي الخلفي.



#### arteria cerebri

شرايين الجهة الإنسية للدماغ: (1) فروع الجبهي الباطني (2) الخلفي (3) المتوسطي (4) الأمامي (5) الفرع الحافتي النخفي (6) الفرع الجبهي القطبي (7) الشريان المخي الأمامي الأيمن (8) الفرع الحجاجي (9) الشريان الموصل الأمامي (10) الفرع الراجع (11) الشريان المخي الأمامي الأيمن (12) الشريان السباتي الباطن (13) الشريان الموصل الخلفي (14) الفرع الصدغي الأمامي (15) الفرع الصدغي الخلفي (16) الفرع المهمازي (17) الفرع الجداري القذالي (18) الشريان المخي الخلفي الأيمن (19) الفرع أمام الإسفيني (20) الفرع جنيب المركزي (21) الفرع حول النخفي.



arteria cerebri

منظر جبهي للدماغ يبين شرايينه المختلفة: (1) الفرع جنيب المركزي للمخ الأمامي (2) فروع الجبهي الباطن الأمامي والمتوسط والخلفي للمخي الأمامي (3) الفرع الثغني الحافي للمخي الأمامي (4) الفرع الجسري القطبي للمخي الأمامي (5) الفرع الحجابي للمخي الأمامي (6) الفرع الراجع للمخي الأمامي (7) الشريان المخي الأمامي (8) الشريان السباتي الباطن (9) شريان المشيمية الأمامي (10) العصب المحرك للعين (11) الشريان القاعدي (12) العصب المبعد (13) الشريان السععي الباطن (14) الشريان المخيخي السفلي الأمامي (15) الشريان المخيخي السفلي الخلفي (16) الشريان النخاعي الخلفي (17) الشريان الفقري (18) الشريان المخيخي العلوي (19) الشريان المخي الخلفي (20) الشريان الموصل المتوسط والخلفي (21) الشريان الموصل الأمامي (22) الشريان المخي المتوسط (23) الفروع الصدىية الأمامية والأمامية للشريان المتوسط (24) الفرع الجداري القذالي للمخي المتوسط (25) الفرعان الجداريان الأمامي والخلفي (26) الفرعان الرولاندي وأمام الرولاندي للمخي المتوسط (27) الفرع الجبهي للمخي المتوسط (28) الفرع الحجابي الجبهي للمخي المتوسط (29) الفرعان المخططان الإنسي والوحشي للمخي المتوسط.



- a. inferior anterior cerebelli (= anterior inferior cerebellar artery) الشَّرِيَّانُ الْمُخَيَّضُ السُّفْلِيُّ الْأَمَامِي.
- a. inferior posterior cerebelli (= posterior inferior cerebellar artery) الشَّرِيَّانُ الْمُخَيَّضُ السُّفْلِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. labyrinthi (= labyrinthine artery) الشَّرِيَّانُ الْتِيهِي.
- a. meningea anterior (= ramus meningeus anterior arteriae ethmoidalis anterioris) الشَّرِيَّانُ السَّحَائِي الْأَمَامِي. الفرع السَّحَائِي الْأَمَامِي للشَّرِيَّانِ الْقِرْبَالِي الْأَمَامِي.
- a. meningea media (= middle meningeal artery) الشَّرِيَّانُ السَّحَائِي الْأَوْسَط.
- a. meningea posterior (= posterior meningeal artery) الشَّرِيَّانُ السَّحَائِي الْخَلْفِيُّ.
- arteriae mesencephalicae شَرَايِينُ الدُّمَاغِ الْمُتَوَسَّط. شَرَايِينُ تَبْدَأُ مِنَ الشَّرِيَّانِ الْقَاعَدِيِّ وَلَا تَعْطِي آيَةَ فُرُوعٍ وَتَتَوَزَّعُ إِلَى سَوِيقَةِ الْمَخ.
- a. occipitalis (= occipital artery) الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِي.
- a. occipitalis lateralis (= lateral occipital artery) الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِي الْوُخْشِي.
- a. occipitalis medialis (= medial occipital artery) الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِي الْإِنْسِي.
- a. ophthalmica (= ophthalmic artery) الشَّرِيَّانُ الْعَيْنِي.
- a. paracentralis (= paracentral artery) الشَّرِيَّانُ الْمَجَاوِرُ لِلْمَرْكَزِيِّ.
- arteriae parietales anterior et posterior الشَّرَايِينُ الْجِدَارِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ وَالْخَلْفِيَّةُ. الْقِسْمُ الْإِنْتِهَائِيُّ مِنَ الشَّرِيَّانِ الْمُخِي الْمُتَوَسَّطِ وَيَتَفَرَّعُ إِلَى الْفُرْعَيْنِ الْأَمَامِيِّ وَالْخَلْفِيِّ اللَّذَيْنِ يَتَوَزَّعَانِ إِلَى الْقَصِينِ الْجِدَارِيِّ الْأَمَامِيِّ وَالصَّدْغِيِّ الْخَلْفِيِّ.
- a. parieto-occipitalis (= parietooccipital artery) الشَّرِيَّانُ الْجِدَارِيُّ الْقَذَالِي.
- a. pericallosa (= pars postcommunalis arteria cerebri anterioris) الشَّرِيَّانُ حَوْلَ الثَّقْنِي. الْفَرْعُ بَعْدَ الْمُوصِلِ لِلشَّرِيَّانِ الْمُخِي الْأَمَامِيِّ.
- arteriae pontis (= pontine a's.) الشَّرَايِينُ الْجَسْرِيَّة.
- a. precunealis شَرِيَّانُ الطَّلَلِ (أَمَامَ الْإِسْفِينِ). الْقِسْمُ خَلْفَ الْمُوصِلِ لِلشَّرِيَّانِ الْمُخِي الْأَمَامِيِّ وَلَيْسَتْ لَهُ آيَةُ فُرُوعٍ وَيَغْذِي الطَّلَلِ (أَمَامَ الْإِسْفِينِيِّ).
- a. spinalis anterior (= anterior spinal artery) الشَّرِيَّانُ النَّخَاعِيُّ الْأَمَامِي.
- a. spinalis posterior (= posterior spinal artery) الشَّرِيَّانُ النَّخَاعِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. sulci centralis (= central sulcus artery) شَرِيَّانُ التَّلَمِّ بَعْدَ الْمَرْكَزِيِّ.
- a. sulci precentralis (= precentral sulcus artery) شَرِيَّانُ التَّلَمِّ قَبْلَ الْمَرْكَزِيِّ.
- a. temporalis anterior (= anterior temporal artery) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْأَمَامِي.
- a. temporalis media arteriae temporalis superficialis) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْأَوْسَطُ لِلشَّرِيَّانِ الصَّدْغِيِّ السُّطْحِيِّ. يَبْدَأُ مِنَ الشَّرِيَّانِ الصَّدْغِيِّ السُّطْحِيِّ وَلَيْسَتْ لَهُ آيَةُ فُرُوعٍ وَيَغْذِي الْمُنْطَقَةَ الصَّدْغِيَّةَ.
- a. temporalis media partis insularis arteriae cerebri mediae الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْأَوْسَطُ لِلْقِسْمِ الْجَزِيرِيِّ لِلشَّرِيَّانِ الْمُخَيَّ الْأَوْسَطِ. الْقِسْمُ الْجَزِيرِيُّ مِنَ الشَّرِيَّانِ الْمُخِي الْمُتَوَسَّطِ وَلَيْسَتْ لَهُ آيَةُ فُرُوعٍ وَيَتَوَزَّعُ إِلَى قَشْرَةِ الْفَصِّ الصَّدْغِيِّ بَيْنَ الشَّرِيَّانَيْنِ الْمُخَيَّيْنِ الْأَمَامِيِّ وَالْخَلْفِيِّ.
- a. temporalis posterior (= posterior temporal artery) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْخَلْفِيُّ.
- a. temporalis profunda posterior (= posterior deep temporal artery) الشَّرِيَّانُ الصَّدْغِيُّ الْخَلْفِيُّ الْعَمِيقُ.
- a. vertebralis (= vertebral artery) الشَّرِيَّانُ الْفَقْرِي.



**arteriola (= arteriole)** (ج: شُرَيْنَ)

شُرَيْنَات). فرع شرياني صغير خصوصاً ذلك القريب من الشعيرات.

**- a. macularis inferior** الشُرَيْنُ البَقْعِي السُّفْلِي. الشرين السفلي الذي يغذي بقعة الشبكية.

**- a. macularis superior** الشُرَيْنُ البَقْعِي العُلَوِي. الشرين العلوي الذي يغذي الشبكية.

**arteriosclerosis** تَصَلُّبُ شُرَيَانِي. تصلب وتثخن جدران الشرايين.

**- cerebral a.** تَصَلُّبُ الشَّرَايِينِ الدِّمَاغِيَّة. تصلب شرايين الدماغ.

**artery** شُرَيَان. وعاء دموي ينقل الدم من القلب إلى أقسام الجسم المختلفة.

**- auditory a., internal (= arteria labyrinthi)** الشُرَيَانُ التِّهْيِي. شريان يبدأ من الشريان القاعدي أو الشريان المخيخي السفلي وينتشر خلال الصماخ السمعي الباطن إلى الأذن الداخلية.

**- basilar a. (= arteria basilaris)** الشُرَيَانُ القَاعِي. الشريان الذي يتكون من اتصال الشريانيين الفقريين الأيمن والأيسر وتغذي فروعه جذع الدماغ والأذن الداخلية والمخيخ والمخ الخلفي.

**- carotid a., common (= arteria carotida communis)** الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الْأَصْلِي. الشريان الذي يتفرع من الجذع العضدي الرأسي (الأيمن) أو من قوس الأبهر (الأيسر) وينقسم إلى الشريانيين السباتيين الظاهر والباطن.

**- carotid a., external** الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الظَّاهِر. الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي العام وتنتشر فروعه إلى الغدة الدرقية والبلعوم واللسان والوجه وإلى المناطق القذالية والأذنية الخلفية والصغوية السطحية والفكية العلوية.

**- carotid a., internal** الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الْبَاطِن. الشريان الذي يتفرع من الشريان السباتي العام وتنتشر فروعه إلى مناطق الأذن الوسطى والعين والحجاب والصفيرة المشيمية والغدة النخامية والمخ.

**- central a's.** الشَّرَايِينُ الْمُرَكَّزِيَّة. مجموعة من الشرايين التي تتفرع من الشرايين المخية الكبيرة المختلفة وتتنوع لمختلف أقسام المخ.

**- cephalic a. (= common carotid a.)**

الشُرَيَانُ السُّبَاتِي الْأَصْلِي.

**- cerebellar a., inferior anterior** الشُرَيَانُ الْمُخَيَّخِي السُّفْلِي الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان القاعدي وينتشر إلى القسم الأمامي السفلي للمخيخ وللأقسام السفلية والوحشية للجسر وأحياناً إلى القسم العلوي من البصلة.

**- cerebellar a., inferior posterior** الشُرَيَانُ الْمُخَيَّخِي السُّفْلِي الْخَلْفِي. شريان يتفرع من الشريان الفقري ويتوزع إلى القسم السفلي من المخيخ والبصلة والصفيرة المشيمية للبطين الرابع.

**- cerebellar a., superior** الشُرَيَانُ الْمُخَيَّخِي العُلَوِي. شريان يتفرع من الشريان القاعدي وتتوزع فروعه إلى القسم العلوي من المخيخ والدماغ المتوسط والجسم الصنوبري والصفيرة المشيمية للبطين الثالث.

**- cerebral a., anterior** الشُرَيَانُ الْمُخِي الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويتوزع إلى القشرة الحجاجية والجبهية والجدارية والجسم الثفني والمحفظة الداخلية والصفيرة المشيمية للبطين الجانبي.

**- cerebral a., middle** الشُرَيَانُ الْمُخِي الْأَوْسَط. شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويتوزع إلى القشرة الحجاجية والجبهية والجدارية والصغوية والجسم المخطط والمحفظة الداخلية.

**- cerebral a., posterior** الشُرَيَانُ الْمُخِي الْخَلْفِي. هو الانشعاب الانتهائي للشريان القاعدي ويتوزع إلى القشرتين الصغوية والقذالية وإلى الدماغين البيني والمتوسط وإلى الصفيرتين المشيميتين في البطينين الثالث والجانبي والباحة البصرية للقشرة المخية وإلى البنيات الأخرى المتعلقة بالسبيل البصري.

**- choroidal a., anterior** شُرَيَانُ الْمَشِيمِيَّة الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن أو الشريان المخي الوسطي ويتوزع إلى داخل الدماغ والصفيرة المشيمية للبطين الجانبي وإلى المناطق المجاورة.

**- communicating a., anterior cerebral** الشُرَيَانُ الْمُوَصَّلُ الْمُخِي الْأَمَامِي. شريان يتفرع من الشريان الأمامي قبل منطقة الموصل ويعمل بعض التوصيلات مع الشرايين المخية الأمامية.

**- communicating a., posterior cerebral**

الشَّرِيَّانُ الْمُوصِّلُ الْمُخَيُّ الْخَلْفِيّ. شريان يوصل بعض التوصيلات من الشريان السباتي الباطن إلى الشرايين المخية الخلفية.

**- ethmoidal a., anterior** الشَّرِيَّانُ الْغَرْبَالِيّ

الْأَمَامِيّ. شريان يتفرع من الشريان العيني ويتوزع إلى الأم الجافية والأنف والجيب الجبهي والخلايا الغרבالية الامامية.

**- ethmoidal a., posterior** الشَّرِيَّانُ الْغَرْبَالِيّ

الْخَلْفِيّ. شريان يتفرع من الشريان العيني ويتوزع إلى الخلايا الغרבالية الخلفية والأم الجافية والأنف.

**- frontobasal a., lateral** الشَّرِيَّانُ الْجَبْهِيّ

الْقَاعِيّ الْوَحْشِيّ. شريان يتفرع من القسم الجزيري من الشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة الوحشية السفلية للفص الجبهي.

**- frontobasal a., medial** الشَّرِيَّانُ الْجَبْهِيّ

الْقَاعِيّ الْإِنْسِيّ. شريان يتفرع من القسم بعد الموصل من الشريان المخي الامامي ويتوزع إلى القشرة الوحشية السفلية للفص الجبهي.

**- gyrus a., angular** شَرِيَّانُ التَّلْفِيفِ الزَّاوِيّ.

فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى الفصوص الصدغية والجدارية والقذالية.

**- hypophyseal a., inferior** الشَّرِيَّانُ النُّخَامِيّ

السُّفْلِيّ. فرع صغير من القسم المخي من الشريان السباتي الباطن يغذي الغدة النخامية.

**- hypophyseal a., superior** الشَّرِيَّانُ النُّخَامِيّ

الْعُلَوِيّ. فرع صغير من القسم المخي من الشريان السباتي الباطن يغذي الغدة النخامية.

**- labyrinthine a.** الشَّرِيَّانُ اللَّيْهِيّ.

شريان يتفرع من الشريان القاعدي أو من الشريان المخيخي السفلي الامامي ويتوزع خلال الصماخ السمعي الباطن إلى الأذن الداخلية.

**- lenticulostriate a.** الشَّرِيَّانُ الْعَدْسِيّ الْمُخْطَطِيّ.

واحد من الفروع الإنسية أو الوحشية من الفروع الامامية الوحشية المركزية للشريان المخي الواسطي وهي كثيراً ما تتعرض للنزف المخي.

**- meningeal a., middle** الشَّرِيَّانُ السَّحَائِيّ

الْأَوْسَط. فرع من شريان الفك العلوي ويتوزع إلى عظام القحف والأم الجافية.

**- meningeal., posterior** الشَّرِيَّانُ السَّحَائِيّ

الْخَلْفِيّ. فرع من الشريان البلعومي الصاعد ويتوزع إلى عظام القحف والجافية الخلفية.

**- occipital a.** الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِيّ.

شريان يتفرع من الشريان السباتي الظاهر ويتوزع إلى عضلات الرقبة والفروة والسحايا والخلايا الخشائية.

**- occipital a., lateral** الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِيّ الْوَحْشِيّ.

فرع انتهائي أو قشري للشريان المخي الخلفي ويتوزع إلى الأقسام الامامية والإنسية والوسطية والخلفية للفص الصدغي.

**- occipital a., middle** الشَّرِيَّانُ الْقَذَالِيّ الْأَوْسَط.

فرع انتهائي أو قشري من الشريان المخي الخلفي ويتوزع إلى ظهر الجسم الثفني والإسفين والطلل والتلفيف اللساني والقسم الخلفي للوجه الوحشي للفص القذالي.

**- ophthalmic a.** الشَّرِيَّانُ الْعَيْنِيّ.

شريان يتفرع من الشريان السباتي الباطن ويتوزع إلى العين والحجاج وبنيات الوجه المجاورة.

**- paracentral a.** الشَّرِيَّانُ الْمَجَاوِر لِلْمَرْكَزِيّ.

فرع من الشريان المخي الامامي بعد الموصل وينتشر إلى قشرة المخ والشق المركزي الإنسي.

**- parietal a's., anterior & posterior**

الشَّرِيَّانَانِ الْجِدَارِيَّانِ الْأَمَامِيّ وَالْخَلْفِيّ. فرع انتهائي من الشريان المخي الواسطي يتفرع إلى فرعين امامي وخلفي يتوزعان إلى الفص الجداري الامامي وإلى الفص الصدغي الخلفي.

**- parieto-occipital a.** الشَّرِيَّانُ الْجِدَارِيّ الْقَذَالِيّ.

شريان يتفرع من القسم بعد الموصل من الشريان المخي الامامي ويتوزع إلى الفص الجداري وأحياناً إلى الفص القفوي.

**- pontine a's.** الشَّرَايِينُ الْجِسْرِيَّة.

شرايين تتفرع من الشريان القاعدي وتتوزع إلى الجسر والمناطق الدماغية المجاورة.

**- spinal a., anterior** الشَّرِيَّانُ النُّخَاعِيّ الْأَمَامِيّ.

شريان يتفرع من قسم الشريان الفقري داخل الفقار ويتوزع إلى النخاع الشوكي.

**- spinal a., posterior** الشَّرِيَّانُ النُّخَاعِيّ

الْخَلْفِيّ. يتفرع من الشريان المخيخي الامامي السفلي ويتوزع إلى النخاع الشوكي.

**- sulcus, central, a.** شَرِيَّانُ التَّلْمِ الْمَرْكَزِيّ.

فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة المخية على جهتي التلم المركزي.

**- sulcus, postcentral, a.** شَرْيَانُ التَّلَمِ بَعْدَ الْمَرْكَزِيِّ. فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط يتوزع إلى القشرة المخية على جهتي التلم بعد المركزي.

**- sulcus, precentral, a.** شَرْيَانُ التَّلَمِ قَبْلَ الْمَرْكَزِيِّ. فرع انتهائي من الشريان المخي المتوسط يتوزع إلى القشرة المخية على جهتي التلم قبل المركزي.

**- temporal a., anterior** الشَّرْيَانُ الصُّدْغِيُّ الأَمَامِيُّ. شريان يتفرع من القسم الجزيري للشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة الأمامية للفص الصدغي.

**- temporal a., anterior deep** الشَّرْيَانُ الصُّدْغِيُّ الأَمَامِيُّ الْعَمِيقُ. شريان يتفرع من الشريان الفكي العلوي ويتوزع إلى العضلة الصدغية ويتفاغر مع الشريان الصدغي المتوسط.

**- temporal a., posterior** الشَّرْيَانُ الصُّدْغِيُّ الخَلْفِيُّ. شريان يتفرع من القسم الجزيري للشريان المخي المتوسط ويتوزع إلى القشرة الخلفية للفص الصدغي.

**- temporal a., posterior deep** الشَّرْيَانُ الصُّدْغِيُّ الخَلْفِيُّ الْعَمِيقُ. فرع من الشريان الفكي العلوي يتوزع إلى العضلة الصدغية ويتفاغر مع الشريان الصدغي المتوسط.

**- vertebral a.** الشَّرْيَانُ الْفَقْرِيُّ. شريان يتفرع من الشريان تحت الترقوي ويتوزع إلى عضلات الرقبة والفقرات والنخاع الشوكي والمخيخ وداخل المخ.

**arthralgia** أَلَمٌ مَفْصَلِيٌّ. ألم في أحد المفاصل.

**arthresthesia** حِسٌّ مَفْصَلِيٌّ. حس المفاصل.

**arthrodynia** وَجَعُ الْمَفْصَلِ. وجع أحد المفاصل.

**arthrogryposis** 1. اغْوِجَاجُ الْمَفْصَلِ  
2. تَشْنِجٌ تَكَرُّزِيٌّ. 1. انثناء المفاصل أو تقفُّعه  
2. تشنج تركززي للعضلات.

**- congenital multiple a.** اغْوِجَاجُ الْمَفَاصِلِ الخَلِيقِي. متلازمة تتصف بثبات معظم المفاصل بأوضاع شاذة مختلفة مع نقص تنامي العضلات وتناميها.

**arthroneuralgia** وَجَعٌ مَفْصَلِيٌّ. ألم ينشأ في المفصل أو من حواليه.

**arthropathy, neurogenic** اِغْتِلَالٌ مَفْصَلِيٌّ عَصَبِيٌّ الْمَنْشَأُ.

**arthropathy, neuropathic** اِغْتِلَالٌ مَفْصَلِيٌّ عَصَبِيٌّ الْمَنْشَأُ. تنكس مترقٍ مزمن لقسم المفصل المتحمل للضغط والذي يمكن أن يكون مضاعفة لأحد الاعتلالات العصبية وخصوصاً التابيس الظهري المصحوب بفقدان الحس الذي يؤدي إلى ارتخاء العضلات والبنيات الساندة وبالتالي إلى عدم استقرار المفصل.

**arthropathy, tabetic** اِغْتِلَالٌ مَفْصَلِيٌّ تَابِيسِيٌّ. اعتلال مفصلي ناتج عن التابيس الظهري.

**A-scan encephalography** تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الْقَرِيسِيِّ A. تخطيط صدى الدماغ ببعدين يبين أحدهما الوقت اللازم لعودة الصدى ويبين الثاني شدته.

**ascending reticular activating system** الْجِهَازُ الشَّبَكِيُّ الْمُنَشِّطُ الصَّاعِدُ. أنظر system.

**ascending reticular alerting system (= ascending reticular activating system)** الْجِهَازُ الشَّبَكِيُّ الْمُوقِظُ الصَّاعِدُ.

**asemasia** حُبْسَةٌ دَلَالِيَّةٌ. عدم المقدرة على التواصل سواء بالكلمات أو بالإشارات.

**asemia** تَعَذُّرٌ الدَّلَالَةِ؛ اسْتِنْبَاهٌ. حُبْسَةٌ تتصف بعدم المقدرة على التعبير بالكلام أو بالإشارات أو فهم الكلام والإشارات بسبب آفة مركزية.

**- a. graphica** اسْتِنْبَاهٌ الْمَكْتُوبِ. عدم المقدرة على التعبير بالكتابة (تعذر الكتابة) أو فهم الكلمات المكتوبة (تعذر القراءة) بسبب آفة مركزية.

**- a. mimica** اسْتِنْبَاهٌ الْإِيْمَاءِ. عدم المقدرة على التعبير بالإشارات أو على توليد أية تعابير عاطفية أو فكرية.

**- a. verbalis** اسْتِنْبَاهٌ الْكَلَمِ. عدم المقدرة على تلفظ الكلمات أو فهم ما يسمعه المصاب منها.

**aseptic** طَاهِرٌ؛ مُعَقَّمٌ؛ عَقِيمٌ. خالٍ من العدوى أو من المواد النتنة.

**asexual** لاجنسي. شخص مصاب باللاجنسية أو انعدام الجنس.

**asexuality** انعدام الجنس. انعدام الرغبة الجنسية.

**asitia** بغض الطعام.

**asomatognosia** عَمَة أَقْسَامِ الْجِسْم. عدم مقدرة المريض على التعرف على بعض أقسام جسمه.

**association** 1. تَرَابُط 2. تَدَاعِي 3. مُشَارَكَة. 1. مصطلح يدل على المناطق المخية التي توصل الباحات الحركية الأولية بالباحة الحسية الأولية. 2. ترابط بين ظاهرتين نفسانيتين كفكرتين أو شعورين نتيجة الخبرة والممارسة والتعلم 3. مجموعة أفراد أو كيانات اجتماعية تتعاون في سبيل تحقيق هدف معين.

**- dream a.** تَدَاعِي الْأَحْلَام. أفكار أو عواطف ترتبط بأحلام سابقة وتؤثر على سلوك الشخص وتكتشف بالتحليل النفسي.

**- a. of ideas** تَدَاعِي الْأَفْكَار. تداعي أفكار سابقة وربطها مع أفكار أو حوادث لاحقة.

**astasia** تَعَذُّرُ الْوُقُوف. عدم التناسق الحركي مع عدم المقدرة على الوقوف.

**- a. - abasia** تَعَذُّرُ الْوُقُوف والمشي. عدم التناسق الحركي مع عدم المقدرة على الوقوف أو على الخطو بالرغم من استطاعة المصاب تحريك ساقيه وأطرافه عند جلوسه أو استلقائه وقد يكون ذلك بسبب رَنَحٍ هستيري.

**astereocognosy** عَمَة التَّجَسُّيم. انظر **astereognosis**.

**astereognosis** عَمَة التَّجَسُّيم. عدم المقدرة على التعرف على المواد والأشياء وأشكالها بمجرد لمسها وتحسسها.

**asthenia** وَهْن. ضعف أو فقدان القوة والنشاط.

**- bulbo-spinal a.** وَهْنٌ بَصَلِيّ نَخَاعِي؛ وَهْنٌ عَضَلِيّ وَبِيل. انظر **myasthenia gravis**.

**- myalgic a.** وَهْنٌ عَضَلِيّ مُؤَلِم. حالة تتصف بالضعف والتعب العام مع ألم في العضلات.

**- neurocirculatory a.** وَهْنٌ عَصَبِيّ دَوْرَانِي.

متلازمة تتصف بالخفقان وضيق النفس والشعور بالتعب والخوف من التحرك وعدم الراحة خصوصاً عند القيام بأي مجهود حركي مهما كان بسيطاً ويعتبرها البعض بأنها من علامات عصاب القلق وقد يكون فرط التنفس والاستجابات المستقلة هي السبب في توليد هذه الأعراض.

**- periodic a.** وَهْنٌ دَوْرِي. حالات من الوهن الشديد تعاود بين فترة وأخرى.

**asthenophobia** رُهَابُ الْوَهْن. الخوف من الضعف والوهن.

**astigmatism** لَأَبُورِيَّة. عدم تساوي سطوح العين الانكسارية مما يولد صوراً مشوشة للأجسام المرئية في بؤر غير متطابقة أو غير متناسقة بمستوى واحد.

**astraphobia (= astrapophobia)** رُهَابُ الصَّوَاعِق. الخوف من البرق والرعد.

**astroblast** أَرْوَمَة نَجْمِيَّة. خلية تتطور لتكون خلية نجمية.

**astroblastoma** وَرَمُ الْأَرْوَمَةِ النَجْمِيَّة. ورم بخلايا نجمية غنية بالهيبولى وتحوي كل منها نواتين أو أكثر.

**astrocyte** خَلِيَّة نَجْمِيَّة. خلية دبقية عصبية تنشأ من الأديم الظاهر ولها نتوءات ليفية أو جبليّة أو ليفية جبليّة.

**- fibrous a's.** خَلَايَا نَجْمِيَّة لَيْفِيَّة. خلايا نجمية توجد خصوصاً في المادة البيضاء للدماغ ولها فروع رقيقة وطويلة وهيبولية ومتفرعة. يمتد بعضها إلى المادة البيضاء وتكون ليفية ويمتد بعضها الآخر إلى المادة السنجابية وتكون جبليّة.

**- gemistocytic a. (= gemistocyte)** خَلِيَّة نَجْمِيَّة مَقْعُومَة. خلية نجمية لها جسم شديد التورم وتحوي نواة في أحد أطرافها وجبلة واضحة.

**- plasmotofibrous a's.** خَلَايَا نَجْمِيَّة جَبَلِيَّة. اللَّيْفِيَّات. خلايا نجمية توجد في مواضع اتصال المادتين البيضاء والسنجابية في الدماغ وتكون الزوائد الممتدة إلى المادة السنجابية جبليّة أما تلك الممتدة للمادة البيضاء فتكون ليفية.

**- protoplasmic a's.** خَلَايَا نَجْمِيَّة جَبَلِيَّة.

خلايا نجمية توجد بصورة خاصة في المادة السنجابية من الدماغ ولها فروع عديدة وكلها جبلية.

**astrocytoma** وَرَمُ النَجْمِيَّات. ورم مختلف الخبائث يتكون من خلايا نجمية ويصنف إلى أربع درجات حسب شدة خبائثته.

**- anaplastic a.** وَرَمُ الأُرُومَةِ الدَبْقِيَّةِ المُتَعَدِّدِ الأشكال. انظر glioblastoma multiforme.

**- a. fibrillare** وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ اللَّيْفِيِّ. ورم النجميات المكون من خلايا نجمية ليفية تولد فروعاً خيطية أو ليفاً عصية.

**- gemistocytic a.** وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ مَلْفُومِ الخَلايَا. ورق النجميات تكون فيه أجسام الخلايا الورمية منتفخة وهyalينية متجانسة وحمضة الانصباع.

**- pilocytic a.** وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ المُتَوَازِي اللَّيْفِيَّات. نوع من ورم النجميات الليفي تكون فيه الليفيات مرتبة بصفوف متوازية.

**- a. protoplasmaticum** وَرَمُ النَجْمِيَّاتِ الجِليي. ورم النجميات مكون من خلايا نجمية جبلية.

**astrocytosis** كُثْرَةُ النَجْمِيَّات. تكاثر الخلايا النجمية بسبب تلف العصبونات القريبة منها خلال نوبات نقص التأكسج أو نقص سكر الدم.

**astroglia** دَبْقُ النَجْمِيَّات. مجموعة من الخلايا النجمية الدبقية التي تعتبر كنسيج مستقل.

**astroma** وَرَمُ النَجْمِيَّات. انظر astrocytoma.

**astrophobia** رُهابُ النُجُوم. الخوف من رؤية النجوم والسماء.

**asyllabia** حُبْسَةُ المَقَاطِع. مصاب يتعرف على الحروف بوضوح ولكنه لا يتمكن من تجميعها لتكوين كلمات أو مقاطع (تعدُّر نطق المقاطع).

**asylum** مَأْوَى. ملجأ للمعوزين أو للمرضى النفسانيين أو كبار السن أو المعاقين.

**- lunatic a.** بيمَارِسْتَان. مأوى المصابين بأمراض نفسية.

**- old people's a.** مَأْوَى المُسِنَّين. مأوى كبار السن.

**asymbolia** عَمَّةُ الرُّمُوز. عدم المقدرة على فهم الرموز بأنواعها كالكلمات والرسوم والإشارات والإيماءات والتعبير.

**- pain a.** عَمَّةُ الأَلَم. عدم الاستجابة النفسية للإحساسات المؤلمة الذي يمكن أن يكون خلقياً أو نتيجة آفة مركزية في الدماغ وخصوصاً في التلفيف فوق الهامشي في الفص الجداري السادس.

**asymmetry** لا تَنَاطُر. عدم وجود تناظر بين الأقسام المتناسبة أو المتناظرة على طرفي الجسم والتي تكون عادة متشابهة.

**- encephalic a.** لا تَنَاطُر دِمَاجِي. عدم تناظر نصفي. كرة المخ إذ إنها لا يكونان متساويين في الحجم.

**asynchronism (= asynchrony)** لا تَرَافُق. حدوث فعاليات تحدث عادة متزامنة في أوقات متباينة مما يؤدي إلى فقدان التناسق بينهما.

**asyndesis** حُبْسَةُ التَّرَابُط. كلام تبدل فيه مواقع الكلمات والمقاطع بطريقة شاذة كما يحدث في هذيان المفصوم.

**asynergia (= asynergy)** تَعَدُّر التَّآزُر. عدم التناسق بين أقسام العضو أو بين الأعضاء التي تعمل عادة باتساق. فقد يولد اختلال عصبي فقدان التناسق بين العضلات التي تعمل عادة متعاونة لتوليد حركة متوازنة ومتناسقة. حيث تتقلص فيه مختلف العضلات بمختلف الشدد والاتجاهات والتوقيت.

**atactic** رَنَحِي. 1. منعدم التناسق وغير منتظم. 2. متعلق أو يتصف أو مصاب بالرنح.

**atactiform** رَنَحِي الشَّكْل. شبه بالرنح.

**ataractic** 1. مُطْمَئِن؛ مُهْدِئ. 2. إِطْمِئْنَانِي. 1. ما يمكنه أن يهدئ ويطمئن. 2. دواء مهدئ.

**ataralgesia** تَسْكِينٌ تَطْمِينِي. طريقة تسكين وتركين لتطمين المصاب وإزالة أي ألم أو قلق نفسي منه وخصوصاً ذلك الذي يرافق حالات المداخلة الجراحية.

**ataraxia (= ataraxy)** إِطْمِئْنَان؛ طَمَآنِيَّة. راحة البال واستقراره.

**ataraxic** مُطْمَئِن. مرتاح البال.

**ataxaphasia** حُبْسَةُ تَكْوِين الجُمْل. انظر ataxiaphasia.

**ataxia** رَنَح. فشل التناسق العضلي وسوء نظام الحركات واختلالها.

**- acute a.** رَنَحٌ حَاد. رنح يبدأ بصورة مفاجئة.

- **acute cerebellar a.** رَنْجٌ مُخَيِّجٌ حَادٌّ. رنج يصيب إحدى جهتي الجسم ويترافق مع ورم أو رضخ أو مرض عدواني في المخيخ فيولد نقص توتر عضلات الجهة المصابة وعدم تناسقها والرنج.
- **alcoholic a.** رَنْجٌ كُحُولِيٌّ. حالة تشبه التابس الظهري بسبب فقدان حس الوضع في حالة الكحولية المزمنة.
- **autonomic a.** رَنْجٌ مُسْتَقْلِلِيٌّ؛ رَنْجٌ ذَاتِيٌّ. عدم التناسق بين الجهازين الودي واللاودي للجهاز العصبي المستقل.
- **central a.** رَنْجٌ مَرْكَزِيٌّ. رنج بسبب آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- **cerebellar a.** رَنْجٌ مُخَيِّجٌ. رنج بسبب آفة في المخيخ.
- **cerebral a.** رَنْجٌ مُخَيٍّ. رنج بسبب آفة في المخ.
- **cervical a.** رَنْجٌ رَقَبِيٌّ. رنج حسي يتولد عن آفة في القسم الرقبى للنخاع.
- **family a. (= Friedrich's a.)** رَنْجٌ عَائِلِيٌّ؛ رَنْجٌ فَرِيدْرَايْخٍ.
- **Friedrich's a.** رَنْجٌ فَرِيدْرَايْخٍ. مرض وراثي جسدي متنحي يبدأ عادة عند الطفولة والحادثة مع تصلب العمودين الظهري والجانبى للنخاع الشوكي الذي يولد الرنج وخلل الكلام وانحناء العمود الفقري الجانبى وخلل الحركة وشلل العضلات وخصوصاً الأطراف السفلية.
- **frontal a.** رَنْجٌ جَبْهِيٌّ. اختلال توازن حركات الجسم بسبب ورم الفص الجبهي.
- **hereditary a. (= Friedrich's a.)** رَنْجٌ وَرَاثِيٌّ.
- **hysterical a.** رَنْجٌ هِسْتِيرِيٌّ؛ رَنْجٌ هُزَاعِيٌّ. رنج يظهر كمرض هستيري.
- **intrapsychic a.** رَنْجٌ نَفْسِيٌّ. انفصام بين الفكر والسلوك الذي يشاهد في الفصام.
- **kinetic a. (= motor a.)** رَنْجٌ حَرَكِيٌّ.
- **labyrinthine a. (= vestibular a.)** رَنْجٌ تَيْهِيٌّ؛ رَنْجٌ دَهْلِيْزِيٌّ.
- **Leyden's a.** تَابِسٌ كَاذِبٌ. انظر pseudotabes.
- **locomotor a. (= tabes dorsalis)** تَابِسٌ ظَهْرِيٌّ؛ رَنْجٌ تَحْرُكِيٌّ.

- **Marie's a. (= hereditary cerebellar a.)** رَنْجٌ مُخَيِّجٌ وَرَاثِيٌّ.
- **motor a.** رَنْجٌ حَرَكِيٌّ. عدم المقدرة على تنسيق حركات العضلات.
- **ocular a. (= nystagmus)** رَأْرَأَةٌ. رنج عيني.
- **Sanger Brown's a.** رَنْجٌ سَانْغَرٌ بَرَاوْنٍ. تنكس نخاعي مخيخي وراثي يظهر بين سن 11-45 ويبدأ في الساقين وينتشر إلى الذراعين والوجه ثم يؤثر على عمليتي البلع والنطق ويؤدي إلى شلل العصب العيني والعصب محرك العين.
- **sensory a.** رَنْجٌ حَسِّيٌّ. رنج يتولد عن فقدان الحس العميق (حس وضع المفاصل) مما يؤدي إلى سوء التحكم في حركة العضلات وعدم تناسقها ويزداد ذلك سوءاً عند غلق العينين.
- **spinal a.** رَنْجٌ نُخَاعِيٌّ. رنج ينتج عن مرض النخاع الشوكي.
- **spinocerebellar a.** رَنْجٌ نُخَاعِيٌّ مُخَيِّجٌ. مرض وراثي يصيب النخاع والمخيخ ويؤدي إلى أعراض رنجية.
- **static a.** رَنْجٌ سَتَاتِيكِيٌّ؛ رَنْجٌ سَكُونِيٌّ. الترنج وعدم الثبات والاستقرار عند وقوف المصاب.
- **a. telangiectasia** رَنْجٌ التَوَسُّعِ الوِعَاثِيٍّ. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية يتصف بالرنج المخيخي والرأرة والتوسع الوعائي العيني الجلدي بدرجات متفاوتة ونقص المناعة الخلوية مما يؤدي إلى بعض الإصابات وترافق كل ذلك إصابات واختلالات متنوعة في مختلف وظائف الجسم.
- **thermal a.** رَنْجٌ حَرَارِيٌّ. حالة تتصف باختلاف تموجي شديد في درجة حرارة الجسم.
- **truncal a.** رَنْجٌ جَذْعِيٌّ. رنج يؤثر على عضلات الجذع بسبب آفة مركزية.
- **vestibular a.** رَنْجٌ دَهْلِيْزِيٌّ. رنج وعدم تناسق الحركات بسبب مرض الدهليز.
- **ataxiodynamia** رَنْجٌ وَهْنِيٌّ. رنج يترافق مع الوهن.
- **ataxiagram** مُخَطَّطُ الرَنْجِ. 1. مخطط يرسمه المصاب بالرنج 2. مخطط يسجله مخطاط الرنج.
- **ataxiagraph** مِخْطَاطُ الرَنْجِ. جهاز يسجل

درجة رنج الجسم عند وقوف المصاب مع غلق عينيه.

**ataxiometer** مِقْيَاسُ الرَنْج. جهاز يقيس درجة الرنج.

**ataxiamnesic** رَنْحِي نَسَاوِي. مصاب بالرنج والنسابة.

**ataxiaphasia** حُبْسَةُ تَكْوِينِ الْجُمْل. عدم مقدرة المريض على ترتيب الكلمات لعمل جملة واحدة مفيدة.

**ataxic (= atactic)** رَنْحِي.

**ataxiophemia** لَجَلْجَة؛ رَنْج عَضَلَاتِ النُّطْق. انظر ataxophemia.

**ataxiophobia (= ataxophobia)** رُهَابُ الإِضْطِرَاب.

**ataxoadynamia** رَنْج وَهْنِي. رنج مترافق مع وهن شديد.

**ataxophemia** رَنْج عَضَلَاتِ النُّطْق. اضطراب التلظ بسبب رنج عضلات النطق.

**ataxophobia** رُهَابُ الإِضْطِرَاب. الخوف الشديد من أي نوع من الاضطراب.

**ataxy** رَنْج. انظر ataxia.

**atelencephalia** خَلَلُ تَطَوُّرِ الدِّمَاغ؛ نَقَاصُ الدِّمَاغ. التطور الخلقي المعيب للدماغ.

**atelocephalous** نَاقِصُ تَكْوُنِ الرَّأْس؛ نَقِصُ الرَّأْس. مسيخ لم يكتمل تطور رأسه.

**atelocephaly** نَقْصُ تَكْوُنِ الرَّأْس؛ نَقَاصُ الرَّأْس. نقص في تطور وتكوين القحف.

**ateloencephalia (= atelencephalia)** خَلَلُ تَطَوُّرِ الدِّمَاغ؛ نَقَاصُ الدِّمَاغ.

**atelomyelia** نَقْصُ تَكْوُنِ النُّخَاع؛ نَقَاصُ النُّخَاع. نقص تطور النخاع الشوكي.

**atephobia** رُهَابُ الدِّمَار. الخوف من الدمار بأنواعه.

**athalposis** عَمَةُ الدِّفء. عدم الإحساس بالحرارة أو بالمنبهات الحرارية.

**atheroma** عَصِيدَة. كتلة من صفائح بطانة

شريانية متخنة ومتنكسة تتكون في داء تصلب العصيدي.

**atherosclerosis** تَصَلُّبُ عَصِيدِي. نوع من تصلب الشرياني الشائع حيث تتكون صفائح صفراء (عصيدات) تحوي كولستيرول ومادة شحمية وبلعميات شحمية وتتكون ضمن بطانة الشرايين الكبيرة والمتوسطة وطبقتها الوسطية الباطنة.

**- a. obliterans (= arteriosclerosis obliterans)** التَّصَلُّبُ الشِّرْيَانِي الْمُسَدِّ. تصلب شرياني يؤدي تكاثر العصيدات ونموها فيه إلى انسداد الشريان.

**athetoid** كَنَعَانِي. شبيه بالكنع أو مصاب به.

**athetotic (= athetotic)** كَنَعِي.

**athetosis** كَنَع. اختلال يتصف بحركات تموجية أو التوائية لإرادية بطيئة شديدة خاصة في اليدين ويمكن أن يحدث بعد الشلل الشقي (الفالج).

**- double a. (= double congenital a.)** كَنَعٌ خِلْقِي مُزْدَوِج. كنع خلقي بطرفي الجسم بسبب رضخ ولادي والذي يمكن أن يحدث مع الشلل السفلي التشنجي.

**- pupillary a. (= hippus)** رَقْصُ الحَدَقَة. كنع الحدقة.

**athetotic (=athetotic)** كَنَعِي؛ مُكَنَع. متعلق بالكنع أو منتصف به.

**athymia** 1. إِنْغَدَامُ الْعَاطِفَة 2. إِنْغَدَامُ التَّوْتَة. 1. فُقدَانُ الحَسِّ والعَاطِفَة مع الكَآبَة 2. انغدام غدة التوتة.

**atlantoaxial subluxation** رَخَاوَةُ الْفَهْقِي الْمَحَوْرِي. رخاوة أو خلع جزئي للمفصل الفهقي المحوري.

**atlas** الْفَهْقَة. الفقرة العنقية العلوية الاولى المتصلة بالقحف.

**atonia** وَثِي. انظر atony.

**- choreatic a.** وَثِي رَقْصِي. نقص التوتر العضلي الذي يشاهد في داء الرقص.

**atonic** وَإِنْ. ناقص التوتر السوي أو متعلق بالوثنى.

- atonicity** وَثِي. حالة غياب التوتر أو الشد العضلي.
- atony (= atonia)** وَثِي. نقص التوتر والشد العضلي.
- atopognosia (= atopognosis)** غَمَّة. تَوْضِيع الإحْسَاس. عدم مقدرة المريض على توضيع موقع الحس على جسمه.
- atrabiliary** سَوْدَاوِي؛ كَثِيب. انظر **melancholic**.
- atresia, aqueductal** رَتْقُ الْمَسَال. غياب أو انسداد المسال الخلقي.
- atrophia (= atrophy)** ضُمُور.
- **a. bulborum hereditaria** ضُمُورُ الْمُقَلَّة. الوراثة؛ داء ثوري. انظر **Noorie's disease**.
- **a. cerebri senilis simplex** ضُمُورُ الدِّمَاغ. الشَّيْخُوخِي البَّسِيط. خرف شيخوخي مع ضمور دماغي شديد وفقدان الكثير من العصبونات.
- **a. dolorosa** ضُمُورُ الْمُقَلَّة المؤلم. ضمور مقلة العين مع الألم الشديد.
- **a. senilis (= senile atrophy)** ضُمُور شَيْخُوخِي.
- atrophie (= atrophy)** ضُمُور.
- atrophy** ضُمُور.
- **corticostriatospinal a.** ضُمُورُ قَشْرِيٍّ مُخَطَّطِي. نُخَاعِي. انظر **Creutzfeldt-Jakob syndrome**.
- **denervated muscle a.** ضُمُورُ الْعَضَلَةِ الْفَرَاة. التَّعَصِيب. ضمور العضلة عند إزالة عصبها الحركي منها.
- **disuse a.** ضُمُورُ عَدَمِ الْإِسْتِعْمَال. ضمور العضلة لعدم استعمالها لفترة طويلة.
- **facial a.** ضُمُورُ الْوَجْه.
- **hemifacial a. (= progressive unilateral facial a.)** ضُمُور وَجْهِي أَحَادِي الْجَانِب؛ ضُمُورُ نَصْفِ الْوَجْه.
- **idlopathic muscular a. (= progressive muscular dystrophy)** ضُمُور عَقْلِي مُتَرَقٍّ؛ ضُمُورُ عَضَلِيٍّ غَامِض.
- **ischemic muscular a. (= Volkmann's contracture)** ضُمُورُ عَضَلِيٍّ إِقْفَارِي.
- **leaping a.** ضُمُورُ قَفْزِي. ضمور عضلي مترق يبدأ في اليدين وينتشر إلى المنكب من دون أن يصيب عضلات الذراع.
- **myelopathic muscular a.** ضُمُورُ عَضَلِيٍّ بِاعْتِلَالِ النُّخَاع. ضمور عضلي ينتج عن آفة في النخاع الشوكي.
- **myopathic a.** ضُمُورُ بِالِاعْتِلَالِ الْعَضَلِي. ضمور العضلة بسبب علة فيها.
- **neural a. (= neuropathic a.)** ضُمُورُ بِالِاعْتِلَالِ الْعَصَبِي. ضمور عضلي ينتج عن مرض في الجهاز العصبي المحيطي.
- **neuropathic a.** ضُمُورُ بِالِاعْتِلَالِ الْعَصَبِي. ضمور عضلي ينتج عن مرض في الجهاز العصبي المحيطي.
- **neurotic a. (= neuropathic a.)** ضُمُورُ بِالِاعْتِلَالِ الْعَصَبِي.
- **neurotrophic a.** ضُمُورُ بِاعْتِلَالِ الْعَصَبُونَاتِ التَّغْذَوِيَّة. ضمور يتولد عن تلف العصبون المحيطي الذي يديم تغذية النسيج مما يؤدي إلى ضموره.
- **olivopontocerebellar a.** ضُمُورُ الزَّيْتُونَةِ وَالْجَسْرِ وَالْمُخَيخ. ضمور يصيب قشر المخيخ والسويقة المتوسطة والجسم الزيتوني السفلي.
- **optic a.** ضُمُورُ الْقُرْصِ الْبَصَرِي. ضمور القرص البصري بسبب تنكس الليف العصبي والسبيل البصريين.
- **physiologic a.** ضُمُورُ فِيزِيُولُوجِي. ضمور بعض الأعضاء طبيعياً عند كل الأشخاص بسبب تقدم العمر.
- **progressive muscular a. (= spinal muscular a.)** ضُمُورُ عَضَلِيٍّ مُتَرَقٍّ.
- **progressive neural muscular a. (= progressive neuralmuscular a.)** ضُمُور عَصَبِي عَضَلِيٍّ مُتَرَقٍّ.
- **progressive neuropathic (peroneal) muscular a.** ضُمُورُ بِالِاعْتِلَالِ الْعَصَبِي (الشَّظْطِي الْمَتَرَقِّي). عضلي وراثي يبدأ في العضلات التي يغذيها العصب الشظطي ومن ثم يتطور تدريجياً ليشمل اليدين والذراعين.



- **progressive spinal muscular a.**  
ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ تَخَاَعِي. (= spinal muscular a.)
- **progressive unilateral facial a.** ضُمُورٌ وَجْهِيٌّ شَقِيٌّ مُتَرَقٍّ. ضُمُورٌ مُتَرَقٍّ لجلد وأنسجة وعظام وعضلات إحدى جهتي الوجه.
- **senile a.** ضُمُورٌ شَيْخُوخِي. الضُمُور الطبيعي للأنسجة والأعضاء الذي يحصل عند تقادم العمر.
- **spinal muscular a.** ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ تَخَاَعِي. داء تنكسي مترق في الخلايا الحركية للنخاع الشوكي ويبدأ عادة في العضلات الصغيرة في اليد وأحياناً في الأطراف العلوية والمنكبين ومن ثم ينتشر تدريجياً إلى عضلات الأطراف السفلية.
- **trophoneurotic a.** ضُمُورٌ عَصَبِيٌّ تَغَذَوِي. ضُمُور بسبب مرض المراكز التي ينشأ منها العصب المغذي للمنطقة أو للعضو.
- atropine** أتروپين. اسم كيميائي لمادة قلوانية تستحضر من البَلَادُونَا أو يحضر صناعياً، وهي مادة محصرة للفعل الكولينري وتستعمل كمادة مضادة للتشنج وإرخاء العضلات أو إيقاف الرعاش والصلل في داء باركنسون أو لزيادة سرعة القلب بحصر العصب المبهم. كما أنها تستعمل كمادة مضادة لكثير من المواد السامة أو مضادة للافراز أو موسعة للحدقة.
- atropinism** الأَتْرُوبِينِيَّة. التسمم بالأتروپين.
- attack** هَجَمَةٌ. عارضة المرض أو بدايته.
- **anxiety a. (= panic a.)** هَجَمَةٌ قَلْق. هجمة مقلقة.
- **panic a.** هَجَمَةٌ هَلَع. عارضة قلق حاد شديد تحدث في الكثير من حالات الرهاب مثل رهاب الساح أو غيره.
- **transient ischemic a.** هَجَمَةٌ إِفْقَارِيَّةٌ عَابِرَةٌ. هجمة اضطراب دماغي قصيرة الامد (من بضعة دقائق إلى بضعة ساعات) تتولد عن خلل وعائي ولكن من دون توليد أي نقص عصبي مستديم وتتسبب هذه الهجمات غالباً عن مرض انسدادى وعائى خصوصاً في الجملة الوعائية السباتية - القاعدية - الفقارية.
- **vagal a. (= vasovagal a.)** هَجَمَةٌ مُبْهَمِيَّة. هجمة وعائية مُبْهَمِيَّة. استجابة وعائية عصبية المنشأ تتصف بالشحوب والغثيان والتعرق وبطء القلب والهبوط السريع لضغط الدم

الذي إذا ما وصل إلى مستوى واطيء جداً أدى إلى فقدان الوعي. وتتولد هذه الهجمات عن الكرب العاطفي الشديد المترافق مع الخوف أو الألم.

**انتباه.** 1. التركيز الانتقائي **attention** لإدراك جزء من الظروف أو المنظورات التي تظهر في المحيط. 2. الاستجابة الانتقائية لنوع واحد من المنبهات.

1. وَضْعَةٌ. 2. مَوْقِف. 1. وضعة **attitude** الجسم أو موضعه. 2. وضعة أقسام جسم الجنين بعضها لبعض. 3. نزعة الاستجابة الإيجابية أو السلبية للأشخاص الآخرين أو للحالات أو لமானج العمل والأوامر المختلفة.

**بَكْمُ السَّمِيع.** بكم يصيب الشخص بالرغم من أن له سمعاً طبيعياً.

**تَسْكِينٌ سَمْعِيّ.** تقليل أو **audioanalgesia** إيقاف الألم بالاستماع إلى الأصوات الموسيقية.

**مُخَطَّطُ السَّمْع.** تسجيل عتبات **audiogram** حدة سمع الشخص للموجات الصوتية المختلفة.

**مَقْيَاسُ السَّمْع.** جهاز الكتروني **audiometer** يولد أصواتاً نقية معروفة التردد والشدة تستعمل لقياس حدة السمع ومداه.

**قِيَاسُ السَّمْع.** قياس **audiometry** حدة ومدى السمع باستعمال مقياس السمع.

**سَمَاع.** عملية السمع. **audition**

**سَمَاعٌ لَوْنِيّ.** رؤية بعض الألوان **chromatic a.** عند الاستماع إلى بعض الأصوات.

**سَمَاعٌ ذَوْقِيّ.** الحس ببعض **gustatory a.** الاذواق عند الاستماع إلى بعض الأصوات.

**مُقَدَّمُ البُطَيْنِ الثَّالِثِ.** النهاية الامامية **aula** للبطين الثالث.

**أَوْرَةٌ.** إحساس ذاتي أو ظاهرة حركية **aura** تسبق النوبات الانتبائية مباشرة وتعلن بدئها.

**أَوْرَةٌ الرِّبُو.** أورة تسبق نوبة **a. asthmatica** الربو.

**أَوْرَةٌ سَمْعِيَّة.** إحساس سمعي يسبق **auditory a.** أحياناً نوبة الصرع.

**أَوْرَةٌ شَرْسُوفِيَّة.** إحساس مزعج **epigastric a.** في المنطقة الشرسوفية يسبق نوبة الصرع أحياناً.

**أَوْرَةٌ الصَّرَع.** إحساس ينذر **epileptic a.** المصاب أحياناً بقدوم نوبة الصرع.

- أَوْرَة الهستيريا**. إحساس شبيه - **a. hysterica**  
بأورة الصرع ينذر الشخص بقدوم نوبة الهستيريا.
- أَوْرَة فِكْرِيَّة**. حالة أحلامية - **Intellectual a.**  
تسبق نوبة الصرع أحياناً.
- أَوْرَة جِسْمِيَّة حَرَكِيَّة**. إحساس - **kinesthetic a.**  
بحركة أحد أقسام الجسم سواء تحرك القسم فعلاً أو لم يتحرك أبداً.
- أَوْرَة حَرَكِيَّة**. حركة تسبق نوبة الصرع. - **motor a.**
- أَوْرَة الجُرِّي**. فترة جري - **a. procursiva**  
قصيرة تسبق نوبة الصرع أحياناً.
- أَوْرَة** (= **intellectual a.**) - **reminiscent a.**  
فِكْرِيَّة.
1. أُوْرِي. 2. أُوْرِي. 1. نسبة إلى الأذن **aural**  
2. نسبة إلى الأورة.
- ذَاتَوِيَّة**: **إِنطَوَائِيَّة**. **autism**  
الانصراف إلى الأفكار الذاتية وأحلام اليقظة  
والأوهام والأهلاس والابتعاد عن الحقائق الواقعية  
وطغيان تفضيل الذات والنفس على كل ما هو في  
محيطها.
- ذَاتَوِيَّة لا حركية**: **سُبَات سَهْرِي**. - **akinetlc a.**  
انظر coma vigil.
- ذَاتَوِيَّة طفيلية**: **إِضْطِرَابٌ إِنطَوَائِي**. انظر disorder.  
**ذَاتَوِي**: **إِنطَوَائِي**. المصاب بالانطواء **autistic**  
على الذات.
- تَنفِيسٌ ذَاتِي**. علاج نفساني **autocatharsis**  
بتشجيع المريض على كتابة أفكاره ومشاعره  
وإحساساته وخبراته وتجاربه ومشاكله، وبهذا  
يفرج عن عواطفه المكبوتة.
- شَبَقٌ** (= **autoerotism**) **autoeroticism**  
ذَاتِي. شبق موجه نحو الذات.
- مَعْرِفَةُ الذَّات**. طريقة علاج **autognosis**  
بالتحليل النفسي بمساعدة المريض على تحليل  
نفسه ذاتياً.
- طُعْمٌ ذَاتِي**. طعم نسيجي **autograft**  
يؤخذ من الجسم لغرسه في منطقة أخرى منه.
- تَنوِيمُ الذات**. تنويم الشخص **autohypnosis**  
لنفسه ذاتياً.
- تَحْرُكٌ إِرَادِي**. حركة الشخص **autokinesis**  
إِرَادِيّاً.
- مُتَحَرِّكٌ إِرَادِيّاً**. قابل أو متمكن **autokinetic**  
من الحركة الإرادية.
- تِلْقَائِي**. 1. لا إرادي، عمل ينفذ **automatic**  
تلقائياً 2. ذاتي الحركة أو ذاتي التنظيم.
- سُلُوكٌ تِلْقَائِي**. انظر behavior. - **a. behavior**
- تِلْقَائِيَّة**: **سُلُوكٌ تِلْقَائِي**. سلوك **automatism**  
غير موجه وغير مستهدف ومن غير سيطرة واعية  
عليه ومن دون شعور المريض به ويشاهد في  
الصرع التفساني الحركي والفصام الجامودي.
- تِلْقَائِيَّة سَيْرِيَّة**. حالة سير المريض. - **ambulatory a.**  
وقيامه ببعض الأعمال من دون وعي أو معرفة بما  
يعمله.
- تِلْقَائِيَّة أمرية**. القيام ببعض - **command a.**  
الأعمال التي يؤمر المريض القيام بها فينفذها من دون  
تفكير ومن دون التأكد من صلاحيتها كما يحدث في  
حالات التنويم.
- رُهَابُ القُدَارَة**. خوف **automysophobia**  
المصاب من كونه قدراً أو ذا راحة كريمة.
- ذَاتِي**: **مُسْتَقَل**. مستقل ذاتياً **autonomic**  
أو عمل ينفذ من دون سيطرة الإرادة عليه.
- الجَهَازُ العَصْبِيُّ المُسْتَقَل**: - **a. nervous system**  
الجَهَازُ العَصْبِيُّ الذَاتِي. انظر system.
- النَّرْجِسِيَّة**: **عِشْقُ الذَّات**. **autophilia**  
انظر narcissism.
- رُهَابُ الإِنْفِرَاد**. رهاب الانفراد **autophobia**  
بالذات أو الخوف عند وجود الشخص بمفرده  
ولوحده.
- نَفْسِي ذَاتِي**. متعلق بنفس **autopsychic**  
الشخص وب عقله ووعيه.
- نَظْمٌ نَفْسِي ذَاتِي**. **autopsychorhythmia**  
فعالية الدماغ الكهربائية النظمية المرضية.
- مُعَالَجَة نَفْسِيَّة ذَاتِيَّة**. **autopsychotherapy**  
تحليل نفسي ذاتي.
- تَوَهُمٌ بَقَاءِ المَبْتَوَّر**. **autosomatognosis**  
حس قسم من الجسم الذي سبق أن أزيل منه بالبت  
بكونه لا زال موجوداً في موضعه.

**autosuggestibility** قَابِلِيَّةُ الْإِيحَاءِ الذَّاتِي. حالة فكرية خاصة تقل فيها الإرادة ويصبح من السهل الإيحاء للشخص.

**autosuggestion** الإِيحَاءُ الذَّاتِي. عملية إقناع الشخص لنفسه لقبول بعض الأفكار أو المعتقدات أو الآراء من دون مناقشة أو اعتراض.

**autosynnoia** الْإِنْشِغَالُ بِالذَّاتِ. تركيز المريض كل اهتماماته على نفسه وأفكاره وتخيالاته للحد الذي يفقده الاتصال بالعالم الخارجي.

**autotopagnosia** عَمَةُ وَضْعِ الْجِسْمِ. عدم مقدرة المريض على وضع أعضاء جسمه وتوجيهها بالاتجاه المناسب وعدم معرفة مواضعها.

**auxotonic** مُتَقَلِّصٌ ضِدَّ الْمُقَاوِمَةِ. التقلص العضلي الشديد ضد المقاومة المتزايدة.

**aversive (= noxious)** مُكَرِّهٌ؛ مُنْفِرٌ. ما ينفر منه ويحفز على اجتنابه.

**avoidance** إِجْتِنَابٌ. وسيلة دفاعية واعية أو غير واعية ترفض مواجهة بعض الحالات أو الفعاليات أو الأشياء التي قد تحدث للشخص القلق والصراع النفسي.

**awareness** وَعْيٌ؛ إدْرَاكٌ. وعي الشخص وإدراك الحوادث التي تحدث في محيطه أو الإحساسات والمشاعر الداخلية.

**- reality a.** وَعْيُ الْحَقَائِقِ. إدراك الشخص للحوادث التي تحدث في محيطه وإدراك مغزاها وعلاقاتها ببعضها.

**- spatial a.** وَعْيٌ حَيَازِي. معرفة الشخص لمواضع المواد والأشياء في محيطه.

**axilemma** غِشَاءُ الْمَحْوَرِ. انظر axolemma.

**axis** 1. محور. 2. المحور. 1. خط يدور الجسم حوله أو خط مركزي تترتب حوله مجموعة من بنى الجسم. 2. الفقرة الرقبية الثانية.

**- cerebrospinal a.** الْمَحْوَرُ الدِّمَاغِيُّ النُّخَاعِي. الجهاز العصبي المركزي.

**- encephalospinal a.** الْمَحْوَرُ الرَّأْسِيُّ النُّخَاعِي. الجهاز العصبي المركزي.

**axis cylinder** الْمَحْوَرِ. انظر axon.

**axoaxonic** مَحْوَرِي مَحْوَرِي. يشير إلى

مشبك بين محوار أحد العصبونات ومحوار عصبون ثانٍ.

**axodendritic** مَحْوَرِي تَغْصُنِي. يشير إلى مشبك بين محوار أحد العصبونات وتغصن عصبون ثانٍ.

**axofugal (= axifugal)** مُبْتَعِدٌ عَنِ الْمَحْوَرِ. مبتعد عن المحور أو المحوار.

**axolemma** غِشَاءُ الْمَحْوَرِ. الغشاء المغطي للمحور.

**axon** مَحْوَر. (ج: مَحَاوِير). 1. محور الجسم وهو العمود الفقري. 2. فرع العصبون الذي ينقل الدفوعات العصبية من جسم خلية إلى نهاياته والتي تنتقل بدورها من تفرعاته إلى عصبون آخر أو إلى عضو مستقل. وقد يكون المحوار محاطاً بغمد نخاعيني وقد لا يكون مغمداً كما في بعض أعصاب الجهاز المستقل.

**- myelinated a.** مَحْوَرٌ مُغْمَدٌ. محوار محاط بغمد نخاعيني (ميلييني).

**- naked a. (= unmyelinated a.)** مَحْوَرٌ غَيْرٌ مُغْمَدٌ.

**- unmyelinated a.** مَحْوَرٌ غَيْرٌ مُغْمَدٌ. محوار غير محاط بغمد ميلييني.

**axonotmesis** إِنْهَتَاكُ الْمَحْوَرِ. إصابة المحوار التي تؤدي إلى تمزقه والغمد النخاعيني (الميلييني) المحيط به من دون إصابة النسيج الضام الذي يحيطه، ويؤدي ذلك إلى تنكس قسمه المقطوع تحت الإصابة ثم يبدأ تجرده بعد ذلك تلقائياً بصورة جيدة عادة.


**axopetal (= axipetal)** نَحْوُ الْمَحْوَرِ. متجه نحو المحور أو المحوار.

**axophage** بَلْعَمُ الْمَحْوَرِ. خلية دبقية عصبية تتواجد في الكهوف النخاعية في التهاب النخاع.

**axoplasm** جَبْلَةُ الْمَحْوَرِ. الجبلية الموجودة في المحوار.

**axosomatic** مَحْوَرِي جَسَدِي. يشير إلى المشبك بين محور أحد العصبونات وخلية أخرى في الجسم.

**axospongium** إِسْفَنْجَةُ الْمَحْوَرِ. البنية الشبكية التي تكون مادة محوار العصبون.



axon

رسم تخطيطي للعصبون يبين أقسامه المختلفة والمحوار.

# B

**Babinski's law** قَانُونُ بَابِنْسْكِي. أنظر law.

**Babinski's reflex** مُنْعَكَسُ بَابِنْسْكِي. أنظر reflex.

**Babinski's sign** عَلَامَةُ بَابِنْسْكِي. أنظر sign.

**backache** أَلَمُ الظَّهْرِ: ظَهَار. أَلَمُ الظهر  
كعلامة غير مولدة عن تشوه بنيوي أو مرض ظهري معين فيه.

**backalgia** أَلَمُ الظَّهْرِ: ظَهَار. أنظر backache.

**ballism (= ballismus)** الْقَذَائِفِيَّةُ: رَفْنٌ.

**ballismus** الْقَذَائِفِيَّةُ: رَفْنٌ. حركات قذفية عنيفة تتولد عن تقلص العضلات الدانية للأطراف نتيجة آفة نواة لويزي (النواة تحت المهادية) أو ارتباطاتها العصبية. ويمكن أن تظهر في جهة واحدة من الجسم ولكنها غالباً ما تظهر في الجهتين.

**ballistic** قَذَائِفِيٌّ. 1. متعلق بالقذائف أو بدء القذائفية 2. نفضي.

**ballistophobia** رُهَابُ الْقَذَائِفِ. رهاب الرصاص والقذائف.

**band of Broca, diagonal (= stria diagonalis)** شَرِيْطُ بَرُوْكَا الْمَائِلُ: السُّطْرُ الْمَائِلُ.

**band, Vicq d'Azyr** شَرِيْطُ فَيْك دَازِير. شريط من ألياف عصبية مغمدة رقيقة في الطبقة الحبيبية الخارجية.

**baragnosis** عَمَةُ الْوَزْنِ. عدم المقدرة على معرفة الوزن.

**barbaralalia** عُسْرُ تَلْفُظِ الْأَجْنَبِيِّ. عسر النطق عند التكلم بلغة أجنبية.

**barbital** بَارَبِيْتَال. دواء من مجموعة الباربيتورات يستعمل كمנוم ومركن ويؤخذ عن طريق الفم.

**barbitone** بَارَبِيْتُون: بَارَبِيْتَال. أنظر barbital.

**barbiturate** بَارَبِيْتُوْرَات. مجموعة من الأدوية المركنة المنومة تستخلص من حمض الباربيتوريك ومنها دواء الفينوباربيتال.

**baresthesia** حِسُّ الْوَزْنِ: حِسُّ الضَّغْطِ. حس الضغط والوزن.

**baresthesiometer** مَقْيَاسُ حِسِّ الْوَزْنِ: مَقْيَاسُ حِسِّ الضَّغْطِ. آلة تقيس حساسية الشخص للضغط والوزن.

**baroagnosis** عَمَةُ الْوَزْنِ. أنظر baragnosis.

**baroreceptor** مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْطِ. أنظر baroreceptor.

**baroelectroesthesiometer** مَقْيَاسُ الْحِسِّ الْوَزْنِيِّ الْكَهْرَبَائِيِّ. آلة تقيس درجة الضغط عند التحسيس الكهربائي لحسي الألم أو التئمل.

**barognosis** إِدْرَاكُ الْعِزْنِ. الإدراك الواعي لحس الوزن ومعرفة مقداره.

**baroreceptor** مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْطِ. نهاية عصبية حسية تتنبه بتغير الضغط الواقع عليها كتلك الموجودة في الأوعية الدموية.

**barrier** حَائِل. حاجز.

- **blood-brain b.** الحائل الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيّ. الحائل الذي يفصل الدم عن متن الجهاز العصبي المركزي ويتكون من جدران الشعيرات الدموية للجهاز والأغشية الدبقية المحيطة بها.

- **blood-cerebral b. (= blood brain b.)** الحائل الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيّ.

- **blood-cerebrospinal fluid b.** الحائل الدَّمَوِيُّ الدِّمَاغِيّ. (= blood-brain b.) الحائل الدموي للسائل الدماغي النخاعي.

**baryesthesia** حِسُّ الْوُزْنِ. انظر baryesthesia.

**baryglossia** ثِقَلُ الْكَلَامِ. التفوه بكلمات بطيئة وغليلة.

**barylalia** ثِقَلُ التَّلَفُّظِ. النطق بكلمات غليظة غير واضحة لصعوبة ربط الحروف لتكوين الكلمات.

**baryphonia** ثَخُنُ الصَّوْتِ. النطق بصوت ثخين وثقيل.

**base (= basis)** قَاعِدَةٌ. 1. القسم السفلي من الجسم. 2. المكون الرئيسي للمركب. 3. الجزء للأحماض من الملح.

- **b. of dorsal horn of spinal cord** قَاعِدَةُ الْقَرْنِ الظَّهْرِيِّ لِلنَّخَاعِ. جزء القرن الظهري السنجابي من النخاع الشوكي المتصل بالقسم المركزي من مادته السنجابية.

**basilarachnitis, basilarachnoiditis** إِنْتِهَابُ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ الْقَاعِدِيَّةِ. التهاب القسم القاعدي من غشاء العنكبوتية.

**basioccipital** قَاعِدِيٌّ قَذَالِيٌّ. متعلق بالناثيء القاعدي للعظم القذالي.

**basiphobia** رُهَابُ السَّيْرِ. انظر basiphobia.

**basis (= base)** قَاعِدَةٌ. القسم السفلي أو الرئيسي من الجسم أو العضو أو ذلك القسم من العضو أو الجسم المعاكس لقمته.

- **b. cerebri (= facies inferior cerebri)** الْوَجْهُ السُّفْلِيُّ لِلْمُخِّ.

- **b. cochleae** قَاعِدَةُ الْقَوْقَعَةِ. القسم الخلفي من القوقعة الذي يستقر على الصماخ السمعي الباطن.

- **b. cornus dorsalis medullae spinalis** قَاعِدَةُ الْقَرْنِ الظَّهْرِيِّ لِلنَّخَاعِ. dorsal horn of spinal cord

- **b. cranii externa** ظَاهِرُ قَاعِدَةِ الْقَحْفِ. السطح الظاهر للقسم السفلي من القحف.

- **b. cranii interna** بَاطِنُ قَاعِدَةِ الْقَحْفِ. السطح الباطن للقسم السفلي من القحف.

- **b. encephali (= facies inferior cerebri)** الْوَجْهُ السُّفْلِيُّ لِلْمُخِّ.

- **b. modiol** قَاعِدَةُ عِمَادِ الْقَوْقَعَةِ. القسم العريض من العماد الواقع على الجزء الوحشي من الصماخ السمعي الباطن.

- **b. pedunculi cerebri** قَاعِدَةُ السُّوَيْقَتَيْنِ الْمُخَيَّتَيْنِ. الحزمة الكبيرة من سبل الألياف العصبية التي تكون القسم البطني من السويقتين المخيتين والتي تتكون من الألياف القشرية النخاعية والقشرية النورية والقشرية الجسرية والجدارية الصدغية الجسرية والجببية الجسرية الهابطة من قشرة المخ إلى الجسر والنخاع.

- **b. stapedis** قَاعِدَةُ الرِّكَابِ. الصفيحة البيضوية العظمية على قاعدة العظم الركابي والتي تستقر في النافذة الدهليزية.

**basophobia (= basiphobia)** رُهَابُ السَّيْرِ. رهاب الوقوف والسير بالرغم من عدم وجود شلل عضلي في الأطراف التي يتمكن المريض من تحريكها عند جلوسه أو استلقائه.

**bathesthesia** الْحِسُّ الْعَمِيقُ. انظر bathyesthesia.

**bathmotropic** مُكَيِّفُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل يحور استجابة النسيج للمنبهات.

- **negative b.** مُنْطَبِطُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل يقلل استجابة النسيج العضلي للمنبهات.

- **positive b.** مُحَفِّزُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل ينشط استجابة النسيج العضلي للمنبهات.

**bathmotropism** تَكْيِيفُ الْإِسْتِجَابَةِ. عامل يحور درجة استثارية العضلات لملاءمة الحالة الوظيفية.

**bathophobia** رُهابُ العُمُق. رهاب النظر إلى الأعماق كالآبار أو النزول إليها.

**bathyanesthesia** فَقْدَانُ الحِسِّ العَمِيقِ. فقدان حس العضلات والمفاصل.

**bathyesthesia** الحِسُّ العَمِيقُ. حس الأقسام العميقة تحت سطح الجسم كالحس العضلي والحس المفصلي.

**bathyhyperesthesia** فَرطُ الحِسِّ العَمِيقِ. فرط حس البنات والاعضاء العميقة.

**bathyhypesthesia (= bathyhypoesthesia)** نَقْصُ الحِسِّ العَمِيقِ. قلة حس البنات والاعضاء العميقة في الجسم.

**battarismus** تَأْتَاة. stuttering. أنظر

**bedsore** النَّاكِية. decubitus ulcer. أنظر

**bedwetting** التَبَوُّلُ فِي الْفَرَّاشِ؛ النَّفَاص. enuresis. أنظر

**behavior** سُلُوك. التصرفات والفعاليات الشخصية الظاهرة التي يمكن أن يشاهدها الآخرون أو من الممكن إظهارها باستعمال بعض الطرق التشخيصية الخاصة.

**- acquired b.** سُلُوكٌ مُكْتَسَبٌ. سلوك مكتسب الشخص من تجاربه الطويلة في حياته وهو غير السلوك الغريزي الطبيعي.

**- adaptive b.** سُلُوكٌ تَلَاؤُمِيٌّ. سلوك محوّر يساعد الكائن على التفاعل مع محيطه بكفاءة مما يساعده على البقاء.

**- affective b.** سُلُوكٌ عَاطِفِيٌّ. سلوك انفعالي.

**- aggressive b.** سُلُوكٌ عُدَوَانِيٌّ. سلوك اعتدائي.

**- agnostic b.** سُلُوكٌ عَمْهِيٌّ. السلوك اللاأدري.

**- anticipating b.** سُلُوكٌ تَوَقُّعِيٌّ. سلوك استباقي.

**- automatic b.** التِّلْقَائِيَّةُ؛ سُلُوكٌ تِلْقَائِيٌّ. أنظر automatism.

**- collective b.** سُلُوكٌ جَمَاعِيٌّ. سلوك مجموعة من الأشخاص الأسوياء لا يقوم أي منهم بهذا السلوك لو كان بمفرده.

**- defensive b.** سُلُوكٌ دِفَاعِيٌّ. سلوك الدفاع عن النفس عند تعرضها للهجوم أو لخطر ماثل.

**- goal directed b.** سُلُوكٌ مُسْتَهْدَفٌ. سلوك موجه بالهدف.

**- impulsive b.** سُلُوكٌ مُفْهُوْرٌ. تصرف أو فعل مفاجيء من دون تفكير أو تقدير لعواقبه وقد يكون سلوكاً مرضياً وعادة ما يتصف بتصرف انفجاري تتلوه بعض الراحة والتفريح النفسي.

**- instinctive b.** سُلُوكٌ غَرِيزِيٌّ. سلوك طبيعي معقد ومنظم ولا يتعلمه الكائن ولكنه سلوك ذو غرض بيولوجي محدد للنوع وينتقل وراثياً مثل سلوك بناء العش عند الطيور.

**- instrumental b.** سُلُوكٌ وَسِيلِيٌّ. سلوك يستخدم كوسيلة لإحداث تغيير معين في المحيط.

**- invariable b.** سُلُوكٌ ثَابِتٌ. سلوك غير متغير لانه محدد بالبنية أو الوظيفة الذاتية كالفعل المنعكسي.

**- maternal b.** سُلُوكٌ أُمُومِيٌّ. سلوك الأم وحنانها نحو أطفالها.

**- mating b.** سُلُوكٌ تَزَاوُجِيٌّ. سلوك الزوجين تجاه بعضهما.

**- operant b. (= instrumental b.)** سُلُوكٌ مُجَرٍّ. سلوك متوقع الإثابة.

**- reproductive b.** سُلُوكٌ تَنَاسُلِيٌّ. سلوك بعض الحيوانات اثناء موسم التناسل.

**- respondent b.** سُلُوكٌ اسْتِجَابِيٌّ؛ سلوك منعكسي إشرطي.

**b. therapy** مُعَالَجَةُ سُلُوكِيَّة. أنظر therapy.

**- variable b.** سُلُوكٌ مُتَغَيِّرٌ. سلوك يتغير باستمرار نتيجة تجارب الشخص وخبرته وتعلمه.

**- voluntary b.** سُلُوكٌ إِرَادِيٌّ. سلوك إرادي يقوم به الشخص لسبب خاص.

**behavioral** سُلُوكِيٌّ. متعلق بالسلوك.

**behaviorism** السُّلُوكِيَّة. نظرية في علم النفس تنص على أن السلوك الظاهر والملاحظ هو الذي يجب الاهتمام به في دراسات علم النفس ويجب إهمال الأفكار والعواطف المكبوتة وغير المنظورة في مثل هذه الدراسات.

**bends** أَلَمٌ هُبُوطِ الضَّغْطِ. آلام شديدة في البطن والساقين تنتج عن هبوط الضغط الجوي المفاجيء والسريع.

**benzodiazepene** بَنْزُوْدِيَاذِيْبِين. دواء مهدئ مضاد للقلق ومرخٍ للعضلات ومسكن وله تأثير منوم.

**benztropine** بَنْزْتْرُوْبِين. دواء مضاد الفعل الكولينجي ومضاد الهستامين ومخدر موضعي ويستعمل في علاج داء باركنسون عن طريق الفم أو بالحقن بالعضل أو بالوريد.

**beriberi** بَرِّي بَرِّي. داء ينتج عن نقص فيتامين B<sub>1</sub> (ثيامين) ويتصف بالتهاب الأعصاب والوذمة ومرضيات القلب.

البَرِّي بَرِّي الجَاف. - atrophic b. (= dry b.)

- cerebral b. (= Wernicke- Korsakoff syndrome.) البَرِّي بَرِّي الدماغِي: متلازمة فرنيكة - كورساكوف.

- dry b. البَرِّي بَرِّي الجَاف. نوع من البري بري يتصف بالشلل الرخو والضمور العضلي وانعدام المنعكسات وقد يصاحب ذلك تضخم القلب وتسرع.

- infantile b. البَرِّي بَرِّي الْوَلِيدِي. مرض يصيب الأطفال الرضع الذين يرضعون حليب أمهات معوزين الثيامين ويصابون بنقص التبول والوذمة المترقية وغالباً بفشل القلب الحاد والموت. وقد يصابون أحياناً بالتقيؤ وانعدام الصوت والتشنج الظهري والاختلاج.

- paralytic b. (= dry b.) البَرِّي بَرِّي الشَّلَلِي.

- wet b. البَرِّي بَرِّي الرُّطْب. نوع من البري بري يتصف بفشل القلب والوذمة ولكن من دون إصابة كبيرة للجهاز العصبي.

**bestiality** مُوَاقَعَةُ الْبَهَائِم. إتيان البهيمة.

**beta blockers** مُحَصِّرَاتُ الْبِيْتَا. أنظر blocker.

**beta rhythm** نَظْمٌ بِيْتَا. أنظر rhythm.

**beta waves** أَمْوَاجٌ بِيْتَا. أنظر wave.

**bethanechol** بِيْتَانِيْكُول. شادة كولينية الفعل لا يحلمها إستيراز الأسيتيل كولين ولها تأثير مسكاريني وتستعمل كدواء منبه لتقلص عضلات القناة الهضمية والمسالك البولية والمثانة بعد العمليات أو بعد فقدان التوتر العصبي المنشأ.

**betweenbrain** الدِمَاعُ الْبَيْنِي. أنظر diencephalon.

**bibliomania** هَوَسُ الْكُتُب. الرغبة في جمع الكتب وخصوصاً القديم والنادر منها.

**bibliotherapy** الْمُعَالَجَةُ بِالْكَتُب. المعالجة بقراءة الكتب في حالات الاضطرابات العقلية أو لأغراض الصحة العقلية.

**bicoronal** ثَنَائِي الْإِكْلِيل. متعلق بالإكليلين المتشفع كل واحد منهما من المحفظة الداخلية للدماغ.

**bilateral** بِالْجَانِبَيْن. جانبي الجسم أو ذو جانبيين.

**bilateralism** تَنَازُلُ الْجَانِبَيْن. تناظر مرآتي لجانبي الجسم.

**binocular** 1. بِالْعَيْنَيْن 2. ذُو عَيْنَيْن. 1. الأبصار بالعينين 2. مجهر ذو عينيتين.

**biocybernetics** عِلْمُ التَّحَكُّمِ الْحَيَوِي. علم التواصل والتحكم في الحيوانات.

**biofeedback** تَلْقِيمٌ حَيَوِي رَاجِعٌ؛ تَغْذِيَّةٌ حَيَوِيَّةٌ رَاجِعَةٌ. عملية تجهيز الشخص بالمعلومات الخاصة إما بطريق السمع أو البصر عن أحد المتغيرات الفيزيولوجية في جسمه كسرعة القلب أو مستوى ضغط الدم أو درجة الحرارة والتي تساعده على التحكم فيها إرادياً.

- alpha b. تَغْذِيَّةُ الْفَا الْحَيَوِيَّةُ الرَّاجِعَةُ. حالة إعلام الشخص بالسمع بصورة مستمرة عن نمط ونظم موجاته الدماغية بغرض زيادة نشاط موجات ألفا مما يؤدي إلى حالة من الارتخاء واليقظة عند الشخص.

**biopsy** خَزْعَةٌ؛ إِخْتِرَاعٌ. استئصال جزء من نسيج حي من جسم المريض لغرض فحصه وعادة بالفحص المجهرى وذلك لأغراض التشخيص المرضي.

**biopsychic** نَفْسِيٌّ حَيَوِيٌّ. متعلق بالظواهر النفسانية والعقلية للكائنات الحية.

**biopsychology (= psychobiology)** عِلْمُ النَّفْسِ الْبِيُولُوجِي. علم النفس البيولوجي.

**biorhythm** نَظْمٌ حَيَوِيٌّ. ظواهر فيزيولوجية دورية مثل النظم اليوماوي.

**biothesiometer** مِقْيَاسٌ حَسَّ الْإِهْتِرَاز. آلة تقيس عتبة إدراك حس الاهتزاز.



**bipolar** ذُو قُطْبَيْنِ. 1. بنية ذات قطبين.  
2. عصبون ذو قطبين.

**- b. neuron** عَصْبُونٌ ذُو قُطْبَيْنِ. عصبون ذو  
فرعين أحدهما المحوار.

**bisexual** ثُنَائِي الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّةِ. شخص  
يتصف بثنائية الجنس.

**bisexuality** ثُنَائِيَّة الصِّفَاتِ الجِنْسِيَّةِ.

1. خنثة حقيقية في حالة وجود غدتين جنسيتين  
واحدة من كل جنس 2. شخص له سلوك مذهري  
وخصائص من الجنسين 3. انجذاب نحو كلا  
الجنسين الذكر والأنثى، فهو جنوسي ومغاير  
الجنس في ذات الوقت 4. وجود صفات نفسية  
للجنسين أي الذكورة والأنوثة لدى نفس الشخص.

**bitter** مُرٌّ. طعم كريحه مثل طعم الكينين.

**blackout** غَيْمُومَةٌ. حالة تتصف بغياب البصر  
وفقدان الوعي الموقت بسبب نقص دوران الدم في  
الدماغ.

**bladder** مَثَانَةٌ. كيسة غشائية تتجمع فيها  
السوائل وتستعمل اصطلاحياً للكيسة البولية.

**- atonic b.** مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ. حالة تتصف بتمدّد  
المثانة البولية وضعف تقلصها من دون أية إصابة في  
الجهاز العصبي المركزي.

**- atonic neurogenic b.** مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.  
المنشأ. مثانة وائية بسبب إصابة أعصابها الحسية  
التي تربطها بالنخاع وتتصف بفقدان القدرة على  
التحكم على وظائفها والحس بالرغبة بإفراغها عند  
امتلائها المفرط. وغالباً ما تشاهد في التابس الظهري.

**- automatic b.** مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ. مثانة عصبية  
الاعتلال بسبب القطع الكامل للنخاع الشوكي فوق  
مستوى الشدافات العجزية مما يؤدي إلى فقدان  
المنعكسات البولية وحس المثانة والتبول الشديد  
اللاإرادي مع بقاء مثانة بولية كبيرة في المثانة.

**- autonomic b. (= automatic b.)** مَثَانَةٌ  
تَلْقَائِيَّةٌ.

**- autonomous b.** مَثَانَةٌ مُسْتَقْلِلَةٌ. مثانة عصبية  
الاعتلال بسبب آفة في القسم العجزية من النخاع التي  
تقطع القوس المنعكسي الذي يتحكم بالمثانة وتتصف  
بفقدان حس المثانة ومنعكس بدء التبول والسلس.

**- cord b. (= automatic b.)** مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ.

مَثَانَةٌ - **denervated b. (= autonomous b.)** مُسْتَقْلِلَةٌ.

مَثَانَةٌ مَشْلُولَةٌ الحَرَكَةِ. - **motor paralytic b.**  
مثانة عصبية الاعتلال بسبب قطع الأعصاب أو  
العصبونات التي تنظم منعكساتها ويتصف النوع الحاد  
من هذا الداء بتمدّد المثانة المفرط المؤلم مع عدم  
المقدرة على إفراغها أما النوع المزمن فيتصف  
بصعوبة بدء التبول مع العصر والإجهاد وضعف تيار  
التبول وتقطعه

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّةٌ. حالة وظيفية تتصف - **nervous b.**  
بالرغبة المقيمة للتبول مع عدم المقدرة على ذلك  
بصورة تامة.

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّةٌ الإِعْتِلَالُ. أي خلل - **neurogenic b.**  
وظيفي في المثانة البولية ينتج عن آفة عصبية محيطية  
أو مركزية.

مَثَانَةٌ - **nonreflex b. (= autonomous b.)** مُسْتَقْلِلَةٌ.

- **paralytic b. (= atonic neurogenic b.)** مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ الإِعْتِلَالُ.

مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ. - **reflex b. (= automatic b.)**

- **sensory paralytic b. (= atonic neurogenic b.)** مَثَانَةٌ وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ الإِعْتِلَالُ.

مَثَانَةٌ تَلْقَائِيَّةٌ. - **spastic b. (= automatic b.)**

مَثَانَةٌ. - **tabetic b. (= atonic neurogenic b.)** وَائِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ الإِعْتِلَالُ: مَثَانَةٌ تَابِيسِيَّةٌ.

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّةٌ - **uninhibited neurogenic b.**  
الإِعْتِلَالُ غَيْرُ مُقْبَطَةٍ. مثانة عصبية الاعتلال بسبب  
آفة في منطقة العصبونات الحركية العلوية التي تقطع  
السيبل القشرية النخاعية وتتصف بالرغبة الملحة على  
التبول والإفراغ المتكرر اللاإرادي والفعالية التبولية  
الواطنة العتبة.

عَمَى. عدم المقدرة على الرؤية. **blindness**

عَمَةُ الألوان. عدم المقدرة - **amnesic color b.**  
على تسمية اللون المنظور بسبب مرض دماغي.

عَمَى الألوان. عدم المقدرة على رؤية - **color b.**  
بعض الألوان أو كلها.

عَمَى الإِرْتِجَاجِ. عَمَى وظيفي - **concussion b.**

- يُنتج عن الانفجار الشديد كأنفجار القنابل أو المتفجرات.
- **mental block** blocking. انظر فِكْرِيّ.
- **nerve b.** إحصار العَصَب. تخدير موضعي بحقن المخدر خارج أو حول العصب وبالقرب منه لإحصار توصيل الدفعات العصبية خلاله.
- **paracervical b.** إحصار حَوْل الرَقَبَة. تخدير الضفيرة والعقدة الحثليتين بحقن المبنج في القبر الوحشي للمهبل.
- **paraneural b.** إحصار حَوْل العَصَب. تبنيج العصب بحقن المبنج حوله.
- **parasacral b.** تخدير حَوْل العَجْزِيّ. تخدير موضعي بحقن المبنج الموضعي حول الاعصاب العجزية عند ظهورها من الثقوب العجزية.
- **paravertebral b.** إحصار حَوْل الفَقَارِيّ. حقن هيدروكلوريد البروكائين حول العقدة الرقبية الصدرية (النجمية) ويجرى ذلك في نوبات تسرع القلب أو السكتة وما شاكل ذلك.
- **perineural b.** إحصار حَوْل العَصَب. تخدير يجري بحقن المبنج بالقرب من العصب أو حوله.
- **presacral b.** إحصار أَمَام العَجْزِيّ. تخدير يتم بحقن المبنج حول الاعصاب العجزية وعلى السطح الأمامي للعجز.
- **pudendal b.** إحصار العَصَب الفَرْجِيّ. تبنيج العصب الفرجي بإحصاره بالمبنج الموضعي الذي يحقن إلى أحذوبة عظم الورك.
- **sacral b.** إحصار عَجْزِيّ. تخدير يجري بزرق المبنج الموضعي إلى الحيز خارج الجافية في القناة الشوكية.
- **spinal b. (= subarachnoid b.)** انسداد تَحْتَ العَنُكْبُوتِيَّة.
- **spinal subarachnoid b.** انسداد تَحْتَ العَنُكْبُوتِيَّة النخامية. حالة انسداد مجرى السائل المخي النخاعي في القناة الشوكية.
- **subarachnoid b.** إحصار تَحْتَ العَنُكْبُوتِيَّة. تخدير يولد بحقن المخدر الموضعي في الحيز تحت العنكبوتية حول النخاع الشوكي.
- **sympathetic b.** إحصار الوُدِّيّ. إحصار الجذع الودي بزرق المبنج حول الفقري.
- ينتج عن الانفجار الشديد كأنفجار القنابل أو المتفجرات.
- **cortical b.** عَمَى قَشْرِيّ. عَمَى ينتج عن آفة في المنطقة البصرية من قشرة المخ.
- **cortical psychic b.** عَمَى قَشْرِيّ نَفْسِيّ. فقدان الذاكرة البصرية للصور والاتجاهات الحيزية في المحيط بسبب آفة في الفص البصري.
- **functional b.** عَمَى وَظِيفِيّ. عَمَى هستيري من دون أية آفة بصرية أو عصبية.
- **hysterical b. (= functional b.)** عَمَى وَظِيفِيّ؛ عَمَى هِسْتِيرِيّ.
- **mind b. (= psychic b.)** عَمَى نَفْسِيّ.
- **object b.** عَمَى الْأَشْيَاء. عدم المقدرة على التعرف على الأشياء الموجودة في المحيط وعلى طبيعتها ووظائفها بالرغم من رؤيتها جيداً.
- **psychic b.** عَمَى نَفْسِيّ. عدم المقدرة على التعرف على المنبهات البصرية بسبب آفة في الدماغ.
- **soul b. (= psychic b.)** عَمَى نَفْسَانِيّ.
- **syllabic b.** عَمَى الْمُقَاطِع. عدم المقدرة على فهم مقاطع الكلام.
- **taste b.** عَمَى الذُّوق. عدم المقدرة على تذوق بعض المواد وإدراك حسها.
- **text b.** تَعَدُّدُ الْقِرَاءَةِ؛ الْأَقْرَائِيَّة. انظر alexia.
- **word b.** تَعَدُّدُ الْقِرَاءَةِ؛ الْأَقْرَائِيَّة. انظر alexia.
- blinking** طَرْفٌ. منعكس متكرر لفلق الأجفان لنشر فيلم الدمع على سطح العين وحماية القرنية من الجفاف أو الأذى.
- block** إحصار. 1. انسداد أو إيقاف. 2. تخدير موضعي.
- **adrenergic b.** إحصار الفِغَل الأدريناليني. انظر blockade, adrenergic.
- **epidural b.** تخدير خَارِجَ الجَافِيَّة. انظر anesthesia, epidural.
- **intercostal b. (= intercostal nerve b. = intercostal anesthesia)** تخدير وَرْبِيّ.
- **intraspinal b. (= subarachnoid b.)** إحصار

إِحْصَارُ الْمُبْهَمِ. (= vagal b. (= vagus nerve b.))  
إِحْصَارُ الدَفْعَاتِ العَصْبِيَّةِ فِي العَصَبِ المَبْهَمِ بِحَقِّ  
المَبْهَمِ المَوْضِعِيِّ حَوْلَ المَبْهَمِ عِنْدَ مَخْرَجِهِ مِنَ القَحْفِ.

**blockade** إِحْصَارُ. إِحْصَارُ المَسْتَقْبَلَةِ.  
إِحْصَارُ تَأْثِيرِ النَاقِلِ الهَرْمُونِيِّ أَوْ العَصْبِيِّ عَلَى  
مَسْتَقْبَلَةِ سَطْحِ الخَلِيَّةِ بِوِاسِطَةِ ضَادَّةٍ دَوَائِيَّةٍ تَرْتَبِطُ  
بِالمَسْتَقْبَلَةِ.

- **adrenergic b.** إِحْصَارُ الفِعْلِ الأَدْرِينَالِيِّ.  
تَثْبِيطُ انْتِقَائِيٍّ لاسْتِجَابَةِ الدَفْعَاتِ العَصْبِيَّةِ الودِيَّةِ  
وَلِلْكَاتِكُولَامِينِ وَلِلْأَمِينَاتِ الأَدْرِينَالِيَّةِ الفِعْلِ الأُخْرَى  
سِوَاهُ فِي مَوْقِعٍ مَسْتَقْبَلَةِ أَلْفَا أَوْ مَسْتَقْبَلَةِ بِيْتَا فِي  
الأَعْضَاءِ المَسْتَقْبَلَةِ أَوْ فِي العَصْبُونَاتِ الأَدْرِينَالِيَّةِ  
الفِعْلِ بَعْدَ العَقْدَةِ.

- **alpha adrenergic b. (= adrenergic b.)**  
إِحْصَارُ العَصْبُونِ الأَدْرِينَالِيِّ أَلْفَا.

- **beta adrenergic b. (= adrenergic b.)**  
إِحْصَارُ العَصْبُونِ الأَدْرِينَالِيِّ بِيْتَا.

- **cholinergic b.** إِحْصَارُ الفِعْلِ الكُولِينِيِّ. تَثْبِيطُ  
انْتِقَائِيٍّ لِلدَفْعَاتِ العَصْبِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الكُولِينِيَّةِ الفِعْلِ فِي  
المَشَابِكِ العَقْدِيَّةِ المَسْتَقْبَلَةِ وَفِي المَسْتَفْعَلَاتِ اللَادِيَّةِ  
بَعْدَ العَقْدَةِ أَوْ فِي الاتِّصَالَاتِ العَصْبِيَّةِ العَضَلِيَّةِ.

- **narcotic b.** إِحْصَارُ المُخَدَّرَاتِ. إِحْصَارُ التَأْثِيرِ  
السُّمِّيِّ لِلْمَخْدَرِ بِاسْتِعْمَالِ أدْوِيَّةٍ مِثْلِ المِيثَادُونِ فِي  
مُعَالَجَةِ الإِدْمَانِ.

- **neuromuscular b.** إِحْصَارُ عَصْبِيٍّ عَضَلِيٍّ.  
فَشْلُ الانْتِقَالِ العَصْبِيِّ العَضَلِيِّ الَّذِي يَنْتِجُ عَنْ اعْتِلَالِ  
الِاتِّصَالِ العَصْبِيِّ العَضَلِيِّ.

**blocker** مُحْصِرٌ. مَادَّةٌ تَحْصِرُ أَوْ تَسُدُّ مَرُورَ  
بَعْضِ الفِعَالِيَّاتِ أَوْ المَوَادِّ.

- **alpha b.** مُحْصِرُ أَلْفَا. دَوَاءٌ يُؤْدِي  
إِلَى إِحْصَارِ الفِعْلِ الأَدْرِينَالِيِّ فِي المَسْتَقْبَلَاتِ  
الأَدْرِينَالِيَّةِ الفِعْلِ أَلْفَا.

- **beta b.** مُحْصِرُ بِيْتَا. دَوَاءٌ يُؤْدِي إِلَى  
إِحْصَارِ الفِعْلِ الأَدْرِينَالِيِّ فِي المَسْتَقْبَلَاتِ  
الأَدْرِينَالِيَّةِ الفِعْلِ بِيْتَا 1، أَوْ بِيْتَا 2، أَوْ فِي كِلَيْهِمَا.

**blocking** 1. حَصْرُ مَرُورِ الدَفْعَاتِ  
العَصْبِيَّةِ الوَارِدَةِ مِمَّا يُؤْدِي إِلَى تَخْدِيرِ مَوْضِعِي  
2. حَصْرُ الأَفْكَارِ أَوْ حَرَامَتِهَا؛ تَوَقُّفُ التَّفْكِيرِ

الفَجَائِيَّ عِنْدَ حَصُولِ نَوْبَةِ أَلَمٍ.

- **b. agent, competitive** غَامِلٌ إِحْصَارِيٌّ  
مُنَافِسٌ. غَامِلٌ أَوْ دَوَاءٌ غَيْرُ فِعَالٍ يَنَافِسُ المَادَّةَ النَاقِلَةَ  
الفِيزِيُولُوجِيَّةَ وَيَمْنَعُهَا مِنَ الوُصُولِ إِلَى المَسْتَقْبَلَةِ  
وَبِذَلِكَ يَحْصِرُ عَمَلَهَا.

- **b. agent, depolarizing** غَامِلٌ مُحْصِرٌ  
مُزِيلُ الإِسْتِقْطَابِ. غَامِلٌ يَزِيلُ اسْتِقْطَابَ المَسْتَقْبَلَةِ  
وَبِهَذَا يَثْبِطُ تَنْبِيْهَهَا بِالمَنْبِهِ الفِيزِيُولُوجِيِّ.

**blood- brain barrier** حَائِلٌ دَمَوِيٌّ دِمَاعِيٌّ.  
انْظُرُ barrier.

**blush** تَوَرَّدٌ. احْمَرَارُ الوَجْهِ عِنْدَ الخَجَلِ  
بِسَبَبِ تَوَسُّعِ أَوْعِيَتِهِ الجِلْدِيَّةِ.

**body** جِسْمٌ. 1. جَذَعُ الكَائِنِ وَأَعْضَاؤُهُ  
2. أَكْبَرُ وَأَهَمُّ جُزْءٍ مِنْ أَيِّ عَضْوٍ 3. كِتْلَةٌ أَوْ تَجْمَعُ  
مِنْ مَوَادِّ بَنِيَوِيَّةٍ.

- **amygdaloid b.** الجِسْمُ اللُّوزِيّ.  
انْظُرُ corpus amygdaloideum.

- **b. of cerebellum** جِسْمُ المُخَيِّخِ.  
انْظُرُ corpus cerebelli.

- **b. of fornix** جِسْمُ القَبْوِ.  
انْظُرُ corpus fornicis.

- **geniculate b.** الجِسْمُ الزُّجْجِيّ.  
انْظُرُ corpus geniculatum.

- **habenular b.** العُتَّانُ. انْظُرُ habenula.

- **hyaloid b.** الجِسْمُ الزُّجَاجِيّ.  
انْظُرُ vitreous body.

- **infundibular b.** الجِسْمُ القِمْعِيّ. الفَصْ  
الخَلْفِيّ لِلْغَدَةِ النَخَامِيَّةِ.

- **juxtarestiform b.** الجِسْمُ المُجَاوِرُ لِلْمَرَسِيّ  
الشَّكْلُ. بَنِيَّةٌ تَرْتَبِطُ النَوَاةُ الدَهْلِيْزِيَّةُ الوَحْشِيَّةُ مَعَ النَوَاةِ  
الْبَرْحَاءِ وَتَنْقُلُ الدَفْعَاتِ العَصْبِيَّةِ الدَهْلِيْزِيَّةَ.

- **Luy's b. (= nucleus subthalamicus)**  
النَوَاةُ تَحْتَ المِهَادِيَّةِ.

- **mamillary b.** الجِسْمُ الحَلْمِيّ.  
انْظُرُ corpus mamillare.

- **medullary b. of cerebellum (= corpus medullare cerebelli)** لُبُّ المُخَيِّخِ.

- **medullary b. of vermis** شَجَرَةُ الْحَيَاةِ  
arbor vitae أنظر الدودة، أنظر  
cerebelli

- **Nissl b's.** أجسام نيسل. أجسام حبيبية كبيرة  
قعدة توجد في أجسام العصبونات وتتكون من  
الشبكة الهيولية الباطنة الخشنة وعديدات الريباسات  
الحرة.

- **olivary b. (= oliva)** الزيتونة؛ الجسم الزيتوني.

- **pacchionian b's.** الحَبَبِيَّاتُ العَنُكَبَوِيَّةُ.  
granulationes arachnoideae أنظر

- **paraolivary b's. (= accessory olivary nuclei)** النُويَّاتُ الزَيْتُونِيَّةُ الإِضَافِيَّةُ.

- **pineal b.** الجسمُ الصَّنَوْبُورِيّ. جسم مسطح  
صغير مخروطي الشكل فوق المهادي يقع فوق الأكمة  
العلوية وتحت طرف الجسم الثفني وهو مركز تركيب  
الميلاتونين الذي يثبط تنامي الغدد التناسلية.

- **pituitary b.** الغُدَّةُ النُخَامِيَّةُ.  
anظر pituitary gland

- **quadrigeminal b's.** الأجسامُ الرُّبَاعِيَّةُ.  
corpora quadrigemina أنظر

- **restiform b.** الجسمُ المَرَسِيّ الشَّكْلُ.  
pedunculus cerebellaris caudalis أنظر

- **sand b.** رَمْلُ الدِّمَاغِ. أنظر acervulus

- **tigroid b's. (= Nissl b's.)** أجسام نيسل؛  
الأجسامُ النُفْرَاءُ.

- **trapezoid b.** الجسمُ المُنْحَرِفِيّ.  
corpus trapezoideum أنظر

- **vitreous b.** الجسمُ الرُّجَاجِيّ. الجسم الهلامي  
الشفاف الذي يملأ القسم الداخلي من مقلة العين بين  
العدسة والشبكة.

**body agnosia** عَمَّةُ الجسم.  
agnosia أنظر

**body rocking** تَارْجُحُ الجسم. حركة  
الجسم النظامية الأمامية الخلفية عند الجلوس.

**brachial** عَضْدِيّ. متعلق بالعضد.

**brachialgia** أَلَمٌ عَضْدِيّ. ألم في الذراع أو  
الذراعين.

- **b. statica paresthetica** أَلَمُ الذَّرَاعِ المَذَلِّي

الإِضْغَاطِيّ. ألم الذراع واليد الذي يحدث أثناء النوم  
بسبب انضغاط الأوعية الدموية للذراع.

**brachium** العَضْدُ. 1. الذراع، خصوصاً  
قسمها من المئكب حتى المرفق 2. اصطلاح عام  
يدل على أية بنية أو نتوء شبيه بالذراع.

- **b. colliculi caudalis** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الذَّنْبِيَّةِ.  
ألياف من الفئيل الوحشي تمر إلى الأكمة الذنبية ثم  
تتجه إلى الأمام لتنتهي في الجسم الركبّي الإنسي.

- **b. colliculi inferioris (= b. colliculi caudalis)** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الذَّنْبِيَّةِ.

- **b. colliculi rostralis** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ الرُّاسِيَّةِ  
(المنقارية). ألياف تتسلق في الناحية البطنية  
الوحشية من الجهة الوحشية للأكمة الراسية للدماغ  
المتوسط لتنتقل أليافاً من الشبكية والشع البصري إلى  
الأكمة العلوية.

- **b. colliculi superioris (= b. colliculi rostralis)** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ العُلْوِيَّةِ.

- **b. of cranial colliculus (= b. colliculi rostralis)** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ العُلْوِيَّةِ.

- **b. opticum** الذَّرَاعُ البَصَرِيَّةُ. أحد الفروع التي  
تمتد من الأجسام الرباعية إلى المهاد البصري.

- **b. pontis** ذِرَاعُ الجِسْرِ. أنظر  
pedunculus cerebellaris medius

- **b. quadrigeminum inferius (= b. colliculi caudalis)** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ السُّفْلِيَّةِ.

- **b. quadrigeminum superioris (= b. colliculus rostralis)** ذِرَاعُ الأَكِيمَةِ  
الرُّاسِيَّةِ.

**brachybasia** قَصْرُ الخَطْوِيَّةِ. مشية بطيئة  
قَصِيرَةُ الخطو كما تشاهد في الشلل الشقي  
المزدوج.

**brachycephalia (= brachycephaly)** قَصْرُ الرَّاسِ.

**brachycephaly** قَصْرُ الرَّاسِ. رأس قصير  
ذو منسب رأسي بين 81.0-85.4.

**bradyacusia** ثِقَلُ السَّمْعِ. قلة السمع.

**bradyarthria (= bradylalia)** لَفَفٌ ثَقُلُ  
النُّطْقِ.

**bradycinesia (= bradykinesia)** بَطْءُ الْحَرَكَةِ.

**bradyecoa** تَبَاطُؤُ السَّمْعِ. صمم جزئي.

**bradyesthesia** بَطْءُ الإِدْرَاكِ. بطء أو قلة الفهم والإدراك.

**bradyglossia** تَبَاطُؤُ النُّطْقِ. بطء التلفظ الشاذ.

**bradykinesia** بَطْءُ الْحَرَكَةِ. بطء الحركات الشاذ مع تبدل الاستجابة الفكرية والحركية.

**bradylalia** لَفَفٌ؛ ثَقُلُ النُّطْقِ. بطء تلفظ الكلمات الشاذ بسبب آفة دماغية.

**bradylexia** بَطْءُ الْقِرَاءَةِ. بطء القراءة غير الناتج عن أي خلل بصري أو فكري أو عدم معرفة القراءة.

**bradylogia** بَطْءُ الْكَلَامِ. بطء الكلام الناتج عن العجز في التفكير كالذي يحصل في الأمراض العقلية.

**bradyphasia (= bradylalia)** لَفَفٌ؛ ثَقُلُ النُّطْقِ.

**bradyphemia** بَطْءُ الْكَلَامِ. أنظر bradylogia.

**bradyphrasia** بَطْءُ التَّلَفُّظِ. بَطْءُ لَفْظِ الكلمات.

**bradyphrenia** تَبَلُّدُ الذَّهْنِ. حالة تتصف بالعجز في المبادرة الفكرية السريعة وببطء الفعالية النفسية الحركية وعدم الاهتمام والتفاعل مع المحيط وينتج كل ذلك عن التهاب الدماغ الوبائي.

**bradypragia** بَطْءُ الْعَمَلِ. البطء في القيام بأي عمل.

**bradyteleocinesia (= bradyteleokinesia)** بَطْءُ التَّنْسيقِ الْحَرَكِيِّ.

**bradyteleokinesia** بَطْءُ التَّنْسيقِ الْحَرَكِيِّ. البطء في تنسيق الحركات فتتوقف الحركة أو تبطأ كثيراً قبل إكمالها ووصولها إلى هدفها.

**brain (= encephalon)** الدِّمَاغُ. قسم الجهاز العصبي المركزي الذي يوجد في القحف والمكون

من الدماغ المقدم والدماغ المتوسط والدماغ المؤخر وهو يقوم بوظائف السيطرة على الحركات العضلية وتنسيقها وإدراك الحواس وتنظيمها والسيطرة على توليد النطق وحفظ الذكريات وتوسيع الأفكار والعواطف والانفعالات.

**- new b.** الدِّمَاغُ الْجَدِيدُ. أنظر neoencephalon, neencephalon.

**- old b.** الدِّمَاغُ الْقَدِيمُ. أنظر paleoencephalon, paleoencephalon.

**- olfactory b., smell b. (= rhinencephalon)** الدِّمَاغُ الشَّمِّي.

**- respirator b.** دِمَاغُ الْمِنْفَاسِ. حالة المصاب بعد موت دماغه السريري والتي يحافظ فيها على الفعاليات الحيوية صناعياً باستعمال المنفاس.

**- split b.** دماغ منشطر. دماغ يُقَطَعُ فيه الاتصال بين نصفي كرة المخ للسيطرة على نوبات الصرع.

**- tween b.** الدِّمَاغُ الْبَيْنِيّ. أنظر diencephalon, interbrain.

**- visceral b. (= limbic system)** الدِّمَاغُ الْحَشَوِيِّ. الجهاز الحوفي.


**- wet b. (= cerebral edema)** وَذَمَةُ الدِّمَاغِ. حالة وذمة الدماغ.

**brainstem** جِذْعُ الدِّمَاغِ. قسم الدماغ الذي يشبه الجذع والذي يربط نصفي كرة المخ بالنخاع الشوكي والذي يشمل الجسر والبصلة (الدماغ المستطيل) والدماغ المتوسط، وقد يضم البعض الدماغ البيني أيضاً إلى جذع الدماغ.

**brainwashing** غَسْلُ الدِّمَاغِ. محاولة منتظمة لغرس معتقدات وآراء معينة لدى الشخص خلاف رغبته، وعادة بمعتقدات تتناقض مع معارفه وآرائه السابقة.


**bregma** الْهَامَةُ. نقطة على سطح القحف عند اتصال الدرزين الإكليلي والسهمي.

**bromocriptine** بَرُومُوكْرِپْتِين. مادة شاذة للدوبامين وتستعمل كدواء في علاج داء باركنسون ويثبط إفراز الحليب ويحفز الإباضة.




brain

نصفا كرة المخ منظوران من الأعلى: (1) القطب الجبهي (2) التلفيف الجبهي العلوي (3) التلفيف الجبهي المتوسط (4) التلم الجبهي العلوي (5) التلم المركزي (6) التلفيف فوق الهامشي (7) التلم الصدغي العلوي (8) التلفيف الزاوي (9) التلم تحت الجداري (10) الفص الجداري السفلي (11) الفص الجداري العلوي (12) الفص القذالي (13) التلم الجداري القذالي (14) التلم الحزامي (15) التلم داخل الجداري (16) التلفيف خلف المركزي (17) التلم خلف المركزي (18) التلم المركزي (19) التلفيف أمام المركزي (20) التلم أمام المركزي (21) التلم الجبهي السفلي (22) التلم الجبهي العلوي (23) الشق المخي الطولاني.



brain


صورة للمسطح السفلي للدماغ تبين بعض أقسامه والأعصاب القحفية: (1) القطب الجبهي (2) القمع (3) الأتلام الحجاجية (4) التلافيف الحجاجية (5) الغدة النخامية (6) القطب الصدغي (7) المادة المثقبة الأمامية (8) العصب المحرك للعين (9) معقف التلافيف جنب الحصين (10) الجسم الحلمي (11) التلافيف القذالي الصدغي الوحشي (12) التلم الصدغي السفلي (13) التلافيف جنب الحصين (14) السويقة المخية (15) العصب الثلاثي التوائم (16) العصب الوسطاني (17) العصب الوجهي (18) العصب الدهليزي القوقعي (19) النذفة المخيخية (20) المخيخ (21) الضفيرة المشيمية للبطين الرابع (22) العصب اللساني البلعومي (23) العصب المبهم (24) العصب اللساني (25) العصب الإضافي (26) جزيرات العصب الرقبي الأول (27) التصلب الهرمي (28) دودة المخيخ (29) الحبل الشوكي (30) القطب القذالي (31) لوزة المخيخ (32) الشق المتوسط للبصلة (33) هرم البصلة (34) الزيتونة (35) المخيخ (36) العصب المبعد (37) الجسر (38) العصب البكري (39) العقدة الثلاثية التوائم (40) العصب الفكي السفلي (41) الجذر الحركي للعصب الثلاثي التوائم (42) الحفرة بين السويقتين (43) العصب العيني (44) العصب الفكي العلوي (45) الحدة الرمادية (46) السطور المشيمية الوحشية (47) العصب البصري (48) التصلب البصري (49) السبيل الشمي (50) البصلة الشمية (51) التلم الشمي (52) الشق المخي الطولاني.



brain


مقطع ناصفي للدماغ يبين بعض أقسامه: (1) المهاد (2) الحصين (3) الجسم الحلمي (4) اللوزة (5) الدماغ الأمامي القاعدي (6) القشرة الجبهية.






brain

مقطع سهمي متوسط عبر الدماغ: (1) التلم الحزامي (2) التلم النخاعي (3) مؤخر الجسم النخاعي (4) أمام الإسفين (5) التلم تحت الجداري (6) التلم الجداري القذالي (7) السقف (الصفحة الرباعية التوائم) (8) الإسفين (9) التلم المهادي (10) القطب القذالي (11) التلفيف القذالي الصدغي الإنسي (12) المخيخ (13) شجرة الحياة في المخيخ (14) لب الدودة (15) الشراع البصلي الأمامي (16) المزلاج (17) التلفيف القذالي الصدغي الإنسي (18) الحبل الشوكي (19) النسيجة المشيمية للبطين الرابع (20) البصلة (النخاع المستطيل) (21) البطين الرابع (22) المسال المخي (23) الجسر (24) المادة المثقبة الخلفية (25) العصب المحرك للعين (26) الجسم الحلمي (27) الفص الخلفي للغدة النخامية (28) الغدة النخامية (29) الفص الأمامي للغدة النخامية (30) القمع (31) التصالب البصري (32) العصب البصري (33) الرقب البصري للبطين الثالث (34) الصفحة الانتهازية (35) تلم الوطاء (36) القطب الجبهي (37) التلفيف جنب النهائي (38) الباحة تحت النخاعي (39) منقار الجسم النخاعي (40) ركبة الجسم النخاعي (41) التلفيف الجبهي العلوي (42) الصوار الأمامي (43) عمود القبو (44) الثقبة بين البطينين (45) التلم الحزامي (46) الحاجز الشفاف (47) جسم القبو (48) جذع الجسم النخاعي (49) المهاد (50) الالتصاق بين المهادين (51) التلفيف الحزامي (52) النسيجة المشيمية للبطين الثالث (53) الصوار الخلفي (54) الرقب الصنوبري (55) الغدة الصنوبرية (56) التلم المركزي (57) الفصيص جنب المركزي.



brain


مقطع أفقي عبر المخ عند مستوى العقد القاعدية والمحفظة الداخلية مبيّناً بعض أقسامه وأقسام الدماغ (1) جوف الحاجز الشفاف (2) الجسم الثفني (3) الحاجز الشفاف (4) العائق (5) المحفظة الخارجية (6) تلافيف الجزيرة (7) النواة العدسية (8) عمود القبو (9) الثقب بين البطينين (10) نواة الجسم الركبي الوحشي (11) نويات المهاد (12) البطين الثالث (13) الأكمة العلوية (14) الورقات المخيخية (15) جسم المخيخ (16) الشريان المخيخي العلوي (17) قدم الحصين (18) القرن الخلفي للبطين الجانبي (19) الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي (20) ذنب النواة المذنبة (21) الصفيحة اللبية الإنسية (22) الصفيحة اللبية الوحشية (23) الكرة الشاحبة (24) العائق (25) البطانة (الجزء الوحشي من النواة العدسية) (26) الطرف الخلفي للمحفظة الداخلية (27) ركبة المحفظة الداخلية (28) الطرف الأمامي للمحفظة الداخلية (29) البطين الثالث (30) رأس النواة المذنبة (31) القرن الأمامي للبطين الجانبي (32) الشق المخي الطولاني.



brain


مقطع جبهي عبر الدماغ الانتهاء بمستوى الصوار الأمامي: (1) القرن الأمامي للبطين الجانبي (2) رأس النواة المذنبة (3) الفص الجبهي (4) المحفظة الداخلية (5) النواة العدسية (6) التلم الجانبي (7) التلم جنبي النهائي (8) اللوزة (9) البطين الثالث (10) القمع (11) التصلب البصري (12) عمود القيو (13) السبيل البصري (14) الكرة الشاحبة (15) الفص الصدغي (16) المحفظة الخارجية (17) الجزيرة (18) العائق (19) المحفظة القصوى (20) القشرة (21) الصوار الأمامي (22) الحاجز الشفاف (23) الجسم النخفي (24) التليف الحزامي (25) الشق المعخي الطولاني.





brain

مقطع في المستوى الجبهي للدماغ يبين بعض أقسامه الرئيسية ونوى الوطاء المختلفة: (1) الجسم الثفني (2) النواة المنزلة (3) البطين الجانبي (4) الحاجز الشفاف (5) جسم القبو (6) المهاد (7) السبيل الحلمي المهادي إلى النواة الأمامية (8) البطين الثالث (9) المحفظة الداخلية (10) قشرة العدسية (11) الكرة الشاحبة (12) الباحة الوطائية الظهرية (13) النواة جنيب البطين (14) عمود القبو (15) العروة العدسية (16) النواة حول البطين (17) الباحة الوطائية الوحشية (18) الباحة الوطائية الأمامية (19) النواة فوق البصرية (20) السبيل البصري (21) النواة المقوسة حول البطين (22) القمع (23) سويقة النخاعي.



#### brain

مقطع سهمي متوسط عبر جذع الدماغ: (1) جسم القبو (2) تلم الوطاء (3) الثقبه بين البطينين (4) الحاجز الشفاف (5) عمود القبو (6) الجسم الخلمي والحلبة الرمادية (7) الصفيحة الانتهازية (8) منقار الجسم الثفني (9) ركبة الجسم الثفني (10) التلفيف جانبي النهائي (11) الصوار الأمامي (12) الباحة تحت الثفني (13) الصفيحة الانتهازية (14) الرذب البصري (15) الرذب القمعي (16) التصالب البصري (17) القمع (18) الفص الأمامي للغدة النخامية (19) الفص الخلفي للغدة النخامية (20) العصب المحرك للعين (القحفي الثالث) (21) الحفرة بين السويقتين (22) الجسر (23) تصالب السويقتين المخيخيتين العلوية والسفلية (24) الحزم الطولانية للجسر (25) الحزمة الطولانية الإنسية (26) الحفرة المعينية (27) البطين الرابع (28) القناة المركزية (29) الحبل الشوكي (30) الضفيرة المشيمية للبطين الرابع (31) العقيدة (32) لهاء الدودة (33) المركز اللبي للدودة (34) نصف الكرة المخيخية (35) أعلى نقطة في البطين الرابع (36) ورقة الدودة (37) البطين الرابع (38) لسين المخيخ (39) الفصيص المركزي (40) الشراع البصلي العلوي (41) السويقة المخيخية (42) القنة (43) الصفيحة الرباعية التوائم (44) المسال المخيخي (45) مؤخر الجسم الثفني (46) الغدة الصنوبرية (47) رذب الصنوبرية (48) رذب فوق الصنوبرية (49) مثلث العنان (50) الصوار الخلفي (51) البطين الثالث (52) الضفيرة المشيمية للبطين الثالث (53) المهاد (54) الالتصاق بين المهادين (55) جذع الجسم الثفني.

**brontophobia (= astraphobia)** رَهَابُ الرَّعْدِ. رهَابُ الرعد والبرق.

**bruxism** صَرِيْفُ الْأَسْنَانِ. عادة صك الأسنان النظمي والتشنجي اللاإرادي واللاوظيفي وغالباً ما يحدث أثناء النوم وهو علامة اضطرابات نفسية.

**bruxomania** هَوَسُ الصَّرِيْفِ. هوس صك الأسنان وصريرها خلال النهار ومن دون وعي المصاب.

**bud, gustatory (= taste bud)** بُرْعَمٌ ذَوْقِيٌّ.

**bud, taste** بُرْعَمٌ ذَوْقِيٌّ. عضو ذوقي انتهائي صغير يحوي مستقبلات ذوقية، يوجد على سطح اللسان وفي الشدق.

**bulb** بَصْلَةٌ. (ج: بصلات). كتلة كروية الشكل؛ استعمل اللفظ سابقاً للدلالة على النخاع المستطيل.

**- auditory b.** البَصْلَةُ السَّمْعِيَّةُ. الدهليز الغشائي.

**- end b.** بَصْلَةُ إِنْتِهَائِيَّةٍ. 1. جسم كروي أو بيضوي في نهاية الليف العصبي يوجد عادة في الجلد والأغشية المخاطية والعضلات والمفاصل والنسيج الضام والأحشاء. 2. قدم انتهائي.

**- olfactory b.** البَصْلَةُ الشَّمْعِيَّةُ. انظر bulbous olfactorius.

**- taste b.** بُرْعَمٌ ذَوْقِيٌّ. انظر bud, taste.

**- terminal b. (= end b.)** بَصْلَةُ إِنْتِهَائِيَّةٍ.

**bulbopontine** بَصْلِيٌّ جِسْرِيٌّ. اصطلاح يدل على الجسر ومنطقة النخاع المستطيل (البصلة) التي تقع فوقه.

**bulbus** بَصْلَةٌ. 1. جسم كروي أو بيضوي. 2. النخاع المستطيل.

**- b. cornus occipitalis ventriculi lateralis** بَصْلَةُ الْقَرْنِ الْقَذَالِيِّ لِلْبَطْنَيْنِ الْجَانِبِيَّ. بارزة في القسم العلوي من الجدار الإنسي للقرن القذالي للبطين الجانبي فوق مهماز الطير وتولدها الألياف الطرفية للملقط الجبهي عند مرورها نحو الفص القذالي.

**- b. oculi** مُقَلَّةُ الْعَيْنِ. كرة العين، أو بصلة العين.

**- b. olfactorius** البَصْلَةُ الشَّمْعِيَّةُ. الامتداد البصلي

الشكل للسبيل الشمي على السطح السفلي للفص الجبهي في كل من نصفي كرة المخ والذي يدخل فيه العصب الشمي.

**bundle** حُرْمَةٌ. (ج: حزم). مجموعة من الألياف العضلية أو العصبية المرصوفة مع بعضها على شكل حزمة.

**- aberrant b.** حُرْمَةٌ زَائِغَةٌ. مجموعة من الألياف الهرمية التي تترك السبيل القشري النووي في مستويات متتابعة من جذع الدماغ لتوصل اليافها إلى نوى الاعصاب القحفية.

**- cornucommissural b.** الحُرْمَةُ الْقَرْيَّةُ الصَّوَارِيَّةُ. الحزمة المخصوصة التي تمر على سطح العمود الخلفي وصوار النخاع الشوكي.

**- fundamental b's of spinal cord (= fasciculi proprii medullae spinalis)** الحُرْمُ الْمَخْصُوصَةُ لِلنَّخَاعِ الشَّوْكِيِّ.

**- medial forebrain b.** الحُرْمَةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلدِّمَاغِ الْأَمَامِيِّ. مجموعة من الألياف التي تبدأ من المناطق الشمية القاعدية ومن المنطقة حول اللوزية ومن النوى الحاجزية وتمر إلى اللحاء الوحشي، وتستمر بعض الألياف إلى سقيفة الدماغ المتوسط وتترحل في النوى المستقلة الحشوية في جذع الدماغ.

**- Monakow's b. (= tractus rubrospinalis)** حُرْمَةُ مُونَاكُوفِ.

**- olivocochlear b. of Rasmussen** الحُرْمَةُ الرِّيْتُونِيَّةُ الْقَوَقَعِيَّةُ لِرَاسْمُوسِنَ. حزمة من الألياف تبدأ من المعقد الزيتوني العلوي وتنتهي عادة في قوقعة الجهة العاكسة.

**- b. of Oort (= olivocochlear b. of Rasmussen)** الحُرْمَةُ الرِّيْتُونِيَّةُ الْقَوَقَعِيَّةُ لِرَاسْمُوسِنَ.

**- solitary b. (= tractus solitarius medullae oblongatae)** الحُرْمَةُ الْوَحِيدَةُ لِلْبَصْلَةِ. انظر tract.

**- thalamomamillary b.** الحُرْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ. انظر fasciculus mamillothalamicus.

**- b. of Vicq d'Azyr (= fasciculus mamillothalamicus)** الحُرْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ.

- Weissmann's b. حُرْمَةُ فَايسْمَان. حزمة  
الالياف العضلية المخططة التي توجد في المغزل  
العصبي العضلي.

butabarbital sodium

بُوتَابَرْبِيتَال

الصُّوْدِيُوم. دواء يستعمل عن طريق الفم كمرَكَن  
ومنوم.

button's, terminal أَرْزَارُ اِنْتِهَائِيَّة:

الأَقْدَامُ اِلْنْتِهَائِيَّة. أنظر end feet.

# C

**cacesthenic** مُغْتَلِّ الحَوَاسِّ. شخص ذو أعضاء حسية ضعيفة.

**cacesthesia** إختِلَالُ الحِسِّ. اضطراب أو اختلال أو شذوذ إحدى الحواس.

**cachexia** دَنَفٌ. نُحول وهزال عامواختلال بنيوي يترافق عادة مع الأمراض المزمنة أو سوء التغذية أو نقصها.

**- neurogenic c.** دَنَفٌ عَصَبِيّ المنشأ. دنف ينتج عن مرض عصبي أو عقلي مزمن.

**- psychogenic c. (= neurogenic c.)** دَنَفٌ نفسيّ؛ دَنَفٌ عَصَبِيّ.

**cacodemonomania** هَوَسُ الشَّيَاطِين. هوس الشخص بوجود روح شريرة تتملكه.

**cacogeusia** فَسَادُ التَذَوُّقِ. الحس بذوق رديء في الفم من دون تذوق مادة رديئة.

**cacosmia** فَسَادُ الشَّمِّ. الحس برائحة خبيثة من دون التعرض لأية رائحة.

**calcar** مِهْمَاز. المهماز أو بنية شبيهة به.

**- c. avis** مِهْمَازُ الطَّيْرِ. نتوء على الجدار الإنسي للقرن القذالي للبطين الجانبي أسفل بصلة القرن القذالي ويتولد من امتداد التلم المهمازي.

**calcarine** مِهْمَازِيّ. منسوب للمهماز، أو مهمازي الشكل.

**caliculus** كُوَيْسَة. (ج: كُوَيْسَات). بنية كاسية الشكل.

**- c. gustatorius** كُوَيْسَة ذَوْقِيَّة. العضو الانتهائي لعصب الذوق الكاسي الشكل والذي يحيط بقاعدة الحليمة الذوقية المحوطة اللسانية.

**callosal** ثَقَنِيّ. متعلق بالجسم الثقني.

**callosum (= corpus callosum)** الجِسْمُ الثَقَنِيّ، الثَقَنِيّ.

**calmative** مُرَكِّن؛ مُهْدِئ. دواء أو عامل يخفف الهياج.

**calvaria (= calvarium)** القُبَّة. القسم العلوي من القحف الشبيه بالقبة والمكون من الأقسام العلوية للعظام القذالية والجبهية والجدارية.

**canal** 1. قَنَاة 2. نَفَق. 1. ممر أنبوبي ضيق أو مجرى للسوائل 2. ممر للأوعية والأعصاب.

**- arachnoid c.** قَنَاة العَنَكَبُوتِيَّة. صهريج الوريد المخي الكبير.

**- auditory c., external (= meatus, external acoustic)** الصِّمَاحُ السَّمْعِيّ الظَّاهِر.

**- cerebrospinal c.** القَنَاة الدُّمَاغِيَّة النُّخَاعِيَّة. التجويف البدائي للدماغ والنخاع في الجنين.

**- cochlear c.** القَنَاة القَوَاقِيَّة. القناة الحلزونية داخل القوقعة.

**- craniopharyngeal c.** القَنَاة القَحْفِيَّة البُلْعُومِيَّة. قناة توجد أحياناً وتمر خلال العظم الوددي وتفتح في السرج التركي.

**- neural c. (= canalis vertebralis)** القَنَاة العَصَبِيَّة؛ النَفَقُ القَافِرِيّ.

**- optic c. (= canalis opticus)** النَفَقُ البَصَرِيّ.

**- semicircular c's.** الأَقْنِيَّة الهَالِيَّة. الأقنية التيهية الثلاث الامامية والأفقية (الجانبية) والخلفية.



النَّفَقُ  
- spinal c. (= canalis vertebralis) الفقري.

قَنْبِيَّةٌ؛ نَفَقٌ. قناة أنبوبية ضيقة  
canaliculus جداً تكون ممراً ضيقاً للسوائل والأعصاب والأوعية.

نَفَقٌ؛ قَنَاة. ممر أو  
canalis (= canal) مجرى أنبوبي ضيق لمرور الأعصاب أو الأوعية أو السوائل.

قَنَاة  
- c. centralis medullae spinalis النُّخَاع المَرْكَزِيَّة. قناة ضيقة تمتد على طول النخاع الشوكي وتطنها البطانة العصبية وتمتد إلى الأعلى حتى النخاع المستطيل حيث تتصل بالبطن الرابع.

انْفَاقٌ خِلَالِ اللُّوْحَتَيْنِ.  
- canales diploici اقنية عظمية في عظام القحف توجد في العظام الإسفنجية بين لوحاتها الظاهرة والباطنة وتوفر ممرات للأوردة بين اللوحتين.

نَفَقٌ الْوُجْهِي. قناة في العظم الصدغي  
- c. facialis للعصب الصدغي تبدأ من الصماخ السمعي الباطن وتمر فوق دهليز الأذن الباطنة ثم تنثني إلى الخلف على الجدار الإنسي للتجويف الطبلي حتى تصل إلى خارج الجزء الصخري من العظم الصدغي عند الثقبة الإبرية الخشائية.

النَّفَقُ الْبَصَرِي. ثقب في العظم  
- c. opticus الوددي في قمة الحاج تكون أنبوباً يمرر العصب البصري والشریان العيني.

القَنَاةُ الْهَلَالِيَّةُ  
- c. semicircularis anterior الأمامية. القناة العظمية الهلالية الأمامية التي تمرر الأنابيب الهلالي الأمامي الغشائي.

القَنَاةُ الْهَلَالِيَّةُ  
- c. semicircularis lateral الجانبية. القناة التي تمرر القناة الهلالية الجانبية الغشائية للتي.

القَنَاةُ الْهَلَالِيَّةُ  
- c. semicircularis posterior الخلفية. القناة التي تمرر القناة الهلالية الخلفية الغشائية للتي.

القَنَاةُ الْهَلَالِيَّةُ  
- c. semicircularis superior (= c. semicircularis anterior) الأمامية.

النَّفَقُ الْفَقْرِي.  
- c. spinalis (= c. vertebralis)

النَّفَقُ الْفَقْرِي. القناة المكونة  
- c. vertebralis

من ثقب الفقرات المتجاورة والتي تأوي النخاع الشوكي والسحايا

رُهابُ السَّرَطَان. الخوف  
cancerophobia من الإصابة بالسرطان.

الحَشِيش. مادة تستحصل من  
cannabis زهور قمة نبات القنب الهندي وهي مادة مهلوسة.

مُوقٌ؛ لِحَاط. إحدى زاويتي  
canthus فتحة العين.

تَشَنُّجُ الحَنْجَرَةِ الصَّرِيرِي.  
cantus galli (= laryngismus stridulus)

مِحْفَظَةٌ. بنية  
capsula (= capsule) تشريحية تحيط وتحفظ بنية أخرى فيها.

المِحْفَظَةُ الْخَارِجِيَّة. الطبقة  
- c. externa الرقيقة من المادة البيضاء التي تفصل القسم الوحشي من النواة العدسية عن العائق.

المِحْفَظَةُ الْقُصْوَى. المادة البيضاء  
- c. extrema التي تفصل العائق عن قشرة الجزيرة.

مِحْفَظَةُ الْعُقْدَةِ. النسيج  
- c. ganglii الضام ذو الصفائح الذي يحيط بالعقدة العصبية والمتصل بالغمد العصبي للأعصاب الجذرية التي تتصل بها.

المِحْفَظَةُ الدَّاخِلِيَّة. كتلة مروحية  
- c. interna الشكل من الألياف البيضاء تفصل النواة العدسية عن رأس النواة العدنية في الجهة الإنسية وعن ظهر المهاد وذنب النواة الذنبية. وهي تتكون من ذراع أمامي وركبة وذراع خلفي يتكون من ثلاثة أقسام مهادي عدسي وتحت العدسي وخلف العدسي.

مِحْفَظَتَا النُّوَاة  
- capsulae nuclei lentiformis القُدْسِيَّة. انظر capsula externa; capsula interna.

مِحْفَظَةٌ.  
capsule (= capsula)

مِحْفَظَتَا الدِّمَاغ. طبقاً المادة  
- c's. of the brain البيضاء المخيتان وهما المحفظتان الداخلية والخارجية.

المِحْفَظَةُ الْخَارِجِيَّة.  
- external c. انظر capsula externa.

المِحْفَظَةُ الدَّاخِلِيَّة.  
- internal c. انظر capsula interna.

غِدْمُ الْمُقَلَّة.  
- ocular c. (= vagina bulbi)

- optic c. المَحْفَظَةُ البَصَرِيَّة. البنية الجينية التي تتطور منها صلبة العين.

- Tenon's c. (= vagina bulbi) غَمْدُ الْمُقْلَةِ.

caput الرَّأْس؛ رَأْس. النهاية العلوية للجسم التي تشتمل على الوجه والجمجمة والدماغ وأعضاء الحس الخاص (العين والأذن واللسان والأنف والتهية والدهليز (جهاز التوازن).

- c. cornus dorsalis medullae spinalis

رَأْسُ الْقَرْنِ الْخَلْفِيِّ لِلنُّخَاع. الجزء البيضوي أو المغزلي من القرن الخلفي أو المادة السنجابية للنخاع الشوكي بين الجزء الضيق من القرن (عنق القرن) وقمته.

- c. nuclei caudati رَأْسُ النُّوَاةِ الْمُذَنَّبَةِ. أكبر جزء من النواة المذنبة والذي يقع في مقدمتها ويبرز إلى القرن الأمامي للبطين الجانبي.

carbachol كربأكول. شادة كولينية الفعل لا تتحلل بأنزيم إستيراز الأسيتيل كولين، وتستعمل كمنبه لبعض العضلات اللاإرادية وخصوصاً للعضلة ومصرة الحديقة ولتخفيض الضغط داخل العين في معالجة الزرق.

carbamazepine كربأمازيبين. دواء مضاد الاختلاج ومسكن ويستعمل في علاج الصرع وألم التهاب العصب ثلاثي التوائم ويؤخذ عن طريق الفم.

carbidopa كربيدوبأ. دواء يستعمل في علاج داء باركنسون مع الليفودوبا لأنه يولد تركيزاً عالياً من الدوبامين في الدماغ باستعمال جرعات صغيرة من الليفودوبا. وبهذا فإنه يقلل من المضاعفات الجانبية لهذا الدواء.

carcinomatophobia (= cancerphobia) رُهابُ السَّرطان.

carcinophobia (= cancerphobia)

رُهابُ السَّرطان.

cardialgia (= cardiodynia) 1. ألمُ الْفُؤَادِ.

2. ألمُ قَلْبِي.

1. ألم في مقدمة الصدر أو أعلى البطن 2. وجع القلب.

cardiodynia وَجَعُ قَلْبِي. وجع في القلب.

carina جُوجُؤ. بنية بارزة حرفية الشكل.

- c. fornicis جُوجُؤُ الْقَبْو. بروز على السطح السفلي للقبو.

carniophobia (= carnophobia) رُهابُ أَكْلِ اللَّحْم. الخوف من أكل اللحوم.

carotidynia (= carotodynia) إِيْلَامُ السُّبَاتِي. إيلام على طول مسار الشريان السباتي وهي نوبات عادة ما تحدث على جهة واحدة من الرقبة.

carpopedal spasm تَشَنُّجُ رُسْغَيْ قَدَمِي. تشنج الرسغ والقدم.

CAT (= computerized axial tomography) تَصْوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ مَخَوْرِيٌّ مُحَوَّسَب. أنظر tomography.

catabolism تَقْوِيض. عملية استقلابية استهلاكية يحول فيها الكائن المواد إلى مركبات إفراغية.

cataplexy الجُفْة. حالة صمل عضلي واحتفاظ المريض بالوضعية التي يوضع بها. وهي حالة تشاهد في الفصام الجامودي الشديد.

catapleptiform جُفْدِي الشَّكْلِ. حالة شبيهة بالجُفْة.

catalogia ثُرُثْرَة: تَكَرَّارِيَّةُ اللَّفْظ. أنظر verbigeration.

cataphasia ثُرُثْرَة: تَكَرَّارِيَّةُ اللَّفْظ. أنظر verbigeration.

cataphora وَسَنٌ مُتَقَطِّع. وسن مستمر يتقطع بفترات يقظة بسيطة غير تامة.

cataphoria إحْوال سفلي. الهبوط السفلي لمحوري إبصار العينين الدائم بعد توقف المنبهات الدامجة لهما.

cataphrenia (= pseudodementia) وَهَنٌ عَقْلِي. نوع من الخرف ينتهي عادة بالشفاء.

cataplectic جُفْدِي. 1. منسوب للجُفْة أو مصاب بها أو شبيه بها 2. حالة تبدأ بصورة مفاجئة وشديدة.

cataplexis (= cataplexy) الجُفْة. حالة تتصف بنوبة مفاجئة من الوهن العضلي ونقص

التوتر وقد تبدأها بعض المنبهات العاطفية كالخوف والرغبة أو الحزن الشديد أو الغضب أو الدهشة.

**catathymia** طَغْيَانُ الْعَوَامِلِ النَّفْسِيَّةِ. حالة وجود عوامل نفسية مكبوتة في اللاوعي ولكنها شديدة لدرجة أنها تطفئ أحياناً وتؤثر على الوعي.

**catatonia (= schizophrenia, catatonic)** جَامُود. نوع من الفصام الذي يتصف بتغيرات في التوتر العضلي والاستجابات الحركية مع الذهول والوضعية الثابتة الشاذة والعمل أو الهياج.

**catecholamine** كَاتِيكُولَامِين. مركّب له فعل محاكي الودي ويشابه المركبات الأخرى من مجموعته (الدوبامين والنورابينيفرين والابنيفرين).

**catecholaminergic** كَاتِيكُولَامِينِي الْفِعْل. ينشّط بالكاتيكولامين أو يفرزه.

**catelectrotonus** تَوَثُّرٌ مَهْبِطِي. زيادة هيوجية الليف العضلي أو العصبي بالقرب من المهبط عند مرور التيار الكهربائي بسبب هبوط التوتر الكهربائي في المنطقة.

1. ضَغْفٌ **cathaeresis (= catheresis)** دَوَائِي الْمُنْشَأ 2. فِعْلٌ مُغْتَدِل. 1. وهن عام ينتج عن العلاج بأحد الأدوية 2. فعل معتدل.

**catharsis** إِفْرَاقُ الْمَكْبُوتِ. في الطب النفسي هو إطلاق الأفكار والآراء المكبوتة في الوعي الباطن مصحوباً بانفعال عاطفي وتفرّج نفسي.

**cathexis** تَرْكِيزُ الطَّاقَةِ النَّفْسِيَّةِ. تركيز القوى النفسية بصورة واعية أو غير واعية على شخص أو موضوع أو فكرة معينة بالذات.

**cathisophobia** تَعَذُّرُ الْجُلُوسِ؛ قَمَاصٌ؛ الْأَقْعُودِيَّة. انظر akathisia.

**cathodal closure contraction** تَقْلُصُ الْغَلْقِ الْمَهْبِطِي. انظر contraction.

**cathodal opening contraction** تَقْلُصُ الْفَتْحِ الْمَهْبِطِي. انظر contraction.

**cathode** مَهْبِط. القطب السالب في الدائرة الكهربائية أو في البطارية الكهربائية.

**- c. ray oscilloscope** مَنَظَرُ الذَّبْذَبَات

بِالْأَشْعَةِ الْمَهْبِطِيَّة. انظر oscilloscope.

**cauda** ذَنْبٌ. بنية ذنبية الشكل أو ذنب العضو أو البنية.

**- c. corporis striati** ذَنْبُ الْجِسْمِ الْمُخَطَّطِ؛ ذَنْبُ النُّوَاةِ الْمُذَنْبَةِ. انظر cauda nuclei caudati.

**- c. equina** ذَنْبُ الْفَرَس. مجموعة الجذور الشوكية التي تنزل من القسم السفلي من النخاع الشوكي والتي تحتل القناة الفقرية تحت مستوى النخاع والتي تشبه في شكلها ذنب الفرس.

**- c. nuclei caudati** ذَنْبُ النُّوَاةِ الْمُذَنْبَةِ. جزء النواة المذنبية الذي يستدق من جسمها وينحني حول جذر القرن السفلي للبطين الجانبي ويمتد رأسياً كالنواة اللوزية.

**caudatolenticular** مُذَنْبِي عَدَسِي. منسوب إلى النواتين المذنبية والعنسية للجسم المخطط.

**caudex cerebri** سَوِيقَةُ الْمَخ. ذنبيات المخ.

**caumesthesia** فَرْطُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. حس حراري محرق عند التعرض لحرارة غير عالية أو واطئة نسبياً.

**causalgia** حَرَاقي. ألم محرق يترافق غالباً مع تغيرات نمائية في الجلد يتسبب عن إصابة العصب المحيطي المغذي للمنطقة.

**cavitas (= cavum)** جَوْف. (ج: أَجْوَاف). حيز أو نقرة مجوفة.


**- c. cranias** جَوْفُ الْقَحْف. الجوف المحاط بعظام الجمجمة.

**- c. epiduralis** الْحَيْزُ حَوْلَ الْجَافِيَّة. الحيز بين الجافية وجدار القناة الفقرية يحوي الصفائح الوريدية.


**- c. septi pellucidi** جَوْفُ الْحَاجِزِ الشَّفَافِ. الفلح الناصف بين صفيحتي الحاجز الشفاف في المخ.

**- c. subarachnoidealis** الْحَيْزُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة. الحيز الذي يفصل العنكبوتية عن الأم الحنون والذي يحوي السائل الدماغي النخاعي وتمر عبره الترابيق التي توصل بين جدرانه.

**- c. tympanica** الْجَوْفُ الطِّبْلِي. القسم الرئيسي من الأذن الوسطى المكون من جوف ضيق في العظم الصدغي وممتلئ بالهواء ويحوي العظيمات



ب



1

cauda equina

بعض أورام النخاع الشوكي وذنب الفرس.

(أ) ورم ذنب الفرس

(ب) ورم وعائي في النخاع الشوكي.

السمعية ويتصل بالخلايا الخشائية الهوائية وبغار  
الخشاء وبالبلعوم الأنفي عن طريق القناة السمعية.

**cavitation**

تَكَهْفُ؛ تَجْوِيف. تكون  
التجاويف مثلاً في النخاع الشوكي في داء تكهف  
النخاع.

**cavity (= cavitas)**

جَوْف.

**- cranial c. (= cavitas cranias)**

جَوْفُ الرَّحْف.

**- epidural c. (= cavitas epiduralis)** الْحَيْرُ  
حَوْلَ الْجَافِيَّةِ.

**- mastoid c. (= antrum mastoideum)** غَارُ  
الْخُشَاءِ. حيز هوائي في الجزء الخشائي من العظم  
الصدغي يتصل بالجوف الطبلي والخلايا الخشائية.

**- subarachnoid c. (= c. subar-  
achnoidealis)** الْحَيْرُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ.

- subdural c. (= spatium subdurale) الْخَيْرُ  
تَحْتَ الْجَافِيَّةِ.

- tympanic c. (= c. tympanicum) الْجَوْفُ  
الطَّبْلِيُّ.

خَلِيَّةٌ. (ج: خلايا). كتلة جبلية تحوي  
نواة وتحيط بها جبلية تحوي عضيات مختلفة  
ويغلفها غشاء خلوي. وهي وحدة بنائية للأنسجة  
كما أنها تكون وحدة وظيفية في الأجسام الحية.

- acoustic hair c. خَلِيَّةٌ سَمْعِيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ. خلايا  
مهدبة في القوقعة تعمل كمستقبلات حسية في عضو  
كورتى.

- amacrine c. خَلِيَّةٌ لا مِحْوَارِيَّةٌ. نوع من  
عصبونات شبكية العين لا تحوي محواراً ولكن لها  
فروع تشبه التغضنات.

- apolar c. خَلِيَّةٌ لا قطبية؛ عصبون لا محواري.  
عصبون لا يحوي محواراً أو أقطاباً.

- arkyochrome c. عَصْبُونٌ شَبْكِي الصَّبْغَاتِ.  
عصبون توجد فيه حبيبات نيسل مرتبة بشكل شبكي.

- basket c. خَلِيَّةٌ ذَاتُ سَلَّةٍ. خلية قشرة المخ  
ذات محوار ويكون لها فرشاة من الخيوطات التي تكون  
شبكة سلوية الشكل تتوضع فيها خلية بركنجي.

- Betz's c's. خَلَايَا بَتَزْ. خلايا هرمية عقدية  
كبيرة توجد في الطبقة الهرمية الداخلية لقشرة المخ.

- bipolar c. خَلِيَّةٌ بِقُطْبِيْنِ؛ عَصْبُونٌ بِقُطْبِيْنِ.  
عصبون ذو فرعين.

- Cajal c. خَلِيَّةٌ كَاهَالٍ. خلية دبقية نجمية مرتبة  
بشكل أفقي في الطبقة الجزيئية لقشرة المخ.

- caudate c's. خَلَايَا مُذَنَّبَةٍ. خلايا دبقية عصبية  
في المادة السنجابية ذات استطالات متعددة تشبه  
أذناب المذنب.

- cometal c's. (= caudate c's.) خَلَايَا مُذَنَّبَةٍ.

- commissural c's. (= heteromeral c's.)  
خَلَايَا صَوَارِيَّةٌ. خلايا عصبية في المادة السنجابية  
للنخاع الشوكي تعبر فروع محاورها إلى المادة  
البيضاء للجهة المعاكسة.

- compound granule c. دَبِقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ.  
انظر microglia.

- cone c. (= cone, retinal) مَخْرُوطُ الشَّبَكِيَّةِ.

- c's. of Corti خَلَايَا كُورْتِي. خلايا عضو كورتى  
في الأذن الداخلية.

- ependymal c's. خَلَايَا الْبُطَانَةِ الْعَصَبِيَّةِ.  
خلايا البطانة التي تبطن تجاويف الجهاز العصبي.

- ganglion c. خَلِيَّةٌ عُقْدِيَّةٌ. 1. نوع من الخلايا  
العصبية الكبيرة التي توجد في العقد العصبية 2. الخلية  
الثالثة في سلسلة طبقات خلايا الشبكية وهناك أنواع  
عديدة منها حسب نمط تغضناتها لأنسجة الجهاز  
العصبي المركزي (الدبق العصبي) وهناك ثلاثة أنواع  
من هذه الخلايا اللاعصبية، الخلايا النجمية (الدبقية  
الكبرى)، والخلايا القليلة التغصن والدبقيات الصغيرة.

- giant pyramidal c's. (= Betz's c's.) خَلَايَا  
بَتَزْ.

- glial c. (= neuroglial c.) خَلِيَّةٌ دَبِقِيَّةٌ.

- gitter c. (= microglia c.) دَبِقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ.

- gustatory c's (= taste c's.) خَلَايَا ذُوقِيَّةٌ.

- hais c's. خَلَايَا شَعْرِيَّةٌ. خلايا ظهارية عصبية  
ذات نتوءات شعرية الشكل توجد في عضو كورتى  
وفي العرف الانبولي والقريبة والكبيسة في الأذن  
الداخلية وتستلم أليافاً عصبية صادرة وواردة من  
العصبين القوقعي والدهلزي.

- hecatomeral c's. خَلَايَا مُرْدَوِجَةِ التَّفْرُغِ.

خلايا عصبية في المادة السنجابية للنخاع تنقسم  
محاورها إلى فرعين يذهب أحدهما إلى المادة البيضاء  
بنفس الجهة ويذهب الثاني إلى المادة البيضاء للجهة  
المعاكسة.

- heteromeral c's. (= commissural c's.)  
خَلَايَا صَوَارِيَّةٌ؛ خلايا أحادية التوصيل.

- horizontal c. خَلِيَّةٌ أَفْقِيَّةٌ. أحد أنواع عصبونات  
الشبكية تمر فروعها بشكل أفقي وهناك نوعان منها.

- horn c's. خَلَايَا قَرْنِيَّةٌ. خلايا قرون النخاع  
الشوكي.

- Hortega c. (= microglial c.) دَبِقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ.

- mitral c's. الْخَلَايَا التَّاجِيَّةُ. الخلايا الهرمية التي  
تكون إحدى طبقات البصلة الشمية.

- mossy c. (= protoplasmic astrocyte) خَلِيَّةٌ  
اشْنِيَّةٌ. خلية نجمية جبلية.

- **motor c.** خَلِيَّةٌ حَرَكِيَّةٌ. العصبون الصادر خصوصاً. من النخاع الشوكي الذي يستمر محواره في سيره لينضم إلى عصب حركي.
- **myoepithelial c's** خَلَايا عَضَلِيَّةٌ ظَهَارِيَّةٌ. خلايا عضلية ملساء محورة وقلوصة ويعتقد أنها من أصل أدبمي ظاهر وتوجد حول المجموعات الإفرازية لبعض الغدد كالغدد العرقية والدمعية والحلمية ويؤدي تقلصها إلى طرح محتويات هذه الغدد.
- **nerve c. (= neuron)** عَصْبُون.
- **neuroepithelial c's. (= neuroglia c's.)** خَلَايا ظَهَارِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.
- **neuroglia c's., neuroglial c's.** خَلَايا دَبَقِيَّةٌ. خلايا سائدة لانسجة الجهاز العصبي المركزي.
- **olfactory c's.** الخَلَايا الشَّمِيَّةُ. خلايا مغزلية. منوأة ومتخصصة توجد مفروسة بين الخلايا الظهارية في الغشاء المخاطي للأنف.
- **phalangeal c's.** خَلَايا سَلَامِيَّةٌ. خلايا سائدة. في عضو كورتي تستند قواعدها على الغشاء القاعدي وتحيط وتسد الخلايا الشعرية الداخلية والخارجية.
- **pillar c's.** خَلَايا عِمَادِيَّةٌ. خلايا طولانية في عضو كورتي مرتبة بصفين ويلتقي رأسا الخليتين المتجاورتين بينما تباعد قاعدتيهما عن بعضهما وبذلك يكونان نفقاً بينهما يمتد على طول الغشاء القاعدي وتستند الخلايا الشعرية لعضو كورتي على جانبيهما.
- **pineal c's. (= pinealocyte)** خَلَايا الجِسْمِ الصَّنَوْبُورِيِّ.
- **psychic c's.** الخَلَايا النَّفْسِيَّةُ. خلايا القشرة المخية.
- **Purkinje's c's.** خَلَايا بَرْكِنجِي. عصبونات كبيرة متفرعة في الطبقة المتوسطة من قشرة المخ.
- **pyramidal c.** خَلِيَّةٌ هَرَمِيَّةٌ. خلية عقدية كبيرة هرمية الشكل في القشرة المخية تكوّن مع فروعها العصبون الهرمي.
- **Renshaw c's.** خَلَايا رَنْشَاو. عصبونات بينية في المنطقة البطنية الإنسية للقرن الامامي للنخاع الشوكي تكون اتصالاً تثبيطياً مع العصبون الحركي.
- **rod c's.** خَلَايا عَصَوِيَّةٌ. عصيات الشبكية.
- **root c's.** خَلَايا جَذَرِيَّةٌ. عصبونات تولد محاورها جذور الاعصاب.
- **satellite c's.** خَلَايا تَابِعَةٌ؛ خلايا ساتلة. خلايا الغمد العصبي الذي يغلف العقد العصبية.
- **Schwann's c.** خَلِيَّةٌ شَفَّان. خلية كبيرة منوأة يغلف غشاؤها محوار الليف العصبي المحيطي المغمد ويلتف حوله بشكل لولبي، وهو مصدر النخاعين ويولد الغمد النخاعي بين عقد رانفير.
- **sensory c.** خَلِيَّةٌ حِسِّيَّةٌ. عصبون أحد الأعضاء الحسية المحيطية.
- **stellate c.** خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ. خلية تكون مع فروعها شكلاً نجمياً كالخلايا التي توجد في قشرتي المخ والمخيخ.
- **supporting c's.** خَلَايا سَائِدَةٌ. خلايا تسند العصبونات أو المستقبلات الحسية كالخلايا الموجودة في عضو كورتي أو في التيه.
- **sustentacular c's. (= supporting c's.)** خَلَايا سَائِدَةٌ.
- **tactile c. (= corpuscula tactus)** خلية لمسيّة؛ جُسَيْمٌ لَفْسِيّ. انظر corpuscle, Meissner's.
- **taste c's.** خَلَايا ذُوقِيَّةٌ. الخلايا الداخلية للبراعم الذوقية المغطاة بخلايا التغطية.
- **tautomerall c's.** خَلَايا صِنَوِيَّةٌ. خلايا المادة السنجابية للنخاع الشوكي التي ترسل فروعها للاتصال بالمادة البيضاء على نفس الجهة من النخاع.
- **touch c. (= tactile c.)** خَلِيَّةٌ لَمْسِيَّةٌ.
- **cellula** خَلِيَّةٌ. 1. خلية 2. حيز صغير مغلق.
- **cellulae ethmoidalis** الخَلَايا الغُرْبَالِيَّةُ. احياز مليئة بالهواء في العظم الغربالي تتصل بالقمع الغربالي وبالفقاعة الغربالية.
- **cellulae mastoidae** الخَلَايا الخُشَائِيَّةُ. احياز الهوائية للنوء الخشائي للعظم الصدغي.
- **cellulae tympanicae** الخَلَايا الطَبْلِيَّةُ. احياز في الجوف الطبلي بين النتوءات العظمية لقاعدته او جانبه الوداجي.
- **cenesthesia (= somatognosis)** الحِسُّ المُشْتَرَك. الشعور العام الذي يحسه الفرد بذاته وبويعه وبوظائف أعضائه وبجسده.
- **cenesthesiopathy, cenesthopathy** حِسُّ الإِغْتِلَال. شعور الفرد العام بعدم الراحة

والاستقرار مع وهن العزيمة وضعف الإرادة مع عدم الشعور باعتلال قسم معين من جسمه.

**مَرْكَزٌ**. 1. وسط الجسم **center (= centre)**  
2. مجموعة عصبونات متخصصة بالقيام بوظيفة معينة.

**- brain c.** مَرْكَزُ دِمَاعِيٍّ. باحة في قشرة المخ ذات بنية أو وظيفة خاصة.

**- Broca's c. (= speech c.)** مَرْكَزُ الْكَلَامِ.

**- cheirokinesthetic c.** مَرْكَزُ الْكِتَابَةِ. مركز في القسم الخلفي من التلفيف الجبهي الثاني الأيسر يتحكم في حركات أقسام الجسم أثناء الكتابة.

**- ciliospinal c.** الْمَرْكَزُ الْهَذَابِيُّ النَّخَاعِيَّ. مركز في القسم السفلي من النخاع الرقبي وفي قسمه الصدري العلوي يتحكم في توسيع حدقة العين.

**- coordination c.** مَرْكَزُ تَنْسِيقِيٍّ. مركز عصبي يقوم بتنسيق بعض وظائف الجسم.

**- cortical c.** مَرْكَزُ قَشْرِيٍّ. قسم من قشرة المخ متميز وظيفياً عن المناطق المجاورة له ويتحكم بوظيفة جسمية خاصة ويسمى أيضاً باحة أو حقل أو منطقة.

**- dominating c.** مَرْكَزٌ سَادِدٌ. المركز المسيطر على فعاليات مجموعة من المراكز التي تتحكم في وظيفة معينة.

**- eupraxis c.** مَرْكَزُ تَنْسِيقِ حَرَكَاتِيٍّ. أي من مراكز قشرة المخ الذي يسيطر ويتحكم في تنفيذ فعل أو عمل حذق ماهر.

**- heat-regulating c's. (= thermoregulator c's).** مَرَاكِزُ تَنْظِيمِ الْحَرَارَةِ.

**- inhibitory c.** مَرْكَزٌ تَنْظِيطِيٍّ. مركز عصبي يثبط عمل مركز أو مراكز أخرى أو وظائف أو عمليات جسمية.

**- nerve c.** مَرْكَزٌ عَصَبِيٍّ. مجموعة من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تعمل سوية في تنظيم فعالية جسمية معينة.

**- reflex c.** مَرْكَزٌ مُنْعَكِسِيٍّ. أي مركز في الدماغ أو في النخاع يستلم إشارات حسية من أطراف الجسم ويستجيب لها بفعل حركي أو إفرازي. وهناك العديد من هذه المراكز.

**- sensory c.** مَرْكَزٌ حِسِّيٍّ. مركز في الجهاز العصبي المركزي يدرك الإشارات الحسية التي يستلمها من أنحاء الجسم.

**مَرْكَزُ السُّلُوكِ الْجِنْسِيِّ**. **sex-behavior c.**  
النواة البطنية الوحشية للوطاء التي تسيطر على السلوك الجنسي.

**مَرْكَزُ الْكَلَامِ**. **- speech c. (= Broca's c.)**  
مركز في التلفيف السفلي (الأيسر) السائد يتحكم في وظائف الكلام.

**مَرَاكِزُ تَنْظِيمِ الْحَرَارَةِ**. **- thermo-regulatory c's.**  
مراكز في الوطاء تنظم فقدان الحرارة من الجسم أو احتفاظه بها وبذا تبقى درجة حرارته ثابتة.

**مَرْكَزُ فَرْنِيكَةٍ**. المركز المركزي **- Wernicke's c.**  
للكلام.

**الْمَرْكَزُ السَّمْعِيُّ لِلْكَلامِ**. **- word c., auditory**  
مركز التلفيف الصدغي العلوي المستعرض الذي يتحكم في إدراك معاني الكلمات المسموعة.

**الْمَرْكَزُ الْبَصَرِيُّ لِلْكَلامِ**. **- word c., visual**  
مركز في القسم الخلفي من الفص الجداري الأيسر يتحكم في إدراك معاني الكلمات المكتوبة أو المطبوعة.

**(متعلق بِمَرْكَزِ الدِّماغِ)** **centrencephalic**  
متعلق بمركز الدماغ.

**نَائِذٌ**. مبتعد عن المركز. **centrifugal**

**جَائِذٌ**. متجه نحو المركز. **centripetal**

**حَرَكَةٌ** **centrocinesia (= centrokinesia)**  
مركزية التنبيه.

**حَرَكَةٌ** **centrokinesia**  
مركزية التنبيه. حركة تبدأ من تنبيه مركزي.

**رَأْسِيًّا**. متجه نحو الرأس. **cephalad**


**الْمُ الرُّأْسُ؛ صُدَاعٌ**. **cephalalgia (= cephalgia, headache)**  
ألم الرأس؛ صداع. ألم في منطقة الرأس.

**- histamine c. (= cluster headache)**  
صداع هستاميني.

**صُدَاعٌ رُيْعِيٌّ**. ألم في منطقة تكون ربع الرأس. **- quadrant c.**

**وَدَمَةُ الرُّأْسِ**. وذمة في منطقة الرأس. **cephaledema**

**رَأْسِيٌّ**. متعلق أو منسوب للرأس أو للنهاية الرأسية للجسم. **cephalic**



centre, speech

مناطق قشرة المخ التي تسيطر على وظيفة الكلام: (1) باحة الوجه (2) الحزمة المقوسة (3) القشرة البصرية (4) القلم الزاوي (5) باحة فرنكية (6) شق سيلفيس (7) باحة بروكا.

**cephalitis (= encephalitis)** إْتِهَابُ  
الدُّمَاغِ.

**cephalocaudal** رَأْسِيٌّ ذَنْبِيٌّ. منسوب إلى  
محور الجسم ابتداء من الرأس حتى الذنب.

**cephalocele** قَيْلَةٌ رَأْسِيَّةٌ. بروز جزء  
من محتويات القحف للخارج.

**- orbital c.** قَيْلَةٌ رَأْسِيَّةٌ حَاجِجَةٌ. بروز جزء من  
محتويات القحف للخارج خلال عيب في جدار الحاج.

**cephalocentesis** بَزْلُ الرَّأْسِ. البزل  
الجراحي للرأس.

**cephalochord** الْحَبْلُ الظَّهْرِيُّ الرَّأْسِيٌّ.  
جزء الحبل الظهري الجنيني الذي يمتد داخل  
القحف.

**cephalodynia (= cephalalgia,  
headache)** وَجَعُ الرَّأْسِ؛ صُدَاعٌ.



**cephalogram** صُورَةُ الرَّأْسِ المَقَاسِيَّة. صورة شعاعية للرأس تشمل الفك السفلي بمنظر جانبي يصور لقياس أبعاد أقسام الرأس.

**cephalogyric** (خاص) بِتَدْوِيرِ الرَّأْسِ. متعلق بحركة الرأس التدويرية.

**cephalohematocele** (= **cephalohematocele**) قَيْلَةٌ دَمَوِيَّةٌ رَاسِيَّة. ورم دموي تحت سمحاق القحف يتصل بأحد الجيوب الدموية خلال عظام القحف.

**cephalohematoma** (= **cephalohematoma**) وَرْمٌ دَمَوِيٌّ رَاسِيٌّ. نزف تحت سمحاق عظام القحف وعادة ما يتولد نتيجة رضح يصيب القحف.

**cephaloma** (= **medullary cancer**) سَرَطَانَةٌ نُخَاعِيَّةِيَّة. سرطانة لينة نخاعية البنية لقلة احتوائها على السدى.

**cephalomotor** مُحَرِّكٌ لِلرَّأْسِ. محرك الرأس أو منسوب لحركة الرأس.

**cephalonia** ضَخَامَةُ الرَّأْسِ والدِّمَاغ. ضخامة الرأس الشاذة مع فرط تنسج الدماغ التصلبي.

**cephalopathy** إِعْتِلَالُ الرَّأْسِ. أي مرض يصيب الرأس.

**cephaloplegia** شَلْلُ الرَّأْسِ. شلل عضلات الرأس والوجه.

**cephalotome** مِبْضَعُ الرَّأْسِ. آلة لثقب أو قطع رأس الجنين.

**cephalotomy** بَضْعُ الرَّأْسِ. 1. قطع رأس الجنين لتسهيل الولادة 2. تشريح رأس الجنين.

**cephalotropic** إِيْلَفُ الدِّمَاغ. إيلف الأنسجة الدماغية.

**ceptor** مُسْتَقْبِلٌ؛ مُتَقَبِّلٌ. بنية عصبية تستلم المنبهات الخارجية وتوصلها إلى الأعصاب ثم إلى المراكز العصبية.

**- chemical c.** مُتَقَبِّلٌ كِيْمِيَائِيٌّ. متقبل يحول المنبهات المناسبة إلى تفاعلات كيميائية كهربائية في الجسم.

**- contact c.** مُتَقَبِّلٌ تَمَاسِيٌّ. متقبل يستلم المنبهات بالتماس المباشر.

**- distance c.** مُتَقَبِّلٌ بُعَادِيٌّ. عضو حسي يستقبل المنبهات التي تصدر في محيط الجسم من مصادر بعيدة عنه كالضوء والصوت.

**- nerve c.** مُتَقَبِّلٌ عَصْبِيٌّ. متقبل أو مستقبل عصبي.

**cerebellar** مُخَيَخِيٌّ. متعلق أو منسوب للمخيخ.

**cerebellifugal** صَادِرٌ مِنَ الْمُخَيَخِ. مبتعد عن المخيخ.

**cerebellipetal** وَارِدٌ لِلْمُخَيَخِ. متجه نحو المخيخ.

**cerebellitis** إِنْتِهَابُ الْمُخَيَخِ. أي التهاب يصيب المخيخ.

**cerebellofugal** (= **cerebellifugal**) صَادِرٌ مِنَ الْمُخَيَخِ.

**cerebello-olivary** مُخَيَخِيٌّ رَيْتُونِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى الجسم الزيتوني.

**cerebellopontile** مُخَيَخِيٌّ جِسْرِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى الجسر.

**cerebellopontine** (= **cerebello-pontile**) مُخَيَخِيٌّ جِسْرِيٌّ.


**cerebllorubral** مُخَيَخِيٌّ حَفْرَاوِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى النواة الحمراء.

**cerebellorubrospinal** مُخَيَخِيٌّ حَفْرَاوِيٌّ نُخَاعِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى النواة الحمراء ومن ثم إلى النخاع الشوكي.

**cerebellospinal** مُخَيَخِيٌّ نُخَاعِيٌّ. متجه أو ناقل من المخيخ إلى النخاع الشوكي.


**cerebellum** الْمُخَيَخِ. قسم الدماغ التالي الذي يحتل الحفرة الخلفية للقحف خلف جذع الدماغ والذي يقوم بوظيفة تنسيق حركات الجسم، ويتكون من جسم المخيخ الذي يحوي الدودة وهي الشريط الضيق الوسطي والفصين الجانبيين (نصفي كرة المخيخ) وهو مرتبط بجذع الدماغ.

**cerebral** مُخَيٌّ، دِمَاعِيٌّ. متعلق أو منسوب للمخ أو للدماغ.




cerebellum

السبل العصبية الواردة للمخيخ: (1) السويقة المخية (2) السبل من قشرة المخ (3) الجسر (4) النواة الدهليزية (5) العصب والنواة الدهليزيان (6) الزيتونة السفلية اليمنى (7) الزيتونة السفلية اليسرى (8 و 9) السبل النخاعي المخيخي البطني (10) السبل النخاعي المخيخي الظهري (11) الحزمة الإسفينية (12) الحزمة الدقيقة (13) السبل النخاعي المخيخي الظهري (14) الحزمة الإسفينية (15) النواة الإسفينية (16) النواة الدقيقة (17) السبل الزيتوني المخيخي (18) السويقة المخيخية السفلية (الجسم المرسى الشكل) (19) السويقة المخيخية الوسطية (عضد الجسر) (20) العقيدة (21) الشق الابتدائي (22) اللسين (23) السويقة المخيخية العلوية (العضد الملحمي). كما تظهر فيه مناطق تمثيل بعض الأعضاء.



cerebellum

السطح العلوي للمخيخ: (1) الفصيص المركزي (2) القننة (3) الحفرة (4) وريقة الدودة (5) حذبية الدودة (6) الفصيص الهلالي السفلي (7) الفصيص الهلالي العلوي (8) الفصيص البسيط (9) الشق الأول (10) الفصيص المربع الأمامي (11) اللسين.



cerebellum

السطح السفلي للمخيخ: (1) نصف الكرة المخيخية (2) لهأة الدودة (3) الشق الثانوي (4) حذبية الدودة (5) هرم الدودة (6) الفصيص الهلالي العلوي (7) الشق الأفقي (8) الفص الهلالي السفلي (9) الفصيص ذو البطين (10) اللوزة المخيخية (11) الندفة (12) عقيدة الدودة.

<b>cerebration</b>	اِفْتِهَام. الفعاليات الوظيفية للدماغ - التفكير.	<b>cerebroathy</b>	إِعْتِلَالٌ دِمَاعِي. أي مرض يصيب الدماغ.
<b>cerebriform</b>	دِمَاعِي الشَّكْل. ما يشبه شكل الدماغ أو أنسجته.	<b>cerebrophysiology</b>	فِيزْيُولُوجِيَا الدِّمَاغ. علم وظائف الدماغ.
<b>cerebrifugal</b>	صَادِرٌ مِنَ الدِّمَاغ. مبتعد عن المخ أو الدماغ.	<b>cerebropontile</b>	مُخِّي جِسْرِي. متعلق بالمخ والجسر.
<b>cerebripetal</b>	وَارِدٌ لِلدِّمَاغ. متجه نحو المخ أو الدماغ.	<b>cerebrorachidian (= cerebrospinal)</b>	دِمَاعِي نُخَاعِي.
<b>cerebritis</b>	إِلْتِهَابُ الدِّمَاغ. أي التهاب يصيب الدماغ.	<b>cerebrosclerosis</b>	تَصَلُّبٌ دِمَاعِي. داء يؤدي إلى تصلب الدماغ الشديد.
<b>- saturnine c.</b>	إِلْتِهَابُ الدِّمَاغ بِالرِّصَاص. التهاب الدماغ بالتسمم بالرصاص.	<b>cerebrosis</b>	إِعْتِلَالٌ دِمَاعِي. أي مرض يصيب الدماغ.
<b>cerebrocardiac</b>	دِمَاعِي قَلْبِي. متعلق أو منسوب للدماغ والقلب.	<b>cerebrospinal</b>	دِمَاعِي نُخَاعِي. متعلق بالدماغ والنخاع الشوكي.
<b>cerebrocerebellar</b>	مُخِّي مَخِيخِي. متعلق بالمخ والمخيخ.	<b>cerebrospinalant</b>	عِلَاجٌ دِمَاعِي نُخَاعِي. أي دواء يؤثر على الدماغ والنخاع.
<b>cerebroid</b>	دِمَاعَانِي. شبيه الدماغ.	<b>cerebrostomy</b>	فَقْرُ الدِّمَاغ. عملية إجراء فتحة في الدماغ.
<b>cerebrology</b>	عِلْمُ الدِّمَاغ. مجموع المعلومات والدراسات المتعلقة بالدماغ.	<b>cerebrotomy</b>	بَضْعُ الدِّمَاغ. بضع الدماغ جراحياً.
<b>cerebroma</b>	وَرَمُ الدِّمَاغ. أي ورم في الدماغ.	<b>cerebrotonia</b>	نَزْعَةٌ فِكْرِيَّة؛ نَزْعَةٌ دِمَاعِيَّة. حالة نفسية تنصف بحب العزلة وكبت العواطف والتكيف الذاتي.
<b>cerebromacular</b>	دِمَاعِي بُقْعِي. متعلق بالمخ وبقعة الشبكية أو بما يصيبهما.	<b>cerebrovascular</b>	1. وَعَائِي مُخِّي 2. وَعَائِي دِمَاعِي. متعلق بأوعية المخ أو الدماغ.
<b>cerebromalacia</b>	تَلَيُّنُ الدِّمَاغ. تلين أنسجة الدماغ الشاذ.	<b>cerebrum</b>	1. المَخ. 2. الدِّمَاغ. 1. جزء الدماغ الذي يحتل القسم العلوي من جوف القحف والذي يحوي نصف الكرة المخ المتصلتين ببعضهما بواسطة الجسم الثفني. ويكون القسم الأكبر من دماغ الإنسان 2. يستعمل المصطلح أحياناً ليدل على الدماغ المقدم والدماغ المتوسط سوية أو ليعني الدماغ كله.
<b>cerebromedullary (= cerebrospinal)</b>	دِمَاعِي نُخَاعِي.	<b>cervical</b>	رَقَبِي؛ عُنُقِي. متعلق بالرقبة أو بعنق أي عضو كعنق الرحم.
<b>cerebromeningeal</b>	دِمَاعِي سَحَائِي. متعلق بالدماغ والسحايا.	<b>cervicobrachialgia</b>	أَلَمٌ رَقَبِي عَضْدِي. ألم في الرقبة والذراع بسبب انضغاط جذور الأعصاب النخاعية الرقبية.
<b>cerebromeningitis (= meningoencephalitis)</b>	إِلْتِهَابُ السَّحَائِي والدِّمَاغ.		
<b>cerebropathia (= cerebroopathy)</b>	إِعْتِلَالٌ دِمَاعِي.		
<b>- c. psychica toxemica (= Korsakoff's psychosis)</b>	دُهَانُ كُورْسَاكُوف. دُهَانُ كُورْسَاكُوف.		

**cervicodynia** وَجَعُ الرِّقَبَةِ. ألم في منطقة الرقبة.

**cervix of axon** عُقُقُ المَحْوَار. الجزء الضيق من المحوار قبل المنطقة المغطاة بالغمد النخاعيني.

**chain** سِلْسِلَةٌ. ارتباط مجموعة من الأشياء ببعضها بأسلوب خطي بحيث تتصل نهاياتها ببعضها مثل سلاسل العصبونات في قوس المنعكس.

**- sympathetic c. (= truncus sympathicus)** سِلْسِلَةُ الوُدِّي: الجذعُ الوُدِّي.

**chalasia** اِرْتِخَاء. ارتخاء فتحة العضو كارتخاء مصرة الفؤاد الذي يسبب التقيؤ في الولدان.

**chamber** غُرْفَةٌ. حجرة حيز مغلق.

**- anterior c. of eye** الغُرْفَةُ الأَمَامِيَّةُ للعين. جزء الغرفة المائية للعين الكائن بين القرنية والعدسة.

**- aqueous c.** الغُرْفَةُ المَائِيَّةُ. قسم مقلة العين الذي يحوي الخلط المائي.

**- posterior c. of eye** الغُرْفَةُ الخَلْفِيَّةُ للعين. جزء الغرفة المائية للعين الذي تحده القرنية من الامام والعدسة والرباط المعلق من الخلف.

**- vitreous c.** الغُرْفَةُ الرُّجَاجِيَّةُ. حيز مقلة العين الذي يحوي الخلط الزجاجي والذي تحده العدسة والجسم الهدبي من الامام والجدار الخلفي للمقلة من الخلف.

**channel, perineural** القَنَاءَةُ حَوْلَ العَصَب. قناة لمفية تحيط بالجذع العصبي.

**character** خَاصَّة. (ج: خواص).

1. صفة تدل على طبيعة الكائن أو الموضوع.  
2. إحدى الخواص التي تدل على شخصية صاحبها.

**- acquired c.** خَاصَّةٌ مُكْتَسَبَةٌ. خاصة غير وراثية يكتسبها الشخص من محيطه.

**- dominant c. (= dominant trait)** خَاصَّةٌ سَائِدَةٌ: خَلَّةٌ سَائِدَةٌ.

**- inborn c.** خَاصَّةٌ خُلُقِيَّةٌ. خاصة تظهر عند الشخص قبل ولادته وتولد معه.

**- paranoid c.** خَاصَّةٌ زَوْرَانِيَّةٌ. خاصة يتصف

صاحبها بعدم الثقة بالآخرين وفراط الحساسية للانتقاد والروح الاعتدائية.

**- primary sex c's.** الخَوَاصُ الجِنْسِيَّةُ الأَوَّلِيَّةُ. الخواص الجنسية الذكرية والانثوية المتعلقة بالتناسل مباشرة.

**- recessive c. (= recessive trait)** خَاصَّةٌ مُنْتَحِيَّةٌ.

**- secondary sex c's.** الخَوَاصُ الجِنْسِيَّةُ الثَّانَوِيَّةُ. الخواص الجنسية الخاصة بالذكر والانثى والتي تميزهما عن بعضهما وغير متعلقة بالتناسل.

**cheilophagia** قَضْمُ الشَّفَةِ. عادة قضم الشفة اللاشعوري.

**cheiralgia** أَلَمُ اليَد. ألم في اليد.

**- c. paresthetica** أَلَمُ اليَدِ المَذَلِّي. التهاب الفرع السطحي للعصب الكعبري.

**cheirombrachialgia** أَلَمُ اليَدِ والذِرَاع.

متلازمة تتصف بالم وتتمل الذراع واليد والأصابع.

**cheiropinesthesia (= cheiropinesthesia)** اِدْرَاكُ حَرَكَةِ اليَد.

**cheiropinesthesia** تَوْسُّمُ اليَد. الشعور والمقدرة على معرفة جهة اليد المُنْبَهة ومعرفة كونها الجهة اليسرى أو اليمنى.

**cheiropinesthesia** اِدْرَاكُ حَرَكَةِ اليَد.

إدراك الشخص لحركات يديه خصوصاً عند الكتابة.

**cheiropinesthesia (= dactylology)** التَّوَاصُلُ بِحَرَكَاتِ اليَد.

**cheiropinesthesia** أَلَمُ اليَدِ والقَدَم. ألم في اليد والقدم.

**cheiropinesthesia** تَشَنُّجُ اليَد. تشنج عضلات اليد.

**chemanesthesia** نَسَاوَةٌ علاجِيَّة. النساوة العكوسة والمسيطر عليها والتي تحدثها بعض الادوية كالتي تحدث في بعض حالات التخدير.

**chemoreceptor (= chemoreceptor)** مُسْتَقْبِلَةٌ كِيْمِيائِيَّةٌ.

**chemopsychiatry** الطَّبُّ النَفْسِي الكِيْمِيَائِي. معالجة بعض الامراض النفسية أو العاطفية بالادوية الكيميائية.

**chemoreception** اسْتِقْبَالٌ كِيمِيَائِيٌّ. حالة التحسس أو قابلية استقبال المنبهات الكيميائية من المحيط.

**chemoreceptor** مُسْتَقْبِلَةٌ كِيمِيَائِيَّةٌ. متقبل حساس للمنبهات الكيميائية كالمستقبلات الشمية والذوقية أو بعض المستقبلات الخاصة الحساسة للتغيرات الكيميائية في مجرى الدم وخصوصاً نقص الأكسجين فتزيد من سرعة التنفس وضغط الدم، وهي المستقبلات الموجودة في الأجسام السباتية والأبهرية.

**chemothalamectomy** الإِسْتِئْصَالُ الكِيمِيَائِيُّ لِلْمِهاد. تخريب جزء من المهاد بواسطة عامل كيميائي.

**cheromania** هَوَسُ الإِشْرَاح. الطور الهوسي في داء الذهان الهوسي الاكتئابي.

**cherophobia** رُهابُ الإِشْرَاح. الخوف من الانشراح أو من إظهاره.

**chiasm** تَصَالُبَةٌ. تصالب أو تعابر صليبي بشكل X.

التَصَالُبَةُ (= chiasma opticum) - optic c. البَصَرِيَّة.

**chiasma** تَصَالُبَةٌ. تعابر صليبي بشكل X كتعابر بنيتين متشابهتين مثل تعابر العصبين البصريين.

**chill** نَافِضٌ. رعاش أو اهتزاز لإرادي يسببه تقلص العضلات الإرادية مع شعور بالبرد والإصفرار.

نَافِضٌ عَصَبِيٌّ. رعاش بسبب التهيج - nervous c. العصبي غير المصحوب بتغير درجة حرارة الجسم.

**chirobrachialgia** (= cheiro-brachialgia) أَلَمُ اليَدِ والذِرَاع.

**chiropodalgia** (= cheiropodalgia) أَلَمُ اليَدِ والقَدَم.

**chloral hydrate** كلورال هيدرات؛ هيدرات الكلورال. دواء يستعمل كمسكن وكمنوم ويعطى عن طريق الفم.

**chlordiazepoxide** كلورديازيبوكسيد.

دواء مهدئ يستعمل عن طريق الفم لعلاج حالات القلق الحاد والكحولية المزمنة أو عند الامتناع عن الكحول أو المخدر.

**chlorpromazine** كلُورُبرُومَازِين. دواء يستعمل كمضاد للقيء وكمهدئ ويستعمل بطريقة الحقن المستقيمي.

**cholesteatoma** وَرَمٌ كُولِستِيرُولِيٌّ. كتلة كيسية الشكل ذات بطانة صدفية مطبقة مليئة بحطام توتسفي وغالباً ما تحتوي كولستيرول. وتصيب عادة السحايا والجهاز العصبي المركزي وعظام القحف والأذن الوسطى ومنطقة الخشاء.

**cholesterol** كُولِستِيرُول. كحول ستيريودي شبيه الشحم يتبلور على شكل وريقات أو صفيحات ويوجد في شحوم ودهون الحيوانات وفي الدم وفي أنسجة الدماغ والأغمد النخاعية للأعصاب والكبد والكلية والغدة الكظرية كما يوجد في عصيدات الشرايين وحصاة الصفراء وفي الأنسجة السرطانية وهو ضروري لتركيب الهرمونات الستيرويدية يركب عادة في الكبد ولكن بعضه يؤخذ مع الطعام.

**choline acetyl** (= acetylcholine) أَسِيْتِيلُ كُولِين.

**choline acetylase** (= choline acetyltransferase) أَسِيْتِيلَازُ الكُولِين.

**choline acetyltransferase** نَاقِلَةٌ الأَسِيْتِيلُ كُولِين. إنزيم يعمل في تركيب الأسيتيل كولين ويوجد في جسيمات تشابكات الجهاز العصبي المستقل والعضلات المخططة وبعض مناطق الجهاز العصبي المركزي.

**cholinergic** كُولِينِيٌّ الفِعْل. 1. ما ينبه أو ينشط أو ينقل بالأسيتيل كولين ويطلق على الألياف العصبية التي تحرر الأسيتيل كولين في التشابكات عند مرور نبضة عصبية خلالها كالنهايات العصبية اللاودية 2. عامل يولد تأثيراً كعمل الأسيتيل كولين.

**cholinesterase** إَسْتِئْزَازُ الكُولِين. إنزيم يعمل على حلمة الأسيتيل كولين إلى كولين وماء.

**cholinoceptive** كُولِينِيّ الْإِسْتِقْبَال. المواقع على الأعضاء المستقلة التي تتنبه بالمواد الكولينية الفعل.

**cholinoceptor** مُسْتَقْبَلَةٌ كُولِينِيَّة. متقبلة كولينية الفعل.

**cholinolytic** خَالُ الكُولِين. عامل يحصر عمل الأسيتيل كولين أو العوامل الكولينية الفعل في المناطق الكولينية العمل وهي الأعضاء التي تغذيها الأعصاب اللاودية أو في العضلات المخططة أو في التشابكات العصبية.

**cholinomimetic** مُحَاكِي الكُولِين. عامل أو مادة تحاكي في عملها عمل الأسيتيل كولين وهي مادة محاكية للأودي.

**chordoma** وَرَمٌ حَبْلِيّ. ورم خبيث يتولد من البقايا الجنينية للحبل الظهرية.

**chordotomy (= cordotomy)** بَضْعُ الحَبْلِ. قطع السبيل النخاعي المهادي الوحشي وعادة في الربع الامامي الوحشي للنخاع أمام الرباط المسنن لمعالجة الألم الشديد الذي لا يطاق.

**chorea** رَقَصٌ. حركات نفضية سريعة ومعقدة متنوعة ومستمرة وغير إرادية بالرغم من أنها تبدو أحياناً كأنها حركات منسقة.

**- acute c. (= Sydenham's c.)** رَقَصٌ حَادٍ. رقص سايدنهام.

**- atonic c. (= paralytic c.)** رَقَصٌ وَثَائِيّ. رقص شللي.

**- Bergeron's c.** رَقَصٌ بَرغِيرُون. رقص كهربائي طفولي يتصف بتشنج نظمي شديد ولكنه من النوع الحميد.

**- chronic c. (= Huntington's c.)** رَقَصٌ مُزْمِن. رقص هنتنغتون.

**- chronic progressive hereditary c.** رَقَصٌ مُزْمِنٌ مَتَرَقٌّ وَرَائِيّ: (= Huntington's c.) رقص هنتنغتون.

**- chronic progressive nonhereditary c.** رَقَصٌ مُزْمِنٌ مَتَرَقٌّ لَا وَرَائِيّ: رَقَصٌ (= senile c.) شَيْخُوخِيّ.

**- c. cordis** رَقَصٌ قَلْبِيّ. رقص يترافق مع عدم انتظام شديد في عمل القلب.

**- dancing c. (= saltatory c.)** رَقَصٌ قَفْزِيّ.

**- degenerative c. (= Huntington's c.)** رَقَصٌ تَنَكُّسِيّ.

**- diaphragmatic c.** رَقَصٌ جِجَافِيّ. إصدار المريض لصرخات عالية خاصة في عرة غير مؤلمة.

**- c. dimidiata (= hemichorea)** رَقَصٌ شَقِيّ. رقص يصيب جهة واحدة من الجسم.

**- Dubini's c. (= electric c.)** رَقَصٌ دُبِينِيّ. رقص حاد مميت من الرقص الكهربائي تسبب عدوى الجهاز العصبي المركزي.

**- electric c.** رَقَصٌ كَهْرَبَائِيّ. نوع من نوبات الحركات المفاجئة الشديدة والرمع العضلي وقد ينتج ذلك من التهاب الدماغ الوسني.

**- c. festinans (= paralysis agitans)** رَقَصٌ خَبَبِيّ. رنح خبيبي أو شلل رعشي.

**- fibrillary c.** رَقَصٌ رَجْفَانِيّ. تقلص رجفاني للعديد من عضلات الجسم.

**- c. gravidarum** رَقَصٌ حَمْلِيّ. رقص سايدنهام يحدث في الأشهر الأولى من الحمل والذي يمكن أن يكون نتيجة إصابة سابقة بالداء الروماتزمي أو بدونها ويعاود الرقص في المرات اللاحقة للحمل الأول الذي ظهر خلاله.

**- hemilateral c. (= hemichorea)** رَقَصٌ شَقِيّ.

**- Henoch's c. (= chronic progressive electric c.)** رَقَصٌ كَهْرَبَائِيّ مَتَرَقٌّ مُزْمِن.

**- hereditary c. (= Huntington's c.)** رَقَصٌ هُنْتَنَكُون: رَقَصٌ وَرَائِيّ.

**- Huntington's c.** رَقَصٌ هُنْتَنَكُون. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويتصف برقص مترقي مزمن مع تردي عقلي ينتهي بالخرف ويمكن أن يصيب الأشخاص في أي عمر ولكن غالباً ما يصيبهم في العقد الرابع وينتهي بالموت بعد حوالي 15 عاماً.

**- hyoscine c.** رَقَصٌ الْهْيُوسِين. حركات شبيهة بالرقص تظهر في حالات التسمم الحاد بالهْيُوسِين.

- hysterical c. رَقَصٌ هِسْتِيرِيّ. هستيريا تحويلية تظهر فيها حركات رقصية.
- c. Infectora (= Sydenham's c.) رَقَصٌ عَدَوَانِيّ.
- juvenile c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ يَفْعِيّ.
- laryngeal c. (= diaphragmatic c.) رَقَصٌ حَنَجْرِيّ.
- limp c. رَقَصٌ وَهْنِيّ. رقص شديد يتصف بالوهن العام ونقص توتر الاطراف.
- malleatory c. رَقَصٌ مِطْرَقِيّ. رقص نظمي يقوم المريض فيه بحركات طرقية مستمرة.
- maniacal c. (= c. insaniens) رَقَصٌ هَوَسِيّ. رقص يترافق مع الجنون.
- methodic c. رَقَصٌ نِظَامِيّ. رقص يقوم فيه المريض بحركات رقصية في اوقات منتظمة.
- mimetic c. رَقَصٌ التَّقْلِيد. رقص يقوم فيه المريض بتقليد بعض الحركات.
- minor c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ صَغِير.
- c. nocturna رَقَصٌ لَيْلِيّ. رقص تستمر فيه الحركات حتى اثناء النوم.
- c. nutans رَقَصٌ اِنْجَنَائِيّ. رقص يترافق مع انحناء الرأس التشنجي.
- one sided c. (= hemichorea) رَقَصٌ شِقِيّ.
- paralytic c. رَقَصٌ شَلَلِيّ. رقص تستبدل فيه الحركات بالثبات والسكون.
- posthemiplegic c. رَقَصٌ تَالٍ لِلْفَالِج. نوبة رقص يمكن أن تصيب العضلات نصف المشلولة بعد الشلل الشقي.
- prehemiplegic c. رَقَصٌ سَابِقٌ لِلْفَالِج. نوبة رقص يمكن أن تصيب العضلات قبل بدء الشلل الشقي.
- procursive c. (= rotary c.) رَقَصٌ دَوْرَانِيّ. نوع من رقص سيدنهام يقوم فيه الطفل بحركات دورانية او اثنائية.
- rheumatic c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ رُومَاتَزْمِيّ.
- rhythmic c. رَقَصٌ نَظْمِيّ. رقص هستيري يقوم فيه المصاب بحركات رقصية نظمية.

- rotary c. (= procursive c.) رَقَصٌ دَوْرَانِيّ.
- saltatory c. (= dancing c.) رَقَصٌ قَفْرِيّ. رقص نظمي مع حركات رقصية.
- senile c. رَقَصٌ شَيْخُوخِيّ. اضطراب بسيط يصيب الشيوخ يتصف بحركات رقصية من دون أي خلل عقلي.
- simple c. (= Sydenham's c.) رَقَصٌ بَسِيط.
- Sydenham's c. رَقَصٌ سِيدِنْهَام. رقص حاد يصيب الأحداث بين سن الخامسة والخامسة عشر او اثناء الحمل وعادة ما يترافق مع الحمى الروماتزمية ويتصف بحركات لاإرادية تزداد شدة وتؤثر على الحركات الإرادية والمشيية وحركات الذراعين والنطق مع اضطراب نفساني بسيط وقد يصيب المرض إحدى جهتي الجسم وقد يكون من النوع الشللي الصملي.
- choreal (= choreic) رَقَصِيّ.
- choreatic (= choreic) رَقَصِيّ.
- choreic رَقَصِيّ. منسوب للرقص أو يتصف به.
- choreiform رَقَصِيّ الشَّكْل. شبيه بالرقص.
- choreoathetosis رَقَصٌ كُنْعِيّ. حالة تتصف بحركات رقصية كنعية.
- choreoid (= choreiform) رَقَصِيّ الشَّكْل؛ رَقَصَانِيّ.
- choreomania هَوَسٌ رَقَصِيّ. اضطراب يصيب الشباب وعادة بأعداد كبيرة في المجتمعات المغلقة يتصف بحركات رقصية هستيرية.
- choreophrasia تَلَفُظٌ رَقَصِيّ. تكرار بعض الجمل والمقاطع دون الاهتمام بترتيبها ومعانيها.
- chorial 1. مَشِيمَائِيّ. 2. مَشِيمَوِيّ. 1. منسوب إلى المشيماء. 2. منسوب للمشيمية
- choriomeningitis اِلْتِهَابُ السَّحَايَا وَالْمَشِيمِيَّات. التهاب السحايا الدماغية مع ارتشاح لمفاوي في الصفيحة المشيمية.
- lymphocytic c. اِلْتِهَابُ السَّحَايَا وَالْمَشِيمِيَّات اللَّفْأَوِيّ. نوع من التهاب السحايا الفيروسي يصيب الشباب في أشهر الخريف والشتاء وتسببه فيروسات تنتقل من القوارض للإنسان.



**chorion** المشيماء. الطبقة الخلوية التي تكون الغشاء المحيط بالجنين.

**choroid** المشيمية. الطبقة المصطبغة الرقيقة للعين التي تمتد من الحافة المشرشرة حتى العصب البصري وتنقل الأوعية والأعصاب للشبكية.

**choroidectomy** استئصال الضفيرة المشيمية. استئصال الضفيرة المشيمية الوعائية للبطين الجانبي للدماغ.

**chromatopsia** رؤية ملونة. اختلال بصري ترى فيها الأجسام غير الملونة باللون مخالف كما لا ترى الأجسام الملونة باللونها الحقيقية.

**chromesthesia** إحساس لوني. إحساس وهمية للألوان تترافق مع الإحساسات الحقيقية للسمع والذوق والشم.

**chromosome** صبغي. بنية في نواة الخلية تحمل خيط الدنا الذي ينقل المعلومات الوراثية والمرتبطة بالرنا.

**X c.** صبغي X. الصبغي الجنسي الأنثوي الذي تحمله كل الأعراس الأنثوية ويكون نصف ما تحمله الأعراس الذكورية.

**Y c.** صبغي Y. الصبغي الجنسي الذكري الذي لا تحمله الأعراس الأنثوية ولكنه يكون نصف ما تحمله الأعراس الذكورية.

**chronaxie, chronaxy** زمّة. أقصر مدة من التيار الكهربائي اللازمة لتنبيه العضلة أو العصب (لتوليد التقلص أو الدفعة العصبية) والذي تكون شدته ضعف شدة قرارة التيار (الفولتية العتبية).

**chronognosis** إدراك الزمن. الشعور بالزمن ومرور الوقت.

**chronomyometer** مقياس الزمّة العضلية. جهاز لقياس الزمّة العضلية.

**chronophobia** رهَابُ الزمن. الخوف من مرور الوقت أو عصاب السجن وهو القلق أو الرهبة التي يشعر بها المسجونون عند محاولتهم التكيف بحياة السجن لمدة طويلة.

**chronotaxis** توهان زمني. عدم

معرفة الوقت أو مدته بسبب آفة في المهاد أو الفص الجبهي.

**cibophobia** رهَابُ الطعام. عوف الطعام وكراهيته والخوف من تناوله.

**cicatrix (= scar)** ندبة. النسيج الجديد الذي يتكون في الجرح عند التئامه.

**ciliary** هدبي. منسوب إلى أهداب العين أو شبيه بها.

**ciliosis** رف الجفن. ارتجاج الجفن التشنجي.

**cinclisis** حركات ترددية سريعة. حركات تناوبية سريعة كالغمز السريع أو التنفس السريع.

**cinerea** المادة السنجابية. المادة السنجابية للجهاز العصبي.

**cinereal** سنجابي. منسوب إلى المادة السنجابية العصبية.

**cinesalgia** ألم العضلة التحركي. ألم العضلة عند حركتها.

**cingula** أحزمة. جمع حزام.

**cingulectomy** إقتطاع التليفين الجزاميين. تدمير النصفين الأماميين للتليفين الحزاميين على جهتي المخ.

**cingulotomy** بضع التليفين الجزاميين. بضع التليفين الحزاميين لمعالجة الألم غير المتحمل أو لمعالجة الاضطرابات النفسية في حالات الإدمان.

**cingulum** حزام؛ الجزام. 1. بنية أو جزء يحيط ببنية أخرى 2. حزمة من الياف ارتباطية تحيط بالجسم الثنائي جزئياً بالقرب من المستوى الناصف للمخ وهي تربط التليفين الحزامي والحسيني.

**- c. hemispheri (= gyrus, cingulate)** التليف الجزامي.

**cingulumotomy (= cingulotomy)** بضع التليف الجزامي.

**circle** دائرة. شكل منحنى منتظم مغلق.

- arterial c. of Willis (= circulus

arteriosus cerebri) دائرة ويليس الشريانية. الدائرة الشريانية الدماغية.

- vascular c. of optic nerve

الدائرة الوعائية للعصب البصري. دائرة شريانية في الصلبة تحيط بموقع دخول العصب البصري.

- c. of Willis

دائرة ويليس. الدائرة الشريانية الدماغية.

circuit, reflex

دائرة المنعكس. سلسلة

العصبونات التي تقوم بتوصيل دفعات الفعل المنعكسي.

circuit, reverberating

دائرة ترددية

إرجاعية. نوع من السبيل العصبي الذي يحوي عرى تغذية راجعة توجد في الجهاز العصبي المركزي والتي تؤدي إلى إدامة الفعل العصبي.

circulus arteriosus cerebri

الدائرة

الشريانية الدماغية. التفاهر المهم المتعدد الاضلاع الذي يتكون من الشرايين السباتي الباطن والمخيخي الامامي والخلفي والموصلين الامامي والخلفي، وتسمى أيضاً دائرة ويليس.

cistern

صهريج. حيز مغلق يعمل كخزان للسوائل.

- ambient c.

الصهريج المكتنف. الصهريج الذي يربط الصهريج الوريدي المخي الكبير مع الصهريج بين السويقتين.

- basal c. (= Interpeduncular c.)

الصهريج القاعدي.

- cerebellomedullary c.

الصهريج المخيخي

البصلي. الحيز تحت العنكبوتية الكبير الذي يبدأ من السطح السفلي للمخيخ والسطح الخلفي للصلة (النخاع المستطيل) ويستمر للأسفل إلى تحت العنكبوتية النخاعية. ومن الممكن بزله بواسطة إبرة تفرز خلال الغشاء الفقهي القذالي الخلفي (البزل الصهريجي).

- chiasmatic c.

صهريج التصالبة. حيز تحت العنكبوتية بين التصالبة البصرية ومنقار الجسم الثفني.

- c. of fossa of Sylvius (= c. of lateral

cerebral fossa) صهريج حفرة سيلفيوس؛

صهريج الحفرة المخية الوحشية.

- great c. (= cerebellomedullary c.)

الصهريج الكبير؛ الصهريج المخيخي البصلي.

- interpeduncular c.

الصهريج بين السويقتين. توسع في الحيز تحت العنكبوتية بين سويقتي المخ.

- c. of lateral cerebral fossa

المخية الوحشية. الحيز بين العنكبوتية والحفرة المخية الوحشية.

- posterior c. (= cerebellomedullary c.)

الصهريج الخلفي؛ الصهريج المخي البصلي.

- subarachnoid c's.

الصهاريح تحت العنكبوتية. توسعات موضعية في الحيز تحت العنكبوتية تتولد في المناطق التي لا تتبع فيها العنكبوتية والام الجافية حواف الدماغ بصورة كاملة ويتم بذلك توليد احياز صهريجية للسائل الدماغي النخاعي.

- c. of Sylvius (= c. of lateral cerebral

fossa) صهريج الحفرة المخية السفلية؛ صهريج سيلفيوس.

- terminal c's.

صهاريح

النهائية. تتكون من أزواج من الاقنية المستعرضة التي تتصل مع النبيت العضلية وتكون مع النبيب المتوسط T ثلاثيات العضلة.

cisterna magna

الصهريج الكبير.

انظر cistern, great

cisternography

تصوير الصهريج.

التصوير الشعاعي للصهريج القاعدي للدماغ بعد حقن مادة مابينة تحت العنكبوتية.

clairaudience

السماع الغيبي. القدرة

النظرية على سماع الاصوات وإدراكها من دون الحاجة للأذن أو للوظيفة السمعية الطبيعية، وبذا يتمكن السامع من معرفة معلومات عن حوادث تحدث بعيداً عنه أو في أوقات متفاوتة ومتباعدة.

clairvoyance

الاستبصار؛ تبصر الحبايا.

نوع من الإدراك الغيبي اللاحسي حيث يتعرف الشخص على حوادث ويشاهد أموراً بعيدة عنه أو في أوقات متباينة ومتباعدة.

claudicant

اغرج. المصاب بالعرج أو منسوب إليه.

**claudication** عَرَجٌ. عدم تناسق المشية بسبب آفة في أحد الطرفين السفليين أو في كليهما أو بسبب آفة مركزية ويصاحبه الألم أحياناً.

**عَرَجٌ مُنْقَطِعٌ**. متلازمة اعراض - intermittent c. تتصف بعدم وجود الألم عندما يكون المصاب مستقراً ثم يبدأ الألم والوهن عندما يبدأ بالسير ويستمر بل يزداد تدريجياً حتى لا يتمكن المريض من مواصلة سيره فيضطر إلى التوقف فتزول الاعراض تدريجياً. وينتج ذلك عن امراض انسداد الشرايين في الاطراف السفلية مثل الالتهاب الوعائي الخثاري المسد في حالة انضغاط ذنب الفرس.

**claudicatory** أَعْرَجٌ؛ عَرَجِيٌّ. مصاب بالعرج المتقطع أو منسوب إليه.

**claustral** غَائِقِيٌّ. منسوب للعائق.

**claustromania (= claustrophilia)** حُبُّ الْإِنْفِلَاقِ. الرغبة المرضية في الانغلاق في الغرف مع غلق كل أبوابها ونوافذها.

**claustrophobia** رُهابُ الْإِنْفِلَاقِ. الخوف المرضي من البقاء في مكان مغلق كالمصاعد أو الممرات أو الخوف من الاحتجاز والحبس.

**claustrum** الْغَائِقُ. الطبقة الرقيقة من المادة السنجابية الموجودة خارج المحفظة الخارجية للنواة العدسية وتفصلها عن المادة البيضاء للجزيرة ويتكون أغلبها من خلايا مغزلية.

**clava (= tuberculum nuclei gracilis)** حُدَيْبَةُ النَّوَاةِ النَّاجِلَةِ؛ دُبَيْسَةٌ.

**clavus hystericus** ثَفْنٌ هِسْتِيرِيٌّ. الشعور بالألم حاد مثل ألم دخول مسمار إلى الرأس.

**clawfoot** قَدَمٌ مَخْلَبِيَّةٌ. التقوس العالي للقدم مع فرط تمدد أصابعها عند المفاصل المشطية السلامية مع انثناء مفاصلها القاصية.

**clawhand** يَدٌ مَخْلَبِيَّةٌ. انثناء وضمور اليد والأصابع الذي يحدث مع آفات العصب الزندي في الجذام وتكهف النخاع والذي يتصف بفرط انبساط المفاصل السنية السلامية وانثناء المفاصل بين السلاميات.

**cleft, synaptic** الْفَلْحُ الْمَشْبِكِيٌّ. فُحْج

ضيق خارج الخلايا بين الغشائين الخلويين قبل وبعد المشبكيين.

**cleisiophobia** رُهابُ الْإِنْفِلَاقِ. انظر claustrophobia.

**clenching** صَرِيْفُ الْأَسْنَانِ. صك الاسنان وانضغاط الفكين على بعضهما مع إطباق مركزي في حالات التوتر العصبي الحاد أو القيام بعمل جسمي شاق مثل رفع ثقل كبير.

**cleptomania** هَوَسُ السَّرِقَةِ. انظر kleptomania.

**cleptophobia** رُهابُ السَّرِقَةِ. انظر kleptophobia.

**climacophobia** رُهابُ السَّلَامِ. الخوف من الصعود أو النزول على السلالم.

**clinocephalism (= clinocephaly)** تَسَطُّحُ الرَّأْسِ.

**clinocephaly** تَسَطُّحُ الرَّأْسِ. تسطح الرأس الخلقي أو تكهف قمة الرأس.

**clinomania** هَوَسُ الْإِسْتِلْقَاءِ. فرط الرغبة في الاستلقاء على الظهر.

**clinostatism** إِسْتِلْقَاءٌ. وضعة استلقاء الجسم.

**clinothrapy** مُعَالَجَةٌ بِالْإِسْتِلْقَاءِ. معالجة المريض بوضعه مستلقياً في سريره.

**clithrophobia** رُهابُ الْإِنْفِلَاقِ. انظر claustrophobia.

**clivus** الْمَخْدَرُ. سطح عظمي في الحفرة القحفية الخلفية ينحدر من الثقب الكبيرة إلى الأعلى إلى ظهر السرج ويتكون قسمه السفلي من جزء من القسم القاعدي للعظم القذالي ويتكون قسمه العلوي من سطح جسم العظم الوتدي.

**- basilar c. (= c. ossis occipitalis)** الْمَخْدَرُ الْقَاعِدِي.

**- c. monticuli (= declive)** الْحَذْوَةُ.

**- c. ossis occipitalis (= basilar c.)** الْمَخْدَرُ الْقَاعِدِي؛ مَخْدَرُ الْعَظْمِ الْقَذَالِيِّ. القسم القاعدي من

- المحدر المكون من جزء من القسم القاعدي للعظم القذالي.
- c. ossis sphenoidalis** - مَحْدَرُ الْعَظْمِ الْوُتْدِيِّ. القسم العلوي من المحدر المكون من سطح جسم العظم الوتدي.
- clomipramine** - كلوميبيرامين. دواء مضاد للإكتئاب.
- clonazepam** - كلونازيبام. دواء مضاد للاختلاج أو الرمع.
- clonic** - رَمْعِي. منسوب للرمع أو ذو طبيعة رمعية.
- clonicotonic** - رَمْعِي تَوْتَرِي. يتصف بالرمع والتوتر في نفس الوقت.
- clonidine** - أدرينااليني كلونيدين. دواء أدرينااليني الفعل، ولكنه يعمل أيضاً كمضاد للفعل الأدريناليني عندما يكون تركيز الأدرينالين عالياً. يستعمل كعلاج مضاد لفرط ضغط الدم ويستعمل عن طريق الفم.
- clonism, clonismus** - تَرَمُّع. تشنج رمعي ترددي متتالي.
- clonixeril** - كلونيكسيريل. دواء مسكن.
- clonospasm** - تَشَنُّج رَمْعِي. تشنج العضلات ورمعها المتزامنان.
- clonus** - رَمْع. تقلص العضلات وارتخاؤها المتناوبان بسرعة.
- ankle c.** - رَمْع الكَاچل. سلسلة من الحركات الشاذة للقدم يحرضها ثنيها المفاجيء للخلف الذي يولد التقلص والارتخاء المتناوبين للعضلة ثلاثية الرؤوس الساقية.
- anodal closure c.** - رَمْع غَلْقِ الْمَصْعَد. تقلص عضلي رمعي يتولد عند غلق الدارة الكهربائية عند المصعد.
- anodal opening c.** - رَمْع فَتْحِ الْمَصْعَد. تقلص عضلي يتولد عند المصعد عند فتح الدارة الكهربائية أو قطعها.
- cathodal closure c.** - رَمْع غَلْقِ الْمَهْبِط. تقلص عضلي رمعي يتولد عند المهبط عند غلق الدارة الكهربائية.
- cathodal opening c.** - رَمْع فَتْحِ الْمَهْبِط. تقلص عضلي رمعي يتولد عند المهبط عند فتح أو قطع الدارة الكهربائية.
- foot c. (= ankle c.)** - رَمْع الْقَدَم.
- patellar c.** - رَمْع الرَضْفَة. حركة الرضفة النفضية التنظيمية التي تتولد بمسك الرضفة بين الإبهام والسبابة ويدفعها بشدة نحو القدم مرة واحدة أو أكثر. يمثل ذلك منعكساً شاذاً مع تقلص وانقباض العضلة رباعية الرؤوس الفخذية.
- toe c.** - رَمْع إِبْهَام الْقَدَم. حركة إبهام القدم التنظيمية التي يحفزها البسط المفاجيء للسلاهي الأولى.
- wrist c.** - رَمْع المِعْصَم. حركة اليد التشنجية التي يحفزها بسط اليد بشدة عند المعصم.
- clouding** - تَغَيُّم. عدم الوضوح.
- c. of consciousness** - تَغَيُّم الْوَعْي. فقدان الإدراك والشعور بالمحيط وفقدان المقدرة على الاستجابة لمبهاته.
- clubbing** - تَعَجُّر. تغير تَكَثُرِي في الأنسجة الرخوة عند السلاهيات الانتهائية لأصابع اليد والقدم.
- clubfoot (= talipes)** - خَنْفُ الْقَدَم. تشوه القدم الخلقي.
- clubhand (= talipomanus)** - خَنْفُ الْيَد. تشوه اليد بسبب غياب الزند أو الكعبرة الخلقي فتلتف اليد إلى خارج موضعها أو تغير شكلها الطبيعي.
- clumsiness** - عَدَمُ الرِّشَاقَة. عدم البراعة في الحركات.
- cocaine** - كُوكَايْن. مادة كيميائية تستحضر من أوراق أشجار الكوكا أو بالتركيب الكيميائي وتستعمل كمبتجٍ موضعي للأغشية المخاطية.
- coccyalgia (= coccygodynia)** - أَلَمُ الْغُصْعُص.
- coccydynia (= coccyalgia)** - أَلَمُ الْغُصْعُص.
- coccygodynia (= coccyodynia)** - أَلَمُ

**الْعُصْفُصُ**. ألم في العصص والمنطقة المجاورة له والمحيطة به.

**cochlea** القَوَقَعَة. أنبوب حلزوني الشكل يكون قسماً من الأذن الداخلية وهو الجزء الرئيسي من عضو السمع.

**- membranous c.** القَوَقَعَة الغشائية: القَنَاة  
ductus cochlearis أنظر القَوَقَعِيَّة.

**coconscious** مُوَاجِبٌ لِلشُّعُور. ما هو خارج عن حدود الوعي ولكنه قد يظهر إلى سطح الذاكرة في ظروف ملائمة خاصة.

**code** رَامُوز. نظام قواعد خاصة لنقل المعلومات (كرواميز الدفعات العصبية).

**codeine** كُودَايْن. قلواني مخدر يستحصل من الأفيون ويستعمل كمسكن أو مضاد للسعال ويعطى بواسطة الفم.

**cognition** اسْتِعْرَاف؛ عِرْفَة. العمليات الفكرية التي تجعلنا نعي معاني الأمور والمدارك وأغراضها، وهي تشمل كل مناحي الإدراك والتفكير والذاكرة.

**cognitive** اسْتِعْرَافِي. متعلق بالاستعراف.

**coherence** تَرَابُط؛ تَمَاسُك. متانة وانسجام التفكير والكلام.

**coition (= coitus)** جِمَاع.

**coitophobia** رُهابُ الجِمَاع. التخوف الشاذ من الجماع.

**coitus** جِمَاع. الاتصال الجنسي خلال المهبل بين الذكر والأنثى.

**- incomplete c. (= c. interruptus)** عَزَل.

**- c. interruptus** عَزَل. جماع يسحب فيه القضيب من المهبل قبل الدفق وهي طريقة تستعمل لمنع الحمل.

**- c. reservatus** عَزَل؛ جِمَاعٌ مُدَخَّر. جماع يكبت فيه الدفق إرادياً.

**collapse** وَهْط؛ انْتِهْيَار. حالة إعياء ووهن عام بسبب جسدي أو نفسي ويتصف بانهيار قلبي وعائي أو بصدمة.

**collateral** رَافِد. فرع جانبي صغير كوعاء دموي أو فرع عصبي.

**colliculi** أَكْئِمَات. جمع أكيمة.

**colliculus** أَكْئِمَة. حدة أو مرتفع صغير.

**- caudal c.** الأَكْئِمَة الذَّنْبِيَّة. إحدى الأكيمتين السفليتين في سقف الدماغ المتوسط والتي تحوي مراكز المنعكسات السمعية.

**- facial c.** أَكْئِمَة الوُجْهِي. الأكيمة الإنسية فوق السطور البصلية في الحفرة المعينية التي تولدما الركبة الداخلية للعصب الوجهي ثم تنتهي للخلف حول نواة العصب المبعد.

**- inferior c. (= caudal c.)** الأَكْئِمَة السُّفْلِيَّة؛ الأَكْئِمَة الذَّنْبِيَّة.

**- rostral c.** الأَكْئِمَة الرَّأْسِيَّة. إحدى الأكيمتين العلويتين في سقف الدماغ المتوسط التي تحوي مراكز المنعكسات البصرية.

**- superior c. (= rostral c.)** الأَكْئِمَة العُلْوِيَّة؛ الأَكْئِمَة المنقارية.

**collum** رَقَبَة؛ عُنُق. 1. جزء الجسم الذي يربط الرأس بالجذع ويسمى قسمه الأمامي «الرقبة» أما قسمه الخلفي فيسمى «القفا» 2. مصطلح عام لآية بنية رقبية الشكل لأي عضو أو قسم في الجسم.

**colnalgia** أَلَمُ القَوْلُون. ألم في القولون.

**colpalgia** أَلَمُ المَهْبَل.

**column** عَمُود. بنية تشريحية عمودية الشكل.

**- anterior c. of spinal cord** العَمُودُ الأَمَامِي للنُّخَاع. القسم الأمامي من المادة السنجابية للنخاع الشوكي والذي يحوي العصبونات الحركية التي تغذي العضلات الهيكلية للرقبة والجذع والأطراف. ويظهر العمود في المقطع المستعرض للنخاع بشكل قرن يسمى القرن الأمامي للنخاع.

**- anterolateral c.** الجَنْبُ الأَمَامِي الوُخْشِي للنُّخَاع. أنظر funiculus lateralis medullae spinalis.

**- autonomic c. of spinal cord (= intermediolateral c. of spinal cord)** العمود المستقلي للنخاع؛ العَمُودُ الوُخْشِي الوَسْطِي للنُّخَاع.

- c. of Burdach (= fasciculus cuneatus medullae spinalis) الحُرْمَةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.
- Clark's c. (= thoracic c.) الْعُمُودُ الصَّدْرِيّ.
- dorsal c. (= vertebral c.) الْعُمُودُ الْفَقَارِيّ.
- dorsal gray c. (= nucleus proprius) النُّوَّةُ الْمُخْصُوصَةُ. العمود السنجابي الظهري.
- dorsal c. of spinal cord الْعُمُودُ الظَّهْرِيّ لِلنَّخَاعِ. القسم الخلفي من المادة السنجابية للنخاع الشوكي ويحوي مجموعات من العصبونات الحركية ممتدة على طول النخاع ومجموعتين محدنتين في المنطقتين الصدرية والقطنية العلوية ويظهر العمود في المقطع المستعرض للنخاع بشكل قرن يسمى القرن الخلفي للنخاع.
- fornix c. عُمُودُ الْقَبْوِ. إحدى الكتلتين الليفيتين العموديتين المتباعدتين من النهاية الأمامية من جسم القبو والتي تنزل إلى الدماغ البيني.
- fundamental c. (= fasciculi proprius) الحُرْمُ الْمُخْصُوصَةُ.
- c. of Goll (= fasciculus gracilis medullae spinalis) الحُرْمَةُ الناحلة لِلنَّخَاعِ.
- Gower's c. (= tractus spinocerebellaris anterior) السَّبِيلُ النَّخَاعِيّ الْمُخَيَّجِي الْأَمَامِيّ.
- gray c's. الْأَعْمَدَةُ السِّنْجَابِيَّةُ. الأعمدة الطولانية الثلاثة للنخاع الشوكي (الأمامية والخلفية والجانبية) المكونة من المادة السنجابية والتي تحوي أجسام العصبونات وهي تبدو كالقرون في المقطع المستعرض للنخاع.
- intermediolateral c. of spinal cord الْعُمُودُ الْجَانِبِيّ الْوَسْطِيّ لِلنَّخَاعِ.
- c. of Lissauer (= tractus dorsolateralis) السَّبِيلُ الظَّهْرِيّ الْوُخْشِيّ.
- posteromedian c. of medulla oblongata (= fasciculus gracilis medullae oblongatae) الحُرْمَةُ الناحلة لِلْبَصَلَةِ.
- posteromedian c. of spinal cord (= fasciculus gracilis medullae

- spinalis) الْعُمُودُ الْخَلْفِيّ النَّاصِفِيّ لِلنَّخَاعِ؛ الحُرْمَةُ الناحلة لِلنَّخَاعِ.
- spinal c. (= vertebral c.) الْعُمُودُ الْفَقَارِيّ.
- Spitzka-Lissauer c. (= tractus dorsolateralis) السَّبِيلُ الظَّهْرِيّ الْوُخْشِيّ.
- Stilling's c. (= thoracic c.) الْعُمُودُ الصَّدْرِيّ.
- striomotor c. الْعُمُودُ الْمُخْطَطِيّ الْحَرَكَيّ. عمود صادر من القرن الأمامي للنخاع يغذي العضلات المخططة.
- thoracic c. الْعُمُودُ الصَّدْرِيّ. عمود من الخلايا في القسم الإنسي من قاعدة العمود السنجابي الظهري يقع خلف العمود الوحشي مباشرة ويمتد من الشدفة الرقبية الثامنة حتى الشدفة القطنية الثالثة أو الرابعة ويعطي أليافاً للسبيل النخاعي المخيخي الظهري على نفس الجهة.
- vertebral c. الْعُمُودُ الْفَقَارِيّ. التجمع الطولاني للفقرات من قاعدة القحف حتى المصعص.
- عمُود. (ج: أعمدة). columna (= column) أَعْمِدَةٌ. جمع عمود.
- columnae سُبَاتٌ؛ غَيْبُوتَةٌ. حالة فقدان الوعي لا يوقظ منها المصاب حتى بالتنبيه الشديد.
- agrypnodal c. (= c. vigil, locked-in syndrome) سُبَاتٌ سَهْرِيّ.
- alcoholic c. سُبَاتٌ كُحُولِيّ. سبات يحدث في التسمم الكحولي الشديد.
- alpha c. سُبَاتٌ الْفَائِيّ. سبات يتصف بسيادة موجات ألفا في المخطط الكهربائي لدماغ المصاب.
- apoplectic c. سُبَاتٌ سَكْرِيّ. الدھول الذي يرافق السكتة.
- diabetic c. سُبَاتٌ سَكْرِيّ. السبات الذي يصاحب الحمض السكري الشديد.
- hepatic c. سُبَاتٌ كَبِدِيّ. السبات الذي يصاحب الاعتلال الدماغي الكبدي.
- irreversible c. سُبَاتٌ لَأَعْكُوسٌ؛ موت الدماغ. انظر brain death.
- Kussmaul's c. سُبَاتٌ كُسْمَاوُل. سبات وعوز الهواء في الحمض السكري.

- **metabolic c.** سُبَاتٌ إِسْتِقْلَالِيّ. سبات يصاحب الاعتلال الدماغي الاستقلابي.
- **c. somnolentium** سُبَاتٌ مُتَقَطِع. انظر cataphora.
- **uremic c.** سُبَاتٌ يُوْرِيْمِيّ. سبات ينتج عن اليوريمية.
- **c. vigil** سُبَاتٌ سَهْرِيّ. سبات نابه أو نقطة ظاهرة دون أية استجابة للمنبهات الخارجية أو استجابة ضعيفة لها جداً.
- comatose** مَسْبُوت؛ سُبَاتِيّ. شخص مصاب بالسبات أو الغيبوبة.
- commissura (= commissure)** صَوَارٌ؛ مُلتَقَى.
- commissure** صَوَارٌ؛ مُلتَقَى. محل اتحاد قسمين متناسبين.
- **c. of caudal colliculi** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الذَّنْبِيَّتَيْنِ. شريط من الألياف العصبية يوصل الأكيمنتين الذنبيتين.
- **c. of cerebrum, anterior** الصَوَارُ الْأَمَامِيّ لِلْمُخ. حزمة من الألياف العصبية المغمدة تسير عرضياً في الصفحة الانتهائية وتربط أقسام نصفي كرة المخ وتكون من قسم أمامي صغير وقسم خلفي كبير.
- **c. of cerebrum, middle (= adhesio interthalamica)** الصَوَارُ الْوَسْطِيُّ لِلْمُخ؛ الْإِلْتِصَاقُ بَيْنَ الْمِهَادَيْنِ.
- **c. of cerebrum, posterior (= c. of epithalamus)** الصَوَارُ الْخَلْفِيّ لِلْمُخ.
- **c. of cerebrum, rostral (= posterior c. of cerebrum)** الصَوَارُ الْخَلْفِيّ لِلْمُخ.
- **c. of cranial colliculi (= c. of rostral colliculi)** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الْخَلْفِيَّتَيْنِ.
- **c. of epithalamus** صَوَارُ الْمُهْدِ. حزمة ألياف عصبية كبيرة تعبر الخط الوسطي لفوق المهادي فوق النقطة التي ينفتح عندها المسال المخي في البطين الثالث.
- **Forel's c.** صَوَارُ فُورِيل. الحزمة العصبية التي ترتبط بالنواة تحت المهادية.
- **c. of fornix** صَوَارُ الْقَبْو. حزمة من الألياف العصبية توصل خُصَيْنِي الْجِهَتَيْنِ وتمر من خلال جسم القبو.
- **gray c. (= substantia grisea intermedia centralis)** الصَوَارُ السَّنْجَابِيّ؛ الْمَادَّةُ السَّنْجَابِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ الْمَرْكَزِيَّة.
- **habenular c.** الصَوَارُ الْعِنَانِيّ. حزمة ألياف من السطور البصلية تمر خلال عنان كل من الجهتين لتتصالب وتنتهي في عنان الجهة الثانية.
- **hippocampal c. (= c. of fornix)** الصَوَارُ الْخُصَيْنِيّ؛ صَوَارُ الْقَبْو.
- **c. of inferior colliculi (= c. of caudal colliculi)** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ السُّفْلِيَّتَيْنِ.
- **interthalamic c. (= adhesio interthalamica)** الْإِلْتِصَاقُ بَيْنَ الْمِهَادَيْنِ.
- **c. of rostral colliculi (= c. of superior colliculi)** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الْمُفَارِقَتَيْنِ. صوار الأكيمنتين العلويتين.
- **c. of superior colliculi** صَوَارُ الْأَكِيمَتَيْنِ الْعُلْوِيَّتَيْنِ. حزمة من الألياف العصبية تربط الأكيمنتين العلويتين.
- **supraoptic c's.** الْأَصْوَرةُ فَوْقَ الْبَصَرِيَّةِ. ما لا يقل عن ثلاث حزم من الألياف العصبية توجد فوق الصوار البصري وهي حزمة «كدن» (الحزمة السفلية أو البطنية) وحزمة «مينرت» (الحزمة الظهرية أو العلوية) وحزمة «غانزر» (الحزمة الامامية) وتسمى أصدورة ولكنها هي في الواقع تصالبات عصبية.
- **white c. of spinal cord** الصَوَارُ الْأَبْيَضُ لِلنَّخَاع. البنية المكونة من تعابر الألياف العصبية من جهة واحدة إلى الجهة الأخرى من النخاع أمام وخلف القناة المركزية.
- commotio (= concussion)** إِرْتِجَاج. الاهتزاز الشديد أو الصدمة التي تتولد عنه.
- **c. cerebri** إِرْتِجَاجٌ دِمَاعِيّ. ارتجاج الدماغ.
- **c. spinalis** إِرْتِجَاجٌ نَخَاعِيّ. ارتجاج النخاع.
- compatible** 1. من يستطيع التلاؤم ومعايشة الآخرين في أحد المجتمعات 2. مانح أو

متلقي للدم أو للأنسجة أو للأعضاء لا يولد النقل أو الغرس لدى أي منهما أي رد فعل.

**1. مُعَقَّد 2. مُرَكَّب 3. عُقْدَة. complex**  
1. معقد وغير بسيط 2. مجموعة مواد أو حالات مختلفة أو عوامل متناسبة مع بعضها متشابهة أو غير متشابهة مثل مجموعة من الأعراض التي تولد متلازمة مرضية 3. مجموعة من الأفكار المترابطة في اللاشعور لها نسق عاطفي متقارب وتؤثر على سلوك الشخص وحالاته لدرجة كبيرة.

**- amygdaloid c. (= corpus amygdaloideum)** الجِسْمُ اللُّوزِيّ.

**- calcarine c.** calcar avis. انظر الطير. **- castration c.** عُقْدَةُ الْخِصَاء. الأفكار اللاشعورية والدوافع التي تنبع من الخوف من فقدان الأعضاء التناسلية كعقاب عن الممارسة الجنسية اللاشرعية.

**- Electra c.** عُقْدَةُ إِلِيْكَتْرَا؛ عُقْدَةُ الْآب. انحراف نفسي يتصف بحب البنت لآبيها حباً جنسياً وكرهيتها لأمها.

**- Inferiority c.** مُرَكَّبُ النِّقْص. العقدة التي تتولد من شعور الشخص بوجود نقص حقيقي أو وهمي فيه وتؤثر بطريقة تعامل الشخص مع هذا الشعور على نمط سلوكه.

**- Oedipus c.** عُقْدَةُ أُودِيْب؛ عُقْدَةُ الْآم. انحراف نفسي يتصف بحب الولد لأمه حباً جنسياً وكرهيتها لآبيه.

**- symptom c. (= syndrome)** مُعَقَّدُ الْأَعْرَاض؛ مُتَلَاَزِمَة.

**complexion** سَحْنَاء. لون ومظهر جلد الوجه.

**comprehension** إدراك؛ فَهْم. المقدرة على فهم وإدراك معاني المنبهات الحسية.

**compression** انْضِصَاط. 1. عملية ضغط الأجسام أو المواد على بعضها البعض 2. في علم الأجنة تقصير أو حذف بعض مراحل تنامي الجنين.

**- c. of the brain** انْضِصَاطُ الدِّمَاغ. حالة انضغاط الدماغ تتولد عن كسر في القحف أو عن ورم أو خراج أو خثرة دموية.

**- c. of cranial nerves** انْضِصَاطُ الْأَعْصَاب

القَحْفِيَّة. انضغاط الأعصاب الذي يتولد عن ورم أو كسر في القحف.

**- spinal c.** انْضِصَاطُ النُّخَاع. انضغاط النخاع الذي يتولد عن كسر في الفقرات أو عن ورم أو خراج وتختلف الأعراض المولدة عنه حسب موقع الآفة المولدة له وتشمل الألم والاختلالات الحسية والحركية.

**compulsion** 1. دافع لا يقاوم للقيام بعمل غير منطقي أو غير نافع 2. دافع اجباري لتكرار القيام بعمل ما من دون حاجة أو ضرورة له كفسل اليدين أو لمس جسم معين أو عد الدراهم من دون سبب معروف أو لسبب لاشعوري. **- repetition c.** إِجْبَارٌ مُعَاوِد. في التحليل النفسي هو الدافع لإعادة القيام بعمل أو تجارب عاطفية سابقة من دون سبب واضح.

**conation** النُّزُوع. الدافع الداعي إلى القيام بعمل من أي نوع.

**concept** مَفْهُوم. (ج: مفاهيم). الصورة العقلية لآية عملية أو موضوع أو شيء.

**1. مَفْهُوم؛ conception (= concept)** إدراك 2. إخصاب.

**concussion** إِرْتِجَاج. رَجَّة أو اهتزاز شديد أو النتائج التي تولدها مثل هذه الإصابات للأنسجة الرخوة أو للدماغ.

**- c. of the brain** إِرْتِجَاجُ الدِّمَاغ. فقدان الوعي نتيجة ضربة أو صدمة شديدة للرأس يدوم في الحالات البسيطة لفترة قصيرة مع احتمال فقدان القوى العقلية للمصاب مثل نساوة السابق أو الاعتلال العاطفي. أما في الحالات الشديدة فإنه يدوم لفترة طويلة مع اختلال وظائف جذع الدماغ لتوقف التنفس العابر وتوسع الحذقة والاختلال الحركي الوعائي.

**- c. of the labyrinth** إِرْتِجَاجُ الْتِيَه. صمم مع طنين أو اختلال التوازن يتولد عن صدمة للأذن أو الفيحاء بالقرب منها.

**- c. of the spinal cord** إِرْتِجَاجُ النُّخَاع. اعتلال وظيفي عابر للنخاع نتيجة رضح آلي له.

**1. إشْرَاط 2. تَكْنِيف. conditioning** يتم فيه توليد استجابة معينة لمنبه غير نوعي لم يكن في السابق قبل تعلمه عليه قابلاً على إحداث



مثل تلك الاستجابة ويتم ذلك بتكرار هذا المنبه بالتزامن مع المنبه النوعي الخاص الذي يولد هذه الاستجابة عادة وبعد تكرار هذا الترافق لمرات عديدة كافية يتعلم الكائن الاستجابة المعينة لهذا المنبه الجديد غير النوعي.

**- aversive c.** إَشْرَاطٌ مُفْغَرٌ. إشراف يستعمل فيه العقاب ليزامن إحساسه السلبي مع استجابة غير مرغوب بها.

**- avoidance c.** إَشْرَاطٌ إِجْتِنَابِيٌّ. إشراف فعال يتعلم الشخص فيه توليد استجابة تُلغِي الاستجابة للمنبه البغيض أو تجنبه إياه.

**- classical c.** إَشْرَاطٌ تَقْلِيدِيٌّ. انظر conditioning.

**- instrumental c. (= operant c.)** إَشْرَاطٌ فَعَالٌ.

**- operant c.** إَشْرَاطٌ فَعَالٌ. إشراف يتعلم فيه الشخص استجابة حركية معينة لأحد المنبهات الخاصة تجلب له مكافأة مغرية ومفيدة أو مفرقة.

**conduct** 1. تَصَرُّفٌ 2. وَصْلٌ. 1. السلوك الشخصي للفرد الذي يتضمن عاملاً أخلاقياً ويقتضي معرفة اجتماعية وإرادة قوية. 2. يمرر الدفعة العصبية على طول الليف العصبي أو ينشرها إلى الأنسجة الهيجوة.

**conductance** إِيصَالِيَّةٌ. القدرة على التوصيل.

**conduction** تَوْصِيلٌ. نقل وإيصال الموجات الصوتية، أو الحرارة، أو الدفعات العصبية أو الكهربائية.

**- aerial c.** تَوْصِيلٌ هَوَائِيٌّ. توصيل الصوت إلى الأذن الداخلية خلال الهواء في الأذنين الخارجية والوسطى.

**- anterograde c. (= forward c.)** تَوْصِيلٌ مُسَايِرٌ.

**- antidromic c.** تَوْصِيلٌ مُعَاكِسٌ لِلْمَسِيرَةِ. توصيل الدفعات العصبية باتجاه معاكس للاتجاه السوي، مثلاً من المحوار إلى التغصنات.

**- avalanche c.** تَوْصِيلٌ تَهْوُورِيٌّ. توصيل دفعات عصبية من النهايات العديدة لأحد العصبونات إلى أجسام مجموعة كبيرة من العصبونات مما يولد تهيجا منتشراً واسعاً لدخول عصبي صغير نسبياً.

**- bone c.** تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ. توصيل الصوت إلى الأذن الداخلية بطريق العظام القحفية.

**- cranial c. (= bone c.)** تَوْصِيلٌ قَحْفِيٌّ: تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ.

**- dromic c.** تَوْصِيلٌ مُسَايِرٌ. توصيل الدفعات العصبية بالاتجاه السوي.

**- ephaptic c.** تَوْصِيلٌ بِالشَّبَكِ الْجَانِبِيِّ. توصيل الدفعات العصبية عبر المشبك الجانبي بدلاً من التوصيل المشبكي.

**- forward c. (= dromic c.)** تَوْصِيلٌ مُسَايِرٌ.

**- one way c.** تَوْصِيلٌ بِاتِّجَاهٍ وَاحِدٍ. توصيل الدفعات العصبية خلال المشابك باتجاه واحد فقط.

**- osteotympanic c. (= bone c.)** تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ طَبْلِيٌّ.

**- saltatory c.** تَوْصِيلٌ قَفْزِيٌّ. التوصيل السريع للجهد العصبي من عقدة رانفير إلى العقدة المجاورة في الأعصاب المغلفة بدلاً من توصيله على طول الليف العصبي.

**- synaptic c.** تَوْصِيلٌ مُشْبَكِيٌّ. توصيل الدفعات العصبية عبر المشبك.

**- tissue c. (= bone c.)** تَوْصِيلٌ نَسْجِيٌّ: تَوْصِيلٌ عَظْمِيٌّ.

**- unidirectional c. (= one way c.)** تَوْصِيلٌ بِاتِّجَاهٍ وَاحِدٍ.

**cone** مَخْرُوطٌ. 1. المستقبلة الضوئية الشبكية المتخصصة بالرؤية الضوئية 2. جسم ذو شكل مخروطي.

**- cerebellar pressure c.** مَخْرُوطٌ مَخْنَجِيٌّ. انْضِغَاطِيٌّ. تشوه الدماغ الذي ينتج عن زيادة ضغط داخل القحف الذي يدفع المخيخ إلى داخل القناة الشوكية.

**- medullary c.** المَخْرُوطُ النُخَاعِيٌّ. انظر conus medullaris.

**- retinal c.** مَخْرُوطٌ شَبَكَوِيٌّ. خلية متقبلة بصرية مسؤولة عن الرؤية الضوئية واللونية والميز البصري وتنتشر في البقعة المركزية للشبكية وأقسامها الخلفية وتقل كثيراً حتى تنعدم في القسم الامامي من الشبكية.

- c.of spinal cord (= conus medullaris)

مَخْرُوطُ النُّخَاع.

- visual c. (= retinal c.)

مَخْرُوطُ شَبَكَوِيٍّ.

conexus interthalamicus

(= adhesio interthalamica) الوَصِيلَةُ

بَيْنَ الْمَهَادِينِ.

confabulation

تَخْرِيف. تلفيق بعض

الحوادث الخيالية يرويها بعض المصابين بالأمراض العصبية العضوية لملء بعض الفراغات في ذاكرتهم.

conflict

صِرَاع. صراع نفسي وغالباً لا

شعوري يتولد عن تصادم دوافع أو رغبات أو متطلبات متناقضة أو غير متجانسة.

- approach-approach c.

صِرَاعُ الْمَرْغُوبَيْنِ.

صراع يتولد عن الرغبة الشديدة للوصول إلى هدفين متناقضين يولدان صراعاً نفسياً شديداً.

- approach-avoidance c.

صِرَاعُ الْمَرْغُوبِ

وَالْمَكْرُوهِ. صراع يتولد عن الرغبة للوصول إلى أحد الأهداف ولكنه يتضمن عوامل مرغوبة فيه مع عوامل أخرى غير مرغوبة فيتولد صراع لتجنب الأهداف غير المرغوبة.

- avoidance-avoidance c.

صِرَاعُ الْمَكْرُوهَيْنِ.

صراع يتولد من الرغبة في اجتناب عاملين غير مرغوبين بدرجة متساوية.

- extrapsychic c.

صِرَاعُ خَارِجِ النَّفْسِ. صراع

يتولد بين الرغبات والاحتياجات الشخصية للفرد مع رغبات الآخرين.

- intrapersonal c. (= intrapsychic c.)

صِرَاعُ دَاخِلِ النَّفْسِ.

- Intrapsychic c.

صِرَاعُ دَاخِلِ النَّفْسِ. صراع

يتولد بين الرغبات غير المتجانسة واللاشعورية والرغبات والاحتياجات الشخصية والأفكار الذاتية في داخل فكر الشخص.

confrontation

مُجَابَهَةٌ. طريقة علاجية

نفسية يعالج بها المرضى النفسانيين بإظهار أقوالهم أو أعمالهم المتناقضة لهم مباشرة ليقنعوا أنفسهم بتناقضها.

confusion

تَخْلِيط؛ التَّبَاس. تشويش فكري

بالنسبة للوقت أو المحل أو الأشخاص ويطرافق أحياناً مع تشويش الوعي.

confusional

تَخْلِيطِيّ. متعلق بالتخليط.

congenital

خَلْقِيّ. حالات موجودة لدى

المولود حين الولادة وعادة قبلها بصرف النظر عن أسبابها.

conjugal

إِقْتِرَانِيّ. متعلق بالزواج أو

بالزوجين.

conscious

وَاعٍ. شخص مدرك لنفسه وأعماله

ومحيطة.

consciousness

وَعْي؛ شُعُور. حالة إدراك

الشخص لنفسه وأعماله ومحيطه ويتمتع بإحساس كامل.

consensual

إِتِّفَاقِيّ. ما يتجهج بالتنبيه

المنعكسي، ويستعمل المصطلح للدلالة على استجابة حدقتي العينين سوية للمنبه الذي يركز على إحداهما.

constitution

بَنِيَّة؛ بَنِيَان. بناء الجسم

أو حالته الوظيفية التي تعينها فيه العوامل الوراثية والفيزيولوجية والكيميائية والتي قد تعدلها الظروف البيئية.

constitutional

بَنِيَوِيّ. 1. ما يؤثر على

كافة بنية الجسم وليس على موضع واحد فيه فقط 2. متعلق بالبنية.

constriction, Ranvier (= node of

Ranvier)

عُقْدَةُ رَانْفييه.

contract

يَتَقَلَّص. يقصر كالعضلة مثلاً

عند تنبيهها بمنبه وافٍ.

contractile

قَلْوَص. يتمكن من التقلص

أو يتصف بخاصية التقلص.

contractility

قَلْوَصِيَّة. المقدرة على

التقلص استجابة لمنبه مناسب.

- idiomuscular c.

قَلْوَصِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ ذَاتِيَّة.

تقلص العضلة الذاتي في حالة ضمورها أو حثلها

- neuromuscular c.

قَلْوَصِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ عَضَلِيَّة.

التقلص العضلي السوي نتيجة التنبيه العصبي لها.

المستمر من دون فترات انبساط فيها.



contracture

تقلع ثابت في اليد اليمنى بوضعة الفني بسبب اعتلال اليافها العضلية

**contrecoup** رَجْعُ الضَّرْبَةِ. إصابة تتولد عن صدمة أو ضربة على غير موقعها مثل كسر إحدى جهتي القحف عند صدمة جهته المعاكسة.

**control** 1. مُرَاقِبَةٌ؛ تَضْبِيط 2. مُكَافَحَةٌ. 1. التحكم في إحدى العمليات أو تحديد 2. مكافحة بعض الأمراض.

**- associative automatic c.** تَحَكُّمٌ إِرْتِبَاطِيٌّ ذاتي. دفعات عصبية تبدأ من الجسم المخطط وتعمل على السبيل النهائي المشترك وبذلك تؤثر على العضلات.

**- aversive c.** تَحَكُّمٌ مُنْفَر. استعمال بعض المنبهات الكريهة في المعالجة النفسانية لتغيير سلوك غير مرغوب فيه.

**- feedback c.** تَضْبِيطٌ اِرْتِجَاعِيٌّ. تحكم فيزيولوجي خاص حيث تولد الزيادة في أية وظيفة تثبيطاً للمركز أو للعوامل المنبهة لها فتقللها ويحصل العكس عند تقليلها حيث تنبّه هذه العوامل المراكز المولدة لها وتؤدي إلى زيادتها.

**- idiodynamic c.** تَحَكُّمٌ دِينَمِيٌّ ذاتي. دفعات عصبية من خلايا العمود السنجابي الامامي والنوى

الحركية للدماغ التي تحافظ على الحالة النمائية السوية للعضلات.

**- reflex c.** تَضْبِيطٌ مُنْعَكِسِيٌّ. التحكم بالفعالية العضلية بواسطة دفعات عصبية تنقل إليها عن طريق الأقواس المنعكسية.

**- stimulus c.** التَحَكُّمُ التَّنْبِيهِيٌّ. تأثير منبهات المحيط على سلوك الفرد.

**- synergic c.** تَحَكُّمٌ تَأَزُرِيٌّ. دفعات عصبية تنقل من المخيخ إلى الطريق المشترك للتحكم في الفعالية العضلية لوحداث الجسم المتآزرة.

**- tonic c.** تَحَكُّمٌ تَوَثُرِيٌّ. الدفعات العصبية التي تنتقل إلى الطريق المشترك النهائي خلال الأقواس المنعكسية للتحكم في التوتر العضلي.

**- vestibuloequibratory c.** تَحَكُّمٌ دِهْلِيْزِيٌّ. دفعات عصبية من الاقنية الهلالية والكيس والقريبة للمحافظة على توازن الجسم.

**- volitional c. (=voluntary c.)** تَحَكُّمٌ إِرَادِيٌّ.

**- voluntary c.** تَحَكُّمٌ إِرَادِيٌّ. دفعات عصبية من الباحة الحركية لقشرة المخ تتحكم في الفعاليات العضلية حسب إرادة الشخص.

**contusion** رَضٌ. كدمة أو إصابة قسم من الجسم من دون جرح الجلد.

- **brain c.** رَضُ الدِّمَاغ. رض مع فقدان الوعي يتولد عن رضح مباشر للرأس وعادة ما يترافق مع كسر القحف.

- **contrecoup c.** رَضٌ رَجْع الضَّرْبَةِ. رض يتولد عن ضربة أو صدمة لإحدى جهتي الرأس فيولد ضرراً في نصف كرة المخ في الجهة المعاكسة من الرأس.

- **c. of spinal cord** رَضُ النُّخَاع. رضح عضوي للنخاع بسبب ضربة أو صدمة للعمود الفقري تؤدي إلى انعدام الوظيفة الدائم أو الوقتي لأقسام الجسم تحت مستوى الرضح.

**conus** مَخْرُوطُ النُّخَاع. أنظر cone.

- **conus medullaris** مَخْرُوطُ النُّخَاع. النهاية السفلية المخروطية الشكل للنخاع الشوكي عند مستوى الفقرة القطنية العلوية.

**conversion** إِنْقِلَابٌ؛ تَحْوِيل. آلية دفاعية لا شعورية يتحول بها القلق الذي يتولد عن صراع نفسي إلى تعبير جسمي رمزي.

**convolution** تَلَفِيفٌ. (ج: تلافيف). منطقة مرتفعة غير منتظمة تتولد من بنية مطوية على نفسها مثل تلافيف الدماغ.

- **Broca's c.** تَلَفِيفُ بْرُوكَا. التلفيف الجبهي السفلي لنصف كرة المخ الأيسر.

- **Heschl's c.** تَلَفِيفُ هِشَل. التلفيف الصدغي المستعرض الأمامي.

- **Zuckerkandl's c.** تَلَفِيفُ زُوكِرْكَندَل. التلفيف جنبي الانتهائي.

**convulsant** مُخَلِّج. عامل يولد الاختلاج.

**convulsion** إِنْخِلَاج. تقلص لإرادي شديد أو سلسلة من التقلصات اللاإرادية في العضلات الإرادية.

- **central c.** إِنْخِلَاجٌ مَرْكَزِي. اختلاج يتسبب عن آفة الجهاز العصبي المركزي ولا يسببه أي سبب خارجي.

- **choreic c.** إِنْخِلَاجٌ رَقْصِي. نفضات رمعية عضلية شبيهة بالحركات الرقصية.

- **clonic c.** إِنْخِلَاجٌ رَمْعِي. اختلاج يتصف بتقلصات عضلية تتناوب مع ارتخائها.

- **coordinate c.** إِنْخِلَاجٌ مُتَنَاسِقٌ. اختلاج يتصف بحركات رمعية شبيهة بالحركات الطبيعية الإرادية المستهدفة.

- **epileptiform c.** إِنْخِلَاجٌ صَرْعِي الشَّكْلِ. اختلاج يصاحبه فقدان الوعي.

- **essential c. (=central c.)** إِنْخِلَاجٌ أَساسِي؛ إِنْخِلَاجٌ مَرْكَزِي.

- **febrile c's.** إِنْخِلَاجَاتٌ حُمُوءِيَّة. الاختلاجات التي تصاحب الحميات عند الأطفال والرضع.

- **hysterical c, hysteroid c.** إِنْخِلَاجٌ هِسْتِيرِي؛ إِنْخِلَاجٌ هُزَاعِي. هستيريا اختلاجية تتصف باعراض تشبه الاختلاجات الحقيقية.

- **local c.** إِنْخِلَاجٌ مَوْضِعِي. تشنج بسيط يصيب عضلة واحدة أو أكثر في منطقة محدودة من الجسم.

- **mimetic c. (=mimic c.)** إِنْخِلَاجٌ إِمِائِي. تشنج وجهي أو عرة وجهية.

- **puerperal c.** إِنْخِلَاجٌ نَفَاسِي. تشنجات لإرادية عند النساء قبيل أو أثناء أو بعد الولادة مباشرة.

- **salaam c.** إِنْخِلَاجٌ سَلَامِي. اختلاج مع تشنج انحناء الرأس وطاقاته للامام.

- **spontaneous c. (=central c.)** إِنْخِلَاجٌ تَلَقَائِي. تشنج توتري من دون فقدان الوعي.

- **tetanic c.** إِنْخِلَاجٌ تَوَثُّرِي. تشنج توتري طويل بسبب تفريغ سرعي.

- **tonic c.** إِنْخِلَاجٌ تَوَثُّرِي. تقلص العضلات لمدة طويلة بسبب تفريغ سرعي.

- **uremic c.** إِنْخِلَاجٌ يُوْرِمِي. اختلاج يتولد عن اليوريمية.

**convulsivant (=convulsant)** مُخَلِّج. عامل أو مادة تولد الاختلاج.

**convulsive** إِنْخِلَاجِي. متعلق بالاختلاج أو يتصف به.

**coordination** تَنَاسُقٌ؛ تَنَسِيقٌ. قيام الأعضاء المترابطة بوظائفها بصورة منسقة ويطلق عادة على تنسيق الدماغ للوظائف الحركية للعضلات لتوليد حركات منسقة.

**copodyskinesia** عُسْرُ الْحَرَكَةِ الْكَلْبِي. عجز الحركة نتيجة تعب العضلات.

**coprolalia (= coprophrasia)** بُذَاء. استعمال كلمات بذيئة وقذرة بدافع لاإرادي في بعض حالات الفصام.

**coprolomania (= coprolalia)** هَوَسُ الْبُذَاء. الهوس الشاذ بالبراز والقذارة.

**coprophilia** هَوَسُ الْبِرَاز. الهوس الشاذ بالبراز والقذارة.

**coprophobia** رُهَابُ الْبِرَاز؛ رُهَابُ التَّغَوُّط. رهاب التبرز أو رؤية البراز.

**coprophrasia (= coprolalia)** بُذَاء.

**coprostrasophobia** رُهَابُ الْإِنْسَانِ. رهاب توقف التغوط.

**copulation** جِمَاع؛ مُجَامَعَة. أنظر coitus.

**cord** حَبْل. بنية طويلة مدوّرة وقابلة للثني.

**- ganglionated c. (= truncus sympathicus)** جَذَعُ الْوُدِّي. الحَبْلُ الْمُعَقَّد.

**- lumbosacral c. (= truncus lumbosacralis)** الْجَذَعُ الْقَطَنِي الْعَجْزِي.

**- nerve c.** حَبْلٌ عَصَبِي. جذع أو حزمة ألياف عصبية.

**- spinal c. (= medulla spinalis)** النُّخَاعُ الشُّوكِي.

**- Willis's c's.** جِبَالٌ وَيْلِيْس. مجموعة من الحزم الليفية (من تراكيب الجافية) تمتد عرضياً عبر الزاوية السفلية للجيب السهمي العلوي.

**cordotomy** 1. بَضْعُ النُّخَاعِ 2. قَطْعُ الحَبْلِ الصَّوْتِي. أنظر chordotomy.

**cornea** الْقَرْنِيَّة. البنية الشفافة التي تكون القسم الأمامي من غلالة العين.

**cornu** قَرْن. (ج: قُرُون). بروز قرني الشكل وخصوصاً في مقطعه العرضي.

**- c. Ammonis** قَرْنُ آمُون؛ الْحَصِين. أنظر hippocampus.

**- c. anterius medullae spinalis (= c.**

**ventrale medullae spinalis)** الْقَرْنُ الْأَمَامِي لِلنُّخَاعِ.

**- c. dorsale medullae spinalis** الْقَرْنُ الظَّهْرِي لِلنُّخَاعِ. الثنية القرنية الشكل التي يكونها الحبل الظهري للنخاع الشوكي كما تشاهد في مقطعه العرضي.

**- c. frontale ventriculi lateralis** الْقَرْنُ الْجَنْبِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. قسم البطين الجانبي الذي يمتد للأمام من جزئه المركزي إلى الفص الجبهي للمخ.

**- c. inferius ventriculi lateralis (= c. temporale ventriculi lateralis)** الْقَرْنُ الْأَمَامِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. القرن الصدغي للبطين الجانبي.

**- c. laterale medullae spinalis** الْقَرْنُ الْوَحْشِي لِلنُّخَاعِ. البنية القرنية الشكل التي يكونها الحبل الوحشي للنخاع الشوكي كما تشاهد في مقطعه العرضي.

**- c. occipitale ventriculi lateralis** الْقَرْنُ الْقَذَالِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. قسم البطين الجانبي الذي يمتد للخلف من جزئه المركزي إلى الفص القذالي.

**- c. temporale ventriculi lateralis** الْقَرْنُ الصَّدْغِي لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. قسم البطين الجانبي الذي يمتد للأسفل وإلى الأمام من القسم المركزي خلف المهاد إلى الفص الصدغي.

**- c. ventrale medullae spinalis** الْقَرْنُ الْبُطْنِي لِلنُّخَاعِ. البنية القرنية الشكل التي يكونها الحبل البطني للنخاع الشوكي كما تشاهد في مقطعه العرضي.

**corona** تَاج؛ إِكْلِيل. بروز إكليلي الشكل يحيط ببنية تشريحية.

**- c. radiata** الْإِكْلِيلُ الْمُتَشَعِّع. الألياف الإسقاطية المتشعبة والمارة من المحفظة الباطنة إلى كل أنحاء القشرة المخية.

**corpus** جِسْم. (ج: أَجْسَام). كتلة معزولة من مادة أو من نسيج متخصص.

**- amygdaloideum** الْجِسْمُ الْوَلَوِي. معقد بيضوي صغير من مجموعة من النوى مغطى جزئياً بالقشرة الكثرية الشكل ضمن ذروة الفص الصدغي وأمام القرن السفلي للبطين الجانبي للدماغ وهو جزء من الجهاز الحوفي وله اتصال بالمراكز الشمية

وبالقشرة الحوفية ويرسل أليافاً إلى الحصين والحاجز والمهاد وخصوصاً إلى الوطاء.

#### - corpora bigemina (=optic bodies)

الجسمان التوأمان: الجسمان البصريان. جسمان في دماغ الحيوانات اللاشعورية وهما يناسبان الأكيمنين العلويتين للأجسام الرباعية في دماغ الثدييات. انظر corpora quadrigemina.

- c. callosum الجسم الثفني. كتلة مقوسة من المادة البيضاء توجد في أعماق الشق الطولاني تتكون من ألياف عرضانية تربط نصفي كرة المخ وتتكون من الأمام إلى الخلف من المنقار والركبة والجذع والرقادة.

- c. cerebelli جسم المخيخ. الجزء الرئيسي من المخيخ الذي يتكون من نصفي كرة المخيخ المتصلين بشريط ناصف، أي بالدودة.

- c. fornicis جسم القَبْو. القسم الوسطي من قَبْرِ المخ الذي يتكون من اندماج النصفين الجانبيين تحت الجسم الثفني.

- c. geniculatum laterale الجسم الزُكْبِيُّ الوَحْشِي. بارزة في المهاد التالي تكونها النواة الركبية الوحشية المدفونة تحتها وبالجبهة الوحشية من النواة الركبية الإنسية وتترحل فيها الدفعات العصبية البصرية لتمر إلى القشرة المهادية. تسمى أيضاً المهاد البصري.

- c. geniculatum mediale الجسم الزُكْبِيُّ الْإِنْسِي. بارزة في المهاد التالي تكونها النواة الركبية الإنسية المدفونة تحتها وبالجبهة الوحشية من الأكيمة العليا وتترحل فيها الدفعات العصبية السمعية لتمر إلى القشرة السمعية في المخ.

- c. hypothalamicum (=nucleus subthalamicus) جسم الوطاء. النواة تحت المهاد.

- c. interpedunculare (=nucleus interpeduncularis) النواة بَيْنَ السُويَقَتَيْن.

- c. Luysii (=nucleus subthalamicus) النواة تَحْتَ الْمِهَاد.

- c. mamillare الجسم الحُلَيْمِي. إحدى الكتلتين الكرويتين الصغيرتين الموجودتين بالقرب من بعضهما في الحيز بين السويقتين أمام المادة المثقبة الخلفية في المنطقة الوطائية الخلفية وتتكون كل

واحدة منهما من نواتين رئيسيتين إنسية ووحشية وتجمعات صغيرة من المادة السنجابية.

- c. medullare cerebelli لُبُّ الْمَخِيخ. المادة البيضاء في المخيخ.

- c. medullare vermis (=arbor vitae) شَجَرَةُ الْحَيَاةِ الْمَخِيخِيَّة.

- c. nuclei caudati جسمُ النَوَاةِ الْمَذْنَبَةِ. قسم النواة المذنبة التي تقع في الجزء المركزي من البطين الجانبي للدماغ وتمتد من الرأس إلى الخلف حتى تستمر مع ذنب النواة المذنبة.

- c. pineale الجسمُ الصَّنُوبِي. جسم مخروطي مسطح صغير في فوق المهادي يقع فوق الأكيمة العلوية وتحت رقادة الجسم الثفني.

- c. pyramidale medullae (=pyramis هَرْمُ الْبَصَلَةِ: هَرْمُ النَخَاعِ الْمُسْتَطِيل.

- corpora quadrigemina الْأَجْسَامُ الرَّبَاعِيَّة. الأكيمة القحفية والمذنبة لسقف الدماغ المتوسط مجتمعة.

- c. restiforme (=pedunculus cerebellaris caudalis) السُويْقَةُ الْمَخِيخِيَّةُ الْمَذْنَبِيَّة.

- c. rhomboidale (=nucleus dentatus) النَوَاةُ الْمُسَنَّنَةُ. الجسم المعيني.

- c. striatum الجسمُ الْمُخَطَّط. أحد مكونات النوى القاعدية وهو جسم مكون من مادة سنجابية ومادة بيضاء تحت قشرة المخ وأمام وعلى الجهة الوحشية للمهاد في كل من نصفي كرة المخ. وتترتب المادة السنجابية فيه في كتلتين رئيسيتين: النواة المذنبة والنواة العدسية. أما المظهر المخطط للجسم الذي يظهر في مقطعه فتولده أشرطة تربط المادة السنجابية وتمر من إحدى النواتين إلى النواة الأخرى خلال المادة البيضاء للمحفظة الداخلية.

- c. subthalamicum (=nucleus subthalamicus) النَوَاةُ تَحْتَ الْمِهَاد.

- c. trapezoideum الجسمُ الْمُخَحَرَفِي. كتلة من ألياف مستعرضة تمتد خلال القسم المركزي للجسر مكونة جزءاً من سبيل العصب القوقعي.

- c. vitreum الجسمُ الرَّجَاجِي. المادة الشفافة التي تملأ قسم العين الذي يقع بين العدسة والشبكية.

1. جُسَيْمٌ. (ج: جُسَيْمَات).  
2. كَرْيَةٌ. (ج: كَرَيَات). كتلة صغيرة أو جسم صغير.

- Alzheimer's c's. جُسَيْمَاتُ آلزهايمر. جسيمات حبيبية مركبة توجد في الخلايا الدبقية القليلة التغصن في الدماغ.

- axile c. (=axis c.) جُسَيْمٌ مَخَوْرِي. القسم المركزي من الجسم للمسّي.

- Dogiel's c. جُسَيْمٌ تَنَاسُلِيّ: جُسَيْمٌ دُوْجِيل. عضو انتهائي حسي مغلف يوجد في الأغشية المخاطية للأعضاء والأعضاء التناسلية وفي الجلد حول حلمة الثدي.

- Golgi's c's. جُسَيْمَاتُ غُولْجِي. أعضاء انتهائية مكينة توجد في أوتار العضلات في منطقة اتصالها بالألياف العضلية وهي تنقل حَسَّ تَغْيِيرَات التوتّر العضلي إلى الألياف العصبية الحسية التي تتصل بها.

- Golgi-Mazzoni c's. جُسَيْمَاتُ غُولْجِي مَارْزُونِي. جسيمات لمسية توجد في الأنسجة تحت الجلدية لنهايات الأصابع وتشبه جسيمات باسيني ولكن لها صفائح أقل ومخروط أكبر نسبياً وفيها ليف عصبي كثير التفرع.

- Krause's c's. (=corpuscula bulboidea) جسيمات بصلية الشكل: جُسَيْمَاتُ كراوْزَة. نهايات عصبية صغيرة مغلفة ومكينة توجد في الجلد والأغشية المخاطية والملتحمة والقلب، وهي تعمل كمستقبلات حرارية سريعة التكيف.

- lingual c. جُسَيْمٌ لِسَانِيّ. نهاية عصبية حسية مكينة توجد في الحليمات الذوقية.

- Mazzoni's c's. (=corpuscula bulboidea) جُسَيْمَاتُ مَارْزُونِي. نهايات عصبية حسية تشبه جسيمات كراوْزَة.

- Meissner's c's. (=corpuscula tactus) جُسَيْمَاتُ مَيْسْنِر. نهايات عصبية حسية مكينة متوسطة الحجم توجد في الجلد وخاصة في راحة اليد وأخمص القدم وهي نهايات عصبية لمسية.

- Merkel's c's. (=menisci tactus) جُسَيْمَاتُ مِرْكَل. نهايات عصبية حسية كاسية الشكل توجد في الجلد والكثير منها يتكون من فروع ليف عصبي واحد ويتلامس كل واحد منها بخلية ظهارية

محورة. وهي توجد في البشرة العميقة وفي جريبات الشعر وفي الحنك العظمي حيث تعمل كمستقبلات لمسية.

- nerve c's. جُسَيْمَاتُ الْعَصَب. خلايا الغمد التي توجد بين غمد الليف العصبي والغمد النخاعيني.

- Pacini's c's. (=pacinian c's.) جُسَيْمَاتُ بَاسِينِي. نهايات عصبية ذات صفائح متخصصة باستقبال منبهات الضغط.

- Purkinje's c's. خَلَايَا بَرْكِنْجِي. انظر Purkinje's cells.

- Ruffini's c's. جُسَيْمَاتُ رُوفِينِي. نهايات عصبية ذات صفائح متخصصة بحس الحرارة والضغط.

- Schwalbe's c. جُسَيْمٌ شَفَالْبَة. انظر caliculus gustatorius.

- tactile c. (= corpusculum tactus) جُسَيْمٌ لَمْسِيّ. انظر Meissner's c.

- taste c. (= taste cell) جُسَيْمٌ ذَوْقِيّ. خلية ذوقية.

- Timofeev's c's. جُسَيْمَاتُ تِيْمُوفِيُو. نوع من جسيمات باسيني المتخصصة التي توجد تحت مخاطية القسمين البروستاتي والغشائي للإحليل.

- touch c's. (= tactile c's.) جُسَيْمَاتُ لَمْسِيَّة.

- Wagner's c's. (= tactile c's.) جُسَيْمَاتُ وَاغْنِر. لَمْسِيَّة.

جُسَيْمَات. جمع جُسَيْم.

جُسَيْمٌ (= corpuscle) (ج: جُسَيْمَات).

cortex قَشْرَة. الطبقة الخارجية للعضو أو للبنية الجسدية.

- agranular c. القَشْرَة الْأَمْحَبِيَّة. منطقة مخية تكون فيها الطبقتان الحبيبتان الثانية والرابعة صغيرتين نسبياً كما هو الحال في التلفيف أمام المركزي.


- association c. قَشْرَة تَرَابُطِيَّة. القشرة الترابطية العامة في المخ أو في المناطق القشرية الترابطية الخاصة بالقشرة الترابطية البصرية.

- auditory c. القَشْرَة السَّمْعِيَّة. منطقة




التلفيف الصدغي العلوي في الإنسان (باحثاً برودمان 41 و 42) التي تستقبل الإسقاط القوقعي خلال الجسم الركبي الإنسي وهي منطقة حسية سمعية

- calcarine c. (= area striata): الباحة المخططة: القشرة المَهْمَازِيَّة.
- cerebellar c. القشرة المَخَيخِيَّة. الطبقة السنجابية السطحية للمخيخ.



cortex, cerebral

رسم يبين الباحات الحسية والحركية في قشرة المخ أمام وخلف الشق المركزي.



رسم تخطيطي للقشرة الحركية للمخ يمثل مختلف مناطق الحركية ودرجات تمثيلها وتمثيل عضلات اقسامها المختلفة.

- **cerebral c.** القشرة المخية. الطبقة الرقيقة من المادة السنجابية التي تغطي سطح نصفي كرة المخ والتي تنطوي فتولد التلافيف المفصولة عن بعضها البعض بالاتلام. وتصل أعلى مراحل تطورها في الإنسان فهي المسؤولة عن الوظائف العقلية العليا والوظائف الحركية والحسية والحشوية والإدراك والسلوك وترابط هذه الفعاليات وتنسيقها.
- **entorhinal c.** القشرة الشمية الداخلية. الساحة القشرية (الباحة 28) الموجودة بين التكوين الحصيني والقشرة الجديدة والمتصلة بالباحة المخططة. وهي مصدر معظم الألياف التي تصل الحصين.
- **frontal premotor c.** القشرة الجبهية أمام الحركة. الباحة الحركية رقم 6

- **heterotypical c. (= archaeocortex)** القشرة الأدمغية: القشرة البدائية.
- **homotypical c.** القشرة النمطية. قسم القشرة المخية الذي يحوي الطبقات النمطية الست الخاصة بقشرة المخ.
- **nonolfactory c. (= neopallium)** القشرة الجديدة: القشرة الأدمغية.
- **olfactory c. (= archaeocortex)** القشرة البدائية: القشرة الشمية.
- **piriform c.** قشرة الكمثري الشكل. القشرة التي تغطي الفص أو الباحة الكمثرية الشكل.
- **somesthetic c. (= somatosensory area)** القشرة الحسية الجسدية.

- **striate c.** القَشْرَةُ المَخْطَطَةُ. القشرة البصرية الأولية. وهي قسم من قشرة الفص القذالي يستلم الشع البصري من الجسم الثقني الوحشي وهي مركز الحس البصري الأولي.

- **visual c.** القَشْرَةُ البَصَرِيَّة. باحة الفص القذالي المسؤولة عن حس البصر وتتكون من القشرة البصرية الأولية (باحة برودمان 17) والباحتين البصريتين الثانويتين (18 و 19).

**cortical** قَشْرِيّ. متعلق بالقشرة أو منسوب لها.

**corticifugal** صادر من القشرة. ينقل أو يتجه بعيداً عن القشرة.

**corticipetal** وارد للقشرة. ينقل أو يتجه نحو القشرة.

**corticoafferent** وَارِدٌ لِلْقَشْرَةِ. ما ينقل الدفوعات العصبية من المستويات السفلية للجهاز العصبي المركزي نحو قشرة المخ.

**corticobulbar** قَشْرِيّ بَصَلِيّ. منسوب إلى قشرة المخ والنخاع المستطيل أو يربط بينهما.

**corticocerebral** قَشْرِيّ مَخِيّ. منسوب لقشرة المخ.

**corticodiencephalic** قَشْرِيّ دِمَاعِيّ بَيْنِيّ. منسوب لقشرة المخ والدماع البيني أو يربط بينهما.

**corticoefferent** صَادِرٌ مِنَ الْقَشْرَةِ. ما ينقل الدفوعات العصبية من قشرة المخ إلى المراكز السفلية من الجهاز العصبي المركزي.

**corticopontine** قَشْرِيّ جِسْرِيّ. منسوب لقشرة المخ والجسر أو يوصل بينهما.

**corticospinal** قَشْرِيّ نَخَاعِيّ. منسوب لقشرة المخ والنخاع الشوكي أو يوصل بينهما.

**costa cervicalis (= rib, cervical)** الضِّلْعُ الرِّقَبِيَّة.

**costalgia** أَلَمُ الْأَضْلَاع. ألم في الأضلاع.

**coup (= stroke)** ضَرْبَةٌ.

- **c. de fouet** ضَرْبَةٌ الْأَخْمَص. تمزق العضلة الاخمصية مع المها الشديد.

- **c. de sang** ضَرْبَةٌ إِحْتِقَانِيَّة. احتقان الدماغ.

- **c. de soleil (= sunstroke)** ضَرْبَةُ الشَّمْس. وَرَاك. ألم في منطقة الورك.

**coxalgia** وَرَاك. وجع الورك.

**coxodynia (= coxalgia)** وَرَاك. وجع الورك.

**cramp** مَقْصَص. تقلص عضلي تشنجي مؤلم وخصوصاً التشنج التوتري.

- **accessory c.** مَقْصَصُ الْإِضَافِيّ. صَغَرٌ تولده آفة العصب الإضافي.

- **heat c.** مَقْصَصُ الْحَرِّ. نوع من إنهك الحر يتصف بتشنج عضلي مؤلم مع توسع الحدقة وضعف النبض ويشاهد في العمال الذين يعملون في جو حار جداً أو في المناجم مع التعرق الشديد وفقدان الأملاح.

- **muscle c.** مَقْصَصُ عَضَلِيّ. تقلص فجائي لإرادي لمجموعة من الألياف العضلية مع ألم موضعي شديد يتلو ارتخاء بطيء ثم يزول الألم. وهو ينتج عن تعب العضلة أو إقفارها أو نقص الملح.

- **nocturnal c.** مَقْصَصٌ لَيْلِيّ. معص يحدث أثناء الليل وغالباً أثناء النوم.

- **occupational c.** مَقْصَصٌ مِهْنِيّ. تشنج مؤلم في بعض العضلات التي تقوم بحركات مهنية معينة كمعص الموسيقيين أو الكتاب أثناء قيامهم بأعمالهم وحركاتهم.

- **recumbency c.** مَقْصَصُ الْإِسْتِقَاء. تشنج مؤلم في عضلات القدم والساق يحدث أثناء الراحة والاستلقاء وغالباً ما يحدث أثناء النوم الخفيف.

- **writer's c.** مَقْصَصُ الْكَاتِب. تشنج عضلات اليد عند استعمالها بالكتابة لمدة طويلة.

**craniad** نَحْوُ الْقَحْف؛ قَحْفِيًّا. متجه نحو القحف.

**cranial** قَحْفِيّ. متعلق بالقحف أو منسوب إليه.

**craniamphitomy** قَطْعُ مَحَاطِ الْقَحْف. قطع محيط القحف لتخفيف الضغط عن داخله.

**craniectomy** قَطْعُ الْقَحْف. قطع جزء من القحف.

**craniocoele** قَبِيلَةٌ قَحْفِيَّة. بروز أي قسم من محتويات القحف خلال عيب في أحد أقسامه.

- cranioclasia (= craniotomy)** شَذْحُ القَْخْفِ.
- cranioclast (= craniotome)** مَشْدَاخٌ؛ مَحْجَاجٌ. آلةٌ جراحيةٌ لحجِّ القحف.
- cranioclasty (= craniotomy)** حَجُّ القَْخْفِ؛ شَذْحُ القَْخْفِ.
- craniograph** مِصْصَافُ القَْخْفِ. آلةٌ لتعيين حدود القحف وأبعاده.
- craniography** تَوْصِيفُ القَْخْفِ. تصوير القحف أو تخطيطه أو رسمه.
- craniomalacia** تَلَيُّنُ القَْخْفِ. تلين القحف الشاذ.
- craniomeningocele** قَيْلَةٌ سَحَائِيَّةٌ قَحْفِيَّةٌ. بروز السحايا من خلال عيب في جدار القحف.
- craniometer** مِقياسُ الجُمُجْمَةِ. آلةٌ تستعمل لقياس أبعاد الجمجمة.
- craniometry** قِيَاسُ الجُمُجْمَةِ. قياس أبعاد الجمجمة والوجه.
- craniopathy** اِغْتِلَالُ الجُمُجْمَةِ. أي مرض يصيب الجمجمة.
- metabolic c.** اِغْتِلَالُ الجُمُجْمَةِ اِستِغْلَابِيٌّ. مرض يتصف بأفات قبة القحف مع تغييرات استقلابية متعددة فيها يولد الصداع والسمنة واضطرابات البصر.
- craniopharyngioma** وَرَمٌ قَحْفِيٌّ بَلْعُومِيٌّ. ورم يتولد من البقية الأثرية للجراب القحفي البلعومي (جراب راتكة) والذي يتصف بارتفاع ضغط داخل القحف مع ترسب كلسيومي في محفظته أو في داخله ويسبب تخريباً موضعياً ولكنه لا ينتقل إلى باقي أقسام الرأس أو الجسم.
- craniophore** مَاسِكُ القَْخْفِ. آلةٌ تستعمل لمسك القحف وتثبيتها عند قياسه.
- cranioplasty** رَأْبُ القَْخْفِ. عمليةٌ تجرى لرأب القحف أو تقويم أي عيب فيه.
- craniopuncture** بَزْلُ القَْخْفِ. عمليةٌ بزل القحف.
- craniorachischisis** اِنْشِقَاقُ القَْخْفِ.
- والسيساء. شق خلقي في القحف والعمود الفقري.
- cranosacral** قَحْفِيٌّ عَجَزِيٌّ. 1. منسوب للقحف والعجز. 2. منسوب للأعصاب اللاودية.
- cranioschisis** اِنْشِقَاقُ القَْخْفِ. شق خلقي في القحف.
- craniosclerosis** تَصَلُّبُ القَْخْفِ. ثَخَنُ عظام القحف.
- cranioscopy** تَنْظِيرُ القَْخْفِ. تنظير الرأس لتشخيص أمراضه.
- craniostenosis** تَضْيِيقُ القَْخْفِ. تشوه القحف الذي ينتج عن تعظم التداريز المبكر فيتوقف نموه ويتضيق.
- craniostosis** تَعَطُّمُ الدُّرُوزِ الخَلْقِيِّ. تعظم الدُّرُوزِ الولادي.
- craniosynostosis** تَعَطُّمُ الدُّرُوزِ البَاكِرِ. تعظم دُرُوزِ القحف المبكر.
- craniotabes** ضُمُورُ القَْخْفِ. ضمور القحف وتلينه الشاذ بسبب نقص مواده اللاعضوية (المعدنية) ويحدث هذا الضمور عادة في المنطقتين القفوية والجدارية.
- craniotome** مَحْجَاجٌ. آلةٌ تستعمل لقطع القحف.
- craniotomy** حَجُّ القَْخْفِ. 1. أية عملية جراحية تجرى في القحف. 2. عملية تجرى على رأس الجنين الميت لتصغيره ولتسهيل ولادته وذلك ببزل القحف وإفراغ محتوياته.
- craniotonoscopy** تَنْظِيرُ القَْخْفِ التَّسْمُعيِّ. قرع القحف والتسمع إليه بالسماعة.
- craniotopography** طُوبُوغَرَفِيَّةُ القَْخْفِ. دراسة أقسام سطح القحف وعلاقة كل منها بأقسام الدماغ التي تحته في داخل القحف.
- craniotrypsis** نَقَبُ القَْخْفِ. نقب القحف جراحياً.
- cranitis** اِلْتِهَابُ القَْخْفِ. التهاب عظام القحف.
- cranium** القَْخْفُ؛ الجُمُجْمَةُ. الهيكل العظمي للرأس ويشمل كل عظام الجمجمة ما عدا الفك السفلي وهي العظام الثمانية التي تكون قبة القحف الذي يحوي الدماغ.

**c. bifidum** قُفْ مَشْقُوق. فُح القحف الخلفي الظاهر.

**c. bifidum occultum** قُفْ مَشْقُوق خَفِي. فُح القحف الخلفي الخفي من دون أن يرافقه أي تشوه في الدماغ أو السحايا ولا يمكن مشاهدته إلا بالتصوير الشعاعي.

**cerebral c.** القُفْ الدِمَاعي. قسم القحف الذي يكون الصندوق الذي يحوي الدماغ.

**visceral c.** الجُمُجُمَةُ الحَشَوِيَّةُ: عظام الوجه. أقسام عظام الرأس التي تكون الهيكل العظمي للوجه وهي تشمل أيضاً الفك السفلي والعظم اللامي.

**cremnophobia** رُهاب المهاري. رهاب المهاري والوديان والمرتفعات.

**crenotherapy** المُعالِجَةُ بالمِياهِ المُعدِنِيَّةِ. معالجة بالمياه المعدنية من الينابيع.

**crest (= crista)** عُرْف. بروز أو بنية بارزة أو حرف بارز خصوصاً ذلك الذي يبرز من العظم أو من حوافه.

**cretinism** قَدَامَةٌ. حالة مزمنة تنتج عن نقص خلقي في إفراز الغدة الدرقية وتتصف بتوقف النمو الجسمي والعقلي الشديد وحثل العظام والأقسام الرخوة وهبوط سرعة الاستقلاب الأساسي.

**cribriform** مُصَفَوِي الشَّكْلِ. مثقَّب وبشكل مصفاة.

**cricoidynia** وَجَعُ الغُضُرُوفِ الحَلِقي. ألم في الغضروف الحلقي.

**crisis** نَوْبَةٌ. 1. تغير مفاجيء في تطور المرض. 2. تردُّ انتيابي مفاجيء في أعراض المرض.

**catathymic c.** نَوْبَةُ هِياجِ نَفْسِي. نوبة هياج عنيف تتولد عن توتر نفسي غير محتمل.

**cholinergic c.** نَوْبَةُ كُولِينِيَّةِ الفِعْلِ. وهن عضلي يتولد عن إحصار بزوال الاستقطاب بسبب فرط جرعة مضاد الكوليستيراز المستعمل في معالجة الوهن العضلي الوبيل.

**clitoris c.** نَوْبَةُ بَظْرِيَّة. نوبة هياج جنسي تتولد عند النساء المصابات بالتابس الظهري.

**laryngeal c.** نَوْبَةُ حَنَجْرِيَّة. تشنج انتيابي في

الحنجرة في المراحل الأولى من مرض التابس الظهري.

**myosthenic c.** نوبة ضيق. نوبة فجائية تتولد في الوهن العضلي الوبيل وتستمر النوبة عدة أيام مع حمى.

**oculogyric c.** نَوْبَةُ ثَبَاتِ المُقَلَّة. نوبة تحدث في التهاب الدماغ الوبائي أو في الباركنسونية التالية لالتهاب الدماغ حيث تثبت العينان في وضع ثابت واحد لمدة دقائق أو ساعات.

**parkinsonian c.** نَوْبَةُ بَارِكِنْسُونِيَّة. حالة تشاهد أحياناً في داء باركنسون تشبه الصُّمات اللاحركي أو السبات السهري حيث يرقد المريض من دون حركة ومن دون أي تواصل تلقائي مع محيطه.

**Pel's c's.** نَوْبَاتُ بِل. نوبات ألم عيني شديد ومفاجيء في التابس الظهري.

**pharyngeal c.** نَوْبَةُ بُلْعُومِيَّة. نوبة مفاجئة تحدث في التابس الظهري تتصف بحس غريب في البلعوم مع حركات بلعية تلقائية.

**rectal c.** نَوْبَةُ مُسْتَقِيمِيَّة. نوبة ألم شديد في المستقيم في التابس الظهري.

**renal c.** نَوْبَةُ كَلَوِيَّة. نوبة ألم كلوي شبيه بالمغص الكلوي تحدث في التابس الظهري.

**tabetic c.** نَوْبَةُ تَابِسِيَّة. نوبة انتيابية من الألم مع اضطراب وظيفي تحدث في التابس الظهري.

**vesical c.** نَوْبَةُ مُثَانِيَّة. نوبة ألم مثاني شديد في مرض التابس الظهري.

**visceral c.** نَوْبَةُ حَشَوِيَّة. نوبة ألم برقي حاد في أحد الأعضاء في التابس الظهري.

**crispation** إِكْتِرَاز. تقلصات عضلية تشنجية أو اختلاجية بسيطة تولد إحساساً زاحقاً.

**crista (= crest)** عُرْف.

**crus** ساق: سَوِيْقَة. اسم عام يدل على بنية شبيهة بالساق.

**c. cerebelli ad pontem (= pedunculus cerebellaris medius)** السَوِيْقَةُ المُخَيَّجِيَّة الوَسْطِيَّة.

**c. cerebri (= basis pedunculi cerebri)** قَاعِدَةُ سَوِيْقَةِ المُخ.

**- c. fornicis** سَوِيْقَةُ الْقَبْو. أحد شريطي المادة البيضاء اللذين يتحدان ليكونا جسم القبر

**cry** صَرْخَةٌ. تصويت حنجري عالٍ لإرادي ومفاجئ.

**- epileptic c.** صَرْخَةُ الصَّرْع. صرخة عالية تطلق غالباً عند بدء نوبة الصرع.

**- hydrocephalic c.** صَرْخَةُ مَوْه الرُّأْس. صرخة عالية يطلقها الطفل المصاب بالتهاب السحايا التدريجي الحاد.

**cryalgnesia** أَلَمُ التَّبَرِيد. ألم يتولد عند وضع مادة باردة على الجسم.

**cryanesthesia** فَقْدَانُ حِسِّ البُرُودَةِ. خدر قري أو فقدان الحس للبرودة.

**cryesthesia** فَرْطُ حَسَّاسِيَّةِ البُرْد. فرط حس البرودة الشاذ.

**crymoanesthesia** التَّخْيِيجُ القَرِيّ. أنظر anesthesia, refrigeration.

**crymodynia** أَلَمُ التَّبَرِيد. ألم روماتزمي يظهر عند التعرض للبرد أو للرطوبة.

**cryotherapy (= cryotherapy)** مُعَالَجَةٌ قَرِيَّة.

**cryoanalgesia** تَسْكِينٌ قَرِيّ. تسكين الألم باستعمال التبريد للأعصاب المحيطية بواسطة مسبار قري.

**cryoprobe** مِسْبَارٌ قَرِيّ. آلة تستعمل لتطبيق البرودة الشديدة على الأنسجة.

**cryosurgery** جِرَاحَةٌ قَرِيَّة. تدمير الأنسجة جراحياً باستعمال البرودة الشديدة التي تستعمل أحياناً في داخل القحف.

**cryothalamectomy (= cryo-thalamotomy)** قَطْعُ المِهَادِ القَرِيّ.

**cryothalamotomy** قَطْعُ المِهَادِ القَرِيّ. قطع جزء من المهاد باستعمال البرودة الشديدة.

**cryptanamnesia (= cryptomnesia)** تَذَكُّرُ الخَفَايَا.

**cryptesthesia (= clairvoyance)** الإِسْتَبْصَارُ؛ إِذْرَاكُ الخَفَايَا.

**cryptic** خَبِيثِيّ. مخبا أو خفي.

**cryptogenic** خَفِيّ المَنْشَأ. غير معروف أو مشكوك أو مجهول المنشأ أو السبب.

**cryptomnesia** تَذَكُّرُ الخَفَايَا. تذكر الذكريات من دون معرفة أصولها القديمة فتظهر للشخص كأنها أفكار مختلفة وليست ذكريات حقيقية قديمة.

**cryptophthalmos** إَخْتِبَاءُ العَيْن. سوء تكون الجلد فوق العين وغياب الشق الجفني وهو عيب خلقي لا يظهر فيه أي أثر لتكون الجفنين.

**CSF (= fluid, cerebrospinal)** السَّائِلُ الدِّمَاغِيّ النُّخَاعِيّ.

**cubitus (= elbow)** المِرْفَق. المفصل الذي يفصل العضد عن الساعد.

**- c. valgus** مِرْفَقٌ أَرْوَح. تشوه المرفق الذي يؤدي إلى انحرافه بعيداً عن الخط الوسطي للجسم عند بسط الذراع عندما تكون راحة الكف متجهة للأمام.

**- c. varus** مِرْفَقٌ أَفْحَج. تشوه المرفق الذي يؤدي إلى انحرافه نحو الخط الوسطي للجسم عند بسط الذراع عندما تكون راحة الكف متجهة للأمام.

**cul de sac, dural** رَذِيَّةُ الجَافِيَّة. القسم الانتهائي من كيس الجافية.

**culmen** قُنَّة. قمة أو ذروة.

**- c. cerebelli** قُنَّةُ المُخَيخ. جزء الفص الرأسي للمخيخ الذي يقع بالجهة الإنسية بين الفصيص المركزي والشق الأولي.

**cuneus** الإِسْفِين. فصيص إسفيني الشكل في الفص القذالي للمخ وعلى جهته الإنسية بين التلمين الجداري القذالي والمهمازي.

**curare (= curari)** كُورَارِي. مادة تستخلص من بعض النباتات كانت تستعمل كسم للسهم أما الآن فإنها تستعمل كدواء لتقليل التشنج في الكزاز وفي الشلل التشنجي والحالات المشابهة. وتستعمل كذلك مع بعض المبنجات لتقليل توتر العضلات في التبنج العام.

**curaremimetic** مُحَاكِي الْفِعْلِ الْكُورَارِي. مادة تولد تأثيراً مماثلاً لعمل الكوراري.

**curariform** شَبِيهُ الْكُورَارِي. مادة شبيهة بالكوراري.

**curarization** كُورَزَة. إدخال الكوراري للجسم وإشباعه للحد الذي يولد تأثيره الفيزيولوجي فيه.

**current** تَيَّار. 1. الجريان الكهربائي في السلك أو المجري الموصل له 2. أية مادة تجري.

**- abnerval c.** تَيَّارُ عَصَبِيٍّ مُعْشَأ. تيار يمر من الليف العصبي إلى العضلة وخلالها.

**- action c.** تَيَّارُ الْفِعْلِ. التيار الذي يولده جهد الفعل في غشاء الخلية العصبية أو العضلية والذي يعمل على إزالة استقطاب المناطق المجاورة فينبهها وبهذا يعمل على جريان الدفعة العصبية أو العضلية على طول الليف.

**- electrotonic c.** تَيَّارُ التَّوَثُّرِ الْكَهْرَبَائِي. تيار يولده تيار آخر أو جهد الفعل في عصب مجاور يمر خلال القسم الموصل للعصب.

**- c. of injury** تَيَّارُ الْإِصَابَةِ. التيار الذي يمر بين المناطق المصابة والمزالة الاستقطاب من الأنسجة الهیوجة إلى الأنسجة السوية المستقطبة وتكون الأنسجة المصابة في هذه الحالة سالبة بالنسبة للأنسجة السليمة.

**- nerve-action c. (= action c.)** تَيَّارُ الْفِعْلِ الْعَصَبِيِّ.

**curve** مُنْحَنِي. خط لازاوي.

**- audibility c.** مُنْحَنِي الْمَسْمُوعِيَّة. منحني يبين العلاقة بين ذبذبات الصوت وأقل شدة لها تولد حساً سمعياً.

**- strength-duration c.** مُنْحَنِي الشَّدَّة - المُدَّة. منحني يبين العلاقة بين شدة المنبه وأقل مدة لازمة له لكي يولد استجابة من العضو أو النسيج المستثار.

**cycle** دَوْرَة. عمليات أو ظواهر متتالية تعاود في فترات منتظمة وبنفس التتالي.

**- estrous c.** دَوْرَة الْوَدَاق. دورة معاودة الوداق في الإناث البالغات والتغيرات التي ترافقها في الجهاز التناسلي.

**- sleep-wakefulness c.** دَوْرَة النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ. دورة النوم واليقظة في اليوم الواحد والتي تختلف باختلاف الأعمار.

**cyclobarbital** سَيْكْلُو بَارْبِيْتَال. دواء من مجموعة الباربيتورات، قصير الفعل، يستعمل كمخدر عن طريق الفم.

**cyclocephalus (= cyclops)** مُصَقِّلِبُ الرَّأْس. مصاب بتصلب الرأس.

**cyclocephaly** تَصَقِّلِبُ الرَّأْس. عامة خلقية شاذة تتصف باندماج العينين ونصفي كرة المخ.

**cycloid** دَوْرِي الْمَزَاج. مصاب يتصف بتعاقب حالاته النفسية المتباينة من الكآبة التي يعقبها الهياج وهي حالة أخف من الذهان الهوسي الاكتئابي.

**cyclopia (= cyclocephaly)** تَصَقِّلِبُ الرَّأْس.

**cyclothymia** دَوْرِيَّة الْمَزَاج. حالة تتصف بشذوذ المزاج وتتصف بفترات كآبة تتعاقب مع فترات هوس خفيف.

**cyclothymic** دَوْرَوِي الْمَزَاج. مصاب بدورية المزاج.

**cymbocephalia (= scaphocephaly)** تَرَوُزُقُ الرَّأْس.

**cynocephalic** كَلْبِي الرَّأْس. له رأس شبيه برأس الكلب.

**cynophobia** رُهَابُ الْكَلَاب. الخوف من الكلاب.

**cyst** كَيْسَة. (ج: كيسات). كيس مغلق طبيعي أو شاذ مبطن ببطانة ويحوي سائلاً خفيفاً أو كثيفاً أو نصف صلب.

**- arachnoid c.** كَيْسَة الْعَنْكَبُوتِيَّة. كيسة مليئة بالسائل بين طبقات السحايا الرقيقة ومبطنة بغشاء العنكبوتية وتوجد غالباً في شق سلفيان في المخ.

**- hydatid c.** كَيْسَة عُذَارِيَّة. مرحلة الكيسة اليرقية للدودة الشريطية للمشوكة الشريطية وتحوي الكيسة كيسيئات ثانوية تحوي كل منها عدة رويسات، ويمكن

أن تتوضع هذه الكيسات في عدة مواضع أو أعضاء في الجسم وفي الجهاز العصبي المركزي أو في القحف.

- **neural c.** كَيْسَةُ عَصَبِيَّة. كيسة أو بنية شبيهة بها تتوضع في الجهاز العصبي المركزي.
- **neurenteric c.** كَيْسَةُ عَصَبِيَّة خَشَوِيَّة. كيسة تتوضع في المنصف الخلفي تحوي أنسجة من الجهاز العصبي ومن أعضاء أخرى وتتصل بالأم الجافية للنخاع.
- **perineurial c.** كَيْسَةُ ظَهْرَانِيَّة الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة. بروز كيسي من الحيز حول الحزمة العصبية وعلى الجزء خارج الجافية من الجذور الخلفية للأعصاب العجزية والعصعصية عند منطقة اتصال الجذور بالعقد وقد تؤدي إلى ألم أسفل الظهر أو عرق النساء

**cystalgia** أَلَمُ المَثَانَةِ. ألم في المثانة.

**cysticercosis** دَاءُ الكَيْسَانِيَّاتِ المَذْنُبَةِ.

الإصابة بالكيسانيات المذنبة حيث تخترق يرقاتها جدار الأمعاء وتهاجم مختلف أنسجة الجسم وأعضائه ومنها العين والدماغ فتولد الصرع وارتفاع الضغط داخل القحف والكثير من الأعراض العصبية الأخرى.

**cystoplegia** شَلْلُ المَثَانَةِ.

**cystospasm** تَشَنُّجُ المَثَانَةِ.

**cytoarchitecture** التَّهْنِيسُ الخَلَوِي.

تنظيم وترتيب الخلايا المختلفة في العضو وخصوصاً خلايا قشرة المخ.



# D

**dacryadenalgia (= dacryoadenalgia)**

أَلَمُ الغَدَّةِ الدُّمْعِيَّةِ.

**dacryocystalgia** أَلَمُ كَيْسِ الدَّمْعِ؛ أَلَمُ المَدْمَعِ.

**dactylocampsodynia** ثَنِي الأَصَابِعِ المؤَلِمِ.

**dactylogy** التَّوَاصُلُ بِإِشَارَاتِ اليَدِ. استعمال حركات الأصابع واليدين كواسطة للتواصل والتفاهم مع الآخرين.

**dactylophasia (= dactylology)**

التَّخَاطُبُ بالأَصَابِعِ.

**dactylospasm** تَشَنُّجُ الإِصْبَعِ. تشنج أو مغص أحد أصابع اليد أو القدم.

**dantrolene** دَانْتْرُولِين. دواء يستعمل كمرخٍ للعضلات الهيكلية وكمضاد للتشنج في الصدمات والتصلب المتعدد والشلل المخي.

**deaf** أَصَمٌّ. (ج: صُمٌّ). مصاب بالصمم أي معدوم السمع أو ثقيله.

**deafferntation** تَغْطِيلُ الوَاردِ. حصر الدفعات العصبية الواردة بقطع الأعصاب الحسية.

**deaf-mute** أَكْبَمٌ. (ج: بُكْمٌ). شخص لا يتمكن من السمع أو الكلام.

**deaf-mutism** بُكْمٌ. فقدان حاسة السمع مع عدم المقدرة على الكلام.

**deafness** صَمَمٌ. فقدان حاسة السمع.

**- acoustic trauma d.** صَمَمٌ الرُّضْحِ الصوتي. صمم يتولد عن الإصابة المولدة عن الانفجارات.

**- apoplectiform d.** صَمَمٌ سَكْنِي الشَّكْلِ. داء مايزر يبدأ فيه الصمم بصورة مفاجئة ثم تتموج شدته

حتى يشتد كثيراً ويؤدي في النهاية إلى الصمم التام الدائم.

**- bass d.** صَمَمٌ الجَّهْرِ. عدم سماع بعض الموجات الصوتية الواطئة النغمية.

**- boilermakers d.** صَمَمٌ صَانِعِي الغَلَايَاتِ. صمم يصيب العمال الذين يعملون في أمكنة ترتفع فيها شدة الضجيج كمعامل صنع الغلايات المعدنية.

**- central d.** صَمَمٌ مَرْكَزِيٌّ. صمم بسبب آفة في السبل العصبية السمعية المركزية.

**- conduction d.** صَمَمٌ النَّاقلِيَّةِ. صمم بسبب عيب في السبل الناقلة للصوت أي القناة السمعية الظاهرة والأذن الوسطى.

**- cortical d.** صَمَمٌ قَشْرِيٌّ. صمم تسببه آفة في المنطقة السمعية في القشرة المخية.

**- functional d.** صَمَمٌ وظيفي. صمم ظاهر من دون أية آفة عضوية.

**- hysterical d.** صَمَمٌ هِسْتِيرِيٌّ؛ صَمَمٌ هُراعيٌّ. صمم يظهر ويختفي في مريض هستيري من دون أي سبب واضح.

**- labyrinthine d.** صَمَمٌ بَيْهِيٌّ. صمم بسبب آفة في التيه.

**- Michel's d.** صَمَمٌ مَائِكِل. صمم خلقي بسبب عدم تخلق الأذن الداخلية.

**- midbrain d.** صَمَمٌ دِمَاعِيٍّ وَسَطِيٍّ. صمم بسبب آفة في السقيفة تصيب السبل السمعية.

**- nerve d. (= neural d.)** صَمَمٌ عَصْبِيٌّ. صمم بسبب آفة في العصب السمعي أو في السبل العصبية السمعية المركزية.

**- organic d.** صَمَمٌ عَضْوِيٌّ. صمم بسبب آفة عضوية في الأذن أو في الجهاز السمعي.

- paradoxical d.** صَمَمٌ مُتَنَاقِضٌ. صمم جزئي يكون فيه السمع أحسن بوجود الضجيج والصخب العالي.
- perceptive d. (= sensorineural d.)** صَمَمٌ الإِدْرَاك. صَمَمٌ يَبعْدُ التَّكَلُّمَ. صمم يتولد لدى الشخص بعد تعلمه التكلم.
- postlingual d.** صَمَمٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ. صمم يصيب الطفل خلقياً أو قبل تعلمه التكلم.
- prelingual d.** صَمَمٌ جِسْمِي عَصَبِي. صمم ينتج عن آفة في القسم الحسي السمعي في القوقعة أو في العصب السمعي أو في السبل السمعية المركزية أو في مجموعة من هذه الإصابات.
- tone d.** صَمَمٌ النَّعْم. انظر amusia, sensory.
- toxic d.** صَمَمٌ تَسَمِّي. صمم يتولد بالتسمم بإحدى المواد السامة.
- transmission d. (= conduction d.)** صَمَمٌ نَاقِلِي. صَمَمٌ وَعَائِي. صمم بسبب آفة الأوعية الدموية للأذن الداخلية.
- word d. (= auditory aphasia)** صَمَمٌ الكَلِمَات. نوع من الحبسة الإدراكية يسمع فيها المريض الكلمات بوضوح ولكنه لا يدرك مدلولاتها بسبب آفة في المراكز السمعية في المخ.
- death** مَوْتُ. توقف الوظائف الحيوية بصورة تامة وأبدية.
- apparent d.** مَوْتُ ظَاهِرِي. توقف الفعاليات الجسمية بصورة تامة ولكن بالإمكان إنعاش المريض وإعادة الحياة إليه.
- brain d.** مَوْتُ الدُّمَاع. عطب دماغي دائم غير عكوس يتصف بعدم الاستجابة التامة للمنبهات وغياب الفعاليات العضلية الإرادية والتلقائية وحتى التنفسية والارتعاشية وتساي الكهربية في المخطط الكهربائي للدماغ لمدة 30 دقيقة. ومن الضروري التأكد من أن ذلك كله غير ناتج عن تبريد الجسم أو عن مخمدات الجهاز العصبي المركزي قبل إصدار القرار بتشخيص موت الدماغ.
- functional d.** مَوْتُ وَظِيفِي. تلف الجهاز العصبي المركزي التام والدائم مع الاحتفاظ بالوظائف الحيوية بالطرق الصناعية كالتنفس الاصطناعي.
- debility** ضَعْف. فقدان القوة الجسمية أو نقصانها.
- decerebellation** فَصْلُ الْمُخِيخ. إزالة المخيخ أو إتلافه.
- decerebrate** فَصْلُ الْمُخ. 1. توقف الفعاليات المخية بفصل المخ بقطع جذع الدماغ بين الأكميات العلوية والنوى الدهليزية أو بربط الشرايين السباتية الباطنة والشريان القاعدي عند وسط الجسر. 2. حيوان مفصول المخ. 3. شخص أصيب بتلف دماغي ويظهر أعراضاً شبيهة بتلك التي يظهرها حيوان مفصول المخ.
- decerebration** فَصْلُ الْمُخ. عملية فصل المخ.
- decibel** ديسيبل. وحدة قياس شدة القدرة أو شدة الصوت، وهي عُشر البل.
- declive (= declivis)** الحَذْرَة. جزء دودة المخيخ على الجهة الذنبية من الشق الأولي.
- decompensation** لَامْعَاوَضَة. في الطب النفسي هي فشل الآليات الدفاعية للفرد التي تولد تداعي الشخصية التدريجي والمترقي.
- decomposition of movements** تَفْكَكُ الحَرَكَات. قلة أو عدم تناسق الحركات العضلية والتي تتصف بعدم انتظام ثني المفاصل وبسطها المتعاقبين عند حركة الأطراف.
- decompression** تَخْفِيفُ الضَّغْط. إزالة الضغط أو تخفيفه.
- cerebral d.** تَخْفِيفُ الضَّغْطِ عَنِ الدِّمَاع. إزالة سدلة من القحف وشق الجافية لتخفيف ضغط داخل القحف.
- nerve d.** تَخْفِيفُ الضَّغْطِ عَنِ العَصَب. تخفيف أو إزالة الضغط عن العصب جراحياً بإزالة النسيج أو العظم المسبب لذلك الضغط.
- spinal cord d.** تَخْفِيفُ الضَّغْطِ عَنِ النُّخَاع. تخفيف الضغط جراحياً عن النخاع الشوكي.
- suboccipital d.** تَخْفِيفُ الضَّغْطِ تَحْتَ

- القَذَالِي. تخفيف الضغط داخل القحف بقطع قطعة من العظم القذالي والجافية التي تحتها.
- subtemporal d. تخفيف الضغط تحت الصدغي. تخفيف الضغط داخل القحف بفصل قطعة من العظم الصدغي وفتح الجافية التي تحتها.
- trigeminal d. تخفيف الضغط عن ثلاثي التوائم. تخفيف الضغط عن جذور العصب ثلاثي التوائم وعقده العصبية.
- deconditioning** إزالة الإشرط؛ إزالة التكيف. إزالة المنعكس الشرطي أو الاستجابة الشرطية.
- decortication** تقشير. إزالة قسم أو أقسام من قشرة المخ جراحياً.
- decubitus** استلقاء. حالة أو وضع الاستلقاء.
- d. acutus الناقبة الحادة. ناقبة أو قرحة الاستلقاء الوبيلة التي تتولد على جهة المريض المشلولة.
- dorsal d. استلقاء. الاستلقاء على الظهر.
- lateral d. اضطجاع. الاستلقاء على الجنب.
- d. ulcer الناقبة؛ قرحة الاستلقاء. القرحة التي تتكون عند استلقاء المريض لفترة طويلة في وضع واحد في مناطق الانضغاط كما يحدث في الشلل.
- ventral d. انبطاح. الاستلقاء على البطن.
- decussatio (= decussation)** تصالب.
- decussation** تصالب. (ج: تصالبات). تعابر بنيتين متناظرتين على شكل X.
- d. of cranial cerebellar peduncles تصالب السويقتين المخيخيتين القحفيتين. تعابر ألياف السويقتين المخيخيتين القحفيتين في داخل سقيفة الدماغ المتوسط.
- d. of fillet (= d. of medial lemnisci) تصالب فتيلي. تصالب الفتيل الإنسي.
- Forel's d. تصالب فوريل. التصالب السقيفي البطني للسبيل الحماوي النخاعي والسبيل الحماوي الشبكي في الدماغ المتوسط.
- d. of medial lemnisci تصالب الأفتلة الإنسية. منطقة النهاية الذنبية للنخاع المستطيل حيث تتصالب الألياف الواردة من النواة الإسفينية مع ألياف النواة الناحلة عند عبورهما الخط الوسطي قبل أن تتسلك

- باسم الفتيل الإنسي.
- motor d. (= pyramidal d.) تصالب الأهرام. تصالب البصري.
- optic d. (= optic chiasm) تصالب السبيلين الهرميين.
- pyramidal d. تصالب الأهرام. القسم الأمامي السفلي من النخاع المستطيل (البصلة) حيث يتصالب الهرمان (السبيلان الهرميان) عند عبورهما الخط الوسطي قبل أن يهبطا باسم السبيلين القشريين النخاعيين وهما سبيلان حركيان.
- d. of superior cerebellar peduncles (= d. of cranial cerebellar peduncles) تصالب السويقتين المخيخيتين العلويتين.
- tegmental d's. التصالبات السقيفية. تعابر الألياف العصبية في الدماغ المتوسط وتشمل التصالبات السقيفية البطنية للسبيل الحماوية النخاعية والحماوية الشبكية والتصالبات السقيفية الظهرية للسبيل السقيفي النخاعي.
- trochlear d. تصالب البكري. تصالب ألياف العصب البكري في الشراع البصلي العلوي.
- dedolation** 1. حس التكدّم 2. جلف. 1. حس شبيه بحس وجود كدمة أو رض في الساق. 2. إزالة شريحة جلدية رقيقة بقطع مائل.
- defatigation** إرهاق؛ فرط الإجهاد. تعب عضلي أو عصبي شديد.
- defect** عيب. فشل أو غياب أو نقص إحدى الوظائف أو البنات.
- neural tube d. عيب القناة العصبية. شذوذ خلقي يؤدي إلى غياب الدماغ أو إلى السنسنة المشقوقة.
- defibrillation** إزالة الرجفان. إزالة الرجفان الأذيني أو البطيني والذي يجري عادة بالصدمة الكهربائية المباشرة.
- deficiency** عوز. (ج: أعوز). نقص أو عيب.
- mental d. قصور عقلي؛ تخلف عقلي. انظر retardation, mental.
- deformity** تشوّه. (ج: تشوّهات). شوه قسم من الجسم أو شوه عام فيه.
- Arnold-Chiari d. تشوّه أرنولد - جيارى. تشوّه خلقي يكون فيه النخاع المستطيل (البصلة) مسطحاً

ومطولاً ويمتد مع المخيخ ليعبر إلى داخل القناة الشوكية من خلال الثقبة الكبيرة، وقد يترافق ذلك مع بعض التشوهات الأخرى في الجهاز العصبي المركزي مثل السنسنة المشقوقة.

**degeneracy** تَنَكُّسِيَّة. عملية التَنَكُّس أو حالة التَنَكُّس نفسها.

**degenerate** 1. تَنَكَّسَ 2. مُتَنَكَّس. 1. أصيب بالتَنَكُّس 2. شخص مختل عقلياً أو جسمياً أو منحل خلقياً.

**degeneration** تَنَكُّس. تَرَدُّ من حالة إلى أخرى أوطأ أو أسوأ منها خصوصاً تردي بنية أو شكل أحد الأنسجة أو الأعضاء.

**- ascending d.** تَنَكُّسٌ صَاعِد. تنكس ولري يصيب عصباً وارداً ويتقدم تدريجياً نحو النخاع الشوكي أو الدماغ. انظر W. Wallerian d.

**- axonal d.** تَنَكُّسٌ مِخْوَارِي. استجابة الخلية لإصابة محاورها التي تتكون من انحلال الكروماتين المركزي وانحسار نواتها عن المركز.

**- cerebromacular d.** تَنَكُّسٌ دِمَاعِيٌّ بَقَعِي. تنكس بعض الخلايا الدماغية وخلايا بقعة شبكية العين.

**- cerebroretinal d. (= cerebromacular d.)** تَنَكُّسٌ دِمَاعِيٌّ شَبَكَوِي.

**- corticostriatal-spinal d.** تَنَكُّسٌ قَشْرِيٌّ مَخْطَاطِيٌّ نَخَاعِيٌّ. اعتلال دماغي عدواني يصيب الأشخاص متوسطي العمر يتصف بتنكس جزئي في السبيلين الهرمي وخارج الهرمي مع خرف مترق وضمور العضلات والرعاش والكنع والرتة التشنجية.

**- descending d.** تَنَكُّسٌ نَازِل. تنكس ولري في الأعصاب النازلة أو الصادرة يتجه من المركز في الأعصاب نحو المحيط. انظر W. Wallerian d.

**- fascicular d.** تَنَكُّسٌ حَزَمِي. تنكس العضلات المشلولة بسبب آفة في الخلايا العصبية الحركية في المادة السنجابية للنخاع.

**- gray d.** تَنَكُّسٌ سِنْجَابِي. تنكس مادة النخاع الشوكي البيضاء تفقد فيه نخاعينها فيصبح لونها سنجابياً.

**- hepatolenticular d.** تَنَكُّسٌ كَبِدِيٌّ عَدَسِي. انظر disease, Wilson's

**- neurosomatic d.** تَنَكُّسٌ عَصَبِيٌّ جَسَدِي. تنكس دماغي منتشر ينتج عن نوبات صرعية شديدة ومتلاحقة وقد يتولد عن عوز الأكسجين في الدماغ. ويتصف سريرياً بالخرف والتشنج وحالة شبيهة بالباركنسونية.

**- Nissl's d. (= axonal reaction)** تَنَكُّسٌ نَيْسِل. تنكس الخلية العصبية بعد قطع أليافها العصبية.

**- primary progressive cerebellar d.** تَنَكُّسٌ مُخَيَّجِيٌّ أَوَّلِيٌّ مُتَرَقٍ. مرض عائلي يتصف باضطرابات حركية ينتج عن تنكس المخيخ في البالغين بين سن 30-40 عاماً ويترقى تدريجياً حتى نهايته المميتة.

**- retrograde d. (= axonal reaction)** تَنَكُّسٌ رُجُوعِي. سلسلة العمليات التنكسية التي تتم في الخلية العصبية بعد قطع محاورها.

**- secondary d. (= wallerian d.)** تَنَكُّسٌ ثَانَوِي. تَنَكُّسٌ وَلَرِي.

**- spongy d. of central nervous system** التَنَكُّسُ الإسْفَنْجِيُّ لِلجَهَازِ العَصَبِيِّ المَرْكَزِيِّ. حثل المادة البيضاء الوراثي الجسدي في الأطفال الذي يتصف بزوال النخاعين المنتشر مع تشكل فجوات في المادة المخية البيضاء مما يولد مظهراً إسفنجياً مع تخلف عقلي شديد وضخامة الرأس وونى العضلات الرقبية وتشنج الذراع والساق والعمى والموت في حوالي الشهر الثامن عشر من العمر.

**- subacute combined d. of spinal cord** تَنَكُّسُ النُخَاعِ المُشْتَرَكِ دُونَ الحَادِ. تنكس العمودين الخلفي والروحشي للنخاع الشوكي ينتج عن عوز الفيتامين B<sub>12</sub>. وهو مرض مترق ويترافق مع فقر الدم الوبيل ويتصف بالمدل والرنح وعدم استقرار المشية واضطرابات عاطفية.

**- transneuronal d.** تَنَكُّسٌ عَبْرَ العَصَبُونَات. ضمور بعض العصبونات عند قطع المحاويز الواردة لها أو موت العصبونات التي تستلم منها محاويز واردة.

**- traumatic d.** تَنَكُّسٌ رَضَجِي. تنكس القسم المحيطي من الليف العصبي المقطوع حتى أقرب عقدة رانفير من موقع القطع.

- **Türck's d.** تَنْكُسُ تُوْرُك. تنكس متني ثانوي  
للسبل العصبية للنخاع الشوكي
- **wallerian d.** تَنْكُسُ وُلْرِي. تنكس شحمي ليف  
العصبي الذي قطع عن خليته المغذية له.
- **Wilson** Wilson's disease أنظر  
- **Zenker's d.** تَنْكُسُ زَنْكِر. موات وتنكس هيايني  
يصيب العضلات المخططة.
- degenerative** 1. تَنْكُسِي 2. مُنْكَس. ما يتصف  
بالتنكس أو مصاب به.
- delinquent** جَانِح. (ج: جَانِحُونَ). شخص  
غير ملتزم بالقوانين أو مهمل لواجباته القانونية.
- **juvenile d.** حَدَثُ جَانِح. حدث ينتهك القوانين  
ويخرقها حسب قوانين الأحداث بينما يعتبر انتهاك  
البالغين لنفس القوانين جرائم عادية.
- delirium** هَذْيَان. اضطراب عقلي عضوي حاد  
وعكوس يتصف بعدم القابلية على تركيز الانتباه  
على المنبهات الخارجية وعدم تناسق التفكير  
والهذيان وضعف الوعي والتوهم واضطراب النوم  
وتوهان زمني ومكاني وضعف الذاكرة. وهو يتولد  
عن اضطراب استقلاب الدماغ بسبب التسمم أو  
العدوى العامة أو رضخ الرأس أو الاضطرابات  
الاستقلابية أو فشل الكبد أو الكلية.
- **abstinence d.** هَذْيَانُ الْإِمْتِنَاع. هذيان يتولد عن  
الانقطاع عن تناول الكحول أو المخدرات عند مدمنها.
- **active d.** هَذْيَانُ فَعَال. هذيان يتصف بهياج وفرط  
الفعاليات النفسية الحركية والتملل وتنفذ الاغذية
- **acute d.** هَذْيَانُ حَاد. هذيان مفاجيء وشديد  
يدوم لفترة قصيرة.
- **d. alcoholicum (= d. tremens)** هَذْيَانُ  
الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْكُحُول.
- **alcohol withdrawal d. (= d. tremens)**  
هَذْيَانُ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْكُحُول: هَذْيَانُ ارْتِعَاشِي.
- **exhaustion d.** هَذْيَانُ الْإِنْهَاق. هذيان يتولد عن  
الإجهاد أو عن الاضطرابات التغذوية الاستقلابية.
- **febrile d.** هَذْيَانُ الْحُمَى. الهذيان الذي يرافق  
الحمى العالية.
- **low d.** هَذْيَانُ هَادِيء. هذيان يتصف بالتخليط  
الفكري وبطء الفعاليات العقلية من دون هيجان.
- **macromaniacal d. (= macroptic d.)** هَذْيَانُ الضَّخَامَةِ. توهم المصاب بأن جسمه كله أو  
بعض أقسامه قد تضخم تضخماً كبيراً.
- **micromaniacal d., microptic d.** هَذْيَانُ  
الصَّغَارَةِ. توهم المصاب بأن جسمه كله أو بعض  
أقسامه قد تقلص أو تلاشى كلياً.
- **organic d.** هَذْيَانُ عَضْوِي. هذيان يتولد عن آفة  
عضوية في الدماغ.
- **post-traumatic d.** هَذْيَانُ بَعْدَ الرِّضْح. هذيان  
يتلو إصابة الرأس بالرِّضْح.
- **senile d.** هَذْيَانُ شَيْخُوخِي. متلازمة تصيب  
الشيخوخ متقدمي السن تتصف ببداية حادة وتوهان  
وتملل وأرق وهلوسة وقد يترافق ذلك مع الذهان  
الشيخوخي.
- **toxic d.** هَذْيَانُ تَسْمُمِي. هذيان يتولد عن التسمم  
بمادة سامة.
- **traumatic d.** هَذْيَانُ رَضْجِي. هذيان يتلو إصابة  
الرأس الشديدة وقد يظهر المريض لأول وهلة بأنه يقظ  
ومتنبه ولكنه مصاب بالتوهان الشديد وعيب الذاكرة  
والتخريف.
- **d. tremens** هَذْيَانُ ارْتِعَاشِي. هذيان ينتج عن  
التوقف أو الإقلال من تناول الكحول لدى المدمنين  
عليه لفترة لا تقل عن عشر سنوات وخصوصاً عندما  
يكون الإدمان مفرطاً. ويتصف بفرط الفعل العصبي  
الذاتي كتسرع القلب والتعرق وارتفاع ضغط الدم  
والارتعاش غير المنتظم والشديد والتوهم والهلوسة  
وسلوك وحشي هيجاني. ويبدأ هذا الهذيان بعد 2-3  
أيام بعد الانقطاع عن الكحول كما أنه يدوم لفترة  
حوالي 3-4 أيام.
- delphinine** دِلْفِينِيْن. دواء يستعمل خارجياً  
لتسكين الآلام في الألم العصبي والشلل  
والروماتزم.
- delusion** تَوَهُّم. اعتقاد خاطيء لا يمكن  
تصحيحه بالمنطق والحجة والمناقشة والإقناع  
بالرغم من عدم مشاركة الآخرين المحيطين  
بالمصاب في اعتقاده الخاطيء.
- **autopsychic d.** تَوَهُّمُ نَفْسِي ذَاتِي. توهم

- الشخص عن أمور تخص جسده وشخصيته ولا تتعلق بالأمور الخارجة عنه.
- **bizarre d.** **تَوْهُمُ التَّفَاهَةِ.** توهم المريض بأنه سخي وتافه
- **control d. (= d. of being controlled)** **تَوْهُمُ السَّيْطَرَةِ.** توهم المريض بوجود شخص أو قوة خارجية مؤثرة تسيطر عليه وعلى كل أفكاره ومشاعره وأعماله
- **depressive d.** **تَوْهُمُ إِكْتِنَابِي.** توهم مترافق مع مزاج كئيب مولد عن الشعور بأنه مضطهد بسبب عدم كفاءته أو أخطائه ويتولد أحياناً عن التوهم بالإصابة بأحد الأمراض أو بالفقر.
- **encapsulated d.** **تَوْهُمُ مُمَحْفَظ.** توهم ذاتي ليس له أي تأثير على سلوك الفرد.
- **expansive d. (= d. of grandeur)** **تَوْهُمُ العُظْمَةِ.**
- **d. of grandeur (= grandiose d.)** **تَوْهُمُ العُظْمَةِ.** توهم الشخص المبالغ بأنه مهم أو ذو سلطة أو معرفة فائقة أو أن له تأثيراً على شخص كبير متنفذ أو له علاقة حميمة معه أو أنه جميل الشكل وجذاب لدرجة لا تضاهى ولا تقاوم.
- **d. of guilt** **تَوْهُمُ الذَّنْبِ.** التوهم بالمسؤولية عن أي أذى أو شقاء يصيب الآخرين بسبب أخطائه السابقة
- **infidelity d.** **تَوْهُمُ الْخِيَانَةِ.** التوهم بخيانة الزوجة أو الرفيق الجنسي له.
- **d. of influence** **تَوْهُمُ السَّيْطَرَةِ.** التوهم بوجود قوى خارجية تسيطر على أفعاله ولا يمكنه مقاومتها.
- **mood congruent d.** **تَوْهُمُ مُنْسَجِمٍ مَعَ الْمَزَاجِ:** توهم مترافق مع المزاج. توهم يظهر كعرض لمزاج الشخص المضطرب.
- **mood incongruent d.** **تَوْهُمُ غَيْرِ مُنْسَجِمٍ** مع المزاج. توهم يظهر كعرض لاضطراب نفسي.
- **d. of negation (= nihilistic d.)** **تَوْهُمُ الْعَدَمِ.**
- **nihilistic d.** **تَوْهُمُ عَدَمِي؛ تَوْهُمُ إِنْكَارِي.** توهم مكتب يتصف بأن النفس أو الجسد أو جزء منهما أو الأشخاص الآخرين أو حتى العالم كله توقف عن الوجود أو غير موجودين أصلاً.
- **paranoid d's.** **أَوْهَامُ زَوْرَانِيَّةٍ.** توهم العظمة أو توهم الاضطهاد.

- **persecution d.** **تَوْهُمُ الإِضْطِهَادِ.** توهم الشخص بأنه مضطهد مهاجم أو ملاحق أو مغشوش أو متآمر عليه.
- **persecutory d. (= persecution d.)** **تَوْهُمُ الإِضْطِهَادِ.**
- **d. of poverty** **تَوْهُمُ الْفَقْرِ.** توهم الشخص بأنه فقير المال والحال أو أنه سيصبح كذلك عاجلاً.
- **d. of reference** **تَوْهُمُ الْعَلَاَقَةِ.** توهم المريض وقناعاته بوجود علاقة نوعية خاصة بين الأحداث الجارية حوله وتصرفات الآخرين كأنها تعنيه مباشرة ولها مغزى يشير إليه شخصياً.
- **d. of sin (= delusion of guilt)** **تَوْهُمُ الْخَطِيئَةِ.**
- **somatic d.** **تَوْهُمُ جَسَدِي.** توهم المصاب بوجود تغير في أحد أعضاء جسم المصاب أو في وظائفه
- **systematized d's.** **أَوْهَامُ مُتَرَابِطَةٍ.** مجموعة من الأوهام مجتمعة ومنسقة حول موضوع خاص.
- **unsystematized d's.** **أَوْهَامُ غَيْرِ مُتَرَابِطَةٍ.** أوهام غير منطقية ومتفرقة وغير مترابطة ومفلوطة.
- خَرْف. (ج. خَرْفُون). (= demented)** **dement** شخص مصاب بالخرف.
- خَرْف. اضطراب عقلي عضوي** **dementia** يتصف بفقدان عام للنشاط الفكري الذي يشمل وهن الذاكرة وضعف التفكير المجرد وعدم التحكم العقلي مما يولد تغييراً في الشخصية. ولا يتولد أي من هذه الاضطرابات عن تغييم الوعي (كما هو في الهذيان) أو الاكتئاب ولكنه يتولد عن إصابة عضوية أو وظيفية مخية مختلة.
- **alcoholic d.** **خَرْفُ كُحُولِي.** خرف يتولد عن الإدمان الطويل والمفرط للكحول.
- **Alzheimer's d.** **خَرْفُ أَلْزَهِيمَر.** انظر Alzheimer's disease.
- **Binswanger d.** **خَرْفُ بِنْزَفَانْغَر.** خرف تنكسي يبدأ قبل الشيخوخة وينتج عن زوال النخاعين من مادة الدماغ البيضاء تحت القشرية وتصاحبه تغيرات تصلبية في الأوعية الدموية الدماغية.
- **boxer's d. (= punch-drunk encephalopathy)** **خَرْفُ الْمَلَاكِمِين.** خرف أشد

من الاعتلال الدماغي الرضحي يتولد من تراكم الاضطرابات الدماغي ويتصف بالنسابة وببطء التفكير وعسر التلفظ وببطء واختلال الحركة وخصوصاً في السابقين.

**خَرْفُ الدِّيَالِ.** خَرْفٌ يصيب المرضى - **dialysis d.** الذين يعالجون بديال الدم لمدة طويلة (أكثر من ثلاث سنوات) فيولد اعتلالاً دماغياً يتصف بالرتة (عسر التلفظ) وحيسة التسمية والخرف والانتفاض العضلي الرمعي ونوبات الصرع الكبير والذهان وقد ينتج كل ذلك عن وجود نسبة عالية من أيونات الألمنيوم في محلول الديال.

**خَرْفُ الصَّرَعِ.** تَرْدٌ عقلي وفكري - **epileptic d.** متروِّقٌ يحصل في بعض حالات الصرع وقد ينتج عن تنكس العصبونات المولد عن الاضطرابات الدورانية أثناء نوبات الصرع.

**خَرْفُ مَوِّهِ الرَّأْسِ.** الخرف - **hydrocephalic d.** الذي يتولد عن موه الرأس المزمن.

**خَرْفُ طِفْلِيٍّ.** اضطراب تنموي - **infantile d.** دماغي يولد زهان الأطفال بعد سنتين أو ثلاث من التنامي السوي ويتصف بعسر التلفظ واضطراب عاطفي وسلوكي وبعلاقة سيئة مع الآخرين وعادة ما يترافق مع فرط الحركة والخرف والتردي الفكري.

**خَرْفُ مُتَعَدِّدِ الاِخْتِشَآتِ.** - **multi-infarct d.** خرف يتطور تدريجياً ويتصف بنوبات متتالية موزعة في مناطق وظيفية محددة من الجهاز العصبي وينتج عن اختلالات وعائية دماغية.

**خَرْفُ الرَّمْعِ العَضَلِيِّ.** خرف - **d. myoclonica** يحدث في الرمع العضلي المتعدد.

**خَرْفٌ شَلَلِيٌّ.** - **paralytic d. (= paresis, general)**

**خَرْفٌ مُتَعَدِّدٌ زَوْرَانِيٌّ.** - **d. paranoides (= schizophrenia, paranoid)**

**خَرْفٌ مُبْتَسِرٌ؛ خَرْفٌ مُتَعَدِّدٌ زَوْرَانِيٌّ.** - **d. praecox (= schizophrenia)**

**خَرْفٌ كَهْلِيٌّ.** خرف تنكسي أولي - **presenile d.** يبدأ في سن مبكرة قبل الشيخوخة وهو من نمط الزهايمر.

**خَرْفٌ أَوَّلِيٌّ.** - **primary degenerative d.**

تَنَكُّسِيٌّ. خرف ذو بداية مخاتلة يتطور تدريجياً ويحدث دائماً بعد سن الخمسين ويشمل الخرف قبل الكهلي والخرف الشيخوخي.

**خَرْفُ إِزْتِجَاجٍ (boxer's d.).** - **d. pugilistica** الدماغ. الخرف الذي ينتج عن إصابة الرأس بضربات متكررة مع ارتجاج المخ كما يحصل للملاكمين.

**خَرْفٌ ثَانَوِيٌّ.** خرف يحصل بسبب - **secondary d.** عوامل خارجية كإصابات الرأس والتسمم والعدوى.

**خَرْفٌ دَلَالِيٌّ؛ خَرْفٌ دَلَالَةُ الرَّمُوزِ.** - **semantic d.** خرف يتصف بعدم شعور الشخص بالإحساسات العاطفية كالحب والكراهية والحزن والخجل والغرور والعزة والكرامة.

**خَرْفٌ شَيْخُوخِيٌّ.** خرف تنكسي أولي - **senile d.** يصيب المريض في سن الشيخوخة ويتصف بتردي القوى العقلية والمقدرة على القراءة والكتابة والكلام وبالضمور العام.

**خَرْفٌ تَسَمُّمِيٌّ.** خرف يتولد عن التعرض - **toxic d.** المزمن لأحد السموم.

**خَرْفٌ فِرْنِيكِيٌّ؛ خَرْفٌ شَيْخُوخِيٌّ.** - **Wernicke's d. (= presbyophrenia)**

**مَفْسُوسٌ.** الاعتقاد القديم بأن - **demoniac** الجنون يتولد عن تملك الشياطين لنفس المصاب.

**هُوسُ الشَّيَاطِينِ.** توهم - **demonomania** المصاب بأن الشياطين تتملكه.

**رُهَابُ الشَّيَاطِينِ.** الخوف - **demonophobia** من الشياطين.

**إِزَالُ المِيَالِينِ.** إزال الميالين - **demyelinate** أو النخاعين من الأعصاب.

**رِزَالُ المِيَالِينِ؛ إِزَالَةُ المِيَالِينِ.** - **demyelination** إزالة النخاعين. إتلاف النخاعين أو إزالته أو فقدانه من الأعصاب.

**رِزَالُ المِيَالِينِ؛ إِزَالَةُ المِيَالِينِ.** - **demyelination (= demyelination)** إزالة النخاعين.

**مَنَعَ المُخَذَّرِ.** منع العقار عن - **denarcotize** المريض عند علاج المدمنين.

**تَغْصُنِيٌّ؛ مُتَغَصِّنٌ.** - **dendric (= dendritic)**

**مُسْتَقْبَلَةُ التَغْصُنِ.** نقطة - **dendriceptor**

حساسية في نهاية أحد فروع التغصن يمكن تنبيهها بنهايات محوار عصبون آخر.

**dendriform** مُتَغَصِّن. متفرع وشبيه بالأغصان.

**dendrite** تَغَصُّن. (ج: تَغَصُّنَات). أحد الامتدادات الهيولية الخيطية الشكل للعصبون. وهو يشبه شكل المحوار في العصبونات الأحادية والثنائية الأقطاب أما في العصبونات متعددة الأقطاب فإنه يمتد ويتفرع مثل أغصان الشجر ويكون عادة معظم السطح التقبلي للعصبون.

**dendritic** تَغَصُّنِيّ: مُتَغَصِّن. 1. متفرعة مثل الأغصان 2. تمتلك تغصينات.

**dendron (= dendrite)** تَغَصُّن.

**denervate** يُزِيلُ التَغَصِّيب. يزيل التحصيب من النسيج أو العضو.

**denervation** إِزَالَةُ التَغَصِّيب. إزالة التحصيب من العضو أو النسيج بقطع العصب أو تدميره.

**denial** إنْكَار. وسيلة دفاعية يدفع فيها الشخص الحقائق المؤلمة أو الكريهة بعيداً عن وعيه فلن يشعر بها.

**dentalgia (= toothache)** أَلَمُ الْأَسْنَان.

**dentatohalamic** مُسْتَنْجِي مَهَادِي. متعلق بالنواة المسننة والمهاد.

**dentatum (= nucleus dentatus)** النَوَاةُ الْمُسَنَّنة.

**dependence** 1. اِعْتِمَاد 2. تَغْوِيل. حالة الانكال على العقار والاضطرار إلى تناوله باستمرار أو بفترات متقطعة للشعور بتأثيره النفسي المناسب أو للوقاية من تأثير الحرمان منه.

**- emotional d. (= habituation)** تَغْوِيلٌ عَاطِفِيّ: تَعَوُّد. تعاطي العقار للتفريج عن الكرب النفسي والقلق الذي يولده الحرمان منه.

**- physiological d.** تَغْوِيلٌ فِيزِيُولُوجِيّ. تعاطي العقار لاجتناب تأثير الحرمان منه.

**- psychoactive substance d.** التَغْوِيلُ عَلَى الْمَادَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ نَفْسِيًّا. سوء استعمال الادوية المؤثرة نفسياً والتي تولد أعراض التحمل أو الامتناع.

تَغْوِيلٌ (- psychological d. = emotional d.) نَفْسِيّ: تَغْوِيلٌ عَاطِفِيّ.

**- substance d.** التَغْوِيلُ عَلَى الدَّوَاء. التحويل على أحد الادوية المولدة لأعراض التعود أو الامتناع واستعماله لفترة طويلة.

**depersonalization** تَبَدُّدُ الشَّخْصِيَّة. فقدان حس معرفة الشخص لذاته أو لجسمه أو لجزء منه وشعوره بالاغتراب عن جسمه وعدم الشعور بسيطرته على أفعاله وأقواله.

1. زَوَالُ الْإِسْتَقْطَاب  
2. إِزَالَةُ الْإِسْتَقْطَاب. عملية إزالة الاستقطاب أو معادلتها من النسيج المستقطب كالعصب والعضل. ويستعمل الاصطلاح في فيزيولوجيا الأعصاب للدلالة على عكس استقطاب جهد الراحة من غشاء العصب أو العضل عند تنبيههما.

1. مُخَدِّد 2. مُكْتَئِب. 1. عامل يقلل الفعالية الوظيفية للعضو أو النسيج أو للجهاز العصبي المركزي 2. عامل يقلل الفعاليات الحيوية في الجسم بصورة عامة ويولد الارتخاء العضلي والتعرق الغزير.

1. مُكْتَئِب 2. مُنْخَسِف 3. مَنْخُض. **depressed** 1. شخص مصاب بالاكتئاب 2. كسر قحفي منخفض أو هابط تحت مستوى العظام المكسور منها.

1. اِنْخِسَاف 2. خُمُود 3. اِكْتِنَاب. **depression** 1. حفرة أو منطقة هابطة للأسفل 2. هبوط أو قلة الفعالية الوظيفية للعضو أو النسيج 3. حالة نفسية تتصف بهبوط المزاج والحزن واليأس والقنوط. وتختلف درجات الاكتئاب كثيراً من حالة الحزن البسيط إلى حالات الاكتئاب الشديد.

**- agitated d.** اِكْتِنَابٌ هَيَّاجِيّ. اكتئاب شديد مع هياج نفسي حركي.

**- anaclitic d.** اِكْتِنَابٌ يَتِمُّ. إفساد التنامي والتطور العقلي والجسدي والاجتماعي للوليد بسبب فقدانه للأمومة وتيممه.

**- endogenous d.** اِكْتِنَابٌ دَاخِلِيّ الْمَنْشَأ. اكتئاب يتولد بسبب عوامل داخلية وليس بأسباب بيئية أو محيطية فيولد التخلف النفسي الحركي والاستيقاظ



- الصباحي المبكر وفقدان الوزن وضعف الاستجابة للمنبهات الخارجية والشعور بالذنب.
- **involutional d. (= melancholia, involuntional)** **اِكْتِنَابٌ أَوْبِيٌّ**.
- **major d.** **اِكْتِنَابٌ كَبِيرٌ**. اضطراب نفسي يتصف بحدوث نوبات اكتئاب شديد مع غياب أو عدم حدوث أية نوبات هوسية أو دون الهوسية.
- **neurotic d.** **اِكْتِنَابٌ عَصَابِيٌّ**. أي نوع من الاكتئاب غير الذهاني.
- **psychotic d.** **اِكْتِنَابٌ ذُهَانِيٌّ**. اكتئاب كبير مع خواص ذهانية كالهوس والتوهم والصمات أو الذهول.
- **reactive d.** **اِكْتِنَابٌ تَفَاعُلِيٌّ**. اكتئاب يتولد عن الحوادث المحيطة المقلقة والكثيرة وهو نوع من الاكتئاب العصابي.
- **retarded d.** **اِكْتِنَابٌ تَخَلُّفُ الْعَقْلِيِّ**. اكتئاب مع تخلف نفسي حركي.
- **situational d. (= reactive d.)** **اِكْتِنَابٌ تَفَاعُلِيٌّ**. يُكْتَبُ. يولد الاكتئاب.
- depressive** **مُخَفَّدُ الْحَرَكَةِ**. عامل يثبط أو يقلل الفعاليات الحركية.
- depressomotor** **خَافِضٌ**. 1. آلة أو عضو يخفض عضو آخر أو بنية أخرى 2. عصب يؤدي تنبيهه إلى خفض ضغط الدم.
- deprivation** **حِرْمَانٌ**. فقدان أو ضياع أو غياب عضو أو جزء أو فعالية أو عامل يحتاجه الجسم.
- **emotional d.** **حِرْمَانٌ عَاطِفِيٌّ**. حرمان العلاقات الشخصية المناسبة في المحيط أثناء السنوات الأولى من تطور وتنامي الطفل.
- **maternal d.** **حِرْمَانُ الْأُمومة**. فقدان المبكر للام وحرمان الوليد أو الطفل من رعاية الام وعطفها.
- **sensory d.** **حِرْمَانٌ حِسِّيٌّ**. حرمان المنبهات الحسية السمعية والبصرية اللمسية التجريبي الذي يولد القلق لدى الكائن (الإنسان أو الحيوان) وفقدان القدرة على التركيز وتنظيم الأفكار والهوس المزعج والبيغض. ومن الممكن أن تحصل أعراض مشابهة لذلك في حالات العزل الانفرادي أو العمى أو الصمم أو الشلل أو حتى في الغرف الانفرادية في المستشفيات.

- thought d.** **الْحِرْمَانُ الْفَكْرِيُّ**. توقف سلسلة الأفكار المفاجيء لدى الفرد عند وصوله إلى فكرة مؤلمة أو بغیضة مكبوتة.
- deranencephalia** **انعدام الرأس والعنق**. انعدام الرأس المولد لعييب في دماغ المسيح وفي القسم العلوي من نخاعه الشوكي.
- deranged** **مُخَفَّلٌ**. مختل الوظيفة أو مختل عقلياً.
- derangement** 1. **اِخْتِلَالٌ**؛ 2. **اِخْتِلَالٌ عَقْلِيٌّ**. 1. تشويش ترتيب أو نظام عضو أو جزء منه 2. اضطراب عقلي.
- derealization** **عَمَهُ الْوَأَقِع**. فقدان الشخص لقدرة إدراكه للعالم الخارجي أو شعور غير حقيقي به.
- derencephalocoele** **قَبِيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ رَقَبِيَّةٌ**. انفتاق الدماغ خلال أحد شقوق الفقرات الرقبية.
- derism, dereism** **وَهْمٌ؛ وَهْلٌ**. تفكير ونشاط عقلي غير واقعي وخيالي وغير متعقل كما يحصل في التوهم.
- dermatome** **قَطَاعٌ جِلْدِيٌّ**. منطقة جلدية يغذيها عصب حسي وارد من أحد الجذور النخاعية الظهرية.
- dermatophobia** **رُهابُ الْجُلَادِ**. رهاب الإصابة بمرض جلدي.
- dermoid** 1. **جِلْدَانِيٌّ**؛ 2. **كَيْسَةٌ جِلْدَانِيَّةٌ**. 1. شبيه بالجلد 2. ورم الكيسة الجلدية.
- **cranial d.** **جِلْدَانِيَّةٌ قَحْفِيَّةٌ**. كيسة جلدية داخل القحف.
- **d. cyst** **كَيْسَةٌ جِلْدَانِيَّةٌ**. كيسة جلدية خلقية تتوضع على خطوط انغلاق السطوح الجنينية وقد تكون غالباً في الرأس حول العين والرقبة.
- **intramedullary d.** **جِلْدَانِيَّةٌ دَاخِلُ النُّخَاعِ**. كيسة جلدية داخل النخاع الشوكي.
- **intraspinal d. (= intramedullary d.)** **جِلْدَانِيَّةٌ دَاخِلُ النُّخَاعِ**.
- **spinal d. (= intramedullary d.)** **جِلْدَانِيَّةٌ دَاخِلُ النُّخَاعِ**.
- descendens** **نَازِلٌ**. بنية أو جزء مار من أعلى إلى الأسفل.

عُرْوَةُ رَقَبِيَّة. - d. cervicalis  
انظر ansa cervicalis

إِزَالَةُ التَّحَسُّس. 1. في desensitization  
المعالجة السلوكية هي تعريض المريض سواء  
بالتصور أو بصورة حقيقية إلى المنبهات المزعجة  
التي يرهبها وذلك بغرض معالجة القلق والخوف  
منها 2. تقليل التحسس بإعطاء المريض جرعات  
صغيرة من المادة الأربعة وزيادتها تدريجياً.

إِزَالَةُ التَّحَسُّس النِّظَامِي. معالجة - systematic d.  
نفسية لإزالة رهاب المريض لأي عامل أو مادة بإعطائه  
جرعات صغيرة منها مبدئياً سواء بالتصور أو بصورة  
حقيقية ومن ثم تزداد تدريجياً حتى يشفى المريض من  
رهابه حتى لاشد الجرعات منها

دِيَزُومُورْفِين. دواء مسكن desomorphine  
مخدر.

زَوَالُ التَّرَافُ. 1. عدم desynchronization  
ترافن وعدم تشابه موجات المخطط الكهربائي  
للدماغ في نصفي كرة المخ بسبب آفة مرضية في  
أحدهما أو في كليهما 2. نمط المخطط الكهربائي  
للدماغ الذي تكون موجاته قليلة الارتفاع وسريعة  
التردد والذي يشاهد في حالات الانتباه والتركيز أو  
في النوم سريع الحركات العينية.

desynchronized sleep (= sleep, REM)  
نَوْمُ مَزَالُ التَّرَافُ.

الْحَتْمِيَّة. النظرية التي تقول إن determinism  
كل أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية هي ثمرة  
عوامل مقررّة لا سلطة للمرء عليها ولا تحدث  
بمجرد الصدفة.

الْحَتْمِيَّةُ النَّفْسِيَّة. النظرية التي تنص - psychic d.  
على أن كل الحوادث النفسية للمرء لا تحدث بمجرد  
الصدفة بل إن لها أسباباً لا شعورية مسبقة ومقررّة  
ولا سلطة للمرء عليها حتى الطوارئ وعثرات اللسان  
هي عمليات عقلية مقررّة مسبقاً وحتمية.

تَطَوُّر؛ تَنَامِي؛ نُشُوء. عملية development  
النمو والتمايز في الكائنات والخلايا والأنسجة  
والأعضاء.

تَنَامِي الإِسْتِغْرَاف. عملية تنامي - cognitive d.  
الذكاء والتفكير الواعي والمجرد وعملية حل المشاكل  
التي تبدأ منذ الطفولة.

التَّنَامِي النَّفْسِي الْجِنْسِي. - psychosexual d.  
عملية التنامي الجنساني خلال دورة حياة الفرد التي  
تتأثر بالعوامل البيولوجية والاجتماعية والبيئية  
والثقافية والعاطفية منذ فترة قبل الولادة وعبر دورة  
حياته ويمر هذا التنامي من الطفولة حتى البلوغ  
بالتطور القموي ثم الشرجي ثم التناسلي.

التَّنَامِي النَّفْسِي الإِجْتِمَاعِي. - psychosocial d.  
تنامي شخصية الفرد واكتسابه خبرة تكوين المواقف  
والعلاقات الاجتماعية

مُنَحَرَف؛ شَاذ. شخص غير سوي أو deviant  
حالة مختلفة عن الحالة السوية أو المعيارية.

مُنَحَرَفٌ جِنْسِي. شخص شاذ جنسياً. - sexual d.

إِنْحِرَاف. شذوذ عن المقاييس deviation  
المعيارية أو السوية.

إِنْحِرَافٌ جِنْسِي. شذوذ جنسي. - sexual d.

إِنْحِرَافٌ تَجَانُفِي. دوران العين للأسفل - skew d.  
وللداخل على جهة الإصابة المخيخية وإلى الأعلى  
والخارج على الجهة الثانية.

دِكْسِيْتِيْمِيد. دواء يستعمل لعلاج dextimide  
الباركنسونية.

دِكْسِيْمَافِن. دواء مضاد deximafen  
للاكتئاب.

دِكْسِتْرُو أَمْفِيْتَامِين. dextroamphetamine  
دواء منبه يستعمل في علاج الاكتئاب والنوم  
الانتيابي وفراط حركية الأطفال والسمنة الخارجية  
المنشأ وهو يعمل مثل الأمفيتامين ولكنه أشد منه.

يَمِينِيَّةُ الْمُخ. ذو مخ dextrocerebral  
فيه نصف الكرة اليمينية هي السائدة.

مَتَفُوقُ الْيَدِ الْيَمْنِي؛ أَيْمَنُ الْيَدِ. dextromanual  
شخص يده وذراعه اليمينيتان أنشط وأكثر مهارة  
من نظيرتيهما اليساريتين وأكثر منهما استعمالاً.

مُتَفُوقُ السَّاقِ الْيَمْنِي؛ أَيْمَنُ dextropedal  
الْقَدَم. شخص يستعمل قدمه اليمنى أكثر من  
اليسرى ويفضلها عليها.

تَنَاقُوبِيَّةُ الْحَرَكَات. وظيفة diadochokinesia  
إيقاف دفعات عصبية حركية وتعويضها مباشرة

بدفعات حركية معاكسة لها تماماً مما يولد حركات متناوبة مثل كب وبسط الذراع بصورة متناوبة.

**diadochokinesis (= diadoc-hokinesia)** تَنَّاوُيَّةُ الحَرَكَاتِ.

**diaphemetric** بِقِيَاسُ حِسِّ اللُّمَسِ. متعلق بِقِيَاسِ حِسِّ اللُّمَسِ.

**diaphemetry** قِيَاسُ حِسِّ اللُّمَسِ. قياس إدراك حس اللمس وتمييزه.

**diaphoresis** التَّعَرُّقُ الغَزِيرُ. التعرق وخصوصاً التعرق الغزير.

**diaphragmalgia** أَلَمُ الحِجَابِ. ألم الحجاب الحاجز.

**diaphragma sellae** حِجَابُ السَّرْجِ. حجاب السرج التركي، طية حلقيّة الشكل من الأم الجافية تغطي السرج التركي وتحتوي فتحة صغيرة لمرور قمع الغدة النخامية.

**diaphragmodynia (= diaphragmalgia)** أَلَمُ الحِجَابِ.

**diaschisis** إِنْفِرَاقٌ عَصَبِيّ. فقدان الفعالية الكهربائية والوظيفية لقسم من الجسم بسبب إصابة دماغية وبالرغم من بُعده عن موقع الإصابة الدماغية المسببة لهذا الخلل إلا أنه مرتبط به ارتباطاً عصبياً.

**diastematocrania** إِنْشِطَارُ القَحْفِ. شقّ طولي خلقي في القحف.

**diastatomyelia** إِنْشِطَارُ النُّخَاعِ. انشطار النخاع الشوكي طولياً وخلقياً بواسطة شويكات عظمية أو رباط ليفي ويحاط كل من النصفين بكيسة جافية منفصلة و يترافق هذا العيب عادة مع السنسنة المشقوقة.

**diastomyelia (= diastatomyelia)** إِنْشِطَارُ النُّخَاعِ.

**diataxia** رَنْجٌ مُزْدَوِجٌ. رنج يصيب جهتي الجسم.

**- cerebral d. (= paralysis, infantile cerebral ataxic)** شَلَلٌ مُخَيّ رَنْجِيٌّ طِفْليّ.

**diathesis** أَهْمِيَّةٌ. حالة استعداد الجسم وبنيته للاستجابة بطريقة خاصة لبعض المنبهات

الخارجية وهذا ما يجعله معرضاً لبعض الأمراض المعينة بصورة خاصة.

**diazepam** دِيَازِيبَام. دواء يستعمل كمسكن ومرخ للعضلات الهيكلية وكمضاد للاختلاج والهذيان الارتعاشي وأعراض الامتناع عن الكحول ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقن في العضلات أو بالوريد.

**dicephalous, dicephalus** ذُو رَأْسَيْنِ. مسيخ ذو رأسين.

**dicephaly** اِرْدَوَاجُ الرُّأْسِ. حالة المسيخ ذي الرأسين وهي عيب خلقي.

**diencephalon** الدِّمَاغُ الدِّبْنِيّ. القسم الذنبى من الدماغ المقدم الذي يحوي البطين الثالث ويربط الدماغ المتوسط مع نصفي كرة المخ ويقسم التلم الوطائي كل نصف جانبي منه إلى قسم ظهري يتكون من فوق المهاد والمهاد الظهري والمهاد التالي وإلى قسم بطني يتكون من المهاد البطني (تحت المهاد) والوطاء.

**digitalgia** أَلَمُ الأصَابِعِ. ألم في الأصابع.

**dimercaprol** دِيْمَرْكَابْرُول. دواء يُستعمل كمضاد للتسمم بالزرنيخ والذهب والزنك كما أنه يستعمل في علاج التلوكس الكبدى العدسي.

**diphallia** اِرْدَوَاجُ القَضِيبِ. وجود قضيبين لدى الشخص.

**diphallus** قَضِيبٌ مُزْدَوِجٌ. قضيب مضاعف.

**diphenhydramine** دِيْفَنْهَيْدْرَامِين. دواء مسكن ومضاد للهستامين ومضاد للفعل الكوليني وللتشنج.

**diplegia** شَلَلٌ مُزْدَوِجٌ. شلل يصيب الأعضاء المتماثلة على جهتي الجسم.


**- atonic d.** شَلَلٌ وَأَنْ مُزْدَوِجٌ. شلل مزدوج في الرضع يتصف بنقص التوتر.

**- atonic-astatic d. (= atonid d)** شَلَلٌ وَأَنْ لا وَقُوفِيّ مزدوج.

**- cerebellar d.** شَلَلٌ مُخَيّ مُزْدَوِجٌ. شلل مخي ولكن تظهر فيه علامات وأعراض الشلل المخي أكثر من علامات الشلل المخي.

- **cerebral d. (= spastic d.)** شَلَلٌ مُخِّي مُزْدَوِج. شَلَلٌ وَجْهِي خَلْقِي مُزْدَوِج.
- **congenital facial d. (= syndrome, Mobius)** شَلَلٌ وَجْهِي خَلْقِي مُزْدَوِج.
- **facial d.** شَلَلٌ وَجْهِي مُزْدَوِج. شلل جهتي الوجه.
- **infantile d. (= palsy, birth)** شَلَلٌ الْوِلَادَةِ.
- **masticatory d.** شَلَلٌ مَضْغِي مُزْدَوِج. شلل كل العضلات التي تشارك في عملية المضغ.
- **spastic d. (= disease, Little's)** 1. شَلَلٌ تَشَنُّجِي مُزْدَوِج 2. شَلَلٌ سَفَلِي تَشَنُّجِي.
- diplopia** شَفَعٌ؛ إزْدَوَاجُ الرُّؤْيَةِ. رؤية صورتين للجسم الواحد.
- dipsomania (= alcoholism)** هَوَسُ الشُّرْبِ؛ الكحولية.
- dipsophobia** رُهَابُ الشُّرْبِ؛ رُهَابُ الْكُحُولِ. الخوف من تناول الكحول.
- disability** عَجَزٌ. عدم المقدرة على العمل الفكري أو الجسمي بطريقة سوية.
- disc** قُرْص. (ج: أَقْرَاص). انظر disk.
- discharge** 1. نَجِيج 2. تَفْرِيج 3. خُرُوج؛ إِخْرَاج. 1. مادة محررة 2. تفريغ كهربائي 3. تحرير أية مادة أو إبرازها.
- **epileptic d.** تَفْرِيجٌ صَرَغِي. تفريغ كهربائي مرضي لعصبونات في الجهاز العصبي المركزي يشير إلى حدوث نوبة صرعية.
- **nervous, d. (= neural d.)** تَفْرِيجٌ عَصَبِي. الاستثارة المنتشرة التي يولدها تنبيه أحد المراكز العصبية المركزية.
- discrimination** تَفْصِيلٌ. المقدرة على التعرف على الفروق الكمية أو النوعية بين منبهين حسيين أو أكثر وعادة ما يؤدي ذلك إلى استجابة تفريقية خاصة لكل منهما حسب الفروق المميزة.
- **one point d.** تَفْصِيلُ النُقْطَةِ الْوَاحِدَةِ. المقدرة على تعيين موقع تنبيه إحدى النقاط على سطح الجسم.
- **pitch d.** تَفْصِيلُ النَغَمِ. المقدرة على تمييز أي تغيير في سرعة تردد الصوت عند سماعه.

- **sensory d.** تَفْصِيلٌ حِسِّي. المقدرة على التفريق بين مختلف المنبهات الحسية كميًا ونوعيًا.
- **tactile d.** تَفْصِيلٌ لَمْسِي. المقدرة على تمييز مختلف أنواع ودرجات شدة حس اللمس كاللمس الناعم أو الخشن الذي ينبه الجلد.
- **two-point d.** 1. المقدرة على تمييز حس تنبيه نقطتين لسطح الجسم في وقت واحد 2. أصغر بعد بين النقطتين المنبهتين الذي يمكن أن يميزه الشخص.
- discus (= disc)** قُرْص.
- isidiadochokinesia (= dysdiadochokinesia)** خَلَلٌ تَنَاقُوبِيَّةُ الْحَرَكَاتِ.
- disease** دَاء. (ج: أَدْوَاء)؛ مَرَضٌ (ج: أَمْرَاض). حالة انحراف أو ابتعاد أو تغير بنية أو وظيفة أحد أقسام الجسم أو أعضائه أو أجهزته عن حالاته السوية والذي يولد أعراضاً وعلامات خاصة.
- **Addison's d.** دَاءٌ أَدِيسُون. مرض ينتج عن سل الغدة الكظرية أو مرضها المناعي الذاتي والذي يولد هبوط ضغط الدم وفقدان الوزن والشاهية للطعام (القهم) والوनी العام وفقرط انصباغ الجلد الميلاني.
- **Alexander's d.** دَاءٌ الْكُسَنْدَر. حثل المادة البيضاء في الاطفال ويتصف بوجود مادة حمضة (بيورينية) على سطح الدماغ وحول أوعيته الدموية مما يؤدي إلى تضخمه.
- **Alzheimer's d.** دَاءٌ الزَّهَائِمَر. مرض دماغي تنكسي متروك غير معروف السببيات يتصف بضمور شامل للقشرة المخية مع تغيرات مرضية نسجية خاصة تسمى «اللويحات الشيخوخية» ويظهر أن معظم الخلايا المتنكسة هي خلايا كولينية الفعل. وأهم العلامات الأولية للمرض هي بعض اضطرابات الذاكرة وتغير الشخصية ثم تسوء الأعراض تدريجياً حتى الخرف خلال 5-10 سنوات وقد يبدأ المرض في أي سن وهو شبيه بالهرم الشيخوخي الذي يظهر بعد سن الخامسة والستين. ويصيب هذا المرض النساء ضعف ما يصيب الرجال.
- **Aran-Duchenne d.** ضُمُورٌ عَضَلِيٌّ نَحَاعِي. انظر atrophy, spinal muscular.
- **autoimmune d.** دَاءُ الْمَنَاعَةِ الذَاتِيَّةِ؛ دَاءٌ



#### disease, Addison

علامات واعراض فشل الكظر الأولي (داء أديسون) الذي يتولد عن ضمور قشرة الكظر أو إصابتها بداء السل: (1) انصبغ الغشاء المخاطي (2) انصبغ الجلد (3) اسوداد الشعر (4) النمش (5) البهق (6) زيادة صبغ الحلمة (7) زيادة صبغ مناطق الاحتكاك (8) ترسب الصباغ في بعض المناطق وفي ندبات الجروح (9) ضعف العضلات (10) فقدان الوزن والهزال والقيء والإسهال (11) انخفاض ضغط الدم.

- مَنِيْعٌ لِلذَّاتِ. اضطراب يتولد عن الاستجابة المناعية للمستضدات الذاتية ويشمل أمراضاً عديدة مثل الذئب الحمامي والتهاب المفاصل الروماتزمي.
- Behcet's d. (= syndrome, Behcet's) دَاءُ بَهْجَتٍ.
- Billroth's d. دَاءُ بِيلِرُوْث. انفتاق السحايا
- الدماغية خلال كسر في القحف مع تمزق العنكبوتية.
- Bourneville's d. (= tuberous sclerosis) دَاءُ بُورْنِفِيل: التصلُّبُ الحديبي.
- Buerger's d. (= thromboangiitis obliterans) داء بُورْغِر.
- Canavan's d. دَاءُ كَنَفَان. تنكس الجهاز العصبي المركزي الإسفنجي.
- central core d. of muscle دَاءُ اللُّبِّ المَرْكَزِيِّ
- للعضل. داء وراثي جسدي سائد يتصف بوثى عضلي شديد يوقف تنامي العضلات في الأطفال ولكنه يزول حوالي سن السادسة ويمكن الطفل من السير بعد ذلك بصورة طبيعية.
- Charcot's d. (= arthropathy, neuropathic) دَاءُ شَارْكَوْت: اعتلال المفاصل العصبي المنشأ.
- Charcot's-Marie-Tooth d. (= progressive spinal muscular atrophy) التهاب شَارْكَوْت - مَارِي - تُوث: الضمور العضلي الشوكي المترقي.
- Creutzfeldt-Jakob d. دَاءُ كَرْوُتْزِفِلْد - جَاكُوب.
- داء معدي ومميت وهو اعتلال دماغي إسفنجي يحدث في متوسط العمر مع تنكس جزئي للجهاز العصبي الهرمي وخارج الهرمي مع خرف مترق وضمور العضلات والرعاش والكنع والرتة التشنجية.
- dancing d. (= choreomania) هَوَسٌ رَقْصِي.
- David's d. دَاءُ دَيفِيد. سل السيساء.
- Dejerine-Sotta d. دَاءُ دِيجِيرِين - سُوْتَا.
- اعتلال عصبي ضخامي خلالي وراثي.
- demyelinating d. دَاءُ زَوَالِ النُّخَاعِيْن. أبة حالة مرضية تتصف بتهتك النخاعين وزواله.
- Devic's d. (= neuromyelitis optica) التهاب النخاع والعصب البصري: دَاءُ دِفِيْكَ.
- Erb-Charcot d. (= Erb's spastic paraplegia) شلل إرب السفلي التشنجي: دَاءُ إِرْب - شَارْكَوْت.
- Erb-Goldflam d. (= myasthenia gravis) الوهن العضلي الوبيل: دَاءُ إِرْب - غُولْدْفَلَام.
- Erb-Landouzy d. (dystrophy, muscular) حَثَلٌ عَضَلِي: دَاءُ إِرْب - لَانْدُوْزِي.
- Eulenburg's d. (= paramyotonia congenita) داء التشنج العضلي التوتري الخلقي: دَاءُ أُولِنْبِرْغ.
- extrapyramidal d. دَاءُ خَارِجِ الهَرْمِي. أحد الاضطرابات السريرية التي تتصف بحركات لاإرادية شاذة وتغير التوتر العضلي واضطرابات الوضع وتنتج عن إصابة السبيل خارج الهرمي وتشمل أمراض الباركنسونية والرقص والكنع.
- Fabry's d. دَاءُ فَابْرِي. مرض وراثي مرتبط بالصبغي X وهو مرض استقلابي يؤثر على الجهازين البولي والقلبي الوعائي ويولد أعراضاً متعددة في كل الجسم ومنها الأعراض العصبية التي تشمل الألم المحرق في الراحة والأخمص والبطن ومذل اليدين والقدمين المزمن ومرض الأوعية الدماغية مع بقاء النمو وتخلف البلوغ.
- Farber's d. دَاءُ فَارْبِر. مرض استقلابي يتصف بأعراض جسمية عديدة ومنها التخلف النفسي الحركي.
- focal d. دَاءُ بُؤْرِي. داء متوضع في منطقة محدودة من الجسم.
- functional d. دَاءُ وَظِيفِي. داء يؤدي إلى اختلال إحدى الوظائف أو أكثر من دون أية تغيرات عضوية.
- Gaucher's d. (= glucosylceramide الشحام الغلوكوزيل سيراميدي) (lipidosis) دَاءُ كُوِشَر. داء استقلابي يتصف بالشحام بسبب ترسب الغلوكوسربروزيد في الكبد والطحال والعقد اللمفية والتنقي، وهناك عدة أنواع منه أحدهما النوع الحاد الطفلي الاعتلالي العصبي الذي يتصف بتضخم الكبد والطحال وتلف الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الموت خلال عام واحد وهناك النوع الطفلي دون

الاعتلالي العصبي الذي يشبه النوع الأول ولكنه يتطور ببطء نسبياً.

- Gerlier's d. (= endemic paralytic

vertigo) دَاءُ غَزَلِير: دوار شللي متوطن.

داء يصيب الفلاحين وعمال الإسطبلات يتصف بالدوار وجحوظ العين واضطرابات حركية وقد ينتج عن التهاب العصب الدهليزي.

- hereditary d. دَاءُ وراثي. مرض ينتقل وراثياً من الآباء للأبناء.

- heredoconstitutional d. دَاءُ وراثي بُنْيَوِي. حالة مرضية وراثية لا تتطور وغير مترقية.

- heredodegenerative d. دَاءُ وراثي تَنَكُّسِي. داء وراثي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتصف بفقدان أنسجة عصبية معينة.

- hydatid d. الدَّاءُ الحَبَّارِي. داء مُعْدِي ينتج عن الإصابة ببرقات المشوكة الحبيبية ويولد أكياساً تتضخم تدريجياً ويمكن أن تصيب الدماغ أو نخاع الشوكي.

- hydrocephaloid d. الدَّاءُ الشَّيْبِي بِمَوْه الرَّأْس. حالة تشبه موه الرأس ولكن مع انخساف اليافوخ الشديد بسبب الإسهال أو مرض ضموري آخر مع التجفاف.

- idiopathic d. دَاءٌ مَجْهُول السَّبَب. داء غير ناتج عن مرض آخر ولا يعرف له سبب ظاهر.

- Krabbe's d. دَاءُ كَرَابَّ. مرض استقلابي يبدأ في الطفولة بالهيجية والصمل تتلوهما نوبات توترية واختلاجات وشلل رباعي ثم العمى والصمم وصعوبة البلع وتردي عقلي مترقي وبترافق ذلك كله مع زوال النخاعين الدماغيين المترقي ووجود جسيمات كروية في المادة البيضاء.

- Kuf's d. (= amaurotic idiocy) دَاءُ كُوف: البَلَاهَةُ الكَمْنِيَّة.

- Kugelberg-Welander d. (= hereditary juvenile muscular atrophy

فيلاندر: الضمور العضلي البَقَعِي الوراثي. مرض وراثي حديث ينتقل كصفة جسدية متنحية ويتصف بالضمور العضلي الذي ينتج عن آفات في القرون الأمامية للنخاع الشوكي ويبدأ بين سني 2-17 عاماً

بوني العضلات العلوية للذراع الأسفل وعضلات الحوض ثم يصيب عضلات الذراع الأخرى مع تفصاتها.

- Lafora's d. (= myoclonus epilepsy) صَرَع رمعي عضلي: دَاءُ لَافُورَا.

- Leber's d. (= Leber's optic atrophy) ضَمُور ليبر البصري: دَاءُ لِيبر.

- Leigh's d. (= subacute necrotizing encephalomyelopathy) اعتلال دماغي نخاعي نخري: دَاءُ لِي.

- Little's d. دَاءُ لِيْتَل. تيبس تشنجي خلقي للأطراف وهو نوع من الشلل المخي التشنجي ويبدأ عند الولادة بسبب عدم تنامي الجهاز الحركي الهرمي وقد ينتج عن بعض الاضطرابات كالإصابات الرضحية الولادية أو عوز الأكسجين الجنيني أو مرض الأم أثناء الحمل. ويتصف سريراً بالونى العضلي وصعوبة السير وغالباً مع الاختلاج والكتن بالجانبين والتخلف العقلي.

- Meniere's d. دَاءُ مِينِيَّير. فقدان السمع مع الطنين والدوار المولد من التهاب التيه اللاتقيحي مع استسقاء لمفي باطني.

- motor neuron d. دَاءُ العَصَبُون الحَرَكَي. أي مرض للعصبون الحركي ويشمل الضمور العضلي النخاعي والشلل البصلي المترقي والتصلب الوحشي والتصلب الوحشي الضموري العضلي.

- Mozer's d. دَاءُ مُوزَر. تصلب النخاع لدى البالغين.

- Niemann's d. دَاءُ نِيْمَان. داء استقلابي متعدد الأنواع وهناك خمسة أنواع رئيسية فيه تختلف بدرجة إصابة الجهاز العصبي وسن بدء الإصابة وشدتها وسن وفاة المريض.

- Niemann-Pick d. (= Niemann's d.) دَاءُ نِيْمَان - بِيك.

- Norrie's d. دَاءُ نُورِي. مرض وراثي مرتبط بالصبغي X ويتصف بعمى العينين مع التخلف العقلي والصمم.

- occupational d. دَاءٌ مِهْنِي. داء يتولد عن عوامل مهنية تتعلق بمهنة المريض.

- Oppenheim's d. (= amyotonia congenita) دَاءُ أُوْبِنَهَايم. الونى العضلي الخلقي.

- **organic d.** داء عضوي. داء ينتج عن تغيرات عضوية في العضو أو النسيج المصاب.
- **Parkinson's d. (= paralysis agitans)** داء باركنسون؛ شلل زعشي.
- **Pelizaeus-Merzbacher d.** داء بليزاوس - مرزباخر. حثل المادة البيضاء العائلي المترقي الذي يبدأ عند مقتبل العمر ويتطور ببطء حتى سن الشباب ويتصف بالرأرأة والرنح والرعاش والحركات الرقصية الكنعية والسحنة الباركنسونية والتخلف العقلي واختلال النطق وينتج عن زوال نخاعين المادة البيضاء في الدماغ.
- **Pick's d.** داء بيك. مرض تنكسي مترق في الدماغ شبيه في ظواهره السريرية بداء الزهايمر ولكنه يختلف عنه بنسيجه المرضي. فالضمور القشري محدد في الفصين الصدغي والجبهي وتحوي العصبونات المتكسفة مشتملات داخل الهيولى كروية خاطية.
- **Pott's d.** داء بوت. سل السيساء.



disease, Parkinson

صورة لمرضى مصاب بداء باركنسون تبين وضعته ومشيته وانحناؤه للأمام

- **Recklinghausen's d. (= neuro-fibromatosis)** ورام ليفي عصبي؛ داء ركلينغهاوزن.
- **Refsum's d.** داء رفسوم. مرض استقلابي يتصف بالتهاب الأعصاب المزمن والتهاب الشبكية الانصباعي والرنح المخيخي وارتفاع نسبة البروتين في السائل الدماغي النخاعي وقد يترافق مع الصمم العصبي.
- **Sandhoff's d.** داء سندھوف. نوع من داء الغنغليوزيد شبيه بداء تاي ساخر سريريا ولكنه يشاهد في غير اليهود.
- **Schilder's d.** داء شيلدر. نوع من اعتلال بيضاء الدماغ في الأطفال والياقمين ويتصف سريريا بالعمى والصمم والتشنج الجانبيين والتردي العقلي المترقي ويشاهد فيه تخريب كتلي في المادة البيضاء المخيخية مع تكهفها والتندب الدبقي فيها.
- **Selter's d. (= acrodynia)** داء سيلتر؛ وجع اليهاتيات.
- **Simmond's d. (= panhypopituitarism)** قصور النخامية الشامل؛ داء سيموند. قصور النخامية الشامل.
- **Spielmeyer-Vogt d. (= idiocy, amaurotic)** غتة كفتي؛ داء سبيلماير - فوغت.
- **Strumpell's d.** داء شترمبيل. نوع من التصلب الوحشي الوراثي ينحصر فيه الشنّاج (فرط التوتر التشنجي) في الساقين فقط.
- **Sturge-Weber d. (= syndrome, Sturge-Weber)** داء شتورج - ويبر.
- **systemic d.** داء جهازّي. داء يصيب العديد من الأعضاء والأنسجة.
- **Tay-sachs d.** داء تاي - ساكس. داء خزن الغنغليوزيد الذي يصيب أطفال اليهود في الشمال الشرقي من أوروبا ويبدأ بين الشهرين 3-6 من العمر ويتصف بالعمى المبكر وسحنة الدمية وضخامة الرأس ورنح العضلات والنوبات التشنجية ويموت الأطفال المصابين عادة بين السن الثانية والخامسة من العمر.
- **von Hippel-Lindau d. (= retinocerebral angiomas)** الورام الوعائي الشبكيوي؛ داء فون هيبيل - لينداو. ورام وعائي وراثي وخلفي يصيب الشبكية والمخيخ ومن الممكن أيضاً أن



يصيب الخناخ الشوكي والبنكرياس والكليتين وتتصف أعراضه العصبية بالنوبات والتريدي العقلي.

- von Recklinghausen's d. (= Recklinghausen's d.) دَاءُ فُون رِكْلِينْغَهَاوَزِن.

- Werdnig-Hoffmann d. (= atrophy, spinal muscular) ضمور عضلي نخاعي؛ دَاءُ فَرْدِنْغ - هُوفْمَان.

- Wernicke's d. (inflammatory hemorrhagic d.) اعتلال الدماغ النزفي الالتهابي؛ دَاءُ فَرْنِيكَة. انظر encephalopathy.

- Whytt's d. دَاءُ وَيْت. التهاب السحايا السلي الذي يولد موه الرأس.

- Wilson's d. دَاءُ وِيلْسُون. داء وراثي يورث كصفة جسمية متنحية وينتج عن اختلال في استقلاب النحاس الذي يترسب في الدماغ والكبد والكلى والقرنية وبعض الأنسجة الأخرى ويسبب تغيرات تنكسية في الدماغ خصوصاً في العقد القاعدية مع تشمع الكبد.

disequilibrium اِخْتِلَالُ التَوَازُن. اختلال التوازن الجسمي أو العقلي.

disesthesia (= dysesthesia) اِخْتِلَالُ جِسْمِي. اختلال أي من الحواس خاصة حس اللمس.

disinhibition إِزَالَةُ التَثْبِيْط؛ زَوَالُ التَثْبِيْط. 1. إزالة التثبيط من قشرة المخ أو تقليلها بواسطة الأدوية كالكحول الأثيري أو التقليل من شدة الأنا العليا في العلاج النفسي 2. إحياء منعكس شرطي زائل بتعريض الشخص إلى منبهه اللاشرطي.

disintegration تفكُّك؛ تَلَاْش. 1. عملية تهشُّم أو تفسخ 2. تفكك وظائف الشخصية المتكاملة في الأمراض العقلية.

disk قُرْص. صفيحة مسطحة ومدورة.

- cupped d. قُرْصٌ فِنْجَانِي. قرص بصري متضخم ومنخفض يشاهد غالباً في الزرق المتقدم.

- intervertebral d's. الأقراصُ بَيْنَ الْفَقَرَتَيْن. الأقراص الليفية الغضروفية التي توجد بين الفقرتين المتجاورتين.

- optic d. الْقُرْصُ الْبَصَرِي. قسم العصب البصري

داخل العين المكون من الألياف العصبية للشبكية التي تتقارب في منطقة القرص التي لا تغطيها خلايا الشبكية. ولذلك لا تكون حساسة للضوء.

- slipped d. قُرْصٌ مُنْزَلِق. قرص منزلق من بين الفقرتين.

disectomy إِسْتِئْصَالُ الْقُرْص. عملية استئصال قرص ما بين الفقرتين.

disorder اِضْطِرَاب. 1. تشوّه أو اختلال وظيفي 2. حالة اختلال القوى العقلية.

- adjustment d. اِضْطِرَابُ التَكْيُف. رد فعل غير ملائم لحادثة مكتبة معلومة كالطلاق أو فقدان الوظيفة أو المرض أو مصيبة طبيعية، وتزول هذه الحالة عادة بعد زوال السبب أو بعد تكيف المريض لها.

- affective d's. (= mood d's.) اِضْطِرَابَاتُ الْمَزَاج.

- amnestic d. اضطراب مفقد للذاكرة؛ اِضْطِرَابُ نَسَاوِي. اضطراب نسائي كحولي يتولد عن إدمان الكحول أو اضطراب نسائي بسبب الاستعمال الطويل لبعض الأدوية كالادوية المزيلة للقلق أو المنومة أو المسكنة.

- anxiety d's. اِضْطِرَابَاتُ مُقْلِقَة. مجموعة من الاضطرابات العقلية تتصف بالقلق والسلوك الاجتنابي وتشمل العديد من الاضطرابات كالهلج ورهاب الساح ورهاب المجتمع والوسواس القسري والقلق التالي للإصابة أو القلق العام.

- attention deficit hyperactivity d. اِضْطِرَابُ نَاقِصِ الْإِنْتِبَاهِ مُفْرِطُ الْفَعَالِيَة. اضطراب عقلي يصيب الأطفال يبدأ قبل سن السابعة ويتصف بالتلمل والارتباك والتضايق وصعوبة بقاء الطفل مستقراً أو جالساً مع شروء البال وسرعة الإجابة عن الأسئلة حتى قبل انتهاء سماعها مع صعوبة التقيد بالإرشادات والثرثرة والسلوك الفوضوي.

- autistic d. اِضْطِرَابٌ دَاتَوِي؛ اضطراب انطوائي. اضطراب عقلي وخيم يبدأ في الطفولة المبكرة ويتصف بضعف العلاقات الاجتماعية كعدم التحسس بمشاعر الآخرين وعدم الثقة بهم وعدم الركون إليهم للاستراحة أو الاستشارة وعدم التحدث المتبادل معهم



disk, intervertebral

صورة تبين القرص بين الفقرتين في حالته الطبيعية وفي حالة انزلاقه وتدليه وضغطه على الاعصاب الشوكية القطنية والعجزية.

والكشف عن أفكاره ورغباته أمامهم، ويختلف هذا عن الفصام ببذنه المبكر وعدم اتصافه بالهلوس أو التوهم أو التخلف العقلي.

- **avoidant d.** اضطراب إجتنابي. اضطراب يتصف بتجنب الاختلاط مع الغرباء.

- **behavior d.** اضطراب السلوك. اضطراب عقلي يتصف بسلوك غير مقبول اجتماعياً.

- **bipolar d. (= manic depressive d.)**

اضطراب هلوسي اكتسابي؛ اضطراب ذو قطبين. اضطراب عاطفي يتصف بنوبات هلسية وأخرى مكتبة كالاضطراب الهوسي الاكتسابي.

- **body dysmorphic d.** اضطراب تشوه الجسم. اضطراب عقلي يتصف بانشغال البال بعيب خيالي يشوه مظهره بالرغم من أن مظهره سوي من دون أي عيب.

- **character d. (= personality d.)** اضطراب في الشخصية. اضطراب في علاقة المريض بمجتمعه ورفاقه الذي يفسد عليه أي تبادل إيجابي معهم وعدم استعمال قابلياته في أية فعالية اجتماعية.

- **conduct d.** اضطراب التصرف. اضطراب عقلي في الأطفال والمراهقين يتصف بعدم التقيد أو الاعتراف بحقوق الآخرين الأكبر أو الأصغر سناً منهم.

- **conversion d.** اضطراب تحولي. اضطراب نفسي يتصف بأعراض تحويلية (فقدان أو تغير بعض الوظائف الجسدية التي توحى بوجود مرض عضوي في الجهاز المصاب وعادة هو الجهاز الحسي الحركي والذي يتصف بنوبات الشلل وخلل الحركة والخرير والعمى وفقدان الصوت) ولكنها كلها من دون أي أساس فيزيولوجي واضح، ومما يؤدي أساسها النفسي ما يلي: 1. زيادة الأعراض في حالات الكرب النفسي. 2. التفريق عن التناقضات النفسية والقلق النفسي عند ظهور هذه الأعراض. 3. يكسب المريض كسباً ثانوياً (الاسناد والاهتمام والرعاية وتجنب المسؤوليات البغيضة) عند ظهور هذه الأعراض فيفرج عنها.

- **delusional d. (= paranoia)** اضطراب توهمي؛ ذهان كبريائي.

- **depersonalization d.** اضطراب تبدد الشخصية؛ اضطراب جهل الذات. اضطراب يتصف

بنوبات عدم معرفة الشخص لهويته والشعور بالغربة والابتعاد عن الواقع.

- **dissociative d's.** اضطرابات تفارقة.

اضطرابات عصابية مستيرية تفارقية وهي اضطرابات عقلية تتصف بالتغير المفاجيء في الشخصية والذاكرة والوعي وتفقار الشخصية عن هوية المريض.

- **dysthymiac d. (= dysthymia)** اضطراب مكتئب.

- **factitious d.** اضطراب مفتعل. اضطراب عقلي يتصف بتقليد واع ومتكرر لبعض الاعراض الجسمية والنفسية لا لغرض معين إلا للحصول على المعالجة.

- **functional d.** اضطراب وظيفي. اضطراب وظيفي من دون وجود آفة عضوية ويعني ذلك في الطب النفسي اضطراباً نفسي المنشأ. أما في الطب العام فيعني اضطراباً مجهول السبب.

- **generalized anxiety d.** اضطراب قلبي عام. اضطراب قلبي عصابي يتصف بقلق عام من موضوعين حياتيين أو أكثر ويدوم لمدة ستة أشهر أو أكثر.

- **identity d.** اضطراب الهوية. ضائقة شخصية وخيمة تدوم ثلاثة أشهر أو أكثر تتصف بعدم مقدرة المريض على جمع مناحي شخصيته المتعددة وبناء شخصية متكاملة منها وقبوله لذاته مما يولد لديه عدم الثقة بنفسه في اختيار عمله وشريكه الجنسي وسلوكه العام وقيمه الأخلاقية ويحدث هذا الاضطراب غالباً في أواخر مرحلة المراهقة.

- **induced psychotic d.** اضطراب ذهاني محرض. اضطراب توهمي يتولد في الشخص ينتج عن علاقته الوثيقة بشخص آخر مصاب باضطراب نفساني يتصف بتوهم واضح.

- **intermittent explosive d.** اضطراب انفجاري متقطع. اضطراب عقلي وظيفي يتصف بنوبات محددة من فقدان السيطرة والاندفاع الاعتدائي يولد اثناءها عدواناً خطيراً أو تخريباً للممتلكات ولا ينسجم هذا التصرف الشاذ مع أخلاق الشخص الاعتيادية الطبيعية.

- **isolated explosive d.** اضطراب انفجاري منعزل. اضطراب عقلي وظيفي يتصف بنوبة انفجارية

عنيفة واحدة من دون سبب ولا علاقة لها بأية اضطراب نفسي أو عضوي.

- **major mood d's.** اضطرابات المزاج الكبيرة. اضطراب ذو قطبين واضطراب اكتئابي كبير.

- **manic-depressive d. (= bipolar d.)** اضطراب هوسي اكتئابي.

- **mental d.** اضطراب نفسي. متلازمة أعراض سلوكية أو نفسية تتصف بأعراض الضائقة المكتبة أو بتري وظيفي عقلي.

- **mood d's.** اضطرابات المزاج. اضطرابات عقلية تتصف بصورة رئيسية باضطراب المزاج الكلي أو الجزئي ويظهر كهوس أو اكتئاب.

- **organic mental d's.** اضطرابات نفسية عضوية. متلازمة دماغية خاصة تنتج عن آفة عضوية دماغية.

- **overanxious d.** اضطراب فرط القلق. اضطراب قلقي في الأطفال أو المراهقين يتصف بالقلق المفرط والسلوك التخوفي ولا علاقة له بأية حالة قلق طارئة أخرى.

- **panic d.** اضطراب الهلع. اضطراب عقلي عصبي يتصف بنوبات هلع متكررة مع الخوف الشديد والرعب مع بعض الأعراض الجسدية كضيق التنفس والخفقان والدوار والدوام والارتعاش والتخوف من الموت أو الجنون، وقد تدوم بعض الأعراض العصبية والتوتر بين النوبات التي قد تترافق مع رهاب الساح.

- **paranoid d. (= paranoia, delusional d.)** اضطراب زوراني.

- **post- traumatic stress d.** اضطراب الكرب بعد الرضخ. اضطراب نفسي يتولد عن حادثة رضحية فوق القدرة البشرية السوية مثل انتهاك العرض والاغتصاب أو معركة عسكرية أو قصف مدني شديد أو طارئ عارض خطر أو التعذيب أو معتقلات الموت ويتصف بمعاودة ذكريات العارضة والشعور بها وبآلامها أو تذكرها الواعي أو بصورة كابوس مما يولد اليقظة وفرط الانتباه والخدر النفساني أو العاطفي والأرق والشعور بالذنب.

- **psychogenic pain d. (= somatoform pain d.)** اضطراب ألمي نفسي المنشأ.

- **psychophysiologic d. (= psycho-somatic d.)** اضطراب نفسي فيزيولوجي.

- **psychosomatic d.** اضطراب نفسي جسدي. اضطراب تسبب معظم أعراضه الجسدية وتضخمها بعض العوامل النفسية مثل صداع الشقيقة أو ألم الظهر السفلي أو القرحة المعوية أو متلازمة الأمعاء الهیوجة.

- **schizoaffective d.** اضطراب فصامي عاطفي. اضطراب نفسي يتصف بأعراض فصامية ومزاجية.

- **schizophreniform d.** اضطراب فصامي نفسي. اضطراب عقلي يتصف بأعراض فصامية منذ مدة تقل عن الستة أشهر.

- **seasonal mood d.** اضطراب المزاج الموسمي. اضطراب يتصف بالكآبة مع زيادة الحاجة للنوم وكثرة تناول السكريات، ويحل ذلك في فصل الشتاء.

- **seperation anxiety d.** اضطراب قلق الانفراق. ضائقة وتخوف يصيب الأطفال عند افتراقهم عن أبويهم أو عن محيطهم.

- **shared paranoid d. (= induced psychotic d.)** اضطراب ذهاني مُحرض.

- **sleep terror d.** اضطراب دُعر النوم. نوبات متكررة من الاستيقاظ بعد النوم مع القلق الشديد وأعراض عصبية ذاتية مع عدم الاستجابة لمحاولات التهدئة.

- **sleepwalking d.** اضطراب السير النومي. نوبات متكررة من السير النومي.

- **somatization d.** اضطراب الجسدنة. الهستيريا التقليدية، اضطراب نفسي يتصف بشكاوى جسدية متعددة غير ناتجة عن أمراض عضوية جسدية.

- **somatoform d's.** اضطرابات نفسية جسدية الشكل. اضطرابات عقلية تتصف بأعراض تدل على اضطرابات جسدية من أصل نفسي المنشأ ولكنها خارجة عن التحكم الإرادي كالغصاب الهستيري والاضطراب التحويلي واضطرابات تشوّه الجسم.

- **somatoform pain d.** اضطراب نفسي مؤلم جسدي الشكل. اضطرابات نفسية تتصف بألم وخيم مزمن. وهو من مجموعة الاضطرابات التحويلية (فالالم لا يتناسب مع التوزيع التشريحي العصبي ولا مع الآلية الفيزيولوجية المرضية إذ أنه أكثر كثيراً من المتوقع من التغيرات العضوية المرضية الموجودة كما

- تظهر علامات تدل على أن الاضطراب هو نفسي المنشأ).
- إِضْطِرَابٌ أَحَادِي (unipolar d. (= dysthymia))** القطب. عصاب اكتئابي.
- disorientation** تَوَهَان. حالة تخليط عقلي للوقت والمحل أو للهوية.
- spatial d.** تَوَهَانٌ فَضَائِي. حالة عدم تمكن الطيار من معرفة موقعه الفضائي بالنسبة للأرض بدقة وقد تحدث عن انخداع دهليزي.
- temporospatial d.** تَوَهَانٌ زَمَانِيٌّ مَكَانِي. حالة عدم تمكن المريض من معرفة وضعه بالنسبة للمكان والوقت في محيطه.
- disseminated** مُنْتَشِر. منتشر على مساحة واسعة.
- dissociation** تَفَارُقٌ؛ إِفْتِرَاقٌ. 1. عملية فصل أو حالة انفصال. 2. في علم النفس هي عملية دفاعية يتم فيها عزل مجموعة من العمليات الفكرية عن باقي الفعاليات الدماغية كي يتجنب الشخص الضائقة العاطفية ويتم فيها فصل الأفعال عن مدلولاتها العاطفية.
- peripheral d.** تَفَارُقٌ مُحِيطِي. اختلال حسي تقل فيه حواس اللمس والالام السطحي والحرارة في اليدين والقدمين ويشاهد ذلك في التهاب الأعصاب المتعدد.
- syringomyelic d.** التَفَارُقُ التَّكْهُفِيُّ النُّخَاعِي. فقدان جسدي الألم والحرارة مع الاحتفاظ بباقي الحواس نتيجة آفة في القناة المركزية للنخاع الشوكي تصيب السبيل النخاعي المهادي.
- tabetic d.** التَفَارُقُ التَّابِسِي. اختلال جسدي الامتزاز والأوتار العضلية نتيجة آفة في السبل النخاعية الخلفية.
- dissonance** تَنَافُشٌ. اختلاف أو تعارض أو عدم انسجام.
- cognitive d.** تَنَافُشٌ مَعْرِفِي. الشعور بالقيض الذي ينشأ عند عدم انسجام أفكار الشخص أو معتقداته أو مواقفه مع تجاربه وخبرته.
- distad** نَحْوُ الْقَاصِي؛ مَقَاصٍ. متجه باتجاه القاصي.

- distal** قَاصٍ. بعيد عن أية نقطة أو مرجع.
- distalis (= distal)** قَاصٍ.
- distortion** تحريف؛ إِنْقِطَال. في علم النفس هي عملية تحريف أو تغيير الأفكار اللاشعورية أو دوافعها بطريقة تصبح مقبولة للفكر الواعي.
- paradox d.** تحريفٌ مُتَنَاقِضٌ. تحوير الأحكام والمفاهيم خصوصاً في العلاقات الشخصية بطريقة تتلاءم مع حاجات الشخص كي تنسجم مع خبراته السابقة.
- distractibility** شُرُودِيَّة. عدم مقدرة الشخص على تركيز انتباهه على العمل الذي يقوم به وقد يشرد انتباهه إلى أمور تافهة في محيطه.
- distraction** شُرُود. حالة انحراف انتباه الشخص عن العمل أو الحالة التي هو فيها أو توزيعها على عدة أعمال في وقت واحد.
- distress** ضَائِقَةٌ. (ج: ضَوَائِقُ). معاناة جسدية أو كرب نفسي.
- disturbance** إِضْطِرَاب. (ج: إِضْطِرَابَاتٌ). انحراف عن السوي.
- emotional d. (= illness, emotional)** اضطراب انفعالي؛ إِضْطِرَابٌ عَاطِفِي.
- transient situational d. (= reaction, acute stress)** إِضْطِرَابٌ حَادِيٌّ عَابِر. يحدث خلال النهار.
- diurnal** نَهَارِي. ينظم نَهَارِي. تَغْيِيرُ نَهَارِي.
- d. rhythm** دَوَامٌ؛ دَوَخَةٌ. اضطراب حس التوضع في المحيط والحس بعدم ثبات الرأس وحركته.
- d. variation** دُول. وحدة قياس شدة الألم.
- dizziness** دُول. وحدة قياس شدة الألم.
- dol** دُول. وحدة قياس شدة الألم.
- dolichocephalia (= dolichocephaly)** إِسْتِطَالَةُ الرَّأْسِ.
- dolichocephalic** طَوِيلُ الرَّأْسِ. شخص طويل الرأس، يبلغ عامل طول الرأس عنده 75.9 أو أقل من ذلك.

**dolichocephaly** اسْتِطَالَةُ الرَّأْسِ. حالة كون رأس الشخص طويلاً.

**dolichocranial** طَوِيلُ الْقَافِ. من له جمجمة طويلة ويبلغ عامل طولها 74.9 أو أقل من ذلك.

**dolor** أَلَمٌ. أحد الأعراض الرئيسية للالتهاب.

**- d. capitis** صداع. انظر headache.

**- d. coxae** وَرَاكٍ. انظر coxalgia.

**- d. praesagientes** أَلَمٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ. الآلام الكاذبة التي تحس بها الحامل أثناء الحمل والشبيهة بتلك التي تحس بها أثناء الحيض والتي تدل على قرب الولادة.

**- d. vagus** أَلَمٌ مُتَجَوِّلٌ. انظر pain, wandering.

**dolores** آلام. جمع ألم.

**dolorific** مُؤْلِمٌ. ما يسبب أو يولد الألم.

**dolorimeter** مِقْيَاسُ الْأَلَمِ. آلة لقياس شدة الألم.

**dolorimetry** قِيَاسُ الْأَلَمِ. عملية قياس الألم.

**dolorigenic** مُؤْلِمٌ. ما يسبب الألم أو يولده.

**dominance** سِيَادَةٌ. 1. حالة سيادة أحد الأعضاء أو أحد الأقسام على الأقسام الأخرى 2. في الوراثة، خاصية التعبير التام للنمط الظاهري للجين في الزيجوتين المماثل والمباين على السواء.

**- cerebral d.** سِيَادَةٌ مُخَيَّةٌ. سيادة أحد النصفين المخيين على النصف الآخر كما تظهر في وظائفهما حيث تكون حركات إحدى جهتي الجسم أنشط من حركات الجهة الثانية.

**- lateral d.** سِيَادَةٌ جَانِبِيَّةٌ. الاستعمال التفضيلي لإحدى الجهتين في القيام بالحركات الإرادية وخصوصاً بالأعضاء المزدوجة فيهما.

**- ocular d.** سِيَادَةٌ عَيْنِيَّةٌ. تفضيل استعمال إحدى العينين على العين الأخرى.

**- one-sided d. (= lateral d.)** سِيَادَةٌ جَانِبِيَّةٌ.

**dominant** سَائِدٌ. 1. عضو أو بنية تتحكم وتسيطر على أخريات 2. أَلِيلٌ أو خَلَّةٌ أو صفة سائدة.

**dopa** دوبا. حمض أميني يعمل كطليعة للدوبامين وكمنتوج وسط في إنتاج الأبينفرين

والنورأبينفرين والميلانين ويستعمل نوعه (دوبا -L) في علاج الباركنسونية.

**dopamine** دُوبَامِينٌ. مادة وسطية في تركيب النورأدرينالين تعمل كناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي.

**dopaminergic** دُوبَامِينِيٌّ الْفِعْلُ. يُنَشِّطُ أو ينقل بواسطة الدوبامين.

**dormant** هَامِجٌ. نائم أو خامل أو ساكن.

**dorsad** بِاتِّجَاهِ الظَّهْرِ؛ ظَهْرِيًّا. متجه نحو الظهر.

**dorsal** ظَهْرِيٌّ. منسوب للظهر أو موجود في منطقة الظهر أو متجه نحوه، ويمائل «خلفي» في تشريح الإنسان و«علوي» في تشريح رباعيات الأرجل.

**dorsalgia** أَلَمُ الظَّهْرِ. ألم في الظهر.

**dorsalis (= dorsal)** ظَهْرِيٌّ.

**dorsiflexion** انْثِنَاءُ ظَهْرَانِيٍّ. ثني نحو الناحية الباسطة للذراع كثنى القدم أو اليد.

**dorsum** ظَهْرٌ. (ج: ظُهُور). ظهر الجسم أو ظهر أحد الأعضاء.

**dosage** تَقْدِيرُ الْجُرْعَاتِ. تعيين وتنظيم كمية وعدد وأوقات ومرات إعطاء الجرعات.

**dose** جُرْعَةٌ. كمية العلاج التي تعطى في المرة الواحدة ككمية الدواء مثلاً أو مقدار الأشعة التي تمتصها الأنسجة في المرة الواحدة بالمعالجة الشعاعية.

**- average d.** جُرْعَةٌ وَسْطَى. كمية من الدواء يمكنها أن تولد التأثير المتوقع من استعماله.

**- booster d.** جُرْعَةٌ مُعَزِّزَةٌ. جرعة من العامل المناعي التي تعطى لإدامة المناعة، وهي عادة ما تكون أصغر من الجرعة الأولية.

**- curative d.** جُرْعَةٌ شَافِيَّةٌ. جرعة كافية لشفاء المريض.

**- daily d.** جُرْعَةٌ يَوْمِيَّةٌ. مجموع كمية الدواء التي تعطى للمريض في الأربع والعشرين ساعة.

**- divided d.** جُرْعَةٌ مُقَسَّمَةٌ. جزء من كمية الدواء التي تعطى في فترات متباعدة خلال الأربع والعشرين ساعة.

**- effective d.** جُرْعَةٌ مُؤَثِّرَةٌ: جُرْعَةٌ فَعَّالَةٌ. كمية الدواء التي تولد التأثير الذي وصف الدواء من أجله.

**- maintenance d.** جُرْعَةُ الإِدَامَةِ: جرعة المداومة. كمية الدواء اليومية المناسبة لإدامة المستوى الكافي لتوليد التأثير المرغوب في الجسم والذي يبدأ عادة منذ إعطاء الجرعة الكبيرة الأولى.

**- maximum d.** الجُرْعَةُ الْقُصْوَى. أكبر كمية من العلاج التي يمكن إعطاؤها للمريض العادي بسلامة.

**- minimal d. (= minimum d.)** الجُرْعَةُ الدُّنْيَا. اصغر كمية من العلاج التي يمكن أن تولد تأثيراً ملحوظاً في المريض.

**- optimal d. (= optimum d.)** الجُرْعَةُ الْمُثَلَّى. كمية العلاج التي يمكن إعطاؤها للمريض من دون أن تحدث أضراراً غير مرغوبة وتولد تأثيراً علاجياً كافياً.

**- priming d.** جُرْعَةُ الْإِبْتِدَاء. كمية من الدواء أكبر من جرعة الإدامة بكثير تعطى عند البدء بالعلاج كي يصل تركيزه في الدم والأنسجة لمستوى علاجي مؤثر وبسرعة.

**- therapeutic d.** جُرْعَةُ عِلَاجِيَّة. جرعة كبيرة أكبر من جرعة الإدامة تعطى عند المعالجة بالفيتامين في حالات العوز الشديد.

**- tolerance d.** جُرْعَةُ التَّحُلُّ. أكبر كمية من العلاج التي يمكن إعطاؤها للمريض من دون إحداث أي ضرر له.

**- toxic d.** جُرْعَةُ سَاطَةٍ. كمية العلاج التي تولد أعراضاً سمية.

**dosis** جُرْعَةٌ. انظر dose.

**dream** حُلْمٌ؛ مَنَامٌ. ظاهرة نفسية تحدث أثناء النوم يحس فيها المريض بصور وأفكار وعواطف وكأنها تجارب واقعية. وتتم الأحلام خلال فترة النوم السريع الحركات العينية.

**- day d.** أَحْلَامُ الْيَقَظَةِ. تمنيات خيالية من دون اعتبار للواقع.

**- wet d.** إِحْتِلَامٌ لَيْلِي. قذف منوي ليلي أثناء النوم عادة.

**dromic** مُسَارِي؛ مُسَارِي. يشير إلى الدفعات العصبية التي تسير بالاتجاه السوي الصحيح، مثلاً

من التخصصات إلى جسم الخلية ومنها إلى المحاور أو من المستقبلية إلى جسم الخلية العصبية.

**dromomania** هَوَسُ التَّجَوُّال. الرغبة الملحة في التجوال والسفر.

**dromophobia** رُهَابُ الْعُبُور. الخوف من الجري أو من عبور الشوارع.

**dromotropism** تَوَجُّيَةُ التَّوَصِيل. الخاصية أو الخواص التي تؤثر على قابلية الليف العصبي على توصيل الدفعات (التوصيلية).

**- negative d.** التَّوَصِيلِيَّةُ السَّلْبِيَّة. الخاصية التي تقلل من قابلية الليف العصبي على توصيل الدفعات.

**- positive d.** التَّوَصِيلِيَّةُ الْإِجَابِيَّة. الخاصية التي تزيد من قابلية الليف العصبي على توصيل الدفعات.

**drop** 1. قَطْرَةٌ 2. تَدَلِّي؛ هُطُول. 1. كرية صغيرة من السائل عند سقوطها. 2. هبوط.

**- finger d.** تَدَلِّي الإصْبَع؛ إَصْبَعٌ مِطْرَقِيَّة. انظر finger, mallet.

**- foot d.** تَدَلِّي الْقَدَم؛ إِرْتِخَاءُ الْقَدَم؛ قَدَمٌ سَاقِطَةٌ. انظر footdrop.

**- hand d.** تَدَلِّي الرَّسْغ. انظر wristdrop.

**- d. phalangette** سَقُوطُ السَّلَامِيَّات؛ إِنْثِنَاءُ الإِصْبَع. حالة الانثناء الدائم لسلامي أصابع اليد أو القدم كما هو الحال في الإصبع المطرقي.

**- wrist d. (= wristdrop)** تَدَلِّي الرَّسْغ.

**drowsiness** نَعَاس. الشعور بالرغبة في النوم.

**drug** 1. دَوَاء. (ج: أدوية) 2. عَقَّار. (ج: عَقَاقِير). 1. مركب كيميائي يستعمل في الإنسان أو الحيوانات للمساعدة في تشخيص الأمراض أو معالجتها أو الوقاية منها أو لتسكين آلام المرضى أو التخفيف من معاناتهم أو للتحكم في بعض الحالات المرضية أو الفيزيولوجية أو تحسينها 2. مخدر.

**- antagonistic d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ. دواء يعادل أو يصاد فعالية دواء آخر.

- **antianxiety d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ لِلْقَلَقِ. دواء مسكّن أو مهدئ خصوصاً من نوع المهدئات البسيطة.

- **anticonvulsant d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ لِلإِخْتِلَاجِ. دواء مسكّن ومهدئ للاختلاج.

- **antimanic d.** دَوَاءٌ مُضَادٌّ لِلهَوَسِ. أي دواء يعالج أعراض الهوس خصوصاً كربونات الليثيوم.

- **habit-forming d.** دَوَاءٌ مُخْدِثٌ لِلإِدْمَانِ. دواء يولد استعماله الطويل الإدمان وخصوصاً الادوية المخدرة منها.

- **maintenance d.** دَوَاءٌ الإِدَامَةِ. علاج يستعمل لفترة طويلة ومستمرة لإدامة تأثيره ولمنع نكس المريض.

- **psychotropic d.** دَوَاءٌ نَفْسِيّ التَّأثيرِ. دواء يؤثر على الوظائف العقلية والسلوك والذي يستعمل لمعالجة الأمراض العقلية والنفسانية.

**مُقَاوِمٌ (drug-fast = drug-resistant)** للدَّوَاءِ.

**مُقَاوِمٌ للدَّوَاءِ.** مقاوم لفعل **drug-resistant** وتأثير الدواء كالجراثيم التي تقاوم الدواء.

**drunkenness** سُكْرٌ. حالة السكر وهي الكحولية الحادة.

**dualism** ثُنَائِيَّةٌ؛ ثَنَوِيَّةٌ. النظرية التي تنص على أن الإنسان مكوّن من جهازين منفصلين وهما الجسم والنفس وأن الظواهر النفسية والجسمية هما ظواهر منفصلة الواحدة عن الأخرى تماماً.

**duct (= ductus)** قَنَاقَةٌ (ج: قَنَوَات) ممر ذو جدران محددة وهو أنبوب لمرور الإفرازات والإبرازات.

- **acoustic d. (= meatus, external acoustical)** الصَّمَاخُ السَّمْعِيّ الظَّاهِرُ.

- **endolymphatic d.** قَنَاقَةُ اللَّفْظِ البَاطِنِ. قناة تربط القناة القريبية الكييسية مع كيسة اللفظ الباطن.

- **utricleosaccular d.** القَنَاقَةُ القُرْبِيَّةُ الكَيْسِيَّةُ. قناة تربط القريب بالكييس.

**ductus (= duct)** قَنَاقَةٌ.

- **d. reuniens** القَنَاقَةُ المُوَحَّدَةُ. قناة صغيرة تمر من الكييس إلى القناة القوقعية.

**dull** 1. اصَمٌّ 2. بَلِيدٌ 3. كَلِيلٌ. 1. غير رنان 2. قليل الذكاء 3. غير مدبب أو غير حاد.

**dumb (= mute)** أَخْرَسٌ. لا يتمكن من النطق.

**dumbness (= mutism = aphasia)** خَرَسٌ؛ حُبْسَةٌ.

**dura (= dura mater)** الجَافِيَّةُ.

**dural** جَافَوِيٌّ. متعلق أو منسوب للجافية.

**dura mater** الأُمُّ الجَافِيَّةُ. الغشاء الخارجي من الأغشية الثلاثة التي تحيط بالدماغ والنخاع وهو أمّتها وأكثرها تليفاً.

**- d. m. of brain (d.m.encephali)** الأُمُّ الجَافِيَّةُ الدِّمَاغِيَّةُ.

**d. m. encephali** الأُمُّ الجَافِيَّةُ الدِّمَاغِيَّةُ.

الأم الجافية التي تغطي الدماغ والمكونة من طبقتين ملتحمتين الطبقة الخارجية داخل العظمية والمبطنة لعظام القحف والطبقة الداخلية السحائية وتوجد الجيوب الوريدية وعقدة ثلاثي التوائم بين هاتين الطبقتين.

**- d. m. of spinal cord (= d. m. spinalis)** الأُمُّ الجَافِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ.

**- d. m. spinalis** الأُمُّ الجَافِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ. الأم الجافية التي تغطي النخاع الشوكي وهي مفصولة عن سمحاق الفقرات المحيطة بالحيز خارج الجافية والذي يحوي الاوعية الدموية وانسجة ليفية وهلمية.

**duraplasty** رَأْبُ الجَافِيَّةِ. أية عملية راب أو غرس تجري على الجافية.

**duroarachnitis** التهاب الجافية والعنكبوتية.

**dwarfism** قَرَامَةٌ. قصور تنامي الجسم أو حالة كون المصاب قزماً صغير الحجم.

**dynamoneure (= spinal motoneuron)** عَصَبُونٌ حَرَكَيٌّ نُخَاعِيٌّ. عصبون حركي متصل بعضلة ويبدأ من النخاع الشوكي.

**dysacusia (= dysacusis)** خَلَلُ السَّمْعِ. خلل سمعي في استقبال تردد الصوت أو شدته.

**dysanagnosia** خَلَلُ القَرَاءَةِ. عدم المقدرة على إدراك معاني بعض الكلمات أو عدم المقدرة على قراءتها.



**dysantigraphia** عُسْرُ الْإِنْتِسَاخِ. عدم المقدرة على استنساخ الكلمات المكتوبة بسبب آفة في السبيل الموصل بين مركز إبصار الكتابة ومركز تدوين الكلمات.

**dysaphia** خَلَلُ اللَّمْسِ. خلل حس اللمس.  
**dysarthria** رُتَّةٌ: عُسْرُ التَّلْفُظِ. عدم المقدرة على تلفظ الكلمات بطريقة صحيحة بسبب سوء التحكم في عضلات النطق.

رُتَّةٌ رَنْحِيَّةٌ. - ataxic d. (= cerebellar d.)  
رُتَّةٌ مُخَيَّجِيَّةٌ. عسر التلفظ - cerebellar d.  
المولد عن آفة أو اختلال وظيفي في المخيخ مما يؤدي إلى تقطع وانفصال مقاطع الكلام.  
رُتَّةٌ بَمَائِثِيَّةٌ. رتة خلقية - developmental d.  
يمكن أن تحدث بمفردها أو مع الشلل المخي.  
تَأْتَاةٌ. - d. literalis (= stuttering)  
رُتَّةٌ تَشْنُجِيَّةٌ. عسر التلفظ الذي يتولد عن تشنج عضلات النطق كما يحصل في بعض حالات الشلل المخي أو في الشلل البصلي المترقي في البالغين حيث تظهر الأصوات بطريقة انفجارية.

- d. syllabaris spasmodica (= stuttering)  
تَأْتَاةٌ: رتة تشنجية للمقاطع.

**dysautonomia** خَلَلُ التَّلَقَّائِيَّةِ: خلل الوظائف المستقلة. مرض وراثي جسدي متنحي يصيب أطفال اليهود فقط ويتصف بخلل الدمعان وتبقع الجلد والاضطراب العاطفي وعدم التناسق الحركي وغياب حس الألم التام وفرط الانعكاسية.

**dysbasia** عُسْرُ الْخَطْوِ. صعوبة المشي وخصوصاً تلك التي تتولد عن آفة عصبية.

- d. angiosclerotica (= claudication, intermittent) عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ.

- d. angiospastica (= claudication, intermittent) عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ.

- d. lordotica progressiva (= dystonia musculorum deformans) عُسْرُ الْخَطْوِ الْقَعَسِيِّ الْمُتَرَقِّي.

**dysboulia (= dysbulia)** خلل الإرادة.

**dyscalculia** خَلَلُ الْحِسَابِيَّةِ. عدم المقدرة

على حل المسائل الحسابية بسبب آفة أو مرض دماغي.

**dyscephaly** سُوءُ تَكْوُنِ الْجُمُجْمَةِ. تشوه القحف وعظام الوجه.

**dyschesia (= dyschezia)** عُسْرُ التَّغَوُّطِ. صعوبة التغوط مع الألم.

**dyschiasia** خَلَلُ تَوْضِيعِ الْإِحْسَاسِ. عدم المقدرة على معرفة موضع الحس في الجسم الذي يتولد عن تنبيه الموضع.

**dyschiria** خَلَلُ تَوْضِيعِ الْمُنْبَهَةِ. عدم المقدرة على معرفة جهة الجسم الملموسة المنبهة.

**dyschronism** خَلَلُ التَّرَاقُنِ. عدم المقدرة على معرفة الفواصل الزمنية.

**dyscinesia (= dyskinesia)** عُسْرُ الْحَرَكَةِ: خَلَلُ الْحَرَكَةِ.

**dysdiadochocinesia (= disdiadochokinesia)** خَلَلُ تَنَاقُوبِيَّةِ الْحَرَكَاتِ.

**dysdiadochokinesia** خَلَلُ تَنَاقُوبِيَّةِ الْحَرَكَاتِ. خلل في وظيفة تناوبية الحركات حيث لا يتمكن المريض من القيام بحركات تناوبية متتالية مثل الكب والبسط المتتاليين. أنظر diadochokinesia

**dysdipsia** عُسْرُ الشَّرْبِ. صعوبة تناول السوائل.

**dysequilibrium** خَلَلُ التَّوَازُنِ. عدم المقدرة على موازنة الجسم.

**dyserethesia, dyserethism** ضَعْفُ الْحَسَّاسِيَّةِ. خلل الاستجابة للمنبهات الحسية.

**dysergia** خَلَلُ التَّنَاسُقِ الْحَرَكِيِّ. عدم توازن الحركات بسبب آفة في الأعصاب الحركية.

1. ضَعْفُ الْجِسْمِ 2. تَحَسُّسٌ شَاذٌ. **dysesthesia**  
1. عدم أو ضعف التحسس بالمنبهات الحسية  
2. تحسس بغض شاذ يتولد عن المنبهات الحسية السوية.

**dysfunction** خَلَلٌ وَظِيفِيٌّ. اضطراب أو ضعف أو شذوذ وظائف أحد الأعضاء.

- minimal brain d. خَلَلٌ وَظِيفِيٌّ دِمَاعِيٌّ صِغَرِيٌّ.

- ضعف المقدرة على الانتباه والتركيز مع فرط الحركة الشاذ
- myofascial pain d.** خَلَلٌ وَظَيْفِيٌّ عَضَلِيٌّ  
لفاسي مُؤَلِّم. انظر -syndrome, temporo-mandibular
- dysgeusia** خَلَلُ الذَّوْق. اختلال حاسة الذوق.
- dysgnosis** خَلَلٌ مَعْرِفِيٌّ. خلل واضطراب الوظائف الفكرية.
- dysgrammatism** عُسْرُ تَرْتِيبِ الْكَلَامِ.  
عدم المقدرة على ترتيب مفردات الكلام بصورة صحيحة بسبب مرض أو رضخ دماغي.
- dysgraphia** خَلَلُ الْكِتَابَةِ. عدم المقدرة على الكتابة بصورة صحيحة وقد تكون جزءاً من حبة كلامية عامة أو بسبب آفة في المنطقة الحركية في الفص الجداري.
- dyskinesia** خَلَلُ الْحَرَكَةِ. خلل القدرة على القيام بحركات إرادية مما يولد تفكك الحركات أو نقصها.
- d. intermittens** خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْمُتَقَطِّعِ. عسر حركة الأطراف الذي يحدث بصورة متقطعة بسبب خلل دورتها الدموية.
- tardive d.** خَلَلُ الْحَرَكَةِ الْأَجَلِ. اضطراب خارج الهرمي العلاجي المنشأ الذي يتولد عن استعمال الأدوية النفسية التأثير لفترة طويلة ويتصف بعسر الحركة الغموي اللساني الحلقى والذي يشبه حركات المضغ المستمر مع إخراج اللسان بفترات متقطعة وحركات رقصية كنعية في الأطراف. ويصيب هذا الاضطراب النساء والشيوخ أكثر من الرجال والأحداث.
- dyskoimesis** عُسْرُ النَّوْمِ. صعوبة النوم والأرق.
- dyslalia** خَلَلُ النُّطْقِ. خلل النطق بسبب تشوّه أعضاء النطق الخارجية.
- dyslexia** خَلَلُ الْقِرَاءَةِ. عدم المقدرة على قراءة الكلمات أو تهجيها أو كتابتها بالرغم من قدرته على رؤية الحروف وقراءتها وهو مرض وراثي جسدي سائد يغلب ظهوره في الذكور.
- dyslogia** خَلَلُ الْمَنْطِقِ. اضطراب المقدرة على التسبب والاستنتاج وضعف المنطق مع خلل الكلام بسبب مرض نفسي.
- dysmetria** خَلَلُ الْقِيَاسِ. حالة خلل قياس المسافات في الفعاليات العضلية وعدم المقدرة على تقدير مسافة الحركات العضلية الإرادية والسيطرة عليها.
- dysmimia** خَلَلُ الْإِيْمَاءِ. عدم المقدرة على التعبير عن الأفكار بالإيماء.
- dysmnnesia** خَلَلُ الذَّاكِرَةِ. ضعف الذاكرة.
- dysmorphophobia** زُهَابُ التَّشَوُّهِ. الخوف من التشوه أو الاعتقاد الخاطئ بوجوده في الجسم.
- dysmorphosis (= malformation)** تَشَوُّهُ. سوء التكون.
- dysmyotonia** خَلَلُ التَّوَثُّرِ الْعَضَلِيِّ. توتر عضلي شاذ.
- dysnomia** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ. عدم تذكر الأسماء الجزئي.
- dysorexia** خَلَلُ الشَّهِيَةِ. شذوذ الشهية أو ضعفها.
- dysosmia** خَلَلُ الشَّمِّ. شذوذ الشم.
- dyspareunia** عُسْرُ الْجَمَاعِ. صعوبة الجماع أو ألمه.
- dyspepsia** تَخَمُّعٌ؛ عُسْرُ الْهَضْمِ. اضطراب الوظائف الهضمية والشعور بالامتلاء بعد الطعام.
- dysphasia** خَلَلُ الْكَلَامِ. اضطراب النطق الذي يتصف بعدم المقدرة على تنسيق الكلام وترتيب الكلمات بنظام خاص لتؤدي المعنى المقصود منها.
- dysphemia** تَأْتَاةٌ نَفْسِيَّةٌ الْمَنْشَأُ. التأتاة واضطرابات الكلام الأخرى النفسية المنشأ.
- dysphonia** خَلَلُ التَّصَوُّيْتِ. اضطراب أعضاء التصويت وصعوبة النطق.
- dysphoria** انزعاج؛ يَرَمٌ؛ تَحَوُّزٌ. تقلقل وفتر.
- dysphrasia (= dysphasia)** خَلَلُ النُّطْقِ. سوء نطق الكلام بسبب آفة مخية.

**dysphylaxia** الإِسْتِيقَاطُ المُبَكَّرُ. الاستيقاظ من النوم صباحاً مبكراً.

**dysplasia** ثَدَنٌ؛ خَلَلُ النَّسْجِ. شذوذ تنامي أحد الأعضاء أو الأنسجة أو تغير في حجم أو شكل أو ترتيب خلايا النسيج.

**- craniodiaphyseal d.** ثَدَنٌ قَحْفِيٌّ جَذَلِيٌّ. حالة وراثية تنتقل كصفة جسدية متنحية تتصف بفرط تعظم القحف وعظام الوجه مما يولد تشوهاً واضحاً.

**- craniometaphyseal d.** ثَدَنٌ قَحْفِيٌّ كُرْدُوسِيٌّ. خلل التنسج الكردوسي يتصف بفرط تعظم عظام الرأس الذي يؤدي إلى ضخامة الرأس وتشويهه.

**dyspragia** إِيْلَامُ الأداء. التآلم عند أداء أية وظيفة.

**dyspraxia** خَلَلُ الأداء. عدم المقدرة على القيام بحركات منسقة.

**dysprosody** إِخْتِلَالُ التَّصْوِيت. اضطراب شدة ونغمة ونظم الأصوات عند الكلام.

**dysraphia** خَلَلُ الرِّفَاء. سوء رفو الرفاء مثل رفاء الأنبوب العصبي.

**dysreflexia** خَلَلُ المُنْعِكِسَات. اضطراب الاستجابة للمنبهات.

**- autonomic d.** خَلَلُ المُنْعِكِسَات المستقلّة. أعراض تظهر عند إصابة نخاع بآفة فوق مستوى وسط الصدر وتتصف بارتفاع ضغط الدم وبطء القلب والتعرق الشديد وتبيغ الوجه واحتقان الأنف والصداع وتقلص مقفات الشعر وكلها تظهر كنوبات انتيائية وتنتج عن فرط استجابة الجهاز العصبي الذاتي (المستقل) للمنبهات كتمدد المستقيم أو المثانة الشاذ.

**dysrhapia** خَلَلُ الرِّفَاء. انظر dysraphia.

**dysrhythmia** خَلَلُ النِّظْم. خلل الوظائف النظامية للجسم كالنوم والتنفس.

**- cerebral d.** خَلَلُ النِّظْم الدِّمَاغِي. خلل تنظيمية الموجات الدماغية التي يسجلها التخطيط الكهربائي للدماغ.

**- electroencephalographic d.** خَلَلُ النِّظْم الدِّمَاغِي. (= cerebral d.)

**dyssomnia** إِضْطِرَابُ النَّوْم. اضطراب النوم ونظمه.

**dysstasia (= dystasia)** عُسْرُ الوُقُوف. عدم استطاعة المريض الوقوف على قدميه.

**dyssymbolia** خَلَلُ التَّفَكُّر. خلل في إدراك الفكر وصعوبة التعبير عن الأفكار بالكلمات.

**dyssymmetry** خَلَلُ التَّنَاطُر. حالة فقدان التناظر على الجهتين.

**dyssynergia** خَلَلُ التَّآزُر. اضطراب تآزر العضلات وتنسيق حركاتها.

**- d. cerebellaris myoclonica** خَلَلُ التَّآزُر المُخَيَّجِي الرَّمَعِي. خلل التآزر العضلي الذي يصاحب الصرع الرمعي.

**- d. cerebellaris progressiva** خَلَلُ التَّآزُر المُخَيَّجِي المُتَرَقِّي. حالة تتصف بالرعاش القصدي العام والشديد والمترافق مع اضطراب التوتر والتآزر العضلي بسبب اضطراب الوظائف المخيخية.

**dystasia (= dysstasia)** عُسْرُ الوُقُوف. صعوبة الوقوف.

**- hereditary ataxic d. (= Roussy-Levy syndrome)** عُسْرُ الوُقُوف الرَّجَجِي الْوَرِاثِي.

**dystaxia (= partial ataxia)** رَنْجٌ جُزْئِي. صعوبة التحكم بالحركات الإرادية.

**dystectia** خَلَلُ غَلَقِ السَّقْف. خلل خلقي يتصف بعدم انغلاق الأنبوب العصبي مما يولد تشوهات الجهاز العصبي كالسنسنة المشقوقة والقبيلة السحائية أو انعدام الدماغ أو مسامية الدماغ.

**dysthymia** إِكْتِنَابٌ جُزْئِي. اضطراب المزاج الذي يتصف بالشعور بالكآبة وفقدان الاهتمام والتلذذ بالأعمال والحوادث الاعتيادية.

**dystonia** خَلَلُ التَّوَتُّر. اضطراب التوتر العضلي.

**- d. deformans progressiva (= d. musculorum deformans)** خَلَلُ التَّوَتُّر المُشَوِّه المُتَرَقِّي.

**- d. lenticularis** خَلَلُ التَّوَتُّر القَدَسِي. خلل التوتر الناتج عن آفة النواة العدسية.

**- d. musculorum deformans** خَلَلُ التَّوَتُّر العَضَلِي المُشَوِّه. مرض جيني مزمن نادر يتصف بتقلصات رمعية لا إرادية غير منتظمة في عضلات

الجذع والأطراف تظهر بصورة خاصة أثناء السير حيث تدير هذه التقلصات الشاذة الجسم إلى الامام والجانب. وتظهر أعراض النوع الجسدي المتنحي من المرض قبل البلوغ وخاصة بين اليهود أما النوع الجسدي السائد فيظهر بعد البلوغ.

**- tardive d.** خَلَلُ التَّوَثُّرِ الْآجِل. نوع من عسر الحركة الآجل الذي يتصف بحركات مختلفة التوتر.

**- torsion d. (= d. musculorum deformans)** خَلَلُ التَّوَثُّرِ الْإِلْتَوَاتِي.

**dystopia** خَلَلُ التَّوَضُّعِ؛ سُوءُ التَّوَضُّعِ. سوء توضع أحد الأعضاء.

**dystrophia (= dystrophy)** خَلَلٌ.

**dystrophoneurosis** 1. عُصَابٌ سُوءٌ 2. سوء التغذية العصابي 1. أي اضطراب عصبي يسببه سوء التغذية 2. سوء التغذية الذي تولده الاضطرابات العصبية.

**dystrophy** خَلَلٌ. (ج: خُلُول). أي اضطراب يتولد عن سوء التغذية أو قتلها وخاصة الخلل العضلي.

**- adiposogenital d.** خَلَلٌ شُخَامِيٌّ تَنَاسُلِيٌّ. حالة تتصف بشحامة انثوية النمط ونقص التنسج التناسلي والذي يترافق مع آفات النخامي.

**- distal muscular d.** خَلَلُ العضلات القاصية؛ خَلَلٌ عَضَلِيٌّ قَاصٍ. اعتلال عضلي وراثي قاص متاخر.

**- Duchenne type muscular d. (= pseudohypertrophic muscular d.)** خَلَلٌ عَضَلِيٌّ نَمَطٌ دُوشِين؛ خَلَلٌ عضلي تضخمي كاذب.

**- Erb's d. (= pseudohypertrophic muscular d.)** خَلَلٌ إِرْب؛ خَلَلٌ عضلي تضخمي كاذب.

**- infantile neuroaxonal d.** خَلَلٌ طِفْلِيٌّ عَصَبِيٌّ مِخْوَارِيٌّ. اعتلال دماغي تنكسي وراثي مترق ينتقل كصفة جسدية متنحية ويبدأ عند الطفولة بوهن عضلي وتوقف النمو ثم يتبعه الخرف والعمى والتشنج والرنح.

ويتصف أيضاً بتورم بؤري وتنكسي في محاور عصبونات الدماغ.

**- Landozy-Dejerine d.** خَلَلٌ لَانْدُوزِي - دِيَجِيرُون. خَلَلٌ عضلي وراثي جسدي سائد يتصف بضمور عضلات الوجه والمكعب والحزام والساعد ويولد سحنة وجهية تسمى «سحنة الاعتلال العضلي».

**- limb-girdle muscular d.** خَلَلٌ حِزَامِ الْأَطْرَافِ العَضَلِيٌّ. خَلَلٌ عضلي مترقي يبدأ في الطفولة أو عند البلوغ ويتصف بضمور ووهن عضلات الحزامين الحوضي والمكبي.

**- muscular d.** خَلَلٌ عَضَلِيٌّ. مجموعة اعتلالات عضلية تنكسية تتصف بوهن العضلات وضمورها من دون إصابة الجهاز العصبي، وهناك ثلاثة أنواع منه وهي الخلل العضلي الضخامي الكاذب والخلل الوجهي الكتفي العضدي وخلل عضلات أحزمة الأطراف.

**- myotonic d.** خَلَلٌ عَضَلِيٌّ تَوَثُّرِيٌّ. خَلَلٌ عضلي وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويتصف بالتوتر العضلي الذي يتلوه الضمور (خصوصاً في عضلات الوجه والرقبة) والساد وقصور الغدد التناسلية والصلع الجبهي وشذوذ القلب.

**- progressive muscular d. (= muscular d.)** خَلَلٌ عَضَلِيٌّ.

**- pseudohypertrophic muscular d.** الخَلَلُ العَضَلِيُّ الضَّخَامِيُّ الْكَاذِبُ. مرض مزمن مترق يصيب حزامي المكعب والحوض ويبدأ في الطفولة ويتصف بالوهن العضلي الضخامي الكاذب والمترقي والذي يتلوه ضمور العضلات والقعس والمشيبة الاهتزازية مع انفراج الساقين وينتقل المرض كصفة مرتبطة بالصبغي X ويصيب الذكور.

**- reflex sympathetic d.** الخَلَلُ الْمُعْكَسِيّ الْوُدِّي. اضطراب الجهاز العصبي الودي الذي يتصف بالاشحوب أو بالاحمرار والألم والتعرق والوزمة وضمور الجلد وهو يتلو عادة الكسور أو رضح العصب أو الاوعية الدموية.

**- thyroneural d.** الخَلَلُ الدَّرَقِيُّ العَصَبِيٌّ. حالة تتصف بالرقص والكنع والصمل والرنح والأعراض الأخرى المترافقة مع إصابات الجهاز العصبي الذاتي مع العيوب العقلية والدرقية.

# E

**earache (= otalgia)** ألم الأذن. وجع الأذن.

**earwax (= cerumen)** صِفْلَاخ. إفراز شمعي الشكل يفرز في الصاخ السمعي الظاهر.

**ecdysiasm** هَوَسُ التَّعَرِّي. الرغبة الشاذة لخلع الملابس والتعري.

**echoencephalogram** مَخْطُطُ صَدَى الدِّمَاغ. المخطط الذي يحصل عليه بتخطيط صدى الدماغ.

**echoencephalograph** مَخْطَاطُ صَدَى الدِّمَاغ. جهاز تخطيط صدى الدماغ.

**echoencephalography** تَخْطِيطُ صَدَى الدِّمَاغ. وسيلة تشخيصية ترسل فيها نبضات فوق صوتية من جهتي الرأس ويسجل صداها من بنيات المستوى الوسطي للدماغ كمخطط بياني ويدل أي انحراف عن المستوى الوسطي على وجود ورم فيه.

**echographia** صُدَاءُ كِتَابِي. حبسة يقلد المريض فيها الكتابة ولكنه لا يمكنه التعبير عن افكاره كتابة.

**echokinesis (= echopraxia)** صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ لَفْظِي. إعادة نمطية كلمات أو مقاطع نطق شخص آخر تشاهد في بعض حالات الفصام وخصوصاً في الفصام الجامودي.

**echolalia** صُدَاءُ لَفْظِي. صُدَاءُ حَرَكِي. إعادة نمطية كلمات أو مقاطع نطق شخص آخر تشاهد في بعض حالات الفصام وخصوصاً في الفصام الجامودي.

**echomatism (= echopraxia)** صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي.

**echomimia (= echopraxia)** صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي.

**echomotism (= echopraxia)** صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي.

**echopathy** اِغْتِلَالُ صُدَائِي. تقليد حركات وأقوال الآخرين.

**echophrasia (= echolalia)** صُدَاءُ لَفْظِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي. صُدَاءُ حَرَكِي.

**echopraxia** صُدَاءُ حَرَكِي. تقليد نمطي لحركات شخص آخر يشاهد في بعض حالات الفصام الجامودي.

**eclampsia** اِرْتِجَاج. اختلاج وغيوبة يحدثان عند الحمل والنفاس.

**puerperal e.** اِرْتِجَاجُ نَفَاسِي. ارتجاج يحصل بعد الولادة.

**eclysis (= mild syncope)** غَشْي خَفِيف. نَسَاوَةُ الجَدِيد. نسيان الأحداث الجديدة مع الاحتفاظ بذاكرة طبيعية للأحداث القديمة.

**ecmnesia** نَسَاوَةُ الجَدِيد. نسيان الأحداث الجديدة مع الاحتفاظ بذاكرة طبيعية للأحداث القديمة.

**ecomania** هَوَسُ السِّيَادَةِ العَائِلِيَّة. هوس الهيمنة على أفراد العائلة مع التواضع تجاه الآخرين ذوي السلطة.

**ecstasy** شَطْح؛ وَجْد. نشوة وابتهاج أو ذمول مبهج.

**ECT (= electroconvulsive therapy)** المَعَالَجَةُ بِالتَّخْلِيجِ الكَهْرَبِي. المَعَالَجَةُ بِالتَّخْلِيجِ الكَهْرَبِي.

**ectocinerea** السَّنْجَابِيَّةُ الخَارِجِيَّة. القشرة السنجابية للمخ.

**ectopia** اِنْتِبَاز. انزياح أو سوء توضع أحد الأعضاء خصوصاً عندما يكون ذلك خلقياً.

**edrophonium** اِيْدُرُوفُونِيُوم. مادة مضادة للكولينستيراز تعمل لمدة عشر دقائق تستعمل للتشخيص التفريقي وتقييم العلاج في الوهن العضلي الوبيل وكما مادة مضادة للمواد المحصرة العصبية العضلية اللازمة للاستقطاب.

**EEG (= electroencephalogram)** مَخْطُطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ. مَخْطُطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ.

**EEG (= electroencephalogram)** مَخْطُطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ. مَخْطُطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ.

**EEG (= electroencephalogram)** مَخْطُطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ. مَخْطُطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ.

**effect** أثر؛ تأثير؛ فعل.

**effector** مُستَقْعِل. عضو يولد عملاً عند تنبيهه  
مثل العضلة التي تتقلص أو الغدة التي تفرز عند  
تنبيهها.

**efferent** صَادِر. ما ينقل بعيداً عن المركز  
كالليف العصبي الصادر.

**efferential (= efferent)** صَادِر.

**egesis** سُهاد. أرق شديد.

**ego** الأنا. جزء النظام النفسي الذي يتوسط  
بين الذات والعالم الخارجي ووظيفته استقبال  
حقائق المحيط وإدراكها والتلاؤم معها والاستجابة  
لها بكفاءة.

**- auxillary e.** الأنا المُساعد. شخص يطابق  
شخصيته مع رغبات وأهداف شخص آخر بهدف  
تعزيزها وتطويرها مثل الأم التي تعمل كإنسان مساعد  
يعزز شخصية ابنها أو بنتها.

**- body e.** أنا الجسم. التوافق النفسي لانا النفس  
مع أنا الجسم اللذين يكونان شخصية الفرد وصورته  
الاجتماعية.

**- preschizophrenic e.** أنا قبل الفُصام. أنا  
تتصف بعدم انسجام تراكيب وظائفها فتولد انفصاماً  
كبيراً مع الواقع قد يسبق ذلك الفصام.

**egocentric** أنانيّ التّركيز. شخص منطوي  
على الذات ومعجب بنفسه ومغرور ومهتم بها  
وباحتياجاته وغير مهتم بالآخرين فهو مركز على  
ذاته فقط.

**ego-dystonic** تَفَارُقُ الذات؛ مرفوض من الأنا.  
شعور الشخص بأن أفكاره وحوافزه وتصرفاته  
وسلوكه بغيضة ومقلقة وغير مقبولة ولا تتسجم  
مع باقي شخصيته فيكون مرفوضاً من الذات.

**egoism** الأنانيّة. الاهتمام بالمصالح الذاتية  
وتطويرها بصورة واعية.

**egomania** هُوسُ الأنانيّة. الأنانية المفرطة  
والتركيز المفرط على الذات.

**ego-syntonic** تَجَانُسُ الذات. شعور الشخص  
بأن أفكاره وحوافزه وتصرفاته وسلوكه منسجمة  
مع باقي شخصيته ومقبولة ومقنعة له فتصبح  
مقبولة للذات.

**egotism** عُزُور؛ أنانيّة. الغرور والانانية  
والتركيز على الذات والتبجح والاعتقاد المبالغ  
بأهمية ذات الشخص.

**egotropic (= egocentric)** أنانيّ؛ مَرَكِزِيّ  
الذات.

**ejaculatio (= ejaculation)** الدَّفَق.

**- e. deficiens** دَفَقٌ مُعِيب. خلل الدفق وعيبه.

**- e. praecox** دَفَقٌ مُبَكِّر. دفق المنى بعد ابتداء  
الجماع مباشرة.

**- e. retardata** دَفَقٌ مُتَأَخِّر. تأخر دفق المنى  
الطويل.

**ejaculation** دَفَق. عملية إبراز مفاجيء كدفع  
المنى.

**- premature e. (= ejaculatio praecox)**  
دَفَقٌ مُبَكِّر.

**elation** ابتهاج. هياج عاطفي يتصف بتسريع  
الفعاليات العقلية والجسمية.

**elbow** المِرْفَق. المفصل الذي يفصل العضد  
عن الساعد.

**- dropped e. (= radial paralysis)** مِرْفَقٌ  
مُتَدَل؛ شلل العصب الكعبري.

**- golfer's e.** مِرْفَقٌ لَأَعِبيِ الْغُولْف. ألم ناتج عن  
التهاب اللقيمة الإنسية حول أصل العضلات المثنية.

**- tennis e.** مِرْفَقٌ لَأَعِبيِ التَّنِيس. التهاب مؤلم  
موضع في الناحية الوحشية للمرفق حول اتصال  
الأوتار بلقمة العضد الوحشية.

**electroacupuncture** الوَخْرُ الإِبْرِيّ الْكَهْرَبِيّ.  
وخز إبري تنبّه الإبر فيه كهربائياً.

**electroanalgesia** تَسْكِينٌ كَهْرَبِيّ.  
تسكين الألم بالتنبيه الكهربائي للعصب المحيطي أو  
للعמוד الظهري للنخاع.

**electroanesthesia** تَخْدِيرٌ كَهْرَبِيّ. تخدير  
موضعي أو عام بالتحريض الكهربائي.

**electrocontractility** تَقَلُّصِيَّةٌ كَهْرَبِيَّة.  
تقلصية تتولد استجابة للتنبيه الكهربائي.

**electroconvulsive** مُتَعَلِّقٌ بِالتَّخْلِيلِج  
الْكَهْرَبِيّ. توليد الاختلاج بالتنبيه الكهربائي.

**electrocorticogram** مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ القَشْرَةِ. مَحْطَطُ كَهْرَبَائِيَّةِ قَشْرَةِ المَخ.

**electrocortigraphy** تَحْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ القَشْرَةِ. تَحْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ قَشْرَةِ المَخ بوضع المَسَارَاتِ على قَشْرَةِ المَخ مباشرة.

**electrode** مَسْرَى كَهْرَبِي. وسط يستعمل بين ناقل الكَهْرَبَائِيَّةِ والعضو أو الجزء المَنْبَه أو بالعكس.

**electroencephalogram** مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ. مَحْطَطُ الجهد الكَهْرَبَائِيَّيَّ المسجل من على سطح القحف والذي تولده الخلايا العصبية للدماغ. والتردد السائد في هذا المَحْطَط هو 8-10 موجات في الثانية وذات ارتفاع 10-100 ميكروفولت.

تحصل بعض التغيرات في سرعة وارتفاع هذه الموجات في بعض الحالات الوظيفية أو المرضية للدماغ مما يساعد في التشخيص المرضي.

مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغِ المُسَطَّح. -flat e. مَحْطَط لا تظهر فيه أية موجات كَهْرَبَائِيَّةِ دماغية مما يدل على عدم وجود أية فعالية دماغية.

مَحْطَطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغِ المُسَطَّح. -isoelectric e. (= flat e.)


**electroencephalograph** مَحْطَّاطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ. آلة تسجيل كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ.

**electroencephalography** تَحْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الدِّمَاغ. تَحْطِيطُ الفعالية الكَهْرَبَائِيَّةِ للدماغ بوضع المَسَارَاتِ على سطح القحف.



electroencephalogram

مَحْطَطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ الذي يبين موجات ألفا التي تختفي وتستبدل بموجات بيتا عند فتح العين في (1) ثم تعود عند غلقها في (2).



electroencephalogram

مَحْطَطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغِ يبين أنواع الموجات السوية أثناء مختلف حالات اليقظة والنوم.

**electroencephaloscope** مَنظَارُ كَهْرَبِيَّةِ  
الدِّمَاغِ. آلَةٌ لَتَنْظِيرِ كَهْرَبَائِيَّةِ مَقَاطِعِ مِنَ الدِّمَاغِ  
بِعَرْضِهَا عَلَى شَاشَةِ مَنظَارِ أَتْنُوبِ الْأَشْعَةِ الْمَهْبِطِيَّةِ.

**electromyogram** مَخْطُطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ.  
المخطط الذي يسجل كهربائية العضل.

**electromyograph** مَخْطُطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ.  
الجهاز الذي يسجل كهربائية العضل.

**electromyography** تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَضَلِ.  
تسجيل ودراسة الخواص والفعاليات الكهربائية  
للعضل بواسطة مسرى سطحي أو إبري عند تقلص  
العضل أو بغرز المسرى إلى داخل العضل لدراسة  
جهد الفعل أو الفعالية الكهربائية المولدة فيه عند  
تنبيهه بمنبه كهربائي إما مباشرة أو بتنبيه عصبه  
الحركي.

**electronarcosis** تَخْدُرُ كَهْرَبِيَّةٍ. تنبيج يولد  
بإمرار تيار كهربائي خلال الدماغ بوضع المساري  
على الصدغين ومن دون توليد أية اختلاجات فيه.

**electroneurography** تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ  
العَصَبِ. قياس سرعة توصيل الدفعات العصبية  
وكمون الأعصاب المحيطة.

**electroneurolysis** فَكُ الْعَصَبِ كَهْرَبِيًّا.  
حل العصب بواسطة إبرة كهربائية.

**electroneuromyography** تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ  
الْعَضَلِ الْمُكَهْرَبَةِ الْعَصَبِ. تخطيط كهربائية تقلص  
العضلة عند تنبيه عصبها الحركي كهربائياً.

**electronystagmogram** مَخْطُطُ كَهْرَبِيَّةِ  
الرَّأْرَأَةِ. سجل التخطيط الكهربائي للرأرأة.

**electronystagmography** تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ  
الرَّأْرَأَةِ. تسجيل تغيرات الجهد الكهربائي القرنوي  
الشبكي أثناء حركة العين في الرأرأة.

**electro-oculogram** مَخْطُطُ كَهْرَبِيَّةِ الْعَيْنِ.  
سجل تخطيط كهربائية العين.

**electro-oculography** تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ  
الْعَيْنِ. تسجيل تغيرات الجهد الكهربائي أثناء  
حركة العين بين نقطتي تثبيت بصريتين.

**electrophysiology** الْفِيزْيُولُوجِيَا الْكَهْرَبِيَّةِ.

الخواص والتغيرات الكهربائية التي تحدث أثناء  
القيام بالوظائف الفيزيولوجية.

**electroplexy (= ECT)** صَدْمَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ.  
المعالجة بالتخليخ الكهربائي.

**electroretinography** تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ  
الشَبَكِيَّةِ. تسجيل تغيرات الجهد الكهربائي في  
شبكة العين عند تنبيهها بمنبهات ضوئية.

**electroshock (= ECT)** صَدْمَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ.

**electrosleep** تَنَوِيمٌ كَهْرَبِيٌّ.  
انظر electrotherapy, cerebral.

**electrospinoqram** مَخْطُطُ كَهْرَبِيَّةِ النُّخَاعِ.  
سجل كهربائية النخاع الشوكي.

**electrotherapy** مُعَالَجَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ. معالجة  
الأمراض بالكهرباء.

**- cerebral e.** مُعَالَجَةٌ كَهْرَبِيَّةٌ دِمَاغِيَّةٌ. استعمال  
كهربائية واطئة الشدة ومستمرة في معالجة الأرق  
والكآبة العصبية.

**elephantiasis neuromatosa**  
(= neurofibroma) وَرَمٌ لِيْفِي عَصَبِيٌّ.

**elurophobia (= ailurophobia)** رَهَابُ  
الهِرَّةِ.

**emaciation** هُرْأَلٌ. حالة فقدان كميات كبيرة  
من وزن الجسم والضعف العام.

**embolalia (= embololalia)** كَلَامٌ أَنْصِمَامِيٌّ؛  
إِلْتِيَاثٌ؛ هَذَرٌ.

**embolism** أَنْصِمَامٌ. انسداد مفاجيء لأحد  
الشرايين بجلطة أو بجسم غريب يصل موقع  
الانسداد خلال مجرى الدم.

**- air e.** أَنْصِمَامٌ هَوَائِيٌّ. انصمام تولده فقاعات  
هوائية تدخل الأوردة بعد الرضح أو المداخلة الجراحية  
أو الحقن الخاطئ.

**- cerebral e.** أَنْصِمَامٌ مُخِّيٌّ. انصمام أحد شرايين  
المخ.

**- spinal e.** أَنْصِمَامٌ نُخَاعِيٌّ. انصمام أحد  
شرايين النخاع الشوكي.

**embololalia** كَلَامٌ أَنْصِمَامِيٌّ؛ إِلْتِيَاثٌ.



إضافة كلمات أو مقاطع لا معنى لها بين كلمات الكلام العادي.

**embolophrasia (= embololalia)** كَلَامٌ  
إِنْصِمَامِي؛ إِنْثِيَاث.

**embolus** صِمَّة. (ج. صِمَّات). 1. جلطة أو سدادة من نوع آخر ينقلها الدم من أحد الأوعية إلى وعاء دموي آخر أصغر منه فتطلق جريان الدم فيه 2. النواة المخيخية الصمية الشكل.

**emesis (= vomiting)** قَيْء.

**emetic** مُقْيء. عامل يسبب التقيؤ.  
**- central e.** مُقْيءٌ مَرْكَزِيٌّ. مقْيء يعمل بتنبيه مركز التقيؤ في الدماغ بعد وصوله إليه عن طريق الدم.

**- indirect e. (= systemic e, central e.)** مُقْيءٌ مَرْكَزِيٌّ.

**EMG (= electromyogram)** مَخْطُطٌ كَهْرَبِيَّة  
الْعَضَل.

**eminence** بَارَزَةٌ. بروز على سطح العضو أو البنية وخصوصاً في العظام.

**- collateral e. of lateral ventricle.** الْبَارَزَةُ  
الرَّادِفَةُ لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ. بروز في قاع القرن الصدغي للبطين الجانبي يولده التلم الوحشي.

**- mamillary e. (= corpus mamillare)** الْجِسْمُ الْحَلِيمِيّ: البارزة الحلمية.

**- medial e. of rhomboid fossa** الْبَارَزَةُ  
الْإِنْسِيَّةُ لِلْحُفْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ. بارزة في القسم الإنسي من قاع البطين الرابع يحدها التلم المحدد من الجهة الوحشية وتتكون من الأكمة الوجهية ومثلث العصب تحت اللساني.

**- median e.** بَارَزَةُ النَّاصِفِ. الباحة المرتفعة على قمع اللحاء عند قاع البطين الثالث للدماغ والتي تستمر في الأسفل مع جذع قمع الغدة النخامية وتحوي الشبكة الشعرية الأولية للجهاز البابي النخامي.

**- occipital e.** الْبَارَزَةُ الْقَذَالِيَّةُ. حرف في البطين الجانبي الجنيني يناسب الشق القذالي في البالغين.

**- postchiasmatic e.** الْبَارَزَةُ خَلْفَ التَّصَالِبَةِ.  
بارزة على قاع البطين الثالث خلف التصالبة البصرية.

**- postfundibular e. (= postchiasmatic e.)**  
الْبَارَزَةُ خَلْفَ التَّصَالِبَةِ.

**- vagal e. (= trigonum nervi vagi)** بَارَزَةُ  
الْمُبْهَمِ.

**eminencia (= eminence)** بَارَزَةٌ.

**emissarium (= emissary vein)** وَرِيدٌ  
مِشْبَرِيٌّ.

**emotion** انْفِعَالٌ؛ عَاطِفَةٌ. حالة إحساس شديد كالتنهيج والضائقة والفرح الشديد والسعادة والحزن والحب والكراهية والخوف والغضب.

**emotional** انْفِعَالِيٌّ؛ عَاطِفِيٌّ. متعلق بالانفعال.

**empathy** تَقَمُّصٌ عَاطِفِيٌّ؛ تَشَاعُرٌ. تقمص شخصية شخص آخر والتحسس العاطفي والعقلي لمشاعره وأفكاره وسلوكه حتى تلك البغيضة المقلقة منها.

**emprosthotos (= episthotonos)** تَقَوُّسٌ أَمَامِيٌّ. نوع من التشنج الكزازي يُجذب فيه الرأس والقدمان إلى الأمام فينطوي ويتشنج.

**empyema** دُبَيْلَةٌ. تجمع قيحي في أحد أجواف الجسم، يستعمل بمفرده للدلالة على دبيلة الصدر.

**encelialgia** أَلَمٌ حَشَوِيٌّ بَطْنِيٌّ. ألم أحد الأحشاء.

**encephalalgia (= headache)** أَلَمُ الرَّأْسِ؛  
صُدَاعٌ. ألم في داخل الرأس.

**encephalatrophy** ضُمُورُ الدِّمَاغِ.

**encephalaxe** ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ.

**encephalemia** إِخْتِقَانُ الدِّمَاغِ.

**encephalic** 1. دِمَاجِيٌّ 2. دَاخِلُ الْقَحْفِ.  
1. منسوب أو متعلق بالدماغ 2. داخل القحف.

**encephalitic** مُلْتَهَبُ الدِّمَاغِ. منسوب أو متعلق بالتهاب الدماغ أو مصاب به.

**encephalitides** اِلْتِهَابَاتُ الدِّمَاغِ. جمع  
التهاب الدماغ.

**encephalitis** اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ.

- كالتهاب سحائي دماغي نخاعي مع إصابات قشرية ونخاعية شبيهة بالتهاب سنجابية النخاع.
- e. A (= lethargic e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الوَسْنِيّ.**
- acute disseminated e. (= encephalomyelitis) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ المُتَنَتِّرِ الحَاد.**
- acute necrotizing e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ النَّاجِرِ**  
الحَاد. التهاب الدماغ المترافق مع تفاعلات تخريبية فيه.
- e. B (= Japanese B e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْيَابَانِيّ.**
- benign myalgic e. (= epidemic neuromyasthenia) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الحَمِيدِ**  
المؤلم للعضل.
- e. C (= st. Louis e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ السَّنْتِ لُويْسِيّ.**
- cortical e. (= e. conticalis) **إِثْهَابُ قَشْرَةِ الدُّمَاغِ.** التهاب يصيب قشرة الدماغ فقط.
- Economo's e. (= lethargic e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الوَسْنِيّ.**
- epidemic e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْوَبَائِيّ.** التهاب دماغي فيروسي وهناك أنواع متعددة منه.
- Hayem's e. (= e. hyperplastica) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ مُفْرَطُ التَّنَسُّجِ.**
- hemorrhagic e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ النَّزْفِيّ.** التهاب دماغي يتصف بوجود بؤر نزفية مع نضح خارج الأوعية.
- hemorrhagic arspenamine e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ النَّزْفِيّ الْأَرْسْفِينَامِينِيّ.** التهاب الدماغ النزفي الذي يحصل بعد المعالجة بالآرسفينامين.
- herpes e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْهَرَبِسِيّ.** التهاب الدماغ الذي يلده فيروس الهربس.
- e. hyperplastica **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ مُفْرَطُ التَّنَسُّجِ.** التهاب الدماغ اللاقيحي الحاد.
- infantile e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الطِّفْلِيّ.** التهاب الدماغ في الأطفال الذي يتكون من مرض عدوائي.
- influenzal e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ النَّزْلِيّ.** التهاب الدماغ الذي يحدث كمضاعفة للنزلة.
- Japanese B e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْيَابَانِيّ.** التهاب الدماغ الذي ينتشر في اليابان في مناطق الشرق الأقصى ويمكن أن يكون من دون أية أعراض أو
- كالتهاب سحائي دماغي نخاعي مع إصابات قشرية ونخاعية شبيهة بالتهاب سنجابية النخاع.
- lead e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الرَّصَاصِيّ.** التهاب الدماغ الذي يتولد عن التسمم بالرصاص.
- Leichtenstern's e. (= hemorrhagic e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ النَّزْفِيّ.**
- Lethargic e. (= e. lethargica) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الوَسْنِيّ.** نوع من التهاب الدماغ الوبائي الذي يتصف بالوهن والضعف والخمول والتعاس الذي يتطور إلى الوسن.
- e. neonatorum **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْوَلِيدِيّ.** التهاب الدماغ في الولدان.
- postinfectious e. (= acute disseminated encephalomyelitis) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ**  
بعد العدوائي.
- postvaccinal e. (= postinfectious e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْقَائِي لِلتَّلْقِيحِ.**
- purulent e., pyogenic e. (= suppurative e.) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْقَنَجِيّ.**
- St. Louis e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ السَّنْتِ لُويْسِيّ.** التهاب الدماغ الذي لوحظ أولاً في سنت لويس ينتشر في الصيف والخريف وينتقل بواسطة البعوض ويمكن أن يكون عدوى بسيطة أو مرضاً وخيماً.
- e. siderans **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْحَدِيدِيّ.** نوع من التهاب الدماغ الوبائي الذي ينتهي بالموت خلال بضع ساعات.
- subacute inclusion body e. (= subacute sclerosing panencephalitis) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الشَّامِلِ الْمُصْلَبِ دُونَ الْحَاد.**
- e. subcorticalis chronica (= Bin-swanger's dementia) **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ تَحْتَ الْقَشْرَةِ الْمُزْمِن.**
- suppurative e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ الْقَنَجِيّ.** التهاب الدماغ الذي يترافق مع النقيح وتوليد الخراج.
- toxoplasmic e. **إِثْهَابُ الدُّمَاغِ بِالْمَقُوسَات.** التهاب الدماغ بالعدوى بالمقوسات.
- مُحْدِثُ لَإِثْهَابِ الدُّمَاغِ؛** encephalitogen  
**مُلْهَبٌ لِلدُّمَاغِ.** أي عامل يولد التهاب الدماغ.
- encephalization** **تَدْمُغ.** عملية التطور

التي تتم بها سيطرة قشرة الدماغ على المراكز العصبية السفلية (النخاعية).

**encephalo-arteriography** تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ والشرابين. تصوير الدماغ المشترك مع تصوير أوعيته لمشاهدة انتشارها فيه.

**encephalocele** قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ. فتق دماغي يبرز فيه جزء من الدماغ خلال فتحة خلقية أو رضحية في القحف.

**encephalocoele** 1. جَوْفُ القَحْفِ 2. جَوْفُ الدِّمَاغِ. 1. الجوف الكلي للقحف 2. بطينات الدماغ وتجاويفه الأخرى.

**encephalocystocele** قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ كَيْسِيَّةٌ. فتق دماغي يمتلأ جزؤه البارز من الدماغ بسائل ويتصل بالبطين ويولد بروزاً كيسياً الشكل.

**encephalodialysis** تَلْتِيقُ الدِّمَاغِ.

**encephalodysplasia** خلل تنسُّج الدِّمَاغِ. أي شذوذ خلقي في الدماغ بسبب خلل في تنسجه.

**encephalogram** صُورَةُ الدِّمَاغِ. فيلم تصوير الدماغ.

**encephalography** تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ. تصوير الدماغ الشعاعي الذي يبين الأحياز الحاوية على سوائل داخل الدماغ بعد سحب السائل الدماغي النخاعي وإدخال الهواء أو غاز آخر محلّه.

**- air e. (= pneumoencephalography)** التَّصْوِيرُ الهَوَائِيُّ لِلدِّمَاغِ.

**- fractional e.** التَّصْوِيرُ الْمُجَزَّأ لِلدِّمَاغِ. نوع من التصوير الهوائي للدماغ لدراسة مختلف أقسام الأحياز تحت العنكبوتية القحفية والبطينات الدماغية تحقن فيه كميات متزايدة من الهواء أو الأكسجين في تحت العنكبوتية وخلال البزل القطني ويصور القحف بعد كل مرة تحقن فيها كمية من الهواء.

**encephaloid (= medullary carcinoma)** 1. دِمَاعَانِي 2. سَرَطَانَةٌ نخاعية. 1. شبيه بالدماغ. 2. سرطانة تتكون بصورة رئيسية من عناصر ظهارية فيها القليل من السدى.

**encephalolith** حَصَاةُ الدِّمَاغِ. حصاة أو تحصى في الدماغ أو في أحد البطينات.

**encephalology** عِلْمُ الدِّمَاغِ. مجموع الدراسات والمعلومات الخاصة بتشريح ووظائف الدماغ وأمراضه.

**encephaloma (2. = medullary carcinoma)** وَرَمٌ دِمَاعِيٌّ. 1. أي تورم أو ورم في الدماغ 2. سرطانة نخاعية.

**encephalomalacia** تَلْتِيقُ الدِّمَاغِ.

**- periventricular e.** تَلْتِيقُ الدِّمَاغِ حَوْلَ البُطَيْنِ. تلين المادة البيضاء في المخ حول البطينات المخية يشاهد في الكثير من الأطفال المصابين بالشلل المخي.

**- thalamic e.** تَلْتِيقُ الدِّمَاغِ المِهَادِي. تنكس المهاد الذي يولد العديد من الأعراض الحسية مثل المذل والخرف الذي يتصف بفقدان المبادرة الحركية.

**encephalomeningitis (= meningo-encephalitis)** الْتِهَابُ الدِّمَاغِ والسَّحَايَا.



**encephalomeningocele (= meningo-encephalocele)** قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ سَحَائِيَّةٌ.

**encephalomeningopathy** اِغْتِلَالُ الدِّمَاغِ والسَّحَايَا. (= meningoencephalopathy)

**encephalomere** قُسْمٌ دِمَاعِيٌّ. أي من الشدافات المتتالية التي تكون دماغ الجنين.

**encephalomyelitis** اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ والنَّخَاعِ. التهاب يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.


**- acute disseminated e.** اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ والنَّخَاعِ الْمُتَنَتِّرِ الحَاد. التهاب الدماغ الحاد أو دون الحاد الذي يتصف بالارتشاح اللمفاوي والخلايا أحادية النواة مع زوال النخاعيين. ويحصل المرض غالباً بعد الإصابة بعدوى فيروسية خصوصاً الحصبة وقد يحصل من دون أية إصابة مسبقة ظاهرة. وقد كان يتولد سابقاً كمضاعفة للتلقيح ضد الجدري. ويتصف المرض سريرياً بالصداع والقيء والنعاس الذي يتطور إلى الوسن والغيبوبة. كما قد يحدث الرعاش والشلل والنوبات. ومعدل الوفيات فيه حوالي 20-5% ولكن معظم الناجين منه يصابون ببعض العاهات العصبية.




i

encephalography

مقطعان للدماغ بالمرنان resonator (i) سهمي و (ب) جبهي لنفس المريض يبينان ورماً سحائياً تظهر فيه أوعيته وعلاقته السحائية بالأم الجافية.



1



ب

encephalography

التصوير الشعاعي للدماغ:  
(ا) صورة امامية خلفية  
(ب) صورة جانبية

- **allergic e.** **إِغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ** **وَالنُّخَاعُ الْأَرْجِيّ.**  
التهاب الدماغ والنخاع الذي يتولد عن الأرجية أو فرط الحساسية للتلقيح مثلاً.

- **benign myalgic e. (= epidemic neuro-myasthenia, chronic fatigue syndrome)**  
**إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ الْحَمِيدِ الْمُؤَلِّمُ لِلْعَضَلِ.**

- **Cruckett subacute e. (= encephalitis lethargica)**  
**إِثْتَابُ الدُّمَاعِ الْوَسْئِيّ.**

- **granulomatous e.** **إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ**  
الورمي الحُبَيْبِيّ. الالتهاب الذي ترافقه أورام حبيبية ونخر جدران البطينات المخية والنخاعية.

- **postinfectious e. (= acute disseminated e.)**  
**إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ التَّالِي**  
للعدوى.

- **postvaccinal e. (= acute disseminated e.)**  
**إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ التَّالِي لِلتَّقْطِيعِ.**

- **toxoplasmic e.** **إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ**  
بِالْمَقُوسَات. التهاب الدماغ والنخاع بالعدوى بالمقوسات.

- **viral e. (= virus e.)** **إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ**  
الْفَيْرُوسِيّ. التهاب ناجم عن بعض الفيروسات.

**encephalomyelocele** **قَيْلَةُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ**  
وَالسَّحَايَا. شذوذ خلقي في الثقبية العظمية وغياب النواتئ والصفيحات الشوكية للفقرات العنقية والذي يولد انفتاق السحايا وبعض الأنسجة الدماغية والنخاعية.

**encephalomyeloneuropathy** **إِعْتِلَالٌ**  
**دِمَاعِيٌّ نُخَاعِيٌّ عَصَبِيّ.** مرض يشمل الدماغ والنخاع الشوكي وبعض الأعصاب المحيطية.

**encephalomyelopathy** **إِعْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ**  
**نُخَاعِيٌّ.** مرض أو حالة مرضية تصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

- **postinfection e.** **إِعْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ نُخَاعِيٌّ تَالِي**  
لِلْعَدْوَى. زوال النخاع الثانوي للأمراض الفيروسية الشائعة كالحصبة والحصق والحصبة الألمانية والنكاف والنزلة الوافدة.

- **postvaccinal e.** **إِعْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ نُخَاعِيٌّ تَالِي**  
لِلتَّقْطِيعِ. زوال الميالين الذي يضاعف الاستجابة للتلقيح ضد الجدري.

- **subacute necrotizing e.** **إِعْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ**  
**نُخَاعِيٌّ تَاخِرٌ دُونَ الْحَادِّ.** اعتلال دماغي غير محدد المرضيات السريرية والذي يولد مرضيات عصبية وأضراراً في جذع الدماغ مثل تلك التي تتولد في متلازمة فرنيكة - كورساكوف. وهناك نوعان منه أحدهما طفلي حيث تنتكس فيه المادة السنجابية مع بؤر نخزية في ساق الدماغ ويتصف بنقص الشهية والقيء وبطء النمو أو توقفه والوهن العضلي والنوبات والحركات الشاذة واضطرابات في التنفس والرؤية والخرف والذي ينتهي بالموت قبل سن الثالثة، أما النوع الذي يصيب البالغين فإنه يتصف بالضمور البصري بالعينين والعمى المركزية وعمى الألوان. ويظهر بعد سن الثلاثين الرنح والخزل التشنجي والنفضات الرمعية ونوبات الصرع الكبير والخرف.

**encephalomyeloradiculitis** **إِثْتَابُ**  
**الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ وَالْجُذُورِ.** التهاب الدماغ والنخاع والجذور العصبية الشوكية.

**encephalomyeloradiculoneuritis**  
**إِثْتَابُ الدُّمَاعِ وَالنُّخَاعِ وَالْجُذُورِ وَالْأَعْصَابِ.** التهاب الدماغ والنخاع والجذور العصبية الشوكية والأعصاب المحيطية.

**encephalomyeloradiculopathy** **إِعْتِلَالٌ**  
**دِمَاعِيٌّ نُخَاعِيٌّ جَذْرِيّ.** مرض يصيب الدماغ والنخاع الشوكي والجذور العصبية الشوكية.

**encephalomyocarditis** **إِثْتَابُ الدُّمَاعِ**  
**وَالْقَلْبِ.** مرض فيروسي يتصف بتغيرات التهابية وتنكسية في العضلات الهيكلية والقلبية وآفات في الجهاز العصبي المركزي شبيهة بالتهاب سنجابية الدماغ.

**encephalon (= the brain)** **قِسْمُ**  
**الدُّمَاعِ.** الجهاز العصبي المركزي الموجود في داخل القحف والمكون من الدماغ المقدم والدماغ المتوسط والدماغ المؤخر والذي يتطور في الجنين من القسم الأمامي من الأنبوب العصبي.

**encephalonarcosis** **تَخَدُّرٌ دِمَاعِيٌّ**  
**الْمَنْشَأُ.** ذهول بسبب مرض دماغي.

**encephalopathia (= encephalopathy)**  
**إِعْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ.**

- **e. alcoholica (= polioencephalitis hemorrhagica superior)** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كُحُولِيٌّ.

**encephalopathy** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ. أي مرض تنكسي في الدماغ.

- **addisonian e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ أديسونيٌّ. زهان عضوي يترافق مع السحرة الحادة لداء أديسون.

- **alcoholic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كُحُولِيٌّ. أي اختلال وظيفي للدماغ يترافق مع تناول الكحول سواء ذلك الذي يحدث من الانسمام الحاد أو من التغيرات المزمنة التي ترافق الإدمان مثل زهان فرنيكة - كورساكوف.

- **anoxic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِعَوَزِ الأوكسجين. اضطراب دماغي يتولد عند التعرض لعوز الأكسجين.

- **biliary e. (= hepatic e.)** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كَبِدِيٌّ المنشأ.

- **boxer's e. (= traumatic e.)** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَضَجِيٌّ.

- **demyelinating e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ مُزِيلٌ للميالين. مرض تنكسي دماغي يتصف بزوال النخاعين.

- **dialysis e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ دِيَالِيٌّ. مرض تنكسي دماغي يترافق مع الاستعمال الطويل للديال الدموي والذي يتصف باضطراب الكلام وانتفاضات عضلية رمعية مستمرة ويتطور إلى خرف عام وتغييرات نفسية وتلين العظام.

- **hepatic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كَبِدِيٌّ المنشأ. حالة تتطور كمضاعفة ثانوية لمرض الكبد المتقدم وقد تشاهد في الأمراض الشديدة الوخيمة وتتصف باضطراب الوعي الذي يتطور إلى الغيبوبة العميقة (السبات الكبدي) واضطرابات ذهانية مختلف الدرجات والرعاش والتشنج الكبدي.

- **hypernatremic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِفَرْطِ صَوْدِيُومِ الدَّمِ. اعتلال دماغي نزفي وخيم يحدث في الأطفال بسبب الإفراط في تناول الملح أو في البالغين بسبب آفة وطائية كالورم.

- **hypertensive e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِارْتِفَاعِ الضَّغْطِ. مجموعة من أعراض الاضطرابات الدماغية كالصداع والاختلاج والغيبوبة التي تتولد من ارتفاع ضغط الدم الوبيل.

- **hypoglycemic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ بِنَقْصِ السُّكَّرِ. اعتلال دماغي استقلابي يتولد عن نقص سكر الدم الشديد كالذي يحصل في داء خزن الغليكوجين ويتصف بالاختلاج واضطرابات الفعاليات المخية كالتفكير والذاكرة ثم الغيبوبة.

- **lead e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَصَاصِيٌّ. اضطراب دماغي يتولد عن التسمم بالرصاص.

- **metabolic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ اسْتِقْلَابِيٌّ. اضطرابات عصبية نفسانية تنتج عن أمراض استقلابية دماغية وقد تنتج في البدء عن عوز الأكسجين أو الإفقار أو نقص سكر الدم أو كمضاعفة ثانوية لأمراض أعضاء أخرى كالكلية أو الكبد أو الرئة.

- **myoclonic e. of childhood** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَعِيٌّ غَضَلِيٌّ طِفْلِيٌّ. اضطراب عصبي غير معروف السببية يصيب الأطفال بين سني 1-3 سنوات ويتصف بالرمع العضلي في الأطراف والجذع والعين والرنح ورعاش الحركة.

- **portal-systemic e. (= hepatic e.)** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ كَبِدِيٌّ المنشأ.

- **progressive punch-drunk e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ تَرَنَحِيٌّ بِاللَّكَمَاتِ. اعتلال دماغي يصيب الملاكمين نتيجة الاصابات الدماغية المتراكمة والذي يتصف بالنسوة وبطء التفكير والرثة الكلامية والحركات غير المنتظمة خصوصاً في الساقين.

- **saturnine e. (= lead e.)** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَصَاصِيٌّ.

- **spongiform e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ اسْفَنْجِيٌّ الشَّكْلَ. اعتلال دماغي يتصف بتفجي القشرة الدماغية المنتشر ويشمل امراضاً دماغية عديدة كمتلازمة كروتزفيلد-جاكوب.

- **traumatic e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ رَضَجِيٌّ. اضطراب دماغي يتولد عند الملاكمين نتيجة تعرضهم المستمر لرضوح دماغية متلاحقة يتصف ببطء الفعاليات الدماغية والفكرية والنسوة والتخليط.

- **Wernicke's e.** اغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ فَرْنِيكِيٌّ. اضطراب عصبي يتصف بالتخليط والخمول والنعاس ورنح السير والראة وشلل العين وكان يعتقد بأن المرض يتولد عن آفات نزفية في المادة السنجابية للدماغ ولكنه يعرف الآن بأنه يتسبب عن نقص في الثيامين

ويتولد غالباً عن الادمان للكحول وغالباً ما ينتهي بمتلازمة كورساكوف (النسابة العضوية).

### encephalopuncture

بَزْلُ الدِّمَاغِ. البزل الجراحي للدماغ.

### encephalopyosis

تَفْقِيعُ الدِّمَاغِ. خراج الدماغ أو تقيحه.

### encephalorachidian

(= cerebrospinal) دِمَاعِي نَخَاعِي.

### encephaloradiculitis

إِثْتَابُ الدِّمَاغِ والجذور. التهاب جذور النخاع الشوكي والدماغ.

### encephalorrhagia

نَزْفُ دِمَاعِي. نزف في داخل الدماغ أو من الدماغ وخصوصاً النزف المخي حول الشعيرات.

### encephalosclerosis

تَصَلُّبُ الدِّمَاغِ.

### encephaloscope

مِنْظَرُ الدِّمَاغِ. آلة لتتظير أي تجويف (مثل تجويف الخراج) في داخل الدماغ.

### encephaloscopy

تَنْظِيرُ الدِّمَاغِ. فحص أو مشاهدة الدماغ.

### encephalosepsis

إِثْتَانُ الدِّمَاغِ. موات الأنسجة الدماغية.

### encephalosis

دِّمَاغ؛ دَاءٌ دِمَاعِي. أي مرض عضوي يصيب الدماغ ويستعمل خاصة للأمراض التنكسية التي تصيب الدماغ.

### encephalospinal

دِمَاعِي نَخَاعِي. نسبة للدماغ وللعمود الفقاري.

### encephalothlipsis

إِنْضِغَاطُ الدِّمَاغِ.

### encephalotome

مِبْضَعُ الدِّمَاغِ. آلة تستعمل لإتلاف الدماغ أو لشقه.

### encephalotomy

1. إِتْلَافُ الدِّمَاغِ 2. بَضْعُ الدِّمَاغِ. 1. إتلاف دماغ الجنين لتسهيل ولادته في الحالات المستعصية 2. شق الدماغ.

### endarteritis

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ. التهاب طبقة بطانة الشريان.

### - e. deformans

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ المُشَوَّه. التهاب بطانة الشريان المزمن الذي يتصف بتنكس شحمي في أنسجة الشريان مع ترسب أملاح كلسية فيه.

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ المُسَدِّ. التهاب بطانة الشرايين الصغيرة التي تتضيق ثم تنغلق نتيجة تكاثر أنسجة بطانتها.

إِثْتَابُ بَطَانَةِ الشَّرِيَّانِ التكاثري. - e. proliferans فرط نمو الأنسجة الليغية في الطبقات الداخلية للابهر.

الدِّمَاغُ الإِنْتِهَائِي (= telencephalon)

البَرِّاعِمُ (= bouton terminal)

الِإِنْتِهَائِيَّة. الأقدام أو الأزرار أو التضخمات الانتهازية للألياف العصبية الحرة التي تنتهي عند العصبونات الأخرى وتغصناتها وتسمى أيضاً الأزرار الانتهازية.

الصَّفِيحَةُ الإِنْتِهَائِيَّة (= end-plate)

نِهَآيَةُ. النهاية الطرفية الانتهازية للليف العصبي.

النِّهَآيَاتُ الحَلَقِيَّةُ اللُّوَلِيَّةُ. - annulospiral e's. نهايات عصبية حسية عريضة وشريطية الشكل تلتف حول الألياف المغزل العضلي.

نِهَآيَةُ نَبَوْتِيَّة لِبَارْتَلِمَز. - club e. of Bartelmez نوع من النهايات العصبية التي توجد في الجهاز العصبي المركزي وتنتهي بصورة حادة على تغصنات العصبونات الأخرى.

نِهَآيَاتُ عَصْبِيَّة مُمَحْفَظَةٌ (= terminal nerve corpuscle) أنظر corpuscle.

نِهَآيَاتُ فَوْقُ الغَمْدِ. - epilemmal e's. عصبية حسية في العضلات المخططة حيث تكون النهايات العصبية بتماس مباشر مع الألياف العضلية ولكن من دون أن تخرق غمدها العضلي.

نِهَآيَاتُ مُنْقَوِّدِ الزَّهْرِ. - flower spray e's. عصبية حسية دقيقة ومتفرعة تنتهي على الغمد العضلي لألياف المغزل العضلي.

نِهَآيَاتُ عَصْبِيَّة حُرَّة. - free nerve e's. عصبية متقبلة حسية لها شكل بسيط حيث ينتهي الليف العصبي بتفرعات عديدة تنتهي في النسيج الضام أو في الظهارة أو البطانة.

النِّهَآيَاتُ العَصْبِيَّةُ. - nerve e's. نهايات الفروع الحرة للمحاور.

**end-nuclei** النوى الإنتهائية.  
أنظر terminal nuclei.

**endocranitis** التهاب بطانة القحف. التهاب طبقة بطانة القحف.

**endocranium** بطانة القحف. الطبقة السحاقية الباطنة للطبقة الخارجية لجافية الدماغ.

**endolabyrinthitis** التهاب التيه الغشائي.

**endolymph** اللغف الباطن. السائل الذي يوجد في التيه الغشائي للأذن.

**endoneural** ضمن العصب. متعلق بداخل العصب أو متوضع فيه.

**endoneuritis** التهاب غمد الليف العصبي.

**endoneurium** غمد الليف العصبي. النسيج الخلالي الضام الذي يوجد حول الليف العصبي المحيطي والذي يفصل الالياف العصبية الواحد عن الآخر في العصب المحيطي.

**endoneurolysis (= hersage)** تفشيظ. شق ألياف العصب المحيطي جراحياً وتفريق أليافه.

**end-organ** عضو إنتهائي. إحدى النهايات العصبية الحسية الكبيرة المحفوظة وهناك أنواع متعددة منها وتسمى أيضاً الجسيمات العصبية الانتهائية.

**endorphin** إندورفين. أحد المركبات الببتيدية العصبية الموجودة في الدماغ والمرتبطة بالمستقبلات الأفيونية ولها فعل مسكن شديد. وهناك ثلاثة أنواع مهمة منها هي ألفا وبيتا وغاما، ويوجد الإندورفين بيتا في النخامى الغدية والوطاء ومواقع أخرى في الدماغ. وكلها تقوم بوظائف مهمة في إدراك حس الألم.

**end plate (= end-plate)** صفيحة إنتهائية. نهاية عصبية مسطحة.

**- motor e.p.** الصفيحة الإنتهائية الحركية. النهاية المسطحة لفرع إنتهائي من فروع محوار العصبون الحركي الذي يقابل الصفيحة الاخصية لليف العضلي ليكون الاتصال العصبي العضلي.

**endyma (= ependyma)** بطانة عصبية.

**energizer** منشط. عامل يعطي أو يوفر أو ينشط أو يشحن الطاقة.

**- psychic e.** منشط نفساني. دواء يحسن المزاج كالادوية مضادة للكآبة أو محاكية الودي.

**enervation** 1. نزع العصب؛ قطع العصب.  
2. عوز الطاقة العصبية. 1. نزع العصب أو قطعه.  
2. قلة الطاقة العصبية، وهن أو كسل.

**engram** إنطباع. الاثر الدائم الذي يخلفه التنبيه في النسيج أو العضو العصبي، وفي علم النفس هو الاثر الذي تتركه في النفس أية تجربة نفسية يمر بها الشخص.

**enkephalin** إنكيفالين. ببتيدات توجد في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي ومنها الليو - انكيفالين والمت - انكيفالين وهي تعمل كناقلات عصبية في مناطق متعددة من الدماغ والنخاع ولها دور مهم في وظائف إدراك حس الألم وفي المزاج والسلوك والوظائف الحركية والسيطرة العصبية الصماوية. كما أنها توجد في الضفائر العصبية والغدد الخارجية الإفراز في القناة المعدية المعوية.

**enkephalinergic** إنكيفاليني الفعل. يشير إلى التوصيل المشبكي بالانكيفالين.

**enlargement** ضخامة. 1. زيادة في حجم الجزء أو العضو 2. في التشريح هو بروز أو تورم أو تضخم.

**enophthalmos** خوص. انزياح المقلة إلى الخلف في الحجاج.

**enophthalmus (= enophthalmos)** خوص.

**entasia (= entasis)** تشنج مضيق. تقلص عضلي تشنجي مضيق.

**enteralgia** ألم الأمعاء. ألم الامعاء أو ألم عصبي معوي.

**enteroneuritis** التهاب الأعصاب المعوية.

**enuresis** سلس البول؛ بول الإفراش. التبول اللاإرادي للأطفال بعد السن الذي يفترض فيه التمكن من السيطرة على عملية التبول ويستعمل الاصطلاح للتبول الليلي اللاإرادي بالفراش.

**enuretic** (متعلق) ببول الإفراش. 1. متعلق



بيول الفراش 2. عامل يحفز بول الفراش 3. شخص مصاب ببول الفراش.

**بيئة.** مجموع الظروف والعوامل **environment** التي تحيط بالكائن أو أعضائه أو أنسجته والتي تؤثر على فعالياته وتناميها.

**البيئة الخارجية.** البيئة التي تحيط **- external e.** بالكائن من الخارج والتي يعيش فيها ويتنفس منها.

**البيئة الداخلية.** السائل الموجود في **- internal e.** داخل الجسم والذي يحيط بأعضائه وأنسجته وخلاياه.

**البيئة المهنية.** الظروف **- occupational e.** والعوامل التي توجد في محيط عمل الكائن الحي.

**ألم الإزهاق.** اضطراب مؤلم يتولد **eparsalgia** عن إزهاق أي عضو من أعضاء الجسم كإزهاق القلب أو إزهاق الفتق أو السعال.

1. **المخّخ 2.** الدماغ التالي. **epencephalon**

**بطانة عصبية.** بطانة بطينات **ependyma** الدماغ والقناة المركزية للنخاع الشوكي.

**التهاب البطانة العصبية.** **ependymitis**

**أرومة البطانة العصبية.** **ependymoblast** خلية البطانة العصبية الجنينية.

**الورم الأرومي البطني العصبي؛ ورم أرومات البطانة العصبية.** **ependymoblastoma** ورم خبيث يتكون من خلايا البطانة العصبية البدائية.

**خلية البطانة العصبية.** **ependymocyte**

**ورم البطانة العصبية (= endymoma)** **ependymocytoma**

**ورم البطانة العصبية.** ورم **ependymoma** خلايا البطانة العصبية وهو ورم حميد عادة ولكن هناك بعض أنواعه الخبيثة.

**إغتيال البطانة العصبية.** أي مرض يصيب البطانة العصبية. **ependymopathy**

**لمس؛ لمس.** نقطة تلامس جانبية **ephapse** (غير المشبك) بين الألياف العصبية تمر عبرها الدفعات العصبية من ليف لآخر مباشرة ومن دون أي تشابك بينهما.

**لماسي؛ لمس.** انتقال الدفعات **ephaptic** العصبية عبر الملمس وهو غير الانتقال المشبكي.

**بلوغية.** التطورات الجسمية **epheboogenesis** التي تتم في مرحلة البلوغ.

**إفيدرين.** دواء أدريناليني الفعل **ephedrine** يستعمل لإزالة احتقان الغشاء المخاطي للأنف في الحالات الأرجية أو لإرخاء عضلات القصبات في الربو القصبي أو كمنبه للجهاز العصبي المركزي في النوم الانتيابي أو كمضاد للأدوية المكثبة أو لمنع هبوط ضغط الدم في التبنج النخاعي.

**فرط (hyperhidrosis = ephidrosis)** **التعرق؛ تعرق.**

**السرج (sella turcica = ephippium)** **التركي.**

**ألم اللقمة.** ألم العضلات **epicondylalgia** أو الأوتار المرتكزة في لقيمة العضد.

**الشوافة.** غطاء القحف أو لحافته **epicranium** وسفاقه وامتداد العضلات التي تغطيه.

**دقيق التعيين.** ما يتعلق بالتعيين **epicritic** الدقيق والمييز ويطلق على الألياف العصبية الجلدية التي تستقبل حسي للمس أو الحرارة المميزين والدقيقين جداً.

1. **وباء 2.** وبائي. مرض ينتشر **epidemic** بصورة فجائية بأعداد أكبر من حالات انتشاره الاعتيادية أو المتوقعة.

**فوق الجافية.** خارج الجافية أو **epidural** فوقها.

**تصوير فوق الجافية.** تصوير **epidurography** العمود الفقري بعد زرق مادة عتمة للأشعة حول الجافية.

**غمد الليف العصبي (= endoneurium)** **epilemma**


**متعلق بغمد الليف العصبي.** **epilemmal**

**صرع (= epilepsy)** **epilepsia**

**صرع ركضي (= cursive epilepsy)** **- e. cursiva**

**صرع كبير (= grand mal epilepsy)** **- e. gravior**

**صرع كبير (= grand mal epilepsy)** **- e. major**



environment

صورة تبين العلاقة بين المحيطين الداخلي والخارجي للجسم وتأثيرهما في جسم الإنسان حيث تثير تغيرات المحيط استجابة الجهاز العصبي المحيطي والمركزي للتفاعل مع هذه التغيرات.

- **e. minor** (= minor epilepsy) صَرْعٌ صَغِيرٌ.
- **e. mitior** (= minor epilepsy) صَرْعٌ صَغِيرٌ.
- **e. nutans** صرع إيمائي. نوبات أو إيماءات الرأس في الأطفال وهي نوع من نوبات تعذر الثبات.
- **e. partialis continua** نَوَبَاتٌ جُزْئِيَّةٌ متواصلة. نوبات حركات رمعية مستمرة لجزء من الجسم بسبب موجات دفعات عصبية شاذة.
- **e. procursiva** (= cursive epilepsy) صَرْعٌ رَكْضِيٌّ.
- **e. rotatoria** صَرْعٌ دَوْرَانِيٌّ. نوبة سرعية يدور بها الجسم ويلتف.
- **e. tarda** صَرْعٌ آجَلٌ. صرع يبدأ عند منتصف العمر أو بعد ذلك.
- epilepsy** صَرْعٌ. اضطرابات انتيائية عابرة في وظيفة المخ تولد تغييم الوعي أو فقدانه العارض مع ظواهر حركية شاذة واضطرابات حسية أو نفسية أو اختلال الجهاز العصبي المستقل وتنتج هذه العوارض عن اختلال كهربائية الدماغ الانتيائي وهناك أنواع عديدة من الصرع.
- **abdominal e.** صَرْعٌ بَطْنِيٌّ. ألم بطني انتيائي يتولد عن صدور دفعات عصبية شاذة من الدماغ.
- **acquired e.** صَرْعٌ مُكْتَسَبٌ. صرع يتولد عن مرض مخي يصيب المريض بعد ولادته.
- **activated e.** صَرْعٌ مُنَشَّطٌ. نوبات سرعية تحفز بالتنبية الكهربائي أو بالادوية لأغراض مشاهدة أعراضها السريرية الاستجابات الكهربائية الدماغية المولدة فيها.
- **adversive e.** صَرْعٌ تَدْوِيرِيٌّ. صرع بؤري يتصف بتدوير الرأس والعينين والجذع أحياناً إلى الجهة المعاكسة لجهة الإصابة في الفص الجبهي للدماغ والباحة الجبهية البصرية فيه.
- **affective e.** صَرْعٌ عَاطِفِيٌّ. صرع بؤري يتصف بأعراض عاطفية كالخوف والقلق والاكتئاب ويتولد عن آفة بؤرية في أحد الفصين الصدغيين.
- **akinet e.** (= atonic e.) صَرْعٌ لَأَحْرَكِيٌّ.
- **alcoholic e.** صَرْعٌ كُحُولِيٌّ. نوبة صرع يحفزها تناول الكحول.
- **alternating e.** صَرْعٌ مُتَنَاقِبٌ. نوبات صرع

تتناوب في جهتي الجسم فتحدث في كل مرة في إحدى الجهتين أو تبدأ في إحدى الجهتين ثم تنتشر للجهة الثانية ولا يعرف سبب لذلك.


- **ambulatory e.** صَرْعٌ سَيْرِيٌّ. نوبة صرع تتولد تلقائياً تتصف بسير المريض من دون وعي ولن يتذكر ذلك بعد انتهاء النوبة وتسببها آفة في الفص الصدغي.
- **amygdaloid e.** صَرْعٌ لَوَزِيٌّ. نوبة صرع تتولد عن آفة النواة اللوزية وتتصف بحركات مضغية نظمية مع قضم الشفتين.
- **aphasic e.** صَرْعٌ حُبْسَوِيٌّ؛ صَرْعٌ حُبْسِيٌّ. نوبة صرع تتصف بفترة حبسة تامة بالرغم من احتفاظ المريض بوعيه.
- **atonic e.** صَرْعٌ وَانٍ. نوع من الصرع يتصف بفقدان توتر عضلات الوضع مما يؤدي إلى الوهط وقد يكون ذلك مفاجئاً وسريعاً فيسقط المريض على الأرض وقد يصاب بأذى ولكن من دون اختلاج وقد يكون الوهط تدريجياً مصحوباً بنفضات متتالية.
- **auditory hallucinatory e.** صَرْعٌ هَلُوسِيٌّ سَمْعِيٌّ. نوبة صرع تترافق مع سماع اصوات موسيقية أو كلام سابق من الذاكرة وتنتج عن آفة في الفص الصدغي للمخ.
- **automatic e.** صَرْعٌ تَلَقَّائِيٌّ. نوبة صرع تتولد تلقائياً وغالباً ما تكون سيرية شبه قصدية ولكن المريض لا يتذكرها بعد حصولها.
- **autonomic e.** صَرْعٌ مُسْتَقَلٌّ. نوبة صرع تترافق مع أعراض أغلبها ناتج عن تهيج الجهاز العصبي المستقل مثل تسرع القلب وارتفاع ضغط الدم وتوسع الحدقة والتعرق المفرط واضطراب التنفس.
- **Bravais-jacksonian e.** (= jacksonian e.) صَرْعٌ جَكْسُونِيٌّ.
- **centrencephalic e.** صَرْعٌ الدِّمَاغِ المَرْكَزِيٌّ. صرع نتيجة دفعات عصبية تصدر من التكوين الشبكي للدماغ المتوسط والمهاد وتنتشر إلى الجهتين وإلى القشرة المخية.
- **clonic e.** صَرْعٌ رَمْعِيٌّ. صرع عام يصيب الأطفال الصغار وتدموم نوبته لمدة دقيقة واحدة تقريباً ويتصف سريراً بفقدان الوعي مع تقلصات رمعية نظمية في جهتي الجسم وفي كل أقسامه.

- **conscious e.** صَرْعٌ وَاعٍ. صرع لا يفقد المريض فيه وعيه أثناء النوبات.
- **cortical e.** صَرْعٌ قَشْرِيٌّ. نوبات صرعية بؤرية تبدأ من قشرة المخ.
- **cryptogenic e. (= Idiopathic e.)** صَرْعٌ مجهول السبب.
- **cursive e. (= procursive e.)** صَرْعٌ ركضيٌّ.
- **cyclical e.** صَرْعٌ دَوْرَوِيٌّ. صرع يتصف بنوبات صرعية تلقائية تعاود بفترات منتظمة متوقعة ولا علاقة لها بأي عامل مؤهب.
- **delayed e.** صَرْعٌ آجَلٍ. صرع يظهر بعد الإصابة بالرضح بفترة طويلة قد تمتد إلى شهور أو سنوات عديدة.
- **diencephalic e. (= centrencephalic e.)** صَرْعٌ الدُّمَاغِ النِّيْنِيّ.
- **diurnal e.** صَرْعٌ نَهَارِيٌّ. نوبات صرعية تحدث أثناء النهار أو عندما يكون المريض مستيقظاً.
- **essential e. (= Idiopathic e.)** صَرْعٌ مجهول السبب.
- **focal e.** صَرْعٌ بُؤْرِيٌّ. نوبات صرعية صغيرة تكون في جهة واحدة من الجسم أو في منطقة ضيقة منه أو تولد أعراضاً موضعية وتنتج عن آفة بؤرية موضعية في المخ.
- **focal e., chronic (= epilepsia partialis continua)** صَرْعٌ جُزْئِيٌّ مُتَوَاصِلٌ.
- **focal e., minor** صَرْعٌ بُؤْرِيٌّ صَغِيرٌ. نوبة صرعية تتكون من الأورة فقط ومن دون أي اختلاج.
- **gelastic e.** صَرْعٌ ضِحْكِيٌّ. صرع تصاحبه نوبة شديدة من الضحك قبيل نوبة الصرع أو خلالها.
- **generalized e.** صَرْعٌ عَامٌ. صرع يتصف بنوبات عامة شاملة وقد تبدأ النوبة من نقطة واحدة ثم تنتشر أو تكون النوبة شاملة منذ أول ابتدائها.
- **generalized flexion e. (= hypsarrhythmia = infantile massive spasm)** صَرْعٌ انْتِنَائِيٌّ عَامٌ.
- **grand mal e. (= major e.)** صَرْعٌ كَبِيرٌ.
- صرع تسبقه عادة الأورة ويتصف بفقدان الوعي المفاجيء الذي يتلوه الاختلاج العام.
- **haut mal e. (= grand mal e.)** صَرْعٌ كَبِيرٌ.
- **hysterical e.** صَرْعٌ هِسْتِيرِيٌّ. نوبات هستيرية تحاكي نوبات الصرع.
- **ideational e.** صَرْعٌ افْتِكَارِيٌّ. صرع افتكاري يبدأ من المنطقة الجبهية الصدغية يشعر فيه المريض بأفكار إجبارية متكررة لا علاقة لها بمحيطه وواقعه ولكنها تكون موجودة في فكره من قبل بدء نوبة الصرع.
- **Idiopathic e.** صَرْعٌ مجهول السبب. صرع غير معروف السبب وقد يكون مرتبطاً مع استعداد بنيوي وراثي للنوبات.
- **illusional e.** صَرْعٌ اِنْخِدَاعِيٌّ. صرع بؤري يبدأ من المنطقة الصدغية ويولد نوبة يشعر فيها المريض بانخداع حسي ولكنه يحتفظ بوعيه وقد يشعر بصور بصرية ممسوخة أكبر أو أصغر من حجمها الطبيعي وما شاكل ذلك.
- **jacksonian e.** صَرْعٌ جَاكْسُونِيٌّ. صرع يتصف بحركات رمعية بجهة واحدة من الجسم ويبدأ من إحدى المجموعات العضلية ثم ينتشر بصورة منتظمة للمجموعات المجاورة مما يعكس تقدم الفعالية الصرعية خلال المنطقة الحركية القشرية. وتتسبب هذه النوبات عن بؤرة قشرية في نصف كرة المخ المعاكس لجهة النوبة.
- **Koshevnikoff's e. (= epilepsia partialis continua)** صَرْعٌ جُزْئِيٌّ متواصل.
- **larval e.** صَرْعٌ خَافٍ. نوبات صرعية غير ظاهرة تتمثل فقط بظهور موجات متميزة في مخطط كهربائية الدماغ.
- **Laryngeal e. (= tussive syncope)** صَرْعٌ حَنَجَرِيٌّ؛ غَشَشِيٌّ سَعَالِيٌّ. صرع مع أورة سعال ومن المشكوك فيه أن تكون نوبة صرعية.
- **latent e. (= larval e.)** صَرْعٌ كَامِنٌ؛ صَرْعٌ يَزَقِيٌّ.
- **localized e. (= focal e.)** صَرْعٌ بُؤْرِيٌّ.
- **major e. (= grand mal e.)** صَرْعٌ كَبِيرٌ.
- **matutinal e.** صَرْعٌ صَبَاحِيٌّ. نوبات صرعية تحدث في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

- **menstrual e.** صَرْعٌ حَيْضِيّ. نوبات صرعية تترافق مع الحيض.
- **mental e. (= psychic e.)** صَرْعٌ نَفْسِيّ. صَرْعٌ اسْتِقْلَالِيّ. صرع يتولد عن اضطرابات استقلابية في الدماغ مثل تلك التي تحدث نتيجة عوز الأكسجين أو اليوريمية أو انقطاع المدمنين عن تناول العقار.
- **minor e.** صَرْعٌ صَغِير. نوبة صرعية خفيفة تتكون من غشية خفيفة أو فقدان الوعي الكامل أو أعراض حسية أو حركية موضعية كما يحدث مثلاً في الصرع النفسي الحركي.
- **morning e. (= matutinal e.)** صَرْعٌ صَبَاحِيّ. صَرْعٌ مُوسِيقِيّ التَّنْبِيهِ. صرع انعكاسي يتولد استجابة للتنبه الموسيقي.
- **myoclonus e.** صَرْعٌ رَمْعِيّ عَضَلِيّ. صرع مترقي بطيء وهو وراثي جسدي متنحٍ يبدأ عند الأطفال ويتصف بنوبات متقطعة من رمع مستمر لمجموعات عضلية مما يولد صعوبة الحركة الإرادية ويرافق ذلك التخلف العقلي الذي قد يتطور إلى الخرف.
- **nocturnal e.** صَرْعٌ لَيْلِيّ. نوبات صرعية تحدث في الليل أثناء نوم المريض.
- **nonconvulsive e.** صَرْعٌ لَا اخْتِلَاجِيّ. صرع لا تترافق نوباته مع الاختلاج ولكنه يتكرر بكثرة أكثر من نوبات الصرع الاختلاجي.
- **oculoclonic e.** صَرْعٌ رَمْعِيّ عَيْنِيّ. نوبات تولد حركات نظمية في العينين تنتهي عادة بانحراف العينين الرمعي إلى إحدى الجهات وتسبب عن آفة في الفص القذالي للجهة المعاكسة.
- **oculogyric e.** صَرْعٌ مُدَوِّرُ اللَّعِين. نوبة تولد انحراف العينين التوتري المتقارن.
- **olfactory e.** صَرْعٌ شَمْعِيّ. صرع يولد هلساً أو انخداعاً شامياً وعادة ما يكون لرائحة كريهة.
- **organic e. (= symptomatic e.)** صَرْعٌ عُضْوِيّ. صَرْعُ النَّوْبَةِ الصَّغِيرَةِ. صرع يتصف بفقدان الوعي مع نفضات رمعية عضلية خفيفة. يشاهد غالباً عند الأطفال ويطراف مع موجات كهربائية دماغية تتردد ثلاث مرات بالثانية ومن نمط السهم والموجة.
- **photogamic e.** صَرْعٌ ضَوْئِيّ التَّنْبِيهِ. صرع يتولد عن التنبيه الضوئي.
- **physiologic e.** صَرْعٌ فِيزِيُولُوجِيّ. صرع بيولوجي يتولد عن وظائف دماغية فيزيولوجية وليس عن شذوذ بنيوي أو مرض عضوي في الدماغ.
- **posthemiplegic e.** صَرْعٌ بَعْدَ الْفَالِج. نوبات صرعية تتولد عند مريض مصاب بالفالج وعادة ما تبدأ في منطقة محددة في الطرف المشلول.
- **post-traumatic e.** صَرْعٌ بَعْدَ الرُّضْح. نوبات اختلاجية متكررة تحدث بعد إصابات الرأس الرضحية.
- **procursive e. (= cursive e.)** صَرْعٌ رَكْضِيّ. صرع نفسي حركي يتصف بتلقائية سيرية تخطيطية يسير المريض خلالها بضع خطوات حتى يصطدم بالعوائق في طريقه.
- **progressive familial myoclonic e.** صَرْعٌ رَمْعِيّ عَضَلِيّ عَائِلِيّ (= myoclonus e.) مُتَرَقِيّ.
- **psychic e.** صَرْعٌ نَفْسِيّ. نوبات صرعية تتغلب فيها الأعراض النفسية.
- **psychomotor e.** صَرْعٌ نَفْسِيّ حَرَكِيّ. نوبات صرعية تترافق مع آفات الفص الصدغي للدماغ وتتصف بدرجات مختلفة من فقدان الوعي ويقوم المريض خلالها بحركات منسقة ولكنها بدون هدف وفي غير موضعها ولا تخدم أي غرض وينسى القصد من حركاته هذه.
- **pubertal e.** صَرْعُ الْبُلُوغ. صرع يبدأ عند البلوغ أو حواليه وعادة ما تبدأ في هذا السن نوبات الصرع العام التي تنتج عن إصابات الرأس عند الولادة.
- **reading e.** صَرْعُ الْقِرَاءَةِ. نوبات صرعية تظهر عند القراءة وتكون عادة نوبات اختلاجية وتتحفز من التنبيه البصري المتقطع عند حركات العين القفزية أثناء القراءة.
- **reflex e.** صَرْعٌ اِنْعِكَاسِيّ. نوبات صرعية تتولد استجابة للمنبهات الحسية (اللمسية والبصرية والسمعية والموسيقية).
- **rolandic e. (= jacksonian e.)** صَرْعٌ جَاكْسُونِيّ.
- **self-induced e.** صَرْعٌ مَحْرَضٌ ذَاتِيًّا. صرع يحرض المريض على توليده ذاتياً ويحدث ذلك عادة عند الأطفال الذين يولدون نوبات الصرع الصغير ذاتياً بطريقة تنبيه بعض المنعكسات البصرية.

- **sensory e.** صَرْعٌ حِسِّيٌّ. نوبات صرعية تتصف بأهلاس بصرية أو ذوقية أو شمعية.
- **serial e.** صَرْعٌ تَسْلُسُلِيٌّ. نوبات صرعية تحدث بصورة متسلسلة مع عودة الوعي بين نوبات السلسلة الصرعية.
- **spinal e.** صَرْعٌ نَحَاعِيٌّ. متتاليات من تشنجات رمعية وتوترية تحصل في الشلل السفلي التشنجي.
- **symptomatic e.** صَرْعٌ أَعْرَاضِيٌّ. نوبات صرعية مكتسبة تتسبب عن أمراض الجهاز العصبي المركزي نفسه أو عن الاضطرابات الجهازية العامة كنقص سكر الدم أو اليوريمية أو التسمم بالرصاص. يسمى أيضاً الصرع العضوي.
- **tardy e. (= epilepsia tarda)** صَرْعٌ آجَلٌ.
- **temporal lobe e. (= psychomotor e.)** صَرْعٌ الْفَصِّ الصَّدْغِيِّ: صَرْعٌ نَفْسِيٌّ حَرَكي.
- **thalamic e.** صَرْعٌ مَهَادِيٌّ. نوبات صرعية تتولد عن أمراض المهاد.
- **tonic e.** صَرْعٌ تَوْتُرِيٌّ. صرع يتصف بالصلل العام.
- **traumatic e.** صَرْعٌ رَضْجِيٌّ. نوبات صرعية تحدث نتيجة إصابات الدماغ (الجرح الناري أو الرضحي).

- **uncinate e.** الصَرْعُ الشُّصِّيُّ. نوبة صرعية تتولد عن إصابة المنطقة المعقفية للفص الصدغي والتي تتصف بأهلاس شمعية وذوقية.
- **waking e. (= matutinal e.)** صَرْعٌ صَبَاحِيٌّ. متعلق أو منسوب للصرع أو شخص مصاب به.
- **epileptic** صَرْعِيٌّ. متعلق أو منسوب للصرع أو شخص مصاب به.
- **epileptiform** صَرْعِيٌّ الشَّكْلُ. 1. شبيه بالصرع أو بأعراضه 2. ما يحدث بنوبات شديدة أو مفاجئة.
- **epileptogenic (= epileptogenous)** مُحْدِثُ الصَّرْعِ: مُصَرِّعٌ. عامل يولد الصرع.
- **epileptoid (= epileptiform)** صَرْعِيٌّ الشَّكْلُ: صَرْعَانِيٌّ.
- **epinephrine (= adrenaline)** إِبِينَفْرِينٌ. هرمون يفرزه لب الغدة الكظرية استجابة لتنبيه العصب الحشوي ويخزن في الحبيبات اليفة الكروم كما أنه يفرز في حالة نقص سكر الدم، وهو منبه قوي للجهاز العصبي الودي (المستقبلات الأدرينالينية الفعل). وهو موثر وعائي شديد يرفع ضغط الدم ويسرع القلب وينبه العضلة القلبية ويزيد من النتاج القلبي ومن الفعاليات الاستقلابية ومن تحلل الغليكوجين وتحرير الفلوكوز. يسمى أيضاً الأدرينالين.



epilepsy, minor

مخطط كهربائية الدماغ لمرضى يعاني من حالة صرع صغير وتظهر فيه موجات دلنا التي تتكرر ثلاث مرات في الثانية.

**epinephrinemia** وَجُودُ الإبينفرين في الدَّم.  
**epineural** فَوْقَ القَوَسِ العَصَبِيَّةِ. يقع فوق أحد الأقواس العصبية.

**epineurial**

غَمْدِي عَصَبِي؛ غِلَافِي عَصَبِي.  
 منسوب إلى الغمد العصبية.

**epineurium** الغَمْدُ العَصَبِي؛ غَمْدُ العَصَبِ؛  
 غلاف العصب. طبقة النسيج الضام التي تحيط بكامل العصب المحيطي ويحوي أوعيته الدموية واللمفاوية.

**epiphysis cerebri (= pineal body)**  
 الجِسْمُ الصَّنَوْبِرِيّ.

**epipial** فَوْقَ الحَنُونِ. يقع فوق الأم الحنون.

**episode** نَائِبَةٌ؛ عَارِضَةٌ. حادثة مهمة أو سلسلة حوادث تحدث في سلسلة تطور المرض.

**- acute schizophrenic e. (= acute schizophrenia)** فُصَامٌ حَادٌّ.

**- hypomanic e.** عَارِضَةٌ دُونَ الهَوَسِيَّةِ. اضطراب المزاج الشبيه بالهوس ولكنه أقل شدة منه.

**- major depressive e.** عَارِضَةٌ مُعْتَبَةٌ كَبِيرَةٌ. فترة اكتئاب المزاج مع فقدان الاهتمام العام وعدم التلذذ بالعمل والفعاليات مع اضطراب الشهية والنوم وتغير الوزن واضطرابات نفسية حركية وصعوبة التفكير أو التركيز والوهن والتعب والشعور بالذنب والرغبة بالموت أو الانتحار.

**- manic e.** عَارِضَةٌ هَوَسِيَّةٌ. حالة هياج مزاجي مصحوب بأعراض هوسية كالشعور بالعظمة وقلة الرغبة بالنوم وكثرة الكلام وتطاير الأفكار وعدم الانتباه وهياج نفسي حركي وفرط النشاط الجنسي وسلوك مضطرب.

**- psycholeptic e.** نَوْبَةٌ ذُهَانِيَّةٌ. حادثة نفسية واضحة مفاجئة يعتقد المريض فيها بأنها كانت بداية مرضه العقلي ويعتقد بأنه لا يمكنه التغلب عليها أو إزالتها من ذاكرته.

**epispinal** 1. فَوْقَ النُّخَاعِ 2. فَوْقَ العُضُودِ الفَقْرِيّ.

**epithalamus** المِهَادُ الفَوْقِي؛ المِهْدِيد. الجزء

الذنبى لسقف البطين الثالث وجدرانه الوحشية المجاورة له في الدماغ البيني وهو يشمل نوى العنان وصوارها وجسم النخامية وصوار المهيد.

**epithelioceptor** المُسْتَقْبِلَةُ الظَّهَارِيَّةُ. منطقة في الخلية الغدية تستلم التنبيه العصبي من العضو الانتهائي من الليف العصبي.

**equilibrium** تَوَازُن. الحالة التي تتساوى فيها العوامل المتضادة أو المتعاكسة.

**eremophobia** رُهَابُ الوَحْدَةِ. الخوف من الانفراد والانعزال.

**erethism** هَيْوُج. مفرط الاستثارية خصوصاً للمنبهات الجنسية.

**ergasiophobia** رُهَابُ العَمَلِ. كراهية العمل الشديدة.

**ergasthenia** وَهْنُ العَمَلِ. الوهن الشديد العام الذي يتولد عن الاستغراق في العمل لفترة طويلة متواصلة.

**ergotamine** إِرْغُوْتَامِين. دواء قلواني يستعمل في علاج الشقيقة.

**ergotoxine** إِرْغُوْتُوْكْسِين. مزيج قلواني يعمل كعامل محصر للفعل الأدريناليني.

**erotic** شَبَقِي؛ شَبَقِيّ. مشبع بالرغبة الجنسية.

**eroticism (= erotism)** شَبَقِيّ. الرغبة الجنسية.

**eroticomania (= erotomania)** هَوَسٌ شَبَقِيّ.

**erotism** شَبَقِيّ. الغريزة أو الرغبة الجنسية أو إظهار الشخص لرغباته الجنسية الغريزية.

**- anal e.** الشَبَقِيّ الشَّرْجِيّ. تركيز الشبق على مرحلة التطور الجنسي الطفلي الشرجي.

**- oral e.** الشَبَقِيّ الفَمَوِيّ. 1. تركيز الشبق على مرحلة التطور الجنسي الطفلي الفموي 2. التلذذ باستعمال الفم لغير التَغَذّي.

**erotogenesis** تَوَلِيدُ الشَبَقِيّ؛ إِشْبَاق. توليد الشعور الجنسي الشبقي.

**erotomania** هَوَسٌ شَبَقِيّ. الانشغال المرضي بالفعاليات الجنسية.

**erotophobia** رُهابُ العِشق. الخوف من العشق ومن العمليات الجنسية والشعور الجنسي.

**erratic** 1. تائه 2. شاذ. 1. ضال 2. شاذ وغريب الأطوار في أفكاره وتصرفاته.

**eructatio nervosa** تَجَشُّؤٌ عَصَبِيٌّ. اخراج الغاز من المعدة عن طريق الفم بصورة خاصة.

**erythromelalgia (= red neuralgia)** إَحْمَرَارُ الأطراف المُؤَلِم.

**erythrophobia** رُهابُ الأحمر. 1. الخوف من اللون الأحمر والمتراقب غالباً مع الخوف من الدم 2. الخوف من الاحمرار وغالباً ما يترافق مع احمرار الخجل حتى للمؤثرات البسيطة.

**eserine (= physostigmine)** أُرَيرين.

**esophagalgia** أَلَمُ المَرِيء.

**ESP (= extrasensory perception)** إِذْرَاكَ خَارِجِ الحِسِّي.

**essential** 1. أساسي؛ ضروري 2. مجهول السبب. 3. مكوّن أساسي. 1. يكون القسم الأساسي أو الضروري من الشيء أو المادة ويعطيها صفاتها وشكلها المميز 2. مجهول السبب وليس له أي سبب خارجي واضح أو معروف (ويقال ذلك بصورة خاصة عن المرض) 3. مادة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في الطعام كالحموض الأمينية أو الدهنية الضرورية.

**esthesia** حِسٌّ؛ إِذْرَاكَ؛ شُعُور.

**esthesic** إِذْرَاكِيٌّ؛ حِسِّيٌّ. ما يتعلق بالإدراك النفسي للحس.

**esthesiogenic** مُؤَلِّدُ الحِسِّ. عامل يولد الحس.

**esthesiometer (= factometer)** مَقْيَاسُ حِسِّ اللُّفْس. آلة لقياس حس اللمس.

**esthesioneure** عَصَبُونٌ حِسِّيٌّ. خلية عصبية حسية.

**esthesioneuroblastoma** وَرَمٌ أُرُومِيٌّ عَصَبِيٌّ حِسِّيٌّ. ورم دبق حساس للراديويم ويتكون في التجويف الأنفي.

**esthesioneurosis** عَصَابٌ حِسِّيٌّ. أي اضطراب للأعصاب الحسية.

**esthesionosis (= esthesioneurosis)** عَصَابٌ حِسِّيٌّ.

**esthesiophysiology** فِيزِيُولُوجِيَا الحَوَاس. فيزيولوجيا الحس والأعضاء الحسية.

**esthesodic** نَاقِلُ الحِسِّ. ناقل الدفعات الحسية أو متعلق بها.

1. حِسِّيٌّ 2. جَمَالِيٌّ. 1. متعلق بالحس 2. متعلق بالجمال أو بتجميل المظهر.

**etat dysmyelinique** حالة اختلال تَكُونِ الميالين؛ حَالَةٌ إِنْجِلَالِ الميالين.

**etat marbre (= status marmoratus)** قَرَطٌ تَنَحُّعِ الجِسْمِ المُخَطَّط.

**etat vermoulu** تَفْرُوحُ سَطْحِ الدَّمَاع. حالة تقرح سطح الدماغ غير المنتظم الذي يشاهد أحياناً في تصلب الشرايين المتقدم.

**ethical** أَخْلَاقِيٌّ. منسجم مع الأسس والقواعد التي تتحكم بالسلوك الصحيح.

**ethics** أَخْلَاقِيَّات؛ آدَاب. القواعد والأسس التي تعين السلوك الصحيح.

آدَابُ الطَّبِّ. القيم والتعاليم التي يسترشد بها في الممارسة الطبية الصحيحة.

**ethocaine (= procaine hydrochloride)** إِيثُوكَايْنين.

**ethoheptazine citrate** سِتِرَاتُ الإِيثُوهِبَتَازِين. دواء مسكّن للألم.

**ethosuximide** إِيثُوسُكْسِيمِيد. دواء يستعمل في علاج الصرع الصغير ويؤخذ عن طريق الفم.

**ethybenztropine** إِيثِبِنْزِتْرُوبِين. دواء يستعمل كعامل مضاد للباركنسونية وفي علاج متلازمة خارج الهرمي المحرصة بالدواء.

**etidocaine hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيدُ الإِتِيدُوكَايْنين. مخدر موضعي يستعمل كمحصر عصبي محيطي وكمحصر خارج الجافية أو محصر ذنب.

**eucatropine hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيدُ اليُوكَاتْرُوبِين. دواء مضاد للفعل



الكوليني ويستعمل كموسع للحدقة ويوضع موضعياً في العين.

**eugnosia** سَوَائِيَةُ الإِدْرَاك. القدرة على معرفة المنبهات الحسية وتركيبها وإدراكها إدراكاً صحيحاً.

**eugnostic** سَوِيُّ الإِدْرَاك. شخص يتمتع بإدراك سليم.

**eukinesia, eukinesis** سَوَائِيَةُ الحَرَكَةِ. حالة سواء حركات الجسم وسلامتها.

**eukinetic** سَوِيُّ الحَرَكَةِ. شخص يتمتع بحركة سوية.

**eunoia** سَوَائِيَةُ العَقْل. سلامة العقل والتحكم بالإرادة.

**euphoretic** 1. شَمِيقٌ 2. مُشَمِّقٌ. متعلق أو منسوب للشمق أو عامل يولده.

**euphoria** شَمَقٌ. حالة الشعور بالنشوة وراحة الجسم وخلوه من الألم والشعور بالسعادة المفرطة والمبالغة التي تحصل في بعض الأمراض العقلية.

**euphoriant (= euphoretic)** 1. شَمِيقٌ 2. مُشَمِّقٌ؛ شَمَقِيٌّ.

**euphoric** شَمِيقٌ. متعلق أو منسوب للشمق.

**euphorigenic, euphoristic** مُشَمِّقٌ. عامل يولد الشمق.

**eupractic** سَوِيُّ الأَدَاء. شخص سوي في أدائية الحركات والوظائف.

**eupraxia** سَوَائِيَةُ الأَدَاء. حالة توليد حركات سوية متناسقة.

**eupraxis (= eupractic)** سَوِيُّ الأَدَاء.

**eusitia** سَوَائِيَةُ الشَّهْيَةِ. شهية سوية للطعام.

**eusthenia** سَوَائِيَةُ القُوَّة. حالة سواء نشاط وقوة الجسم.

**euthanasia** قَتْلُ المَرَحِمَةِ. 1. الموت السهل غير المؤلم 2. قتل الشفقة وهو القتل المقصود لمرضى في المراحل النهائية من مرضه أو عندما يعاني من آلام مبرحة شفقة ورحمة به.

**exacerbation** سَوْرَةٌ. (ج. سَوَرَات). ازدياد وطأة المرض وشدته أو أي من أعراضه.

**exanimation (= unconsciousness, = coma)** غَنِيْبِيَّة؛ فَقْدُ الوُغْي؛ سُبَات.

**excerebration** إِسْتِخْرَاجُ الدِّمَاغ. إزالة الدماغ، وخصوصاً إزالة دماغ الجنين لتيسير الولادة.

**excitability** الإِسْتِثَارِيَّة. استعداد النسيج أو العضو للاستجابة للمنبهات.

**excitable** يُسْتَثَار. مستعد للاستثارة، أي مستعد للاستجابة للمنبهات.

**excitant** مُثِير. أي عامل يولد استثارة الفعاليات الحيوية أو الدماغية.

**excitation** إِسْتِثَارَةٌ؛ إِثَارَةٌ. عملية إثارة النسيج أو العضو أو استجابتهما للمنبهات وقد يكون ذلك بإضافة طاقة لهما.

**- direct e.** إِثَارَةٌ مُبَاشِرَةٌ. التنبيه الكهربائي للعضلة بوضع المسرى الكهربائي عليها مباشرة.

**- ephaptic e.** إِثَارَةٌ تَمَاسِيَّةٌ. إثارة حوار العصبيون مباشرة بتماسه مع حوار عصبيون آخر.

**- indirect e.** إِثَارَةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ. التنبيه الكهربائي للعضلة بوضع المسرى الكهربائي على عصبها الحركي.

**excitatory** إِسْتِثَارِيٌّ. ما يمكنه أن يستثير أو ينبه.

**excitomotor** مُثِيرُ الحَرَكَةِ. 1. ما يمكنه أن يولد استجابة أو فعالية حركية 2. عامل ينبه وظيفية أو فعالية حركية.

**excitomuscular** مُثِيرُ عَضَلِيٍّ. عامل يستثير العضلات.

**exencephalia (= exencephaly)** اخْتِرَاجُ الدِّمَاغ؛ بَرَانِيَّةُ الدِّمَاغ.

**exencephalous (= exencephalus)**

مَخْتَرَجُ الدِّمَاغ؛ بَرَانِي الدِّمَاغ. مسيخ ذو دماغ براني.

**exencephaly** اخْتِرَاجُ الدِّمَاغ؛ بَرَانِيَّةُ الدِّمَاغ. شذوذ خلقي نمائني يتصف بغييب في القحف وخروج الدماغ منه للخارج.

**exhaustion** إِنْهَاطٌ. حالة تعب فكري أو جسمي شديد.

**- heat e.** إِنْهَآكٌ حَرَارِيّ. حالة اضطراب جسمي يتصف بالصداع والدوران واختلال درجة حرارة الجسم والغثيان والهبذان والإغماء في بعض الحالات نتيجة للتعرض للحرارة العالية لفترة طويلة.

**- nervous e. (= nervous asthenia)** وَهْنٌ عَصَبِيّ.

**exhibitionism** الإِسْتِعْرَاء. شذوذ جنسي يتصف بهياج جنسي متكرر ويستثير المصاب للتعري واستعراض أعضائه التناسلية.

**exhibitionist** المُسْتَعْرِى. شخص مصاب بداء الاستعراء.

**exhilarant** مُنْعِش. عامل مفرح أو منشط.

**exophthalmos (= exophthalmus, proptosis)** جُحُوظ. بروز مقلة العين الشاذ للآمام.

**exploration** إِسْتِقْصَاء. البحث والتحري أو الفحص لأغراض التشخيص.

**exploratory** إِسْتِقْصَائِيّ. متعلق بالاستقصاء والبحث والتحري.

**expression** 1. تَغْيِير. 2. عَصْر. 1. مظهر الوجه وملامحه التي تولدها حالة الشخص العاطفية أو الجسدية. 2. تفريغ بالضغط.

**expressive** مُعْبِّر. حالة أو وجه ذو ملامح معبرة عن الانفعال العاطفي أو الجسدي.

**extension** 1. تَمْدِيد. 2. بَسْط. 1. الحركة التي يتم فيها سحب العاملين الملتصقين بعيداً عن بعضهما. 2. حركة يتم فيها وضع أقسام الذراع بوضع مستقيم أو تحريكها لذلك الاتجاه.

**extensor** بَاسِط. إصطلاح عام للعضلة التي تبسط المفصل.

**exteroceptive** إِسْتِقْبَالِيّ خَارِجِيّ. ساحة السطح الخارجي للجسم التي تنتشر عليها المستقبيلات الحسية الخارجية.

**exteroceptor** مُسْتَقْبِلٌ خَارِجِيّ. نهاية عصبية حسية في سطح الجسم تتنبه بالمنبهات الموجودة في البيئة الخارجية المباشرة التي تحيط بالجسم كمستقبيلات الجلد أو الأغشية المخاطية.

**exterofection** الإِسْتِجَابَةُ لِلْمُنْبَهَاتِ الْخَارِجِيَّةِ. استجابة الجسم لمنبهات البيئة الخارجية والتي يولدها الجهاز العصبي الدماغى النخاعي.

**exteroffective** مُسْتَجِيبٌ لِلْمُنْبَهَاتِ الْخَارِجِيَّةِ. صفة الجهاز العصبي الدماغى النخاعي الذي يستجيب للمنبهات الخارجية.

**extracranial** خَارِجُ الْقَاف. متوضع أو يحدث خارج القحف.

**extradural** خَارِجُ الْجَافِيَّةِ. متوضع أو يحدث خارج الجافية.

**extramedullary** خَارِجُ النُّخَاع. متوضع أو يحدث خارج أي نخاع وخصوصاً خارج النخاع المستطيل.

**extrameningeal** خَارِجُ السَّحَايَا. متوضع خارج السحايا أو يحدث أو يحقن خارج السحايا.

**extrapsychic** خَارِجُ النَّفْس. ما يحدث خارج النفس بين العقل والبيئة الخارجية.

**extrapyramidal** خَارِجُ الْهَرَمِيّ. خارج السبيل الهرمي.

**extroversion** إِنْبِسَاطُ نَفْسِيّ. انفتاح الشخص وتوجيه اهتماماته نحو العالم الخارجي.

**extrovert** مُنْبَسِطُ النَّفْس. شخص منفتح باهتماماته نحو العالم الخارجي.

# F

**تَخْرِيف:** fabrication (= confabulation) تَلْفِيق.

1. وَجْه 2. سَحْنَة. 1. الوجه الامامي **facies** للرأس أو للعضو أو البنية التشريحية 2. التعبير أو مظهر الوجه.

السَحْنَة البَقْرِيَّة. اصطلاح يطلق على **f. bovina** مظهر وجه المصاب بسوء التعظم القحفي الوجهي.

الْوَجْه المَخِيّ **f. cerebrales alae majoris** للجَنَاح الكبير. القسم الاملس الموجه من الجناح الكبير للعظم الورتي الذي يكون القسم الامامي من قاع الحفرة الوسطية للقحف.

السَحْنَة البِقْرَاطِيَّة. الوجه **f. hippocratica** المتفرض الذاتي والشاحب الذي يسبق الوفاة أو يدلل عليها.

السَحْنَة الهَنْشَسُونِيَّة. سحنة **Hutchinson's f.** على وجه المصاب بشلل العين الخارجي تتصف بثبات المقلة وارتفاع الحاجب وتدلي الاجفان.

الْوَجْه السُّفْلِيّ لِلْمُخ. قاعدة **f. inferior cerebri** المخ أو وجهه السفلي.

الْوَجْه السُّفْلِيّ لِإِنْصِفِ كُرَّةِ الْمُخِيخ. الوجه المكون من الفصيص الهلالي واللوزة وندفة المخيخ. **f. inferior hemispherii cerebelli**

سَحْنَة الوَهْنِ العَضَلِيّ. التعبير **myasthenic f.** الوجهي المميز الذي يشاهد في الوهن العضلي الوبيل والذي يتولد عن تدلي عضلات الوجه وضعفها.

سَحْنَة الإِعْتِلَالِ العَضَلِيّ. التعبير **myopathic f.** الوجهي الخاص الذي يولده ارتخاء عضلات الوجه في حالة حثل العضلات.

**Parkinson's f. (= parkinsonian f.)**

السَحْنَة البَارْكِنْسونِيَّة. التعبير الصلب القناعي الشكل مع قلة طرف العين وهو السحنة المميزة لداء باركنسون.

تَيْسِير. تعجيل أو تسهيل أية **facilitation** عملية طبيعية وهو عكس التثبيط وخصوصاً بالنسبة لتأثير الدفعة العصبية عبر المشبك والذي يسهل مرور الدفعات العصبية المارة عبره.

تَيْسِيرٌ وَدُنْسْكِ. تسهيل مرور **wedensky's f.** الدفعات العصبية عبر الإحصار حيث تنخفض عتبة العصب في قسمه أسفل الإحصار.

أَلَمُ الْوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ. ألم **faciocephalgia** عصبي في الوجه والرقبة بسبب اضطراب الجهاز العصبي المستقل.

شَلْلُ **facioplegia (= facial paralysis)** الْوَجْهِ.

حَثَلٌ **facioscapulohumeral dystrophy** وَجْهِيٌّ كَتَفِيٌّ عَضْدِيٌّ.

إِخْتِيَارِيٌّ. غير اجباري أو متمكن **facultative** من التلاؤم مع مختلف الظروف.

1. مَلَكَةٌ. (ج: مَلَكَات). 2. كَلِيَّة. **faculty** (ج: كليات) أي طاقة أو وظيفة سوية خصوصاً الوظائف الفكرية والعقلية.

غَشِيَّة. انظر **syncope**.

غَشْيٌ؛ إَغْمَاء. فقد الوعي المفاجيء **fainting** بسبب نقص الدورة الدموية الدماغية العام والعاير.

مَنْجَل. عضو أو بنية منجلية الشكل. **falx**

مَنْجَلُ الْمُخِيخ. طية الأم الجافية **f. cerebelli**

- الصغيرة في الخط الوسطي للحفرة القحفية الخلفية التي تبرز للأمام نحو دودة المخ.
- f. cerebri** - مُنْجَلُ الْمُخ. طية الأم الجافية التي تمتد للأسفل في الشق المخي الطولاني والتي تفصل نصفي كرة المخ عن بعضهما.
- familial** عائلي. يحدث بين أفراد العائلة ويصيب عدداً كبيراً منهم أكبر مما يتوقع أن يكون ذلك بالصدفة.
- fantasy (= phantasy)** الْمُخَلَّة: اِخْلَامُ اليَقْظَة. حالة خيالية أو تخيل حوادث متعاقبة عند الشخص اليقظ الواعي.
- fascicle (= fasciculus)** حُرْمة.
- fascicular** حُرْمِي. 1. متعلق بالحزمة. 2. محزم أو ذو حزم.
- fasciculated** 1. مُحْرَم 2. تَحْرُم. 1. متجمع بشكل حزمة. 2. مربوط بشكل حزمة.
- fasciculation** 1. تَحْرُم 2. إِزْتِجَاف حُرْمِي. 1. تكوين الحزم. 2. تقلص عضلي يشاهد من خلال الجلد ويمثل تقلصاً تلقائياً لعدد من الألياف العضلية التي يغذيها ليف عصبي واحد.
- fasciculi** حُرَم. مجموع حزمة.
- fasciculus** حُرْمة. (ج: حُرَم). مجموعة من الألياف عصبية أو عضلية مترافقة وظيفياً وتسير سوية.
- f. aberrans of Monakow (= tractus rubrospinalis)** السَّبِيلُ الحَمْرَاوِي النُّخَاعِي.
- f. acusticus (= striae medullares ventriculi quarti)** السُّطُورُ البَصَلِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ.
- f. anterior proprius** الحُرْمةُ الْمُخْصُوصَةُ الأَمَامِيَّة. حزمة الألياف عصبية في المادة البيضاء الأمامية تحيط بالمادة السنجابية للنخاع الشوكي وتتكون من الألياف ترابطية قصيرة صاعدة ونازلة.
- f. arcuatus (= f. longitudinalis superior cerebri)** الحُرْمةُ الطُولَانِيَّةُ العُلْوِيَّةُ للمُخ. الحزمة المقوسة.
- f. of Burdach (= 1. f. longitudinalis superior cerebri) (= 2. pars temporalis radiationis corporis callosi)** الحُرْمةُ الطُولَانِيَّةُ العُلْوِيَّةُ لِلْمُخ. 2. الجُزْءُ الصُّدْغِي لِشَعِ الثَّقْنِي.
- cuneate f. of Burdach (= f. cuneatus medullae spinalis)** الحُرْمةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاع.
- cuneate f. of medulla oblongata (= f. cuneatus medullae oblongatae)** الحُرْمةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلْبَصَلَة.
- cuneate f. of spinal cord (= f. cuneatus = medullae spinalis)** الحُرْمةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاع.
- f. cuneatus medullae oblongatae** الحُرْمةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلْبَصَلَة. استمرار الحزمة الإسْفِينِيَّةُ للنخاع الشوكي التي تصعد إلى النخاع المستطيل (البصلة).
- f. cuneatus medullae spinalis** الحُرْمةُ الإسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاع. القسم الوحشي من الحبل الظهري للنخاع الشوكي والمكون من الألياف صاعدة تنتهي في النواة الإسْفِينِيَّةُ للنخاع المستطيل.
- dorsolateral f. (= f. dorsolateralis tractus dorsolateralis)** السَّبِيلُ الظَّهْرِي الوُحْشِي.
- extrapyramidal motor f. (= rubrospinal tract)** السَّبِيلُ الحَمْرَاوِي النُّخَاعِي.
- Flechsig's f. (= f. proprii medullae spinalis)** الحُرْمةُ الْمُخْصُوصَةُ لِلنُّخَاع.
- f. of Foville (= tractus spinocerebellaris posterior)** السَّبِيلُ النُّخَاعِي المَخِيخِي الخَلْفِي.
- f. of Goll (= f. gracilis medullae spinalis)** الحُرْمةُ الدَّقِيقَةُ لِلنُّخَاع.
- Gower's f. (= tractus spinocerebellaris ventralis)** السَّبِيلُ النُّخَاعِي المَخِيخِي البَطْنِي.
- f. gracilis medullae oblongatae** الحُرْمةُ النَّاخِلَةُ لِلْبَصَلَة. استمرارية الحزمة الناخلة للنخاع التي تصعد إلى النخاع المستطيل (البصلة).
- f. gracilis medullae spinalis** الحُرْمةُ النَّاخِلَةُ لِلنُّخَاع. القسم الناصفي من عمود النخاع الشوكي

والمكوّن من الياف صاعدة تنتهي في النواة الناحلة للبلصلة.

**- interfascicular f. (= f. interfascicularis)**

الْحَزْمَةُ بَيْنَ الْحَزْمِ. مجموعة من الالياف العصبية التي تمتد بين الحزمتين الدقيقة والإسفينية والتي تحوي بعض الفروع النازلة من الياف القسم الناصفي للجذور الخلفية للأعصاب الشوكية.

**- intersegmental fasciculi of spinal cord (= fasciculi proprii medullae spinalis)**

الْحَزْمُ الْمَخْصُوصَةُ لِلنَّخَاعِ.

**- f. lateralis plexus brachialis**

الْحَزْمَةُ

الْوَحْشِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ. الحبل الجانبي للضفيرة العضدية التي تتكون من اتحاد الأقسام الأمامية من الجذوع العلوية والوسطية للأعصاب الشوكية العنقية 5-7 والذي تنبع منه الأعصاب الصدرية الوحشية والعضلية الجلدية والجذور الوحشية للعصبين الناصف والزندني.

**- lenticular f. (= f. lenticularis)**

الْحَزْمَةُ

الْعَدْسِيَّةُ. حزمة من الالياف العصبية المبتعدة عن الكرة الشاحبة والتي تبدأ من سطحها الظهري لتمر خلال المحفظة الداخلية وتعبّر لتختلط مع الياف العروة العدسية وتستمر حتى النوى البطنية للمهاد.

**- f. longitudinalis dorsalis**

الْحَزْمَةُ الطُّولَانِيَّةُ

الظَّهْرِيَّةُ. حزمة الياف قليلة الميالين تمر في المادة السنجابية حول البطينية على طول الدماغ المتوسط وبالقرب من الحزمة الطولانية الإنسية.

**- f. longitudinalis inferior cerebri**

الْحَزْمَةُ

الطُّولَانِيَّةُ الْمُخَيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. حزمة من الياف ترابطية تربط القشرتين القذالية والصدغية وتمتد خلال الفصين القذالي والصدغي وتتكون بصورة خاصة من الالياف الركبية المهمازية الإسقاطية.

**- f. longitudinalis medialis**

الْحَزْمَةُ الطُّولَانِيَّةُ

الْإِنْسِيَّةُ. سبيل ليفي عصبي يمتد بين الدماغ المتوسط والقسم العلوي من النخاع الشوكي ويقع بالقرب من المستوى الناصف وبالجبهة البطنية من المادة السنجابية ويربط النوى الدهليزية مع النوى الحركية للأعصاب القحفية الثالث والرابع والسادس والحادي عشر بصورة خاصة.

**- f. longitudinalis medialis medullae**

الْحَزْمَةُ الطُّولَانِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْبِلْصَةِ.

قسم الحزمة الطولانية الإنسية الذي يمر في البصلة (النخاع المستطيل).

**- f. longitudinalis, medialis pontis**

الْحَزْمَةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْجَسْرِ. قسم الحزمة الطولانية الإنسية الذي يمر في الجسر.

**- fasciculi longitudinalis pontis**

(= fasciculi longitudinalis (pyrami-

dales) pontis) وتشمل الْحَزْمُ الطُّولَانِيَّةُ لِلْجَسْرِ. وتشمل السبيل القشري الجسري والالياف القشرية النووية والقشرية الجسرية للسبيل الهرمي والتي تمر في الجهة البطنية للجسر.

**- f. longitudinalis superior cerebri**

الْحَزْمَةُ الطُّولَانِيَّةُ الْمُخَيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ. حزمة من الياف ترابطية تمتد من الفص الجبهي إلى النهاية الخلفية للتلم الوحشي وترتبط قشرة الفصوص الجبهية والصدغية والجدارية والقذالية.

**- maculary f.**

مجموعة الياف عصبية تبدأ من البقعة الصفراء يتصالب بعضها الذي يوجد على الجهة الأنفية للشبكية ولا يتصالب بعضها الآخر الذي يوجد على الجهة الصدغية للشبكية.

**- mamillotegmental f. (= f. mamilloteg-**

mentalis

الْحَزْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ السَّقِيْفِيَّةُ. حزمة من الالياف تبدأ من الجسم الحلمي، تمر إلى النواة الأمامية للمهاد.

**- f. marginalis ventralis**

الْحَزْمَةُ الْهَامِشِيَّةُ الْبَطْنِيَّةُ. حزمة مكونة من السبيلين السقفي النخاعي والدهلزي النخاعي.

**- medial prosencephalic f. (= f. prosen-**

cephalicus medialis)

الْحَزْمَةُ الدِّمَاغِ الْمَقْدَمِ الْإِنْسِيَّةُ. جملة الياف عصبية تكون السبيل الرئيسي للارتباط الطولاني في الوطاء الذي يسير خلال المنطقة الوطائية الوحشية ويربط سقيفة الدماغ المتوسط مع أقسام الجهاز الحوفي.

**- medial telencephalic f. (= f. prosenceph-**

alics medialis)

الْحَزْمَةُ الدِّمَاغِ الْمَقْدَمِ الْإِنْسِيَّةُ.

**- f. medialis plexus brachialis**

الْحَزْمَةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ. الحبل الإنسي للضفيرة العضدية الذي يتكون من القسم الأمامي من الجذع

السفلي للعصبين الشوكيين الرقبى الثامن والصدري الاول والذي تبدأ منه الاعصاب الصدري الإنسي والعصبي الجلدي الإنسي والامام الصدري الجلدي الإنسي والجذرين الإنسيين للعصبين الزندي والناصف.

**- Meyhert's f. (= tractushabenula-**

**Interpeduncularis)** السَّبِيلُ الْعَنَاقِي بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.

**- Monakow's f. (= tractus rubrospinalis)**

السَّبِيلُ الْحَمْرَائِيُّ الْخَنَاعِي.

**- f. occipitofrontalis inferior** الْحَزْمَةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجَبْهِيَّةُ السُّفْلَى.

مجموعة من الالياف الترابطية في القسم السفلي من المحفظة المحيطية قرب الحزمة المعقفة تربط التلافيف السفلية المختلفة للفصين الصدغي والجبهي.

**- f. occipitofrontalis superior (= f. subcallosus)** الْحَزْمَةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجَبْهِيَّةُ الْعُلْوَى.

**- olivocochlear f. (= tractus olivocochlearis)** السَّبِيلُ الرِّيْتُونِيُّ الْقَوَقَعِي.

**- oval f.** الْحَزْمَةُ الْبَيْضَوِيَّةُ. منطقة الياف نازلة في الحبل الخلفي للنخاع بالقرب من الحاجز الخلفي.

**- f. parieto-occipitopontinus** الْحَزْمَةُ الْجَذَارِيَّةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجِسْرِيَّةُ.

حزمة الياف عصبية تبدأ في الفصين الجداري والقذالي وتمر خلال القسم خلف العدسي للذراع الخلفي للمحفظة الداخلية وتنتهي في نوى الجسر.

**- f. posterior plexus brachialis** الْحَزْمَةُ الْخَلْفِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ الْعَضْدِيَّةِ.

الحبل الخلفي للضفيرة العضدية الذي يتكون من اتحاد الاقسام الخلفية للجذوع العلوية والمتوسطة والسفلية من الاعصاب الشوكية الرقبية 5-8 واحياناً الصدري الاول وتنبع منه الاعصاب تحت الكتفية والصدريّة الظهرية والكعبري والإبطي.

**- fasciculi proprii dorsalis medullae spinalis** الْحَزْمُ الْمَخْصُوصَةُ الظَّهْرِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.

حزم من الالياف العصبية في القسم العميق من الحبل الظهري للنخاع مكونة من الياف بين الشدفية تصدر من خلايا الحبل السنجابي الظهري والتي تنقسم إلى الياف ترابطية صاعدة ونازلة قبل ان تعود ثانية إلى المادة السنجابية حيث تتفرع فيه.

**- fasciculi proprii lateralis** الْحَزْمُ الْمَخْصُوصَةُ الْوَحْشِيَّةُ. الحزم الليفية في المادة البيضاء للحبل الوحشي للنخاع مكونة من الياف بين الشدفية التي جاء بعضها من الجهة المعاكسة وهي الياف شبكية نخاعية والياف مستقلة.

**- fasciculi proprii medullae spinalis (f. anterior proprius)** الْحَزْمُ الْمَخْصُوصَةُ لِلنَّخَاعِ.

**- fasciculi proprii ventralis medullae spinalis** الْحَزْمُ الْمَخْصُوصَةُ الْبَطْنِيَّةُ لِلنَّخَاعِ.

حزم المادة البيضاء الموجودة في الحبل البطني للنخاع والمكونة من الياف بين الشدفية يأتي بعضها من الجهة المعاكسة من النخاع وتحتوي اليافاً شبكية نخاعية واليافاً مستقلة نازلة.

**- f. prosencephalicus medialis** حَزْمَةُ الدِّمَاغِ الْمُقَدَّمِ الْإِنْسِيَّةِ. جملة الياف تكون السبيل الرئيسي للارتباط الطولاني للوطاء تسير في المنطقة الوطائية الوحشية وترتبط سقيفة الدماغ المتوسط مع اقسام الجهاز الحوفي.

**- f. pyramidalis medullae oblongatae** الْحَزْمَةُ الْهَرَمِيَّةُ لِلْبَصَلَةِ. الالياف القشرية النووية والقشرية النخاعية اللتان تعتبران سوية نظيرتين للسبيل الهرمي.

**- f. retroflexus (= tractus habenula-interpeduncularis)** السَّبِيلُ الْعَنَاقِي بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.

**- f. rotundus (= tractus solitarius medullae oblongatae)** السَّبِيلُ الْمُفْرَدُ لِلْبَصَلَةِ.

**- semilunar f. (= f. semilunaris, f. Interfascicularis)** الْحَزْمَةُ بَيْنَ الْحَزْمِ.

**- septomarginal f.** الْحَزْمَةُ الْحَاجِزِيَّةُ الْهَامِشِيَّةُ. حزمة الياف عصبية تقع على المحيط الظهري للحبل الظهري للنخاع في المنطقة الصدرية الذي يجاور الحاجز الناصف الظهري في المنطقة القطنية.

**- solitary f. (= tractus solitarius medullae oblongatae)** السَّبِيلُ الْمُفْرَدُ لِلْبَصَلَةِ.

**- f. subcallosus** الْحَزْمَةُ تَحْتَ الْقَفْصِيَّةِ. مجموعة من الالياف الترابطية الموجودة داخل التقاطع بين المحفظة الداخلية والجسم الثفني والتي تربط قشرة

- الفصين القذالي والصدغي مع قشرة الجزيرة والفص الجبهي وتكون جزء مهماً من البساط.
- **f. subthalamicus** **الْحُرْمَةُ تَحْتَ الْمِهَادِيَّةِ**.  
حزمة الياف عصبية تمر خلال المحفظة الداخلية وترتبط نوى تحت المهاد مع الكرة الشاحبة وقشرة النواة العدسية.
- **f. sulcomarginalis** **الْحُرْمَةُ التَّلْمِيَّةُ الْهَامِشِيَّةُ**.  
طبقة من فروع نازلة من سقف الدماغ المتوسط تقع في الحبل البطني للنخاع على طول حافة الشق الناصف البطني.
- **f. telencephalicus medialis (= f. prosencephalicus medialis)** **حُرْمَةُ الدِّمَاغِ الْمَقْدَمِ الْإِنْسِيَّةِ**.
- **f. teres (= f. longitudinalis medialis pontis)** **الْحُرْمَةُ الطُّوْلَانِيَّةُ الْجِسْرِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ**.
- **thalamomamillary f. (= f. mamillothalamicus)** **الْحُرْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ**.
- **f. thalamicus** **الْحُرْمَةُ الْمِهَادِيَّةُ**. حزمة من الالياف العصبية تصعد لتمر إلى الجهة الظهرية خلال ساحة فوريل والمنطقة المبهمة وتعبّر لتصل إلى بعض نوى المهاد البطينية وهي تحوي استمرارية العروة العدسية والحزمة العدسية والالياف المستننية المهادية والحرارية المهادية والمهادية المخططة.
- **f. of Turck (= tractus pyramidalis anterior)** **السَّبِيلُ الْهَرْمِيُّ الْأَمَامِيُّ**.
- **unciform f. (= f. uncinatus)** **الْحُرْمَةُ الشَّصِيَّةُ**. مجموعة من الالياف الترابطية التي تربط قشرة السطح الحجاجي للفص الجبهي مع التلفيف حول الحصيني ومع اللوزة.
- **f. of Vicq d'Azyr (= f. mamillothalamicus)** **الْحُرْمَةُ الْحَلْمِيَّةُ الْمِهَادِيَّةُ**.
- fastigium** 1. **الْبُرْخَاءُ 2. نِزْوَةُ الْبُطَيْنِ**.  
1. شدة الحمى 2. أعلى نقطة في البطن الرابع للدماغ بين الملتقى بين الشراع البصلي العلوي والغقيدة.
- fatigue** **تَعَبٌ**: كَلَال. حالة زيادة عدم الراحة وقلة الكفاءة الفكرية والجسمية بسبب الإرهاق الشديد والطويل الذي يقلل القدرة على الاستجابة للمنبهات.
- **combat f.** **تَعَبُ الْمَعْرَكَةِ**. اصطلاح يطلق على حالات الإصابات النفسانية في المعارك والتي تنتج عن التعرض الطويل والشديد للكرب ويسمى أيضاً الاضطراب الكربى بعد الرضحي.
- **pseudocombat f.** **تَعَبُ الْمَعْرَكَةِ الْكَاذِبِ**. حالات الكرب النفساني الذي يتولد في المعارك ولكنه يعود لاضطرابات نفسية سابقة لدى المصاب.
- **stimulation f.** **تَعَبُ التَّنْبِيهِ**. ارتفاع عتبة الليف العصبي بسبب تنبيهه المتواصل والمستمر.
- fear** **خَوْفٌ**. حالة عاطفية مزعجة تتكون من استجابات نفسية ونفسية فيزيولوجية للتهديد بالخطر المحدق.
- feeble-mindedness** **تَخَلُّفٌ عَقْلِيٌّ**. تخلف عقلي كان يقسم إلى ثلاث درجات: معتوه ذو سن عقلي أقل من سنتين، وأبله بين السنتين والسبع سنوات، والمأفون بين السبع سنوات والإثنى عشرة سنة.
- feedback** **إِرْتِجَاعٌ تَغْذِيَّةٌ رَاجِعَةٌ**. عودة جزء من نتاج النظام إليه ليعمل كمدخل له ويقوم عند ذلك بالتحكم في عمل النظام.
- **negative f.** **إِرْتِجَاعٌ سَلْبِيٌّ**. عملية المحافظة على ثبات نتاج النظام بواسطة تحكم تنبيطي يولده نتاج النظام على دخله.
- **positive f.** **إِرْتِجَاعٌ إِيْجَابِيٌّ**. حالة يعمل فيها نتاج النظام على زيادة فاعليته باستمرار.
- feed-forward** **تَغْذِيَّةٌ مُسَابِرَةٌ**. التنبيه الذي يقوم به عامل متوسط في أحد الانظمة على العوامل المتوسطة التي تسبقه في مراحل سلسلة النظام.
- feet, end** **أَقْدَامٌ إِنْتِهَائِيَّةٌ**. أنظر end-feet.
- fenestra** **نَافِذَةٌ**. اسم تشريحي لفتحة أو لمنطقة منفحة.
- **f. cochlea (= f. rotunda)** **النَّافِذَةُ الْقَوَاعِيَّةُ**. فتحة دائرية في الجدار الداخلي للأذن المتوسطة والتي يغطيها غشاء رقيق هو الغشاء الطبلي الثاني.
- **f. vestibuli (= f. ovalis)** **النَّافِذَةُ الدَّهْلِيْزِيَّةُ**. فتحة بيضوية في الأذن الداخلية تغطيها قاعدة العظم الركابي.

**festination** هَرَوَلَة؛ مِشْيَة تَسَارُعِيَّة. المشية القصيرة الخطى المتسارعة واللاإرادية خلال السير تحدث في الشلل الرعاشي (داء باركنسون) وفي بعض الأمراض العصبية.

**fever** حُمى. (ج: حُمَيَات). 1. ارتفاع درجة الحرارة أعلى من المستوى السوي 2. أي مرض يتصف بارتفاع درجة الحرارة.

**brain f.** حُمى دِمَاعِيَّة. التهاب الدماغ أو سحايه أو كليهما معاً.

**central f.** حُمى مَرَكَزِيَّة. حمى تتولد عن إصابة مراكز تنظيم حرارة الجسم في الوطاء.

**cerebrospinal f.** حُمى دِمَاعِيَّة تُخَاعِيَّة. التهاب السحايا الدماغية النخاعية الوبائي.

**fiber (= fibre)** لَيْف. بنية طويلة خيطية الشكل.

**A f's.** أَلْيَافُ A. ألياف عصبية نخاعية في الجهاز العصبي الجسدي ذات أقطار تتراوح بين 1 و 22 ميكرونًا وسرعة توصيل تتراوح بين 5 و 120 مترًا في الثانية وتشمل الألياف ألفا وبيتا ودلتا وغاما.

**accelerating f's. (= accelerator f's.)** الأَلْيَافُ المُسَرَّعَة. الألياف أدرينالينية الفعل تنقل دفعات عصبية تسرع القلب.

**adrenergic f's.** الأَلْيَافُ أَدْرِينَالِينِيَّةُ الْفَعْل. ألياف عصبية تحرر مواد أدرينالينية (أو إبينفرينية) عند نهاياتها وأثناء توصيلها للدفعات العصبية.

**afferent f's. (= afferent nerve f's.)** الأَلْيَافُ عَصَبِيَّةُ وَاوَدَة. الألياف عصبية تنقل الدفعات من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي وهي إما أن تكون أليافاً واردة جسدية أو أليافاً واردة حشوية.

**alpha f's.** الأَلْيَافُ ألفا. ألياف حركية واستقبالية حسية حركية من النوع «أ» لها سرعة توصيل تتراوح بين 70 و 120 مترًا في الثانية وأقطارها تتراوح بين 13 و 22 ميكرونًا.

**anastomosing f's. (= anastomotic f's.)** الأَلْيَافُ تَفَاعُرِيَّة. ألياف تمتد من إحدى الحزم العضلية أو الجذوع العصبية إلى الحزم أو الجذوع الأخرى.

**arcuate f's., anterior external** الأَلْيَافُ الْمُقَوَّسَةُ الأَمَامِيَّةُ الظَّاهِرَة. ألياف تبدأ من النواة

المقوسة وتبرز من الشق البطني الناصف وتسير إلى الجهة الوحشية وإلى الخلف والأعلى فوق النخاع المستطيل (البصلة) حتى تصل المخيخ عن طريق السويقة المخيخية السفلية (الذنبية).

**arcuate f's., dorsal external** الأَلْيَافُ الْمُقَوَّسَةُ الظَّاهِرِيَّةُ الظَّاهِرَة. ألياف تبدأ من النواة الإسفينية الإضافية وتدخل المخيخ عن طريق السويقة المخيخية السفلية (الذنبية) في نفس الجهة.

**arcuate f's., internal** الأَلْيَافُ الْمُقَوَّسَةُ الْغَاثِرَة. ألياف تبدأ من النواتين الإسفينيتين والناحلة وتسير إلى الجهة البطنية الإنسية حول المادة السنجابية المركزية للبصلة (النخاع المستطيل) لتكون تصالب الافتلة الإنسية.

**arcuate f's. of cerebrum** الأَلْيَافُ الْمُقَوَّسَةُ لِلْمُخ. ألياف ترابطية قصيرة في داخل قشرة المخ تربط التلافيف المتجاورة.

**arcuate f's., posterior external** الأَلْيَافُ الْمُقَوَّسَةُ الْخَلْفِيَّةُ الظَّاهِرَة. ألياف تبدأ من النواة الإسفينية الإضافية وتدخل المخيخ خلال السويقة المخيخية السفلية (الذنبية) على نفس الجهة.

**arcuate f's., ventral external** الأَلْيَافُ الْمُقَوَّسَةُ الْبَطْنِيَّةُ الظَّاهِرَة. ألياف تبدأ من النوى المقوسة وتظهر من الشق الناصف البطني وتسير إلى الجهة الوحشية والخلفية والعلوية فوق النخاع المستطيل (البصلة) لتصل المخيخ عن طريق السويقة المخيخية السفلية (الذنبية).

**association f's. (= association nerve f's.)** الأَلْيَافُ عَصَبِيَّةُ تَرَابُطِيَّة. ألياف عصبية تربط أجزاء من القشرة المخية في نفس نصف كرة المخ الواحدة ومنها الألياف الترابطية القصيرة التي تربط أجزاء في تلافيف متجاورة وهناك الألياف الترابطية الطويلة التي تربط أجزاء متباعدة من القشرة وتنظم في حزم طويلة.

**augmentor f's. (= accelerating f's.)** الأَلْيَافُ مُسَرَّعَة.


**axial f.** لَيْفٌ مَحْوَرِي. محوار الخلية العصبية.

**B f's.** الأَلْيَافُ B. محاور نخاعية مستقلة قبل العقدة يبلغ قطرها حوالي 3 ميكرونات وتوصل بسرعة 3 و 15 مترًا في الثانية الواحدة.



- **الْيَافُ بِرْغَمَانِ. الياف دبقية. Bergmann's f's.** تنتشر من الطبقة الجزيئية للمخيخ وتدخل الام الحنون.
- **الْيَافُ بِرْنَهَائِمَر. سبيل. Bernheimer's f's.** الياف عصبية تربط السبيل البصري بجسم «لاي».
- **الْيَافُ بِيَتَا. الياف حس للمس والحرارة. beta f's.** من نوع الياف «ا» توصل بسرعة 30-70 متراً في الثانية وتتراوح أقطارها بين 8 و 13 ميكرون.
- **الْيَافُ C. الياف عصبية مستقلة بعد العقيدة. C f's.** عديمة الميلين توجد في الجذور الخلفية للأعصاب الشوكية وفي النهايات العصبية الحرة وتنقل بسرعة 0.6-2.3 متر في الثانية وتتراوح أقطارها بين 0.3-1.3 ميكرون.
- **الْيَافُ مَحْفَظِيَّة. الالياف العصبية. capsular f's.** التي توجد في المحفظة الداخلية للدماغ.
- **الْأَلْيَافُ الْمُخَيَّةُ النُّخَاعِيَّة. cerebrosplinal f's.** الالياف العصبية الموجودة في المحفظة الداخلية للدماغ والتي تبدأ من المنطقة الحركية لقشرة المخ لتتنزل إلى أهرام البصلة ومن ثم إلى النخاع.
- **الْيَافُ كُولِينِيَّةُ الْفُعْل. الياف. cholinergic f's.** عصبية تحرر الاسيتيل كولين عند نهاياتها الحرة أو من نهاياتها عند المشابك.
- **الْيَافُ مُتَسَلِّقَة. الياف واردة تبدأ. climbing f's.** من السويقة المخيخية الوسطى تمر خلال الطبقة الحبيبية لقشرة المخيخ لتنتهي حول تغصنات خلايا بركنجي.
- **الْيَافُ مُتَسَلِّقَة. (= climbing f's.) clinging f's.**
- **الْيَافُ صَوَارِيَّة. الياف. commissural f's.** عصبية تربط مناطق قشرية على جهتي المخ وتعبر من أحد نصفيه للنصف الآخر وكذلك الالياف العصبية التي تعبر بين جهتي جذع الدماغ أو النخاع الشوكي.
- **الْيَافُ عَصْبِيَّةُ صَوَارِيَّة. (= commissural commissural nerve f's.)**
- **الْيَافُ قَشْرِيَّةُ نَوَوِيَّة. (= corticonuclear f's.) corticobulbar f's.**
- **الْيَافُ قَشْرِيَّةُ نَوَوِيَّة. corticonuclear f's.** الياف طولانية في السبيل الهرمي تبدأ من قشرة المخ الحركية وتنزل إلى المحفظة الداخلية وتتشابك في مختلف النوى الحركية للدماغ المتوسط والجسر والبصلة وتكون مجموعها السبيل القشري النووي.
- **الْأَلْيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الْجِسْرِيَّة. corticopontine f's.** الياف عصبية تبدأ من قشرة فصوص المخ الجبهية والجدارية والصدغية والقذالية وتنزل إلى المحفظة الداخلية والسويقة المخية وتنتهي في النوى الجسرية عند مختلف مستوياتها حيث تترحل بصورة رئيسية إلى نصف الكرة المخيخية المعاكسة.
- **الْأَلْيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الشَّبَكِيَّة. corticoreticular f's.** الياف عصبية تبدأ بصورة رئيسية من الباحتات الحسية الحركية لقشرة المخ وتنزل مع الالياف القشرية النخاعية وتتشابك مع خلايا التكوين الشبكي خاصة في الجسر والبصلة (النخاع المستطيل).
- **الْأَلْيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الْحَمْرَاوِيَّة. corticorubral f's.** الياف عصبية تنزل من قشرة الفص الجبهي خلال الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية وتنتهي في النواة الحمراء.
- **الْأَلْيَافُ الْقَشْرِيَّةُ النُّخَاعِيَّة. corticospinal f's.** الياف طولانية تبدأ من قشرة المخ وتنزل في المحفظة الداخلية والدماغ المتوسط والجسر وأهرام البصلة وتكون عند وصولها إلى النخاع الشوكي السبيلين القشريين النخاعيين الوحشي والبطني.
- **الْأَلْيَافُ الْقَشْرِيَّةُ الْجِسْرِيَّة. corticothalamic f's.** الياف عصبية تنتشر من قشرة المخ خلال الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية لتنتهي في المهاد.
- **الْيَافُ تَغْصُنِيَّة. الياف عصبية. dendritic f's.** تسير بشكل أغصان الشجرة من قشرة المخ إلى المادة البيضاء.
- **الْأَلْيَافُ الْمُسَنَّنَةُ الْحَمْرَاوِيَّة. dentatorubral f's.** الياف عصبية واردة تصل إلى النواة الحمراء من النواة المسننة في الجهة المعاكسة.
- **الْأَلْيَافُ الْمُسَنَّنَةُ dentatothalamic f's.** الياف عصبية في السويقة المخيخية العلوية تكون السبيل المسنني المهادي.
- **الْيَافُ خَافِضَة. 1. الياف عصبية. depressor f's.** تثبط انعكاسياً عند تنبيهها التوتر الوعائي الحركي وبذلك تخفض ضغط الدم. 2. الياف عصبية تبطئ سرعة القلب.
- **الْيَافُ صَادِرَة. الياف عصبية توصل. efferent f's.** بعيداً عن مركز الجهاز العصبي المركزي إلى أطراف الجسم وهي الياف صادرة جسمية أو حشوية.

- **endogenous f's.** **الْيَافُ دَاخِلِيَّةُ الْمَنْشَأِ.** الياف عصبية في النخاع الشوكي توجد اجسام خلاياها داخله.
- **exogenous f's.** **الْيَافُ خَارِجِيَّةُ الْمَنْشَأِ.** الياف عصبية في النخاع الشوكي تبدأ من خلايا عصبية موجودة في خارجه.
- **extrafusal f's.** **الْيَافُ خَارِجُ الْمَغْزَلِ.** الالياف العضلية الاعتيادية التي توجد في العضلات ولكن خارج مغازلها.
- **frontopontine f's.** **الْأَلْيَافُ الْجَبْهِيَّةُ الْجَسْرِيَّةُ.** الياف عصبية تبدأ في الفص الجبهي وتعتبر المحفظة الداخلية وتنتهي في نوى الجسر.
- **gamma f's.** **الْيَافُ غَمَامًا.** نوع من الياف (A) العصبية توصل دفعات جسدي للمس والضغط كما انها تغذي الالياف العضلية داخل المغازل العضلية وتوصل بسرعة 15-40 متراً في الثانية وتتراوح أقطارها بين 3-7 ميكرونات.
- **Goll's f's.** **الْيَافُ غُول.** الياف عصبية تمتد من نواة «غول» (النواة الناحلة) إلى دودة المخيخ.
- **gray f's.** **الْيَافُ سِنْجَابِيَّةُ.** الياف عصبية غير نخاعية توجد بصورة خاصة في الاعصاب الودية.
- **heterodesmotic f's.** **الْيَافُ تَرَابُطِ الْبَنَى.** الغشائيات. الياف عصبية بيضاء تربط مناطق عصبية سنجابية متباينة.
- **homodesmotic f's.** **الْيَافُ تَرَابُطِ الْبَنَى.** المتماثلة. الياف عصبية بيضاء تربط مناطق عصبية سنجابية متماثلة.
- **Internuncial f's.** **الْيَافُ بَيْنِيَّةُ؛** الياف بين العصبونات. الياف عصبية توصل بين الخلايا العصبية.
- **Intrafusal f's.** **الْيَافُ دَاخِلُ الْمَغْزَلِ.** الياف عضلية محورة ومحاطة بوسائل ومغلقة بغلاف نسيجي ضام على شكل مغزل.
- **longitudinal f's. of pons** **الْيَافُ الْجَسْرِيَّةُ الطُّوَلَانِيَّةُ.** مجموعة من الالياف العصبية الطولانية تبدأ من سويقة المخ وتسير إلى القسم البطني من الجسر حيث تتوزع إلى حزم صغيرة تفصلها نوى الجسر الصغيرة واليافه المستعرضة وتشمل هذه المجموعة الالياف القشرية النخاعية والقشرية النووية والقشرية الشبكية والقشرية الجسرية والجسرية المخيخية والالياف المستعرضة للجسر.
- **Mauthner's f.** **لَيْفٌ مُوْتَنَر.** محوار يمتد من الدماغ التالي إلى النهاية الذنبية للنخاع في الاسماك ويكون السبيل الانتهاشي المشترك للدفعات التي تنزل إلى الذنب.
- **medullated f's. (= myelinated f's)** **الْيَافُ مِيَالِيْنِيَّةُ.**
- **moss f's. (= mossy f's.)** **الْيَافُ أَشْنِيَّةُ.** الياف عصبية سمكية تبدأ من السويقة المخيخية السفلية وتمر إلى قشرة المخ لتنتهي فيه بتفرعات عديدة ذات زوائد اشنية الشكل حول خلايا الطبقة الحبيبية.
- **motor f.** **لَيْفٌ حَرَكِيّ.** أحد الالياف في العصب الذي ينقل دفعات عصبية حركية إلى إحدى العضلات.
- **myelinated f's. (= myelinated nerve f's.)** **الْيَافُ عَصْبِيَّةُ مِيَالِيْنِيَّةُ.** الياف عصبية بيضاء سنجابية تغطي محاورها اغمار نخاعية تغطي هذه بدورها باغماد ليفية عصبية.
- **nerve f.** **لَيْفٌ عَصْبِيّ.** ناتئ دقيق من الخلية العصبية خصوصاً محوارها الطويل الذي ينقل الدفعات العصبية بعيداً عن جسم الخلية وتصنف الالياف العصبية مبدئياً على اساس احتوائها على الطبقة المياليينية او عدمها.
- **neuroglial f's.** **الْيَافُ دَبَقِيَّةُ عَصْبِيَّةُ.** بنية خيطية مفروسة في هيولى وامتدادات الخلايا العصبية الدبقية.
- **nonmedullated f's. (= unmyelinated f's.)** **الْيَافُ عَدِيمَةُ الْمِيَالِينِ.**
- **paraventricular f's.** **الْيَافُ حَوْلُ الْبُطْنِ.** الالياف الصادرة الموجودة في السبيل الوطائي النخامي والتي تبدأ في النواة حول البطن والتي تكون السبيل حول البطني النخامي.
- **parietotemporo-pontine f's.** **الْأَلْيَافُ الْجَذَارِيَّةُ.** الياف عصبية تبدأ من قشرة الفصين الجداري والصدغي وتنزل في قسم تحت عدسي الشكل في الذراع الخلفي من المحفظة الداخلية لتكون جزءاً من القسم البطني من قاعدة السويقتين المخيتين ومن ثم تمر لتنتهي في نوى الجسر.



fibre, nerve

مقطع طولي في ليف عصبي نخاعي محيطي بين مختلف اقسامه:

1. الغمد النخاعي 2. ليفات المحوار 3. متقدرات المحوار 4. نواة خلية غمد الليف العصبي 5. غمد الليف العصبي 6. عقدة رانفييه 7. قلع شميث - لانترمان.

- **periventricular f's.** الألياف حول البطينية. الياف تبدأ من الوطاء ثم تنزل في المادة السنجابية المركزية خلال سقيفة الدماغ المتوسط والتكوين الشبكي للجسر والبلصلة
- **pilomotor f's.** الياف مُحَرَّكَ للشعر. الياف عصبية غير ميالينية تغذي العضلات الصغيرة لجريبات الشعر.
- **pontocerebellar f's.** الألياف الجسرية المُخَيَّضَة. الياف طولانية في القسم البطني من الجسر وتنتهي في دودة المخ.
- **postcommissural f's.** الياف الصوار الخلفي. الياف الصوار الخلفي الموجودة خلف الجسم الصنوبري.
- **postganglionic f's.** الياف قَبْلَ العُقْدَة. محاور العصبونات قبل العقدة.
- **pressor f's.** الياف رَافِعَة للضَغْط؛ الياف مَوْتَرَة. 1. الياف عصبية يؤدي تنبيهها إلى رفع ضغط الدم 2. الياف محفزة للقلب.
- **projection f's.** الياف إسقاطية. الياف عصبية تربط قشرة المخ بالمراكز تحت القشرية وجذع الدماغ والنخاع.
- **radicular f's.** الياف جَذَرِيَّة. الياف عصبية توجد في جذور الاعصاب النخاعية الشوكية.
- **Rasmussen nerve f's.** الياف رَاسْمُوسِن الياف صادرة من القسمين الدهليزي

- والقوقعي للعصب القحفي الثامن تتبع في الجهتين من جوار الزيتونة العلوية.
- **Reissner's f.** ليف رَايسْنَر. ليف طولاني في القناة المركزية للنخاع.
- **short association f's.** الياف تَرَابُطِيَّة قَصِيْرَة. الياف عصبية قصيرة تربط مناطق متجاورة في قشرة المخ.
- **somatic f's. (=somatic nerve f's.)** الياف عَصْبِيَّة جَسَدِيَّة. الياف عصبية واردة أو صادرة تنشط العضلات الهيكلية والانسجة الجسدية وتنقل الإحساسات منها.
- **f's. of stria terminalis.** الياف السَطْرِي الْإِنْتِهَائِي. الياف العصبية الميالينية التي تكون السطر الانتهائي.
- **sudomotor f's.** الياف المُعَرَّقَة. الياف اللاميالينية التي تغذي الغدد العرقية والتي يؤدي تنبيهها إلى إفراز العرق.
- **supraoptic f's.** الياف فَوْقَ الْبَصَرِيَّة. الياف صادرة تمر في السبيل الوطائي النخامي وتبدأ من النواة فوق البصرية وتكون السبيل فوق البصري النخامي.
- **T f.** ليف عصبي يتفرع بزوايا قائمة من محوار الخلية العصبية.
- **tangential f's.** الياف تَمَاسِيَّة. الياف عصبية مرتبة بشكل خطوط تماسية في الطبقات السطحية للحصين والقشرة المخية.

- **temporopontine f's.** الألياف الصدغية  
الجسرية. الألياف عصبية تبدأ من الفص الصدغي  
وترى في الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية لتنتهي في  
نوى الجسر.

**tendrils f's. (= climbing f's.)** الألياف متسلقة.

- **thalamocortical f's.** الألياف مهادية قشرية.  
الألياف عصبية حسية تربط المهاد الظهري بالقشرة  
المخية وتكون سويقات المهاد.

- **thalamoparietal f's.** الألياف الجذارية المهادية.  
الألياف عصبية تهبط من الفص الجداري وترى خلال  
الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية لتنتهي في المهاد.

- **transverse f's. of pons** ألياف الجسر  
المستعرضة. الألياف في القسم البطني من الجسر  
تنتهي في دودة المخيخ.

- **ultraterminal f.** ليف فوق الإنتهازي. فرع صغير  
عديم الميالين يتشعب من فروع المحوار الإنتهازي في  
الصفحة الحركية.

- **unmyelinated f's. (= unmyelinated  
nerve f's.)** ألياف عصبية عديمة الميالين. الألياف  
عصبية أو محاور لا يغطيها غمد مياليني ولكنها  
مغطاة عادة بغمد الليف العصبي.

- **varicose f's.** ألياف ذوالية. بعض الألياف  
الميالينية التي لا تملك غمداً ليفياً عصبياً ويتجمع بعد  
موتها سائل بين غمدها النخاعيني والمحوار فيعطىها  
شكل الدوالي.

- **vasomotor f's.** ألياف مُحركة وعائية. ألياف  
عصبية لا ميالينية تغذي عضلات الشريانات.

- **visceral f's. (= visceric nerve f's.)**  
ألياف عصبية حشوية. ألياف عصبية صادرة أو  
واردة تنبه أو تنشط العضلات الملساء في الأحشاء أو  
خلايا الغدد وتنقل الإحساسات منها.

**fibra (= fibre)** ليف.

**fibrae (= fibres)** ألياف. جمع ليف.

**fibril** ليف. (ج: ليفات). ليف دقيق أو خيط.

- **fibroglia f. (= fibroglia)** ليف دبق.

- **muscle f. (= myofibril)** ليف عضلي.

- **nerve f. (= axon)** محوار.

- **side f. of Golgi** ليف غولجي الجانبي.

فرع صغير يتفرع بزاوية قائمة من المحوار العصبي  
قرب اتصاله مع خلية عقدية.

**fibrillation** رجفان. تقلص عضلي  
موضعي صغير ولا إرادي تحت الجلد وغير منظور  
يتولد عن التنشيط التلقائي للألياف العضلية.

**fibroblastoma** ورم أرومي ليفي؛ ورم الأرومة  
الليفية؛ أروم ليفي. ورم يتكون من الأرومات  
الليفية.

- **perineural f.** ورم الأرومة الليفية حول العصب.  
ورم ليفي يتكون من النسيج الضام حول العصب مثل  
العصب السمعي.

**fibrogloma** ورم دبق ليفي. ورم دبق  
يحوي كمية كبيرة من النسيج الليف.

**fibroneuroma (= neurofibroma)** ورم  
ليف عديبي.

**field** ساحة. (ج: ساحات)؛ حقل. (ج: حقول)؛  
ميدان. (ج: ميادين). باحة أو فضاء مفتوح  
كالساحة البصرية.

- **Flechsig's f. (= myelinogenetic f.)** ساحة  
مكونة للميالين. ساحة تكوين الميالين في المحوار  
العصبي للجنين.




- **f's. of Forel (= Forel's f's.)** ساحات فوريل.  
ثلاث باحات في القسم البطني من المهاد غنية بالألياف  
العصبية المرتبطة بمجموعات من الخلايا وتسمى  
ساحات هـ 1، هـ 2. فالساحة هـ تقع على الجهة  
الإنسية للنواة تحت المهادية وبالجهة الراسية من  
نواة الحمراء وتمتد فيها الألياف المبتعدة عن الكرة  
الشاحبة والمسننة المهادية والحمراوية المهادية. أما  
الساحة هـ 1 فهي التي تحتلها الحزمة المهادية، كما  
تقع الساحة هـ 2 على طريق الحزمة العنسية.

- **myelinogenetic f.** ساحة مكونة للميالين.  
مجموعة من الألياف في المحوار العصبي تتكون فيها  
الأغمد النخاعية في أحد أطوار تنامي الجنين.

- **visual f.** الساحة البصرية. الساحة التي  
تولد المنبهات البصرية عندما تكون العين في وضع  
النظر الأمامي.

**fila** خيوط. جمع خيط.

**filament** خيط. (ج: خيوط). ليف دقيق.



#### fibroblastoma

بعض أنواع أورام القناة الشوكية والفقار التي تضغط على النخاع: (1) ساركومة عظمية للفقرة *osteosarcoma*, (2) ورم الأرومة الليفية خارج الجافية *fibroblastoma*, (3) ورم وعائي دموي خارج الجافية *hemangioma*, (4) وحمه «أرجوانية» مرافقة للورم الوعائي الدموي وتحدث في القطاع العصبي المناسب مع مواقع الورم.

- meningeal f. (= filum terminale) **الخَيْطُ**  
الْإِنْتِهَائِي. خيط سحائي.
- root f's. of spinal nerves (= fila  
radicularia nervorum spinalium) **الخُيُوطُ**  
الْجَذَرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ.
- spinal f. (= filum terminale) **الخَيْطُ**  
الْإِنْتِهَائِي.
- terminal f. (= filum terminale) **الخَيْطُ**  
الْإِنْتِهَائِي.
- filamentum (= filament) **خَيْطٌ**.
- filum (= filament) **خَيْطٌ**.
- fila anastomotica nervi acustici **الخُيُوطُ**  
التَّغَاغِرِيَّةُ لِلْعَصَبِ السَّمْعِيِّ. خيوط تغاغرية بين  
العصبين القوقعي الدهليزي والوجهي في الصماخ  
السمعي الباطن.
- f. durae matris spinale (= f. terminale  
externum) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ الظَّاهِر.
- f. meningeal (= f. meningeum; f.  
terminale) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ.
- f. olfactoria (= olfactory nerve) **العَصَبُ**  
السَّمْعِيُّ.
- fila radicularia nervorum spinalium **الخُيُوطُ**  
الْجَذَرِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ. خيوط  
الجذور الظهرية والبطنية التي تتصل بواسطتها  
الأعصاب النخاعية بالنخاع الشوكي.
- f. spinale (= f. terminale) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ.
- f. terminale **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ. خيط رقيق من  
نسيج ضام ينزل من مخروط النخاع إلى قاعدة  
العصعص.
- f. terminale durum (= f. terminale  
externum) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ الظَّاهِر.
- f. terminale externum **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ  
الظَّاهِر. الاستطالة السفلية للام الجافية النخاعية التي  
تمتد من الحافة السفلية للفقرة العجزية الثانية إلى  
الشدقة العصبية الأولى.
- f. terminale Internum **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ  
الغائر. استطالة الام الحنون النخاعية المحاطة
- باستطلاات سحايا الجافية والعنكبوتية من المخروط  
النخاعي إلى الحافة السفلية من الفقرة العجزية الثانية.
- f. terminale pialis (= f. terminale  
internum) **الخَيْطُ** الْإِنْتِهَائِيُّ الْغَائِر.
- fimbria **خَمَلٌ**. حافة مشرشرة.
- f. hippocampi **خَمَلُ** الْخُصِينِ. شريط من  
المادة البيضاء على طول الحافة الإنسية للسطح  
البطني للخصين.
- fingeragnosia **عَمَّةٌ** إِنْصِبَعِيَّةٌ. عدم المقدرة  
على معرفة الأصابع أو الإشارة إليها عند السؤال  
عنها أو تسميتها أو التعرف على أحد أصابع يديه  
أو أصابع أيادي الآخرين.
- finger, dead **إِنْصِبَعٌ** مَيِّتٌ. إصبع متنمل  
وزرأقي كما يشاهد في زراق النهايات.
- finger, drop (= mallet finger) **إِنْصِبَعٌ**  
مَطْرَقِيَّةٌ. إصبع ساقطة.
- finger, mallet **إِنْصِبَعٌ** مَطْرَقِيَّةٌ. انثناء دائم  
للسلامي الطرفي لليد.
- fingerprint **بَصْمَةٌ**. (ج: بَصَمَات). انطباع  
الحروف الجلدية للأقسام الطرفية للأصابع.
- fissura (= fissure) **شَقٌّ**. (ج: شُقُوق). فلق  
أو أخدود أو طية عميقة خصوصاً في القشرة  
المخية حيث تمتد عميقاً فيها لتشمل كل سمكها.
- fissure (= fissura) **شَقٌّ**.
- adoccipital f. **الشَّقُّ** جَوَّازُ الْقَذَالِيِّ. شَقٌّ غير  
ثابت الوجود يعبر القسم الذنبي من الطلل ويتصل  
بالشق القذالي.
- amygdaline f. **الشَّقُّ** اللَّوْزِيِّ. أخدود يوجد  
أحياناً بالقرب من طرف الفص الصدغي.
- angular f. (= sphenopetrosal f.) **الشَّقُّ**  
الزَّائِي.
- basilar f. (= sphenop-occipital f.) **الشَّقُّ**  
الْقَاعِيَّةِي.
- basilyvian f. **الشَّقُّ** الْقَاعِيَّةِي السِّيلْفِيَّائِي.
- قسم الشَّقِّ الجانبي بين الفص الصدغي والسطح  
الحجائي للفص الجبهي.
- f. of Bichat (= transverse f. of cerebrum)  
**الشَّقُّ** الْمُخِّي الْمُسْتَقَرِّض.

- Broca's f. شَقُّ بُرُوكَا. اصطلاح يطلق على الفرعين الأمامي والصاعد للشق الوحشي للتلفيف الجبهي السفلي الأيسر.
- Burdach's f. شَقُّ بُورْدَاخ. الأخدود بين السطحين الوحشي للجزيرة والداخلي للوصاد.
- calcarine f. (= sulcus calcarine) الشَقُّ المِهْمَازِي؛ الشَقُّ المِهْمَازِي.
- callosal f. (= sulcus corpus callosum) شَقُّ الجِسْمِ الثَّقَنِي.
- callosomarginal f. (= sulcus cinguli) الشَقُّ الجِزَامِي.
- central f. (central cerebral sulcus) الشَقُّ المَرْكَزِي المَخِي.
- cerebral f's. (= cerebral sulci) الشقوق المَخِيَّة.
- cerebral f., lateral (= lateral cerebral sulcus) الشَقُّ المَخِي الوحشي.
- collateral f. (= collateral sulcus) الشَقُّ الجَانِبِي.
- dentate f. (= s. hippocampi) الشَقُّ الحُصِينِي.
- dorsolateral f. of cerebellum الشَقُّ الظَهْرِي الوحشي المَخِيخي. الشق الذي يفصل العقيدة عن لهة الدودة ويفصل الندفة عن لوزة نصف كرة المخيخ.
- Ecker's f. (= sulcus occipitalis transversus) الشَقُّ القَذَالِي المُسْتَعْرِض.
- great f. of cerebrum (= transverse f. of cerebrum) الشَقُّ المَخِي المُسْتَعْرِض.
- great horizontal f. (= horizontal f. of cerebellum) الشَقُّ المَخِيخي الأفقي.
- hippocampal f. (= sulcus hippocampi) الشَقُّ الحُصِينِي.
- horizontal f. of cerebellum الشَقُّ المَخِيخي الأفقي. الشق الذي يفصل الفصيصين الهلاليين القحفي عن الذنبي.
- inferofrontal f. (= inferior frontal sulcus) الشَقُّ الجَنْبِي السُّفْلِي.
- interparietal f. (= sulcus intra-parietalis) الشَقُّ دَاخِل الجِدَارِي.
- lateral f. of cerebrum (= sulcus lateralis cerebri) الشَقُّ المَخِي الوحشي.
- longitudinal f. (= longitudinal cerebral f.) الشَقُّ الطُولَانِي المَخِي.
- longitudinal cerebral f. الشَقُّ الطُولَانِي المَخِي. الشق العميق بين نصفي كرة المخ والذي يمتد عميقاً حتى الجسم الثقني.
- longitudinal f. of cerebellum (= vallecule cerebelli) أَخْدُودُ المَخِيخ.
- median f. of medulla oblongata, anterior الشَقُّ النَّاصِفِ الأَمَامِي للبصلة. الشق الطولاني في المستوى الناصف للناحية البطنية من البصلة والمتواصل مع الشق البطني الطولاني للنخاع الشوكي وهو يفصل الهرمين ويفلق جزئياً عند موضع اتصاليهما.
- median f. of medulla oblongata, dorsal (= sulcus medianus dorsalis medullae oblongatae) الشَقُّ النَّاصِفِ الظَهْرِي للبصلة.
- median f. of medulla oblongata, ventral (= anterior median f. of medulla oblongata) الشَقُّ النَّاصِفِ البَطْنِي للبصلة.
- median f. of spinal cord, anterior (ventral) الشَقُّ النَّاصِفِ البَطْنِي للنخاع. الشق الطولاني العميق في المستوى الناصف وفي الناحية البطنية للنخاع والذي يحوي الشريان النخاعي الأمامي.
- median f. of spinal cord, dorsal (posterior) (= sulcus medianus dorsalis medullae spinalis) الشَقُّ النَّاصِفِ الظَهْرِي للنخاع.
- f. of Monro (= sulcus hypothalamicus) الشَقُّ الوِطَانِي.
- occipital f. (= sulcus parieto-occipitalis) الشَقُّ الجِدَارِي القَذَالِي.
- occipitospheoidal f. الشَقُّ القَذَالِي الوِطْدِي. الشق بين القسم القاعدي من العظم القذالي وجسم العظم الوطدي.

- parieto-occipital f. (= sulcus parieto-occipitalis) الشَّقُّ الْجَذَارِيُّ الْقَذَالِي.
- postcentral f. (= sulcus postcentralis) الشَّقُّ خَلْفَ الْمَرْكَزِي.
- posterolateral f. of cerebellum الشَّقُّ الظَّهْرِيُّ الْجَانِبِيُّ لِلْمُخِيخِ. الشق الذي يفصل العقيدة عن لهة الدودة ويفصل التدفة عن نصف كرة المخيخ.
- postpyramidal f. (=secondary f. of cerebellum)m الشَّقُّ الثَّانَوِيُّ لِلْمُخِيخِ. شق يقع بين لهة المخيخ والهرم.
- precentral f. (= sulcus precentralis) الشَّقُّ أَمَامَ الْمَرْكَزِي.
- precuneal f. (= precuneal sulcus) الشَّقُّ الطَّلَلِي.
- prepyramidal f. الشَّقُّ أَمَامَ الْهَرَمِيِّ. الشق بين هرم الدودة ولهاتها.
- presylvian f. الشَّقُّ أَمَامَ السِّلْفِيَانِيِّ. الفرع الامامي للشق المخي الوحشي.
- primary f. (=primary f. of cerebellum) الشَّقُّ الْأَوَّلِيُّ الْمُخِيخِيِّ. الشق الذي يفصل بين الفصين القحفي والذنب في المخيخ ويقع بين قنة الدودة وحديثها وبين الفصيصين الرباعي والبسيط في نصفي كرة المخيخ.
- f. of Rolando (= sulcus centralis cerebri) الشَّقُّ الْمَرْكَزِيُّ الْمُخِي.
- secondary f. الشَّقُّ الثَّانَوِيُّ. الشق الذي يقع بين لهة المخيخ والهرم.
- subfrontal f. (= sulcus frontalis inferior) الشَّقُّ الْجَبْهِيُّ السُّفْلِي.
- subsylvian f. الشَّقُّ تَحْتَ السِّلْفِيَانِيِّ. الفرع الخلفي للشق الوحشي المخي.
- subtemporal f. الشَّقُّ الصَّدْعِيُّ السُّفْلِي. شق يشاهد أحياناً في القسم السفلي من الفص الصدغي.
- superfrontal f (= sulcus frontalis superior) الشَّقُّ الْجَبْهِيُّ الْعُلْوِي.
- supertemporal f. (= sulcus temporalis superior) الشَّقُّ الصَّدْعِيُّ الْعُلْوِي.
- sylvian f., f. of Sylvius (= sulcus lateralis cerebri) الشَّقُّ الْوَحْشِيُّ الْمُخِي.

- tentorial f. (sulcus collateralis) الشَّقُّ الْجَانِبِيُّ: الشق الخيمي.
- transverse f. of cerebrum الشَّقُّ الْمُسْتَقَرِّضُ الْمُخِي. الشق بين السطح الظهري للدماغ البيني والسطح البطني لنصفي كرة المخ المولد من انطواء نصفي كرة المخ للخلف أثناء التطور الجنيني.
- fistula فَاسُور. (ج: نَوَاسِير). ممر أو اتصال شاذ عادة بين عضوين حشويين أو بين أحدهما وسطح الجسم.
- craniosinus f. نَاسُورٌ قَحْفِيٌّ جَبِيي. ناسور بين الحيز داخل القحف وأحد الجيوب الانفية مما يسمح بمرور السائل الدماغي النخاعي وتسربه إلى الأنف.
- fit نَوْبَةٌ. (ج: نَوْبَاتٌ أَوْ نُوبٌ). 1. عارضة تتصف بفعالية حركية أو نفسية شاذة ولا إرادية 2. نوبة صرع.
- cerebellar f. (= tonic f.) نَوْبَةٌ مُخِيخِيَّة.
- jacksonian f. نَوْبَةٌ جَاكْسُونِيَّة. نوبة صرع بؤري.
- running f. نَوْبَةٌ سَارِيَّة. 1. داء الرهبة 2. صرع ركضي.
- tonic f. (= tonic epileptic attack) نَوْبَةٌ صَرَعٌ تَوْتَرِي.
- flaccid رَخْو. ضعيف ولين.
- flaccidity رَخَاوَةٌ. حالة الضعف واللين وخصوصاً في العضل.
- flatfoot قَدَمٌ رَحَاء. حالة يستوي فيها قوس القدم.
- spastic f. قَدَمٌ رَحَاءٌ تَشْنُجِيَّة. نوع مؤلم من القدم الرحاء بسبب تشنج العضلات الشظوية.
- flat simian hand يَدٌ رَحَاءٌ قَزْدِيَّة. شلل يصيب اليد عند إصابة العصب الناصف ويسبب عدم انثناء أصابع الإبهام والسبابة والوسطى.
- flecion (= flexion) قَنَى: انْثِنَاء.
- flexibilitas (= flexibility) المَرُونَةُ: الانْثِنَانِيَّة. صفة الجسم القابل للانثناء.
- f. cerea (= waxy flexibility) المَرُونَةُ الشَّمْعِيَّة: الانْثِنَانِيَّةُ الشَّمْعِيَّة.



**flexibility** المرونة؛ الإنثَنائية؛ الطَوَاعِيَّة. قابلية الجسم على الانثناء.

**- waxy f.** المرَونة الشمعية؛ الإنثَنائية الشمعية. تشاهد في الحالات الشديدة من الفصام الجامودي وهي حالة تتصف بإبقاء المريض على أي قسم من جسمه في الوضع الذي يوضع فيه.

**flexible (= flexile)** قابل. طَئِع. قابل الثَنِي؛ الانثناء من دون أن ينكسر.

**flexion** ثَنِي. عملية الثني أو حالة الانثناء.

**- f. withdraw** سَخَبَ إِنْثَنَائِي. انثناء الجسم عند الورك والركبة مع الانثناء الخلفي لأصابع القدم عند تنبيه سطح الجسم ويشاهد ذلك في أورام النخاع الشوكي الانضغاطية.

**flexor** مُثَنِّية. أية عضلة تثني أحد المفاصل.

**flexure** ثَنِيَّة. جزء منثنٍ من العضو أو البنية.

**- basicranial f. (= pontine f.)** الثَنِيَّة الجِسْرِيَّة.

**- cephalic f.** الثَنِيَّة الرُّأْسِيَّة. الانحناء في الدماغ المتوسط للجنين.

**- cerebral f.** إِنْثَنَاء مُخِّي. أحد انثناءات المخ في الجنين.

**- cervical f.** الإِنْثَنَاء الرَّقَبِي. انثناء في الأنبوب العصبي للجنين في موضع اتصال الدماغ بالشوكي.

**- cranial f. (= cephalic f.)** الإِنْثَنَاء الرُّأْسِي.

**- mesencephalic f.** إِنْثَنَاء الدُّمَاغ المُتَوَسِّط. انثناء في الأنبوب العصبي للجنين في منطقة الدماغ المتوسط.

**- nuchal f. (= cervical f.)** الإِنْثَنَاء الرَّقَبِي.

**- pontine f.** الإِنْثَنَاء الجِسْرِي. انثناء في الدماغ المؤخر للجنين.

**flight of ideas** تَشَارُذُ الْأَفْكَار. جريان الكلام المهرول المستمر والقفز به من موضوع لآخر عادة ما يكون بينها بعض الترابط أو التلاعب بالأفكار والكلمات من دون أن يكون بينها في الحالات الوخيمة أية علاقة أو ترابط فيكون الكلام غير متناسق أو غير مفهوم ويحدث ذلك في حالات

نوبات الهوس الشديد. وقد يحدث أيضاً في الاضطرابات النفسية أو النفسانية العضوية.

**flocculus** نُذْفَةٌ. أحد الفصيصين الصغيرين الوحشيين المزدوجين والمنفصلين جزئياً والمتواصلين مع عقيدة المخيخ. ويفصل كلا منهما عن نصف كرة المخيخ الشق الظهري الوحشي ويشكلان سوياً جزءاً من الفص الندفي العقيدي للمخيخ.

**floppy** مُقَرَّهَل. شخص رخو الجسم من كثرة ترسب الشحوم في أقسام جسمه فيتدلى الجلد ويترهل.

**fluid, cerebrospinal (CSF)** السَّائِلُ الدِّمَاغِيّ النُّخَاعِيّ. السائل الذي يملأ بطينات الدماغ الأربعة والحيز تحت العنكبوتية والقناة المركزية للنخاع.

**flush** بَيَّغ. احمرار الوجه والرقبة الطارئ والعارض الذي تولده بعض الأمراض أو بعض الأدوية أو الحرارة أو بعض العوامل العاطفية أو الإجهاد الجسمي الشديد.

**- atropine f.** بَيَّغ أَتْرُوبِينِي. بيبغ جلد الوجه والرقبة وجفافه الذي يتولد عن جرعة الأتروبين المفرطة.

**focus** بُؤْرَةٌ. 1. المركز الرئيسي للفعالية المرضية. 2. نقطة تقارب الأشعة الضوئية.

**- epileptogenic f.** بُؤْرَةٌ مُؤَلِّدَةٌ لِلصَّرَع. منطقة صغيرة في قشرة المخ تبدأ منها نوبة الصرع ويشاهد ذلك في مخطط الدماغ.


**fold** طَيَّة؛ ثَنِيَّة. حافة رقيقة معقوفة أو مثناة.

**- medullary f. (= neural f.)** الطَيَّة العَصَبِيَّة.

**- neural f.** الطَيَّة العَصَبِيَّة. إحدى الطيَّتين الواقعتين على حافتي الصفيحة العصبية واللتين تكونان الأنبوب العصبي في الجنين.

**folium** وَرَقَةٌ. اصطلاح عام للبنية الورقية الشكل خصوصاً لورقات القشرة المخيخية.

**- folia cerebelli (= folia of cerebellum)** وَرَقَاتُ المُخَيِّخ. الطيات العديدة الطويلة والضيقة للقشرة المخيخية المفصولة عن بعضها بالاتلام والتي تسندها صفيحات المادة البيضاء، وتتجمع هذه الأوراق بمجموعات لتوليد الأقسام الثانوية للمخيخ.



fluid, cerebrospinal

السائل الدماغي الشوكي ودورانه بين بطينات الدماغ والحيز تحت العنكبوتي.

- **f. vermis** وَرَقَّة الدُّوْدَة. جزء دودة المخيخ الذي يقع بين الحدة وحدة الدودة.
- fontanel (= fontanelle)** يَافُوخ.
- fontanelle** يَافُوخ. نقطة لينة كالأحيار المغطاة بالأغشية المتبقية في بعض مناطق القحف والمناطق غير المتعظمة عند الولادة.
- **anterior f.** اليَافُوخ الأَمَامِي. باحة القحف غير المتعظمة والواقعة عند اتصال الدروز الجبهي والاكلياني والسهمي.
- **anterolateral f. (= sphenoidal f.)** اليَافُوخ الأَمَامِي الوَحْشِي. اليافوخ الوددي.
- **bregmatic f. (= anterior f.)** اليَافُوخ الهَامِي. اليافوخ الامامي.
- **casserian f. (= Casser's f. = mastoid f.)** اليَافُوخ الخُشَائِي.
- **cranial f's. (= fonticuli cranii)** اليَافُوخ القُحْفِيَّة.
- **frontal f. (= anterior f.)** اليَافُوخ الجَبْهِي. اليافوخ الامامي.
- **Gerdy's f. (= sagittal f.)** اليَافُوخ السَّهْمِي.
- **major f. (= anterior f.)** اليَافُوخ الكَبِير. اليافوخ الامامي.
- **mastoid f.** اليَافُوخ الخُشَائِي. منطقة القحف غير المتعظمة عند نقطة اتصال الدروز اللامي والجداري الخشائي والقذالي الخشائي.
- **f. minor (= posterior f.)** اليَافُوخ الصَّغِير. اليافوخ الخلفي.
- **occipital f. (= posterior f.)** اليَافُوخ القَذَالِي. اليافوخ الخلفي.
- **posterior f.** اليَافُوخ الخَلْفِي. منطقة القحف غير المتعظمة عند نقطة التقاء الدرزين السهمي واللامي.
- **posterolateral f. (= mastoid f.)** اليَافُوخ الخَلْفِي الجَانِبِي. اليافوخ الخُشَائِي.
- **quadrangular f. (= anterior f.)** اليَافُوخ المُرْبَع. اليافوخ الامامي.
- **sagittal f. (= Gerdy's f.)** اليَافُوخ السَّهْمِي.
- **sphenoidal f.** المنطقه القحفية غير المتعظمة عند اتصال العظمين الجبهي والجداري والجناح الكبير للعظم الوددي والجزء الصدغي من العظم الصدغي.
- **triangular f. (= posterior f.)** اليَافُوخ المُثَلَّث. اليافوخ الخلفي.
- footdrop** قَدَم مُتَدَلِّية. قَدَم سَاقِطَة. سقوط القدم بسبب شلل عضلات الساق الامامية.
- foot, flat (= flatfoot)** قَدَم رَحَاء.
- foot, tabetic** قَدَم تَابِسِيَّة. القدم الرخاء المشوهة التي تشاهد في التابس.
- foramen** ثُقْبَة. (ج: ثُقُب). فتحة أو ممر طبيعي خصوصاً في العظام.
- **f. caecum medullae oblongatae** الثُقْبَة العُورَاء لِلْبَصْلَة. توسع مثلث صغير يوجد في الحافة السفلية للجسر يتكون من نهاية الشق الواسط الامامي للبصلة.
- **emissary f.** ثُقْبَة مَشْبَرِيَّة. اية ثقبه في القحف تمرر وريداً مشبرياً.
- **foramina ethmoidalia** الثُقُب الغَرْبَالِيَّة. ثقب في العظم الغربالي تمرر الفرع الأنفي للعصب العيني والاوعية الغربالية.
- **Infraorbital f.** الثُقْبَة تَحْتَ الحَاجِجِيَّة. فتحة القناة تحت الحاجبية التي تمرر العصب والاوعية تحت الحاجبية.
- **intervertebral f.** الثُقْبَة بَيْنَ الفَقَرَتَيْن. ثقبه تتكون بين الفقرتين المتجاورتين تمرر العصب والاوعية النخاعية الشوكية.
- **jugular f.** الثُقْبَة الوَدَاجِيَّة. الثقبه الموجودة في قاعدة القحف بين العظمين القذالي والصدغي وتتمرر العديد من الاوعية والاعصاب.
- **f. lacerum posterior (= jugular f.)** الثُقْبَة المَعْرَقَة الخَلْفِيَّة. الثقبه الوداجية.
- **f. of Luschka (= apertura lateralis ventriculi quarti)** ثُقْبَة لُوشْكَا. الفتحة الوحشية للبطين الرابع.
- **f. of Magendie (= apertura mediana ventriculi quarti)** ثُقْبَة مَاجَنْدِي. الفتحة الإنسية للبطين الرابع.

- **f. magnum** **الثُقْبَةُ العُظْمِيَّةُ** الفتحة الكبيرة في القسمين الامامي والسفلي للعظم القذالي والتي توصل القناة الفقرية بتجويف الحف.
- **f. of Monro (= interventricular f.)** **ثُقْبَةُ مُنْزَوِ** الثقب بين البطينات، يمر يتصل خلاله البطين الجانبي بالبطين الثالث.
- **occipital f., great (= f. magnum)** **الثُقْبَةُ العُظْمِيَّةُ**
- **occipital f., inferior (= f. magnum)** **الثُقْبَةُ العُظْمِيَّةُ**
- **olfactory f.** **ثُقْبَةُ شَمِيَّةُ** اي من الثقب العديدة في الصفحة المصفوية للعظم الغربالي التي تمرر أحد فروع العصب الشمي.
- **optic f. of sphenoid bone (= canalis opticus)** **القَنَاطَةُ البَصَرِيَّةُ**
- **f. ovalis basis cranii** **الثُقْبَةُ البَيضَوِيَّةُ** لِقَاعِدَةُ الحَفْخَفِ. الفتحة الموجودة في القسم الخلفي من الجزء الإنسي للجناح الكبير للعظم الوددي والتي تمرر الفرع الفكي السفلي للعصب ثلاثي التوائم وبعض الاوعية الدموية.
- **f. rotundum ossis sphenoidalis** **الثُقْبَةُ الدَائِرِيَّةُ** للعظم الوددي. ثقب دائري في الجزء الإنسي من الجناح الكبير للعظم الوددي والتي تمرر الفرع الفكي العلوي للعصب ثلاثي التوائم.
- **sphenopalatine f.** **الثُقْبَةُ الودديَّة الحَنَكِيَّةُ** فتحة على الجدار الإنسي للحفرة الجناحية الحنكية والتي توصلها بالتجويف الأنفي والتي تمرر الشريان الوددي الحنكي والعصب الأنفي.
- **f. spinosum** **الثُقْبَةُ الشوكِيَّةُ** ثقب في الجناح الكبير للعظم الوددي يمرر بها الشريان السحائي المتوسط.
- **stylomastoid f.** **الثُقْبَةُ الإِبْرِيَّةُ الخُشَائِيَّةُ** فتحة في القسم السفلي للعظم الصدغي بين الناتئين الإبري والخشائي والتي تمرر العصب الوجهي والشريان الإبري الخشائي.
- **suborbital f. (= infraorbital f.)** **الثُقْبَةُ تَحْتَ الحَجَاجِيَّةُ**

- **supraorbital f.** **الثُقْبَةُ فَوْقَ الحَجَاجِيَّةُ** ثقب في العظم الجبهي على الحافة فوق الجفنية والتي تمرر العصب والشريان فوق الحجاجي.
- **vertebral f.** **الثُقْبَةُ الْفَقْرِيَّةُ** الثقب الكبيرة التي تتكون بين جسم الفقرة وقوسها والتي تمرر نخاع الشوكي.
- foraminotomy** **بَضْعُ الثُقْبَةِ** عملية إزالة سقف الثقب بين الفقرتين لتخفيف الضغط عن جذور العصب النخاعي الشوكي.
- forceps** **مِلْقَطٌ** (ج: مَلَاقِطٌ). 1. آلة جراحية لالتقاط ومسك الأنسجة أو الضغط عليها أو تثبيت الضماد المعقم 2. أي عضو ملقطي الشكل وبصورة خاصة يطلق على الالياف الانتهاية للجسم الثفني.
- forebrain (= prosencephalon)** **الدُّمَاغُ المَقْدَمُ**
- foreconscious** **مَقْدَمُ الوَعْيِ**، الفعالية العقلية التي تتضمن تذكّر التجارب التي يمكن استحضارها لمستوى الوعي عند الحاجة إليها في الحالات الخاصة.
- forehead** **الجَبْهَةُ**، قسم الوجه فوق العينين.
- form** **شَكْلٌ**، خاصية البنية التي يعينها تكوينها وحجمها وصفاتها الظاهرة الأخرى.
- formatio (= formation)** **تَشَكُّيلٌ؛ تَشَكُّلٌ**.
- formation** **تَشَكُّيلٌ؛ تَشَكُّلٌ** 1. عملية تكوين شكل أو بنية ذات شكل محدد 2. بنية ذات شكل معين.
- **coffin f.** **التَشَكُّلُ القَابُوتِيّ**، محيط الخلية العصبية الميتة الذي يتكون من خلايا تابعة في البلعيمات العصبونية.
- **compromise f.** **تَشَكُّيلٌ تَوَفِيقِيّ**، في التحليل النفسي هي الفكرة أو الفعل المقنع الذي يسمح بالتعبير الجزئي عن الفكرة المكبوتة.
- **gray reticular f.** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيّ السِّنْجَابِيّ**، المادة الشبكية السنجابية للنخاع المستطيل (البصلة).
- **reticular f. of medulla oblongata** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيّ لِلْبَصْلَةِ**، القسم القديم تطورياً من البصلة له بنية شبكية مكونة من تجمعات خلوية غير محدودة لكنها تنتشر في وسط الالياف العصبية الغزيرة وغير

المحددة وتملأ المساحات بين الألياف بصورة غير منتظمة.

**- reticular f. of mesencephalon** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ لِلدُّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.** قسم الدماغ المتوسط ذو البنية الشبكية الشبيهة بالتشكيل الشبكي في البصلة والذي يقع بين المادة السوداء والمادة السنجابية المركزية.

**- reticular f. of pons** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ لِلجِسْرِ.** قسم الجزء الظهري من الجسر أمام المادة السنجابية المركزية الذي له تشكيل شبيه بالتشكيل الشبكي للبصلة.

**- reticular f. of spinal cord** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ لِلنُّخَاعِ.** جزيرات صغيرة من المادة السنجابية تقاطع مع الياف عصبية بيضاء ويكونان سوية جزءاً من المادة السنجابية للنخاع الشوكي. ويقع هذا التشكيل في المنطقة الصدرية من النخاع خلف القرن الوحشي مباشرة.

**- white reticular f.** **التَشَكُّيلُ الشَّبَكِيُّ الْأَبْيَضُ.** المادة الشبكية البيضاء في النخاع المستطيل (البصلة).

**formication** **تَنْعُلُ؛ تَمَلَأَن.** هلس لمسي يشعر فيه المريض بوجود حشرات صغيرة تزحف على جلده ويشاهد ذلك غالباً في التسمم بالكوكائين أو الأمفيتامين.

**fornix** **قَبْوُ.** 1. اصطلاح يصف بنية قوسية الشكل أو الحيز الذي يولد بداخلها 2. قبو المخ.

**- f. cerebri** **قَبْوُ المَخ.** السبيل الصادر للحصين والذي يسقط بصورة رئيسية على الاجسام الحلمية ونوى الغنان. وهناك إثنان منها يتكون كل منهما من سبيل مقوس يتحد تحت الجسم الثفني مع القبو الآخر وبهذا يكونان عمودين وجسم وساقين.

**fossa** **حُفْرَة.** (ج: حُفَر). انخفاض أو منطقة منخفضة ومجوّفة.

**- cerebellar f. (= posterior cranial f.)** **الحفرة المخيخية؛ حُفْرَة القحف الخَلْفِيَّة.**

**- cerebral f.** **الحُفْرَة المُخَيَّة.** انخفاض في السطح الباطن للعظم القذالي إلى الخلف من الحفرة المخيخية يحوي الفصين القذاليين للمخ.

**- cranial f, anterior** **الحُفْرَة القَحْفِيَّة الْأَمَامِيَّة.** القسم الأمامي من قاع تجويف القحف الذي يسند الفصين الجبهيين ويتكون من أجزاء من العظام الثلاثة الغربالي والجبهي والوتدي.

**- cranial f., middle** **الحُفْرَة القَحْفِيَّة الْوَسْطِيَّة.** القسم الوسطي من قاع جوف القحف الذي يسند الفصين الصدغيين والغدة النخامية ويتكون من جسم العظم الوتدي وجناحيه الكبيرين والقسمين الصخري والصدغي من العظم الصدغي.

**- cranial f., posterior** **الحُفْرَة القَحْفِيَّة الْخَلْفِيَّة.** القسم الخلفي من قاع جوف القحف الذي يحوي المخيخ والجسر والبصلة (النخاع المستطيل) ويتكون من أجزاء من العظام الوتدي والصدغي والجداري والقذالي.

**- hypophyseal f.** **الحُفْرَة النُّخَامِيَّة.** حفرة عميقة في وسط السرج التركي للعظم الوتدي، وهي تحوي الغدة النخامية.

**- interpeduncular f.** **الحُفْرَة بَيْن السُّوَيْقَتَيْن.** حفرة بين السويقتين المخيتين يكون قاعها المادة المثقبة الخلفية.

**- f. lateralls cerebri** **الحُفْرَة الْمُخَيَّة الْوَحْشِيَّة.** حفرة تظهر في الجنين على السطح الوحشي لنصف كرة المخ وتقع الجزيرة في قاعها ثم تغلق على الوصاد وتكون حوافها التلم الوحشي للمخ.

**- pituitary f. (= hypophyseal f.)** **الحُفْرَة النُّخَامِيَّة.**

**- sellar f. (= hypophyseal f.)** **نُقْرَة.** (ج: نُقَر). حفرة صغيرة في سطح العضو أو البنية.

**- f. centralis retinae** **نُقْرَة الشَّبَكِيَّة الْمَرْكَزِيَّة.** نقرة صغيرة في مركز البقعة الصفراء التي تكون بدورها حفرة صغيرة في الشبكية والتي تحوي المخاريط وهي منطقة حس الإبصار المميز لأن طبقات الشبكية فيها مزاحة عن المخاريط فيقع ضوء الصورة عليها مباشرة فتولد أوضح صورة وأوضح إبصار.

**fracture** **كَسْرُ قَاعِ الْجُمُجْمَة.** كسر عادة ما يكون خطياً في قاع الجمجمة يتصف بثُرْ انففي دموي وتجمع دموي في الجوف الطبلي.

- **depressed f.** كَسْرٌ مُنْخَسِفٌ. كسر قحفي  
تنخسف فيه شدة عظمية إلى داخل القحف.

- **neurogenic f.** كَسْرٌ عَصَبِيٌّ الْمَنْشَأُ. كسر يتولد  
بسبب ضعف العظام الناتج عن مرض عصبي كالتابيس  
الظهري.

**frigidity** بُرُودَةٌ. برودة وخصوصاً البرودة  
الجنسية وبالأخص عند النساء.

**frigotherapy (= cryotherapy)** مُعَالِجَةٌ  
قُرُودَةٌ. المعالجة بالبرودة.

**frustration** حَبْطَةٌ؛ إِحْباطٌ. منع أو إيقاف  
تحقيق الرغبات أو الأغراض أو الأفعال أو الدوافع  
النفسية مما يؤدي إلى الشعور بالتوتر بسبب هذا  
الفشل.

**fugue** شُرَادٌ. حالة مرضية تتصف بتغير الوعي  
بشكل يعمل فيه المصاب وكأنه واعي ولكن أعماله لا  
توجهها شخصيته الحقيقية السوية وبعد انتهاء  
النوبة لا يتذكر شيئاً عنها أبداً.

- **epileptic f.** شُرَادٌ صَرْعِيٌّ. حالة شرود تتصف  
بالجري والتجول التي تحدث أحياناً أثناء نوبة الصرع  
النفسي الحركي (الصرع الصدغي) أو بعدها.

- **hysterical f.** شُرَادٌ هِسْتِيرِيٌّ. عارضة نَسَاوة  
تتصف بفقدان حس الذات ومعرفة الهوية الشخصية  
وتحدث نوبة الهستيريا هذه في محاولة للهروب من  
حالة كرب أو تناقض نفسياني وعادة ما يتجول  
المريض لمسافات طويلة من دون هدف ولن يتذكر عن  
ذلك شيئاً بعد زوال النوبة.

**fundus oculi** قَاعُ الْعَيْنِ. القسم الخلفي من  
داخل العين الذي يشاهد عند تنظير العين.

**funduscopy (= ophthalmoscopy)**  
تَنْظِيرُ قَاعِ الْعَيْنِ.

**funiculitis** اَلْتِهَابُ الْحَبْلِ. التهاب قسم جذر  
العصب النخاعي الذي يقع في القناة بين الفقرتين.

**funiculus** حَبْلٌ. (ج: حَبَالٌ). اسم عام لبنية أو  
جزء حبل الشكل.

- **f. anterior medullae spinalis** الْحَبْلُ الْأَمَامِي  
لِلنُّخَاعِ. المادة البيضاء للنخاع التي توجد في الجهتين  
بين الشق الناصف البطني والجذور البطنية للنخاع.

- **cuneate f. (= cuneate fasciculus of  
spinal cord)** الْحُرْمَةُ الْإِسْفِينِيَّةُ لِلنُّخَاعِ.

- **f. cuneatus lateralis** الْحَبْلُ الْإِسْفِينِيَّ الْجَانِبِيَّ.  
حرف طولاني على البصلة بين جذور العصب الإضافي  
النخاعي والحزمة الإسفينية.

- **f. cuneatus medullae oblongata  
(= fasciculus cuneatus medullae  
oblongatae)** الْحُرْمَةُ الْإِسْفِينِيَّةُ لِلْبَصَلَةِ.

- **f. dorsalis medullae spinalis** الْحَبْلُ الظَّهْرِيُّ  
لِلنُّخَاعِ. المادة البيضاء في جهتي النخاع الشوكي التي  
تقع بين الشق الناصف الخلفي والجذور الظهرية  
للأعصاب النخاعية الشوكية.

- **lateral f. of medullae oblongata** الْحَبْلُ  
الْجَانِبِيُّ لِلْبَصَلَةِ. استمرارية السبل العصبية للحبل  
الجانبى للنخاع الشوكي إلى النخاع المستطيل ما عدا  
السبل الهرمي.

- **f. lateralis medullae spinalis** الْحَبْلُ الْجَانِبِيَّ  
لِلنُّخَاعِ. المادة البيضاء للنخاع الشوكي الموجودة  
بالجهتين بين الجذور الظهرية والبطنية للأعصاب  
النخاعية الشوكية.

- **funiculi medullae spinalis** حَبَالُ النُّخَاعِ.  
الحزم الكبيرة للسبل العصبية التي تكون المادة  
البيضاء للنخاع الشوكي.

# G

**GABA (= gamma aminobutyric acid)** غَابَا: حمض الغاما أمينو بيوتيريك.

**gait** مَشْيَة. طريقة أو أسلوب السير.

- **antalgic g.** مَشْيَة تَضَادُّ الأَلَم. مشية عرجاء  
يمشيها المريض كي يتجنب الألم في البنيات حاملات  
الوزن المصابة (كمفصل الورك)، وتتصف بخطوات  
قصيرة مضطربة.

- **ataxic g.** مَشْيَة زَنْحِيَّة. مشية غير منسقة وغير  
مستقرة وذات قاعدة واسعة تقذف فيها القدم للخارج  
وتهبط على العقب أولاً ثم على الأباخس.

- **calcaneus g.** مَشْيَة عَقْبِيَّة. المشية التي تتبع  
عند شلل العضلة النعلية وعضلة الساق مع ضعف قوة  
الدفع في الساق وزيحان الظنوب فوق العقب عند  
نهاية طور الخطو.

- **cerebellar g.** مَشْيَة مُخَيَّخِيَّة. مشية سدرية  
تمايلية تدل على مرض مخيخي.

- **Charcot's g.** مَشْيَة شَارْكَوَت. مشية خاصة في  
رنح فريدرايخ.

- **double step g.** مَشْيَة الخطوة المزدوجة؛ مَشْيَة  
ثَنَائِيَّة الخطوات. مشية تختلف فيها أطوال الخطوات  
المتعاقبة وتوقيتها بصورة ملحوظة.

- **drag-to g.** مَشْيَة سَحَبِ القَدَم. مشية تسحب  
فيها القدم نحو العكازات بدلاً من رفعها عن الأرض.

- **drop foot g. (= stepage g.)** مَشْيَة القَدَم  
السَّاقِطَة. مشية حردية.

- **drunken g.** مَشْيَة السِّكْر. المشية الرنحية التي  
تشاهد عند التسمم بالكحول أو بالادوية الأخرى،  
كالباربيتورات.

- **duck g. (= myopathic g.)** مَشْيَة الإِغْتَالَال  
الْعَضَلِي؛ مشية البطة.

- **dystrophic g. (= myopathic g.)** مَشْيَة  
خَثَلِيَّة. التناوب المبالغ لحركات الجذع الجانبية مع  
الرفع المبالغ للحوض الذي يشبه مشية القطة أو  
البطريق التي تظهر في الخثل العضلي المترقي.

- **equine g.** مَشْيَة خَيْلِيَّة. مشية تتم بصورة  
رئيسية بثني مفصل الورك وتشاهد في شلل تعابر  
الساقين.

- **festinating g.** مَشْيَة هَرَوَلَة؛ هَرَوَلَة. مشية  
يخطو فيها المريض بصورة لا إرادية خطوات قصيرة  
ومتسارعة وعادة على رؤوس الأصابع والتي تشاهد  
في الشلل الرعاشي وبعض الأمراض العصبية الأخرى.

- **four-point g.** مَشْيَة النِّقَاطِ الأَرْبَع. مشية للامام  
تتم بتقديم أحد العكازين أولاً تليه خطوة الساق  
المعاكسة ثم تقديم العكاز الثاني تتلوه خطوة الساق  
الثانية وهكذا.

- **gluteal g.** مَشْيَة أَلْوِيَّة. مشية تنتج عن شلل  
العضلة الألوية الوسطية تتصف بميلان الجذع نحو  
الجهة المصابة عند كل خطوة.

- **heel-toe g.** مَشْيَة العَقَب - الأصابع. مشية تتم  
بنزول العقب أولاً على الأرض ومن ثم تنزل الأباخس.

- **helicopod g.** مَشْيَة مَرَوَّجِيَّة. مشية تدور فيها  
القدم نصف دائرة كما يحدث في الحالات الهستيرية.

- **hemiplegic g.** مَشْيَة الْفَالِج. مشية تشمل انثناء  
الورك بسبب تدلي القدم وحركة الساق الدورانية.

- **hypotonic g.** مَشْيَة نَاقِصَة التَوَتُّر. مشية  
الاعتلال العضلي في المرضى ناقصي توتر العضلات  
الوركية الفخذية.

- **intermittent double-step g.** مَشْيَة الخُطْوَة  
المُزْدَوِجَة المُتَقَطِّعَة. مشية فالجية تحدث فيها

- فاصلة بعد الخطوة القصيرة للقدم السليمة وفي بعض الحالات بعد خطوة القدم المصابة.
- **myopathic g.** **مِشْيَةُ** الاعتلال العضلي. تناوب الحركات المبالغة للجذع مع الرفع المبالغ للحوض مما يولد مشية شبيهة بمشية البط أو البطريق ويحصل ذلك في الامراض العضلية.
- **Oppenheim's g.** **مِشْيَةُ** أوبنهايم. مشية تتصف بتذبذب الرأس والأطراف والجسم غير المنتظم والذي يشاهد في بعض حالات التصلب المتعدد.
- **pendular g. (= Oppenheim's g.)** **مِشْيَةُ** نواسية. مشية أوبنهايم.
- **scissor g.** **مِشْيَةُ** المقص. مشية تمر فيها إحدى القدمين أمام القدم الثانية في كل خطوة مولدة مشية تعابر الساقين.
- **spastic g.** **مِشْيَةُ** تشنجية. مشية تتصف بالتشنج وعدم تناسق الحركات يسحب فيها المريض قدميه بدلاً من رفعهما.
- **staggering g.** **مِشْيَةُ** دوامية. مشية تمايلية دورانية رنحية يظهر فيها المريض وكأنه يوشك على السقوط إلى الخلف أو يفقد توازنه وتشاهد في حالات التسمم بالكحول والباربيتورات.
- **stamping g. (= tabetic g.)** **مِشْيَةُ** الدفع؛ **مِشْيَةُ** تابسية.
- **steppage g.** **مِشْيَةُ** حربية. مشية تشاهد في حالة القدم المتدلية حيث ترفع القدم المتقدمة عالياً كي تبعد الأصابع عن الأرض، وتولد عن شلل العضلات الظنبوبية والشنطوية وتشاهد في حالات إصابات العصبون الحركي السفلي كالتهاب الأعصاب وإصابات خلايا القرن الامامي.
- **swaying g. (= cerebellar g.)** **مِشْيَةُ** تارُججية.
- **swing through g.** **مِشْيَةُ** التارُجج البيني. مشية تقدم فيها العكازتان إلى الامام ثم تخطو القدم من بينهما.
- **swing-to g.** **مِشْيَةُ** التارُجج الإنتهائي. مشية تقدم فيها العكازتان ثم تخطو القدم لتنتهي عندهما.
- **tabetic g. (= ataxic g.)** **مِشْيَةُ** تابسية. مشية رنحية تحدث في التابس الظهري.
- **Trendelenburg g. (= gluteal g.)** **مِشْيَةُ** ألوية.
- **waddling g. (= dystrophic g.)** **مِشْيَةُ** متهادية؛ **مِشْيَةُ** حثلية.
- galeophilia (= ailurophilia)** **هُوسُ** الهررة.
- galeophobia (= ailurophobia)** **رُهابُ** الهررة.
- gamma-aminobutyric acid (GABA)** **حَفْضُ** الغاما أمينوبيوتيريك. حمض أميني يعمل كناقل مثبط رئيسي في الدماغ.
- ganglia** **عُقْدُ** جمع عقدة.
- gangliated (= ganglionated)** **مُعَقَّدُ** ذو **عُقْدُ**.
- gangliocytoma (= ganglioneuroma)** **وَرَمٌ** عصبي عُقدي.
- ganglioform** **عُقْدِي** الشكل. ذو شكل يشبه العقدة.
- ganglioglioma** **وَرَمٌ** دبقِي عُقدي. ورم دبقي عُقدي.
- ganglioglioneuroma** **وَرَمٌ** عَصَبِي عُقدي. (= ganglioneuroma)
- gangliolytic (= ganglioplegic)** **شالٌ** عُقدي.
- ganglioma (= ganglioneuroma)** **وَرَمٌ** عُقدي؛ **وَرَمٌ** عَصَبِي عُقدي.
- ganglion** **عُقْدَةُ**. (ج. عُقْد). 1. كتلة عقدية الشكل 2. اصطلاح يدل على مجموعة من اجسام خلايا عصبية موجودة خارج الجهاز العصبي المركزي. ويستعمل الاصطلاح أحياناً للدلالة على مجموعة منها داخل الدماغ أو النخاع الشوكي كالعقد القاعدية 3. ورم كيسِي حميد يقع في الوتر أو السفاق في المرفق مثلاً أو في ظهر القدم ويتكون من غلاف ليفي رقيق يحوي سائلاً مخاطينياً.
- **accessory ganglia (= ganglia intermedia)** **عُقْدُ** إضافية. العقد المتوسطة.
- **acousticofacial g.** **العُقْدَةُ** السَّمْعِيَّةُ الوُجْهِيَّةُ.



عقدة تظهر في المراحل الجنينية الاولى يبقى قسم منها مكوناً العقدة الركبية.

- Andresch's g. (= inferior glossopharyngeal g.) **العُقْدَةُ اللُّسَانِيَّةُ البَلْعُومِيَّةُ السفلية.**
- aorticorenal g. **العُقْدَةُ الأَبْهَرِيَّةُ الكُلَوِيَّةُ.** قسم منفصل تقريباً من العقد البطنية.
- auditory g. (= ventral & dorsal cochlear nuclei) **العُقْدَةُ السَّمْعِيَّةُ.** النوى القوقعية البطنية والظهرية.
- Auerbach's g. **عُقْدَةُ أَوْرباخ.** إحدى العقد العصبية الصغيرة في ضفيرة أورباخ.
- autonomic ganglia **العُقْدَةُ المُسْتَقْلَةُ.** عقد الجهاز العصبي المستقل التي توجد على طول الجذع الودي وفي الضفائر المحيطة وفي جدران بعض الأعضاء المجهزة بأعصاب مستقلة، وهناك نوعان منها متشابهان بنيوياً ومختلفان وظيفياً وهما العقد الودية والعقد اللاودية.
- ganglia of autonomic plexuses **عُقْدُ الضَّفَائِرِ المُسْتَقْلَةُ.** مجموعات من أجسام خلايا عصبية توجد في الضفائر المستقلة وتتكون بصورة رئيسية من خلايا ودية بعد العقدية.
- azygous g. **الكَبَةُ المُضْعِفِيَّةُ.** انظر glomus coccygeum.
- basal ganglia **النُّوى القَاعِيَّةُ.** انظر basal nuclei.
- Bezold's g. **عُقْدَةُ بِيْرُولد.** سلسلة من خلايا عقدية توجد في الحاجز بين الأذنين.
- Bidder's ganglia **عُقْدُ بِيْدِر.** عقد على الأعصاب القلبية تقع في النهاية السفلية للحاجز الأذيني.
- Blandin's g. (= submandibular g.) **عُقْدَةُ** تَحْتَ الْفَكِّ السُّفْلِيِّ.
- Bochdalek's g. (= superior dental plexus) **الضَفِيرَةُ السِّنِّيَّةُ العُلْوِيَّةُ.**
- Bock's g. (= carotid g.) **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ.**
- cardiac ganglia **العُقْدَةُ القَلْبِيَّةُ.** عقد الضفيرة القلبية التي توجد بالقرب من الرباط الشرياني.
- carotid g. **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ.** عقدة الضفيرة السباتية الباطنة التي توجد في الجيب الكهفي.
- carotid g., inferior **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ.**

عقدة الضفيرة السباتية الباطنة التي توجد في القسم السفلي من القنال السباتي.

- carotid g., superior **العُقْدَةُ السُّبَاتِيَّةُ العُلْوِيَّةُ.** عقدة الضفيرة السباتية الباطنة التي توجد في القسم العلوي من النفق السباتي.
- caudal g. of glossopharyngeal nerve **العُقْدَةُ الذَّنْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللُّسَانِيِّ البَلْعُومِيِّ.** العقد السفلية لعقدتي العصب اللساني البلعومي عند مروره بالثقبه الوداجية وتحوي العقدتان خلايا عصبية واردة لهذا العصب.
- caudal g. of vagus **العُقْدَةُ الذَّنْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ المُبْهِمِ.** عقدة العصب المبهم الواقعة أسفل الثقبه الوداجية مباشرة أمام النتوء المستعرض للفقرتين الرقبيتين الأولى والثانية وتحوي أجسام خلايا عصبية واردة للمبهم.
- celiac ganglia **العُقْدَةُ البَطْنِيَّةُ.** عقدتان غير منتظمتين في شكلهما كل واحدة منهما على أحد ساقى الحجاب الحاجز وضمن الضفيرة البطنية وتحويان خلايا عصبية ودية واليافاً عصبية ودية قبل العقدية من العصبين الحشويين الكبير والصغير. كما تمر خلال العقد الياف نظيرة الودي والياف عصبية حسية.
- cephalic g. **العُقْدَةُ الرُّأْسِيَّةُ.** مجموعة العقد اللاودية التي توجد في الرأس وتتألف من العقد الهدبية والأذنية والجناحية الحنكية وتحت الفك السفلية.
- cerebrospinal ganglia **العُقْدَةُ الدُّمَاغِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ.** العقد المرتبطة بالأعصاب القحفية والنخاعية.
- cervical g., inferior **العُقْدَةُ الرَّقَبِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ.** قسم من العقد الرقبية الصدرية.
- cervical g., middle **العُقْدَةُ الرَّقَبِيَّةُ الوُسْطَى.** عقدة متغيرة غالباً ما تكون مدمجة مع العقد الفقرية على الجذع الودي في مستوى الغضروف الحلقي وتتوزع اليافها بعد العقدية بصورة رئيسية إلى القلب والمنطقة الرقبية والأطراف العلوية.
- cervical g., superior **العُقْدَةُ الرَّقَبِيَّةُ العُلْوِيَّةُ.** أعلى عقدة في الجذع الودي تقع خلف الشريان السباتي الباطن وأمام الفقرتين الرقبيتين الثانية والثالثة وتوزع اليافها بعد العقدية إلى القلب خلال

- الأعصاب الرقبية القلبية وإلى الضفيرة البلعومية ومنها إلى الحنجرة والبلعوم وإلى الرأس خلال الضفيرتين السباتيتين الظاهرة والباطنة.
- **cervical g. of uterus** عقدة عُقْ الرَحِم. عقدة عصبية تقع بالقرب من عنق الرحم.
- **cervicothoracic g.** العُقْدَةُ الرَقَبِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ. عقدة في الجذع الودي بمستوى الفقرتين، الرقبية السابعة والصدرية الأولى، وأمام العصبين، الرقبية الثامن والصدرية الأول، ولها قسمان العقدة الرقبية السفلية والصدرية الأولى الملتحمتان عادة بصورة جزئية أو كاملة. وتتوزع اليافها بعد العقدة إلى القلب والرأس والرقبة والأطراف العليا.
- **cervicouterline (= cervical g. of uterus)** عقدة عُقْ الرَحِم. عقدة الهُدْبِيَّة. عقدة لا ودية توجد في القسم الخلفي من الحجاج تستلم اليافاً قبل عقدة من العصب محرك العين وتجهز اليافها البعد عقدة إلى العضلة الهدبية محركة العين وتجهز اليافها البصرية العقدة إلى العضلة الهدبية ومصرة الحدقة. كما تمر خلال العقدة بعض الألياف الحسية وبعد العقدة الودية.
- **Cloquet's g.** عُقْدَةُ كُلُوْكَ. تضخم في العصب الأنفي الحنكي في القناة الحنكية الأمامية.
- **cochlear g.** العُقْدَةُ القَوَاقِعِيَّةُ. العقدة الحسية الموجودة في داخل القناة اللولبية لعماد القوقعة وتتكون من خلايا ثنائية الأقطاب التي ترسل اليافاً إلى الجهة المحيطية للعضو اللولبي خلال الثقبية العصبية وإلى الجهة المركزية إلى النوى القوقعية لجذع الدماغ خلال الصماخ السمعي الباطن.
- **g. coeliaca (= celiac g.)** العُقْدَةُ البَطْنِيَّةُ.
- **collateral ganglia (= prevertebral g.)** العُقْدُ الجَانِبِيَّةُ: العقد أمام الفقرات.
- **Corti's g. (= cochlear g.)** العُقْدَةُ القَوَاقِعِيَّةُ.
- **craniospinal ganglia** العُقْدُ القَحْفِيَّةُ النُخَاعِيَّةُ. مجموعات من العصبونات الحسية التي تولد تضخمات عقدية في الجذور الحسية للأعصاب النخاعية (العقد النخاعية الشوكية) والجذور الحسية للأعصاب القحفية (العقد الحسية للأعصاب القحفية).
- **dorsal root g. (= spinal g.)** عُقْدَةُ الجَذَرِ الظَهْرِي. عقدة نخاعية.
- **Ehrenritter's g. (= superior g. of glossopharyngeal nrv)** عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْعُومِيِّ العُلْوِيِّ.
- **encephalospinal ganglia (= carnospinal ganglia)** العُقْدُ القَحْفِيَّةُ النخاعية.
- **false g.** عُقْدَةُ كَاذِبَةٍ. ضخامة على العصب ليست لها بنية عقدية.
- **Ganser's g. (= Interpeduncular g.)** العُقْدَةُ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.
- **gasserian g. (= trigeminal g.)** عُقْدَةُ ثَلَاثِي النَوَائِمِ. عقدة غاسير.
- **geniculate g.** العُقْدَةُ الرُّكْبِيَّةُ. العقدة الحسية للعصب الوجهي الواقعة على ركبية العصب الوجهي.
- **g. of glossopharyngeal nerve, inferior (= caudal g. of glossopharyngeal nerve).** عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْعُومِيِّ السفلية.
- **g. of glossopharyngeal nerve, superior (= rostral g. of glossopharyngeal nerve)** عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْعُومِيِّ العُلْوِيِّ.
- **hepatic g.** العُقْدَةُ الكَبِدِيَّةُ. عقدة عصبية تقع بالقرب من الشريان الكبدي.
- **hypogastric g.** العُقْدَةُ الخَثَلِيَّةُ. إحدى العقدتين العصبيتين الواقعتين على جهتي عنق الرحم والمتصلتين بالضفيرتين العجزية والخثلية.
- **hypoglossal g.** عُقْدَةُ تَحْتَ اللِّسَانِيِّ. عقدة العصب تحت اللساني ونادراً ما تشاهد في الإنسان إلا في أجنته.
- **g. impar** العُقْدَةُ الْمُفْرَدَةُ. العقدة التي توجد عادة أمام العصعص حيث يتحد الجذعان الوديان فيها.
- **intermediate ganglia** العُقْدُ الْمُتَوَسِّطَةُ. مجموعات صغيرة من خلايا عصبية ودية توجد على الأعصاب النخاعية والأعصاب الموصلة خصوصاً في المناطق الرقبية والصدرية السفلية والقطنية العلوية.

- jugular g. of glossopharyngeal nerve  
(= rostral g. of glossopharyngeal nerve)  
عُقْدَةُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ الرَّاسِيَّةِ.
- jugular g. of vagus nerve (= rostral g. of vagus nerve)  
عُقْدَةُ الْعَصَبِ الْمُهَيْمِ الرَّاسِيَّةِ.
- Laumonier's g. (= 1. carotid g., inferior carotid g.)  
العُقْدَةُ السَّيَّائِيَّةُ: العُقْدَةُ السَّيَّائِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ.
- lesser g. of Meckel (= g. submandibularis.)  
عُقْدَةُ مِيكَل الصَّغْرَى: العُقْدَةُ تَحْتَ الْفَكِّ.
- Lobstein's g. (= g. thoracicus splanchnicum)  
عُقْدَةُ لُوبْشْتَايْن. عُقْدَةُ عَلَى الْعَصَبِ الْحَشَوِيِّ الصَّدْرِيِّ الْكَبِيرِ فَوْقَ الْحِجَابِ الْحَاجِزِ وَمِنْ الْمَحْتَمَلِ أَنَّهَا الْعُقْدَةُ الْحَشَوِيَّةُ.
- Ludwig's g.  
عُقْدَةُ لُودْفِيغ. عُقْدَةُ مُرْتَبِطَةٌ مَعَ الضَّفِيرَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَتَقَعُ قَرَبَ الْأَذِينَ الْيَمَنِ لِلْقَلْبِ.
- lumbar ganglia  
العُقْدُ الْقُطْنِيَّةُ. عُقْدُ الْقِسْمِ الْقُطْنِيِّ مِنَ الْجَذْعِ الْوَدِيِّ وَعَادَةً مَا تَكُونُ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ عُقَدٍ عَلَى كُلِّ جَانِبٍ.
- Luschka's g. (= glomus coccygeum)  
الْكَبَّةُ الْعُصْعُصِيَّةُ.
- lymphatic ganglia (= lymph nodes)  
العُقْدُ اللَّفْافِيَّةُ.
- Meckel's g. (= g. pterygopalatinum)  
العُقْدَةُ الْجَنَاحِيَّةُ الْحَنْكِيَّةُ.
- Meissner's g.  
عُقْدَةُ مَيْسْنَر. إِحْدَى مَجْمُوعَاتِ الْخَلَايا الْعَصْبِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي ضَفِيرَةِ مَيْسْنَرِ تَحْتَ الْمُخَاطِيَّةِ.
- mesenteric g., inferior  
العُقْدَةُ الْمَسَارِيْقِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. عُقْدَةُ وَدِيَّةٌ فِي الضَّفِيرَةِ الْمَسَارِيْقِيَّةِ السُّفْلِيَّةِ بِالْقَرَبِ مِنْ مَنَاطِقَةِ ابْتِدَاءِ الشَّرْيَانِ الْمَسَارِيْقِيِّ السُّفْلِيِّ.
- mesenteric g., superior  
العُقْدَةُ الْمَسَارِيْقِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ. عُقْدَةُ وَدِيَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى جَانِبِي الشَّرْيَانِ الْمَسَارِيْقِيِّ الْعُلْوِيِّ أَوْ تَحْتَهُ مَبَاشِرَةً وَعَادَةً مَا تَكُونُ مُنْدَمِجَةً مَعَ الْعُقْدَةِ الْبَطْنِيَّةِ.
- Muller's g. (= superior glossopharyngeal g.)  
عُقْدَةُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ الْعُلْوِيَّةِ.
- nodose g. (= caudal g. of vagus)  
الذَّنْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُهَيْمِ.
- olfactory g.  
العُقْدَةُ الشَّمْعِيَّةُ. كِتْلَةُ نَسِيجِيَّةٍ فِي الْجَنْبَيْنِ تَتَطَوَّرُ لِتَكُونُ الْعَصَبَ الشَّمْعِيَّ.
- otic g.  
العُقْدَةُ الْأُذُنِيَّةُ. عُقْدَةُ لَا وَدِيَّةٌ فِي الْحَفْرَةِ تَحْتَ الصَّدْغَةِ بِالْجِهَةِ الْإِنْسِيَّةِ مِنَ الْعَصَبِ الْفَكِّي السُّفْلِيِّ وَتَحْتَ الثَّقْبَةِ الْبَيْضَوِيَّةِ مَبَاشِرَةً وَتَأْتِي الْيَافِهَا قَبْلَ الْعُقْدَةِ مِنَ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ خِلَالَ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الصَّغِيرِ وَتَغْذِي الْيَافِهَا بَعْدَ الْعُقْدَةِ الْغَدَّةِ النَّكَفِيَّةِ. وَتَمُرُّ خِلَالَ الْعُقْدَةِ أَلْيَافٌ حَسِّيَّةٌ وَوَدِيَّةٌ.
- parasympathetic g.  
عُقْدَةُ لَا وَدِيَّةٌ. إِحْدَى مَجْمُوعَاتِ الْخَلَايا الْعَصْبِيَّةِ الْكُولِينِيَّةِ الْفَعْلِ فِي الْجِهَازِ الْعَصْبِيِّ الْإِلَادِيِّ وَالتِّي تَوْجَدُ بِالْقَرَبِ مِنَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تُغْذِيهَا أَوْ مَفْرُوسَةٌ فِي جَدْرَانِهَا.
- pelvic ganglia  
العُقْدُ الْحَوْضِيَّةُ. عُقْدُ وَدِيَّةٌ وَلَا وَدِيَّةٌ تَوْجَدُ ضَمْنَ الضَّفَائِرِ الْحَوْضِيَّةِ.
- petrosal g. (= caudal g. of glossopharyngeal nerve)  
العُقْدَةُ الصَّخْرِيَّةُ: عُقْدَةُ الْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ الذَّنْبِيَّةِ.
- phrenic g.  
العُقْدَةُ الْحَبَابِيَّةُ. عُقْدَةُ وَدِيَّةٌ صَغِيرَةٌ تَوْجَدُ غَالِبًا ضَمْنَ الضَّفِيرَةِ الْحَبَابِيَّةِ عِنْدَ اتِّصَالِهَا مَعَ الضَّفِيرَةِ الْبَطْنِيَّةِ.
- prevertebral ganglia  
العُقْدُ أَمَامَ الْفَقَّارِ. عُقْدُ وَدِيَّةٌ (وَهِيَ غَيْرُ الْعُقْدِ الْوَدِيِّ فِي الْجَذْعِ الْوَدِيِّ) تَوْجَدُ فِي الضَّفَائِرِ أَمَامَ الْفَقَّارِيَّةِ فِي الْمَنَاطِقَتَيْنِ الصَّدْرِيَّةِ وَالْبَطْنِيَّةِ.
- pterygopalatine g.  
العُقْدَةُ الْجَنَاحِيَّةُ الْحَنْكِيَّةُ. عُقْدَةُ لَا وَدِيَّةٌ تَوْجَدُ فِي الْحَفْرَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنْكِيَّةِ وَتَأْتِي الْيَافِهَا قَبْلَ الْعُقْدَةِ مِنَ الْعَصَبِ الْوَجْهِِيِّ خِلَالَ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الْكَبِيرِ وَعَصَبِ الْقَنَاةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنْكِيَّةِ وَتَغْذِي الْيَافِهَا بَعْدَ الْعُقْدَةِ الْغَدَّةِ الدَّمْعِيَّةِ وَالْأَنْفِيَّةِ وَالْحَنْكِيَّةِ. وَتَمُرُّ خِلَالَهَا بَعْضُ الْأَلْيَافِ الْحَسِّيَّةِ وَالْوَدِيَّةِ.
- Remak's g. (= sinoatrial g.)  
عُقْدَةُ رِيْمَاكُ: الْعُقْدَةُ الْجَبِيْبِيَّةُ الْأَذِينِيَّةُ. عُقْدَةُ وَدِيَّةٌ فِي جِدَارِ الْقَلْبِ بِالْقَرَبِ مِنَ الْوَرِيدِ الْأَجُوفِ الْعُلْوِيِّ وَتَسْمَى أَيْضًا الْعُقْدَةُ الْجَبِيْبِيَّةُ الْأَذِينِيَّةُ. كَمَا تَوْجَدُ كَذَلِكَ عُقْدُ وَدِيَّةٌ فِي الْفَتْحَةِ الْحَبَابِيَّةِ لِلْوَرِيدِ الْأَجُوفِ السُّفْلِيِّ أَوْ فِي الضَّفِيرَةِ الْمَعْدِيَّةِ وَتَسْمَى بِهَذَا الْاسْمِ أَيْضًا.

- renal g. العُقْدَةُ الكُلَوِيَّةُ. عقدة ودية صغيرة توجد ضمن الضفيرة الكلوية.
- rostral g. of glossopharyngeal nerve عُقْدَةُ العَصَبِ اللِّسَانِيِّ البلعومي المنقارية. أعلى العقدتين الموجودتين على العصب اللساني البلعومي عند مروره خلال الثقبه الوداجية واللثان تصدران له أليافهما.
- rostral g. of vagus nerve عُقْدَةُ العَصَبِ المَبْهَمِ المنقارية. عقدة صغيرة على العصب المبهم عند الثقبه الوداجية والتي تعطي فرعاً سحائياً وآخر أنشياً كما تحوي خلايا عصبية تصدر أليافها للعصب المبهم.
- sacral ganglia العُقْدَةُ العَجْزِيَّةُ. عقد القسم العجزي من الجذع الودي وعادة ما تكون ثلاث أو أربع عقد على كل من الجهتين.
- Scarpa's g. (= vestibular g.) العُقْدَةُ الدِهْلِيْزِيَّةُ.
- Schacher's g. (= ciliary g.) العُقْدَةُ الهُدْبِيَّةُ.
- Schmiedel's g. (1. carotid g., 2. inferior carotid g.) 1. العُقْدَةُ السَّبَاتِيَّةُ. 2. العقدة السباتية السفلية.
- semilunar g. (= trigeminal g.) العُقْدَةُ الهَلَالِيَّةُ. عقدة ثلاثي التوائم.
- sensory ganglia (= craniospinal ganglia, = spinal ganglia) العُقْدَةُ الحَسِّيَّةُ. 1. العقد القحفية النخاعية 2. العقد النخاعية الشوكية.
- sinoatrial g. (= Remak's g.) العُقْدَةُ الجَنْبِيَّةُ الأذينية. عقدة ريماك.
- sinus g. العقدة الجَنْبِيَّةُ. مجموعة من الخلايا العصبية توجد حول منطقة اتصال الجيب الإكليلي والأذين القلبي الأيمن.
- sphenomaxillary g. (= pterygopalatine g.) العُقْدَةُ الوَتْدِيَّةُ الحَنْكِيَّةُ. العقدة الجناحية الحنكية.
- sphenopalatine g. (= pterygopatatine g.) العُقْدَةُ الوَتْدِيَّةُ الحَنْكِيَّةُ. العقدة الجناحية الحنكية.
- spinal ganglia العُقْدَةُ النُّخَاعِيَّةُ. العقد التي توجد على الجذور الخلفية للأعصاب النخاعية الشوكية والتي تتكون من خلايا عصبية أحادية الفرع.
- spiral g. (= cochlear g.) العُقْدَةُ الخَلَزَوِيَّةُ. العقدة القرقعية.
- splanchnic g. (= thoracic splanchnic g.) العُقْدَةُ الحَشَوِيَّةُ. العقدة الصدرية الحشوية.
- stellate g. (= cervicothoracic g.) العُقْدَةُ النُجْمِيَّةُ. العقدة الرقبية الصدرية.
- sublingual g. العُقْدَةُ تَحْتَ اللِّسَانِ. عقدة خلايا عصبية توجد أحياناً على الألياف العصبية المارة من العقدة تحت الفك السفلي إلى العصب اللساني.
- submandibular g. العُقْدَةُ تَحْتَ الفَكِّ. عقدة لا ودية توجد في أعلى القسم العميق من الغدة تحت الفك السفلية وعلى السطح الوحشي للعضلة تحت اللسانية. وتأتي أليافها قبل العقدية من العصب الوجهي خلال العصبين اللساني والحبلي الطبلي وتغذي أليافها بعد العقدية الغدتين تحت اللسانية وتحت الفك السفلية وتمر خلال العقد ألياف عصبية حسية وودية بعد العقدية.
- submaxillary g. (= submandibular g.) العُقْدَةُ تَحْتَ الفَكِّ.
- suprarenal g. العُقْدَةُ الكُظْرِيَّةُ. عقدة ودية صغيرة توجد ضمن الضفيرة الكظرية.
- sympathetic ganglia العُقْدُ الوُدِّيَّةُ. مجموعات من خلايا عصبية أدرينالينية الفعل في الجهاز العصبي الودي وهي مرتبة بشكل سلسلتين على جهتي النخاع الشوكي.
- sympathetic plexus ganglia (= ganglia of autonomic plexus) عُقْدُ الضَفِيرَةِ المُسْتَقْلَةِ.
- ganglia of sympathetic trunk عُقْدُ الجِذْعِ الوُدِّيِّ. مجموعات من أجسام خلايا عصبية توجد على طول الجذع الودي وتوجد منها حوالي 20-23 عقدة على كل جهة.
- terminal g. العُقْدَةُ الإِنْتِهَائِيَّةُ. مجموعة من الخلايا العصبية توجد على طول الأعصاب الانتهازية على الجهة الإنسية للصلة الشمية.
- thoracic ganglia العُقْدُ الصَّدْرِيَّةُ. العقد الموجودة في القسم الصدري من الجذع الودي وعادة هي 11-12 عقدة على كل جهة.

**العُقْدَةُ الصَّدْرِيَّةُ** thoracic g., splanchnic  
الحَشَوِيَّةُ. عقدة صغيرة توجد على العصب الحشوي  
الصدري الكبير بالقرب من الفقرة الصدرية الثانية  
عشرة.

**عُقْدَةُ ثَلَاثِي التَّوَانِمِ** trigeminal g.  
الجذر الحسي للعصب القحفي الخامس توجد في فلق  
في الأم الجافية (كهف ثلاثي التوائم) على السطح  
الامامي للجزء الصخري من العظم الصدغي وتعطي  
العصبين العيني والفكي العلوي وجزءاً من الفكي  
السفلي وهي تحوي خلايا معظم الألياف الحسية  
للعصب ثلاثي التوائم.

**العُقْدَةُ الطَّبَنِيَّةُ** tympanic g. of Valentin  
الْفَالْتِينِيَّةُ. عقدة على العصب السني العلوي.

**g. of vagal nerve, inferior (= caudal  
g. of vagus)**  
العُقْدَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغَائِظِ.  
العقدة الذنبية للعصب المبهم.

**g. of vagal nerve, superior (= rostral  
g. of vagus)**  
العُقْدَةُ الْعُلَوِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغَائِظِ.  
العقدة الرأسية للعصب المبهم.

**العُقْدَةُ** ventricular g. (= Bidder's g.)  
البُطْنِيَّةُ. عقدة بيدر.

**عُقْدَةُ قَعَارِيَّةُ** vertebral g.  
عقدة صغيرة توجد دائماً تقريباً بين العقدتين الوديتين الوسطية والسفلية  
وإلى الامام من الشريان الفقري وتشارك في عروة  
تحت الترقوة وترسل أليافاً إلى العصب الفقري وإلى  
الضفيرة العضدية.

**العُقْدَةُ الدِّهْلِيْزِيَّةُ** vestibular g.  
العقدة الحسية الموجودة في القسم العلوي من النهاية الجانبية  
للصماخ السمعي الباطن وتعطي خلاياها العصبية  
ثنائية الأقطاب أليافاً للعصب الدهليزي.

**visceral ganglia (= autonomic  
ganglia)**  
العُقَدُ الحَشَوِيَّةُ. العقد المستقلة.

**visceral plexus ganglia (= ganglia of  
autonomic plexuses)**  
عُقَدُ الضَّفَائِرِ الحَشَوِيَّةُ. عقد الضفائر المستقلة.

**عُقْدِيّ؛ ذُو عُقْدٍ** ganglionated  
مجهز بعقد.  
**إِسْتِنْتِصَالُ الْعُقْدَةِ** ganglionectomy  
إحدى العقد.

**عَصْبُونٌ عُقْدِيّ** ganglioneure  
خلية عصبية عقدية.

**وَرَمُ الْأَرْوَمَةِ** ganglioneuroblastoma  
العَصْبِيَّةُ الْعُقْدِيَّةُ. ورم مكون من خلايا عصبية  
عقدية وأرومات عصبية.

**ganglioneurofibroma (= ganglioneu-  
roma)**  
وَرَمٌ لِيَفِي عَصْبِيّ عُقْدِيّ.

**ganglioneuroma**  
وَرَمٌ عَصْبِيّ عُقْدِيّ. ورم حميد يتكون من ألياف وخلايا عصبية ناضجة  
ويعتبره الكثيرون ورماً أرومياً عصبياً مميزاً.

**عُقْدِيّ** ganglionic  
منسوب للعقدة.

**إِلْتِهَابُ الْعُقْدَةِ** ganglionitis  
التهاب إحدى العقد.

**acute posterior, g. (= herpeszoster)**  
إِلْتِهَابُ الْعُقْدَةِ الْخَلْفِيَّةِ الْحَادِ. الهربس النطاقي.

**gasserian g. (= herpeszoster  
ophthalmicus)**  
إِلْتِهَابُ الْعُقْدَةِ الْغَاسِرِيَّةِ.  
الهربس النطاقي العيني.

**شَالُ** ganglionoplegic (ganglioplegic)  
عُقْدِيّ.

**شَالُ عُقْدِيّ** ganglioplegic  
عامل يحصر انتقال الدفعات العصبية خلال العقد الودية  
واللاودية.

**إِسْتِنْتِصَالُ** gangliosympathectomy  
العُقْدَةِ الْوُدِيَّةِ. استئصال إحدى العقد الودية.

**مَوَاتٌ؛ غَنَرِيَّةُ** gangrene  
موت الأنسجة ويكون عادة بكتل كبيرة ويطرافق مع توقف التغذية  
الدموية الذي تتلوه عدوى جرثومية ثم التفسخ.

**فُقْدَانُ جِسِّ الدَّغْدَغَةِ** gargalanesthesia

**جِسُّ الدَّغْدَغَةِ** gargalesthesia

**gargoylism (= syndrome, Husler's,  
= mucopolysaccharidosis)**  
حَثَلٌ مُتَعَدِّدٌ؛ داء عديد السكريد المَخَاطِيّ.

**حَمَلَقَةٌ** gaze  
تثبيت النظر باتجاه واحد.

**مَقَاوِمَةُ التَّخْرِيكِ** gegenhalten  
المقاومة اللاإرادية للحركة المنفصلة كالتى تحصل في  
اضطرابات القشرة المخية.

**gelasmus** ضَحْكٌ هِسْتِيرِيٌّ. الضحك الهستيرى اللاإرادي.

**generalization, stimulus** تَغْمِيمُ الْمُنْبَه. الاستجابة الشرطية للمنبهات الشبيهة بالمنبه الشرطي.

**geniculum** رُكْبِيَّة. انثناء حاد في بنية أو عضو صغير كالعصب.

**- g. of facial nerve** رُكْبِيَّةُ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ. قسم العصب الوجهي في النهاية الجانبية للصماخ السمعي الباطن حيث تنتهي اليافه العصبية بصورة حادة باتجاه خلفي سفلي في موضع وجود العقدة الركبية.

**genophobia** رُهَابُ الْجِنْس. التخوف المرضي من الجنس.

**genu** رُكْبَة. 1. محل ارتفاق الفخذ بالساق 2. اصطلاح تشريحي يدل على أية بنية مثنية مثل الركبة.

**- g. of corpus callosum** رُكْبَةُ الْجِسْمِ الْفَقْنِيِّ. الانثناء البطنني الحاد في النهاية الامامية لجذع الجسم الفقني.

**- g. extrorsum (= g. varum)** رُكْبَة فَخْجَاء.

**- g. of facial canal (= geniculum of facial canal** رُكْبَة قَنَاةِ الْوَجْهِيِّ. ركبة قناة الوجهي التي تحوي ركبة العصب الوجهي.

**- g. of facial nerve** رُكْبَةُ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ. ثنية الالياف التي تنبع من النواة الوجهية والتي تكون الاكيمة الوجهية في قاع البطين الرابع حيث تدور الالياف حول نواة المبعد.

**- g. of internal capsule** رُكْبَةُ الْمُحْفَظَةِ. الزاوية المكونة من اتصال ذراعي المحفظة الداخلية والواقعة خلف النواة المذنبة وامام المهاد وعلى الجهة الوحشية للنواة العدسية.

**- g. introrsum (= g. valgum)** رُكْبَة رَوْحَاء.

**- g. recurvatum** رُكْبَة طَرْقَاء. فرط تمديد مفصل الركبة.

**- g. valgum** رُكْبَة رَوْحَاء. تشوه يتصف بتقارب الركبتين الشاذ مع زيادة المسافة بين الكاحلين.

**- g. varum** رُكْبَة فَخْجَاء. تشوه يتصف بابتعاد

الركبتين الشاذ عن بعضهما وانحناء الاطراف السفلية الشاذ للدخل ويمكن أن يكون هذا الانحناء في الفخذين أو الساقين.

**geophagia** أَكْلُ التُّرَاب. عادة أكل التراب أو الطين.

**geophagism, geophagy** أَكْلُ التُّرَاب. (= geophagia).

**geratic** شَيْخُوخِيٌّ. متعلق بالشيخوخة.

**gereology (geratology)** عِلْمُ الشَّيْخُوخَةِ. العلم الذي يُعنى بالشيخوخة وجوانبها.

**geriatric** (متعلق) بِطَبِّ الشُّيُوخ.

**geriatrics** طَبُّ الشُّيُوخ. فرع الطب الذي يعنى بمعالجة الشيوخ وأمراضهم وبمشاكل الشيخوخة لديهم.

**gerontology** عِلْمُ الشَّيْخُوخَةِ. العلم الذي يدرس مشاكل الشيخوخة والهرم من كل نواحيها السريرية والبيولوجية والاجتماعية والتاريخية.

**gerophilia** حُبُّ الشُّيُوخ. الحب الخاص للشيوخ.

**gerophobia** رُهَابُ الشُّيُوخ؛ رُهَابُ الشَّيْخُوخَةِ.

**gestalt** التَّكُونُ الْإِدْرَاكِيُّ؛ التَّكُونُ الْجِسْتَالْتِي. تشكيل إدراكي يضم المدارك وينسقها بطريقة تولد إدراكاً عاماً يزيد كثيراً عن مجموع مفردات هذه المدارك ويؤدي تجمعها هذا إلى تكاملها مما يولد إدراكاً كلياً عاماً متكاملًا (كُلَانِي).

**gestaltism** التَّكُونِيَّةُ الْإِدْرَاكِيَّةُ؛ الْجِسْتَالْتِيَّةُ. النظرية التي تنص في علم النفس بأن أعمال العقل التي توجّه الفعاليات تظهر ككل متكامل لا يمكن فصله إلى أجزاء متفرقة، ويسمى هذا بنظرية التكون الإدراكي.

**gesture** إِبْعَاءَةٌ. حركة الجسم التعبيرية كطريقة لنقل المشاعر أو الافكار ويتم أغلبها في الإنسان بواسطة اليدين والذراعين.

**gibbous** أَخْذَب. ذو حدة.

**gibbus** حَدْبَةٌ. انحناء الظهر بسبب انثناء العمود الفقري ويتسبب غالباً عن خراج في الفقرات أو في القرص بين الفقرات يؤدي إلى انهيار الفقرة للأمام مما يسبب انحناء الظهر.

**دُوَام؛ دُوَحَة.** giddiness (= dizziness)

**عَمَلَقَة.** فرط الضخامة الشاذ. gigantism

**عَمَلَقَة صَخَمَة النهايات.** عَمَلَقَة - acromegalic g. ضخامية تتصف أيضاً بضخامة العظام القصيرة والمسطحة وعظام النهايات القصوية كما هو في ضخامة النهايات.

**عَمَلَقَة مُخَيَّة.** عَمَلَقَة لا تتولد عن - cerebral g. زيادة مستوى هرمون النمو بل يولدها مرض دماغي ويكون فيها الولدان ضخاماً في أحجامهم وينمون بسرعة كبيرة خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الأولى من أعمارهم ثم يعود نموهم ليصبح سوياً وتكون اليدين والقدمان كبيراً أما الرأس فيكون كبيراً وطويلاً وتميل العينان ميلاناً مضاداً للمنفولية وتكونان متباعدين كما يكون الطفل أخرقاً ومتخلفاً عقلياً.

**عَمَلَقَة سَوِيَّة.** عَمَلَقَة تكون فيها نسب - normal g. أحجام الأعضاء والأجزاء سوية ومتناسقة مع سواء التطور الجنسي.

**pituitary g. (= syndrome, Launois)** عَمَلَقَة نُخَامِيَّة.

**غُدَّة.** مجموعة خلايا متخصصة في gland توليد مادة إفرازية أو إبرازية لا علاقة لها باحتياجاتها الاستقلابية الخاصة بها.

**الغُدَّة الصُّم.** غدد عديمة القناة - endocrine g's. تفرز مواد معينة خاصة تسمى الهرمونات التي تحرر مباشرة إلى جهاز الدوران وتؤثر على استقلاب الجسم وبعض وظائفه الأخرى.

**غُدَّة خَارِجِيَّةُ الإفراز.** غدد ذات - exocrine g's. أقتنية وتحرر إفرازاتها خلال الاقتنية التي تفتح على سطح الجسم الخارجي أو الداخلي.

**الغُدَّة النُخَامِيَّة.** غدة توجد في قاع - pituitary g. الدماغ في السرج التركي وتتصل بالوطاء بواسطة سويقة أو قمع الوطاء وتستلم منه الياقاً عصبية وأوعية دموية مهمة. وتتكون الغدة من قسمين رئيسين. النخامية الغدية والنخامية العصبية. وتفرز هذه الغدة العديد من الهرمونات التي تؤثر على بعض وظائف الجسم بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق تأثيرها على الغدد الصماء الأخرى فيه.

**غُدَّة الكُظُر.** - suprarenal g. (= adrenal g.)

غدة توجد في النسيج خلف الصفاق وفوق الكلية مباشرة وهي غدة مزدوجة توجد واحدة منها فوق كل كلية وتتكون من قسمين قشرة الكظر ولب الكظر وهما تحت سيطرة الغدة النخامية. ويفرز لب الكظر الأدرينالين والنورأدرينالين.

**غُدَّة.** (ج: غُدَد). glandula (= gland)

**دَبْقُ عَصَبِي.** glia (= neuroglia)

**دَبْقُ عَصَبِي أَمِيْبَانِي.** دبق عصبي - ameoboid g. متنكس أميبي الشكل غني بجبلة شاحبة اللون فيها بعض النواتئ والنوى غامقة اللون.

**دَبْقُ عَصَبِي هَيُولِي.** خلية دبق - cytoplasmic g. عصبي ضخمة وغنية بالهيولي، وفيها بعض الليفيات والفجوات وتشاهد في حالة تنكس النخاع الشوكي.

**دَبْقُ عَصَبِي فَنَانِي.** نوع من الدبق - g. of Fananas العصبي الذي يوجد في الطبقة الجزيئية من قشرة المخ.

**دَبْقُ عَصَبِي لَيْفِي.** دبق عصبي - fibrillary g. متنكس يحوي الكثير من الليفيات.

**خَلِيَّةُ دَبْقِيَّة عَصَبِيَّة.** خلية الدبق - gliocyte العصبي.

**أَرُومَة.** glioblast (= spongioblast) أرومة الإسفنجية.

**وَرَمٌ أَرُومِي دَبْقِي.** مصطلح - glioblastoma عام للأنواع الخبيثة من ورم النجميات.

**وَرَمٌ أَرُومِي دَبْقِي مُتَعَدِّد.** - g. multiforme لأشكال. أنواع خبيثة من ورم النجميات عادة ما تصيب نصفي كرة المخ وتتكون من خليط من خلايا الأرومة الإسفنجية والأرومة النجمية والأرومة الدبقية.


**خَلِيَّةُ دَبْقِيَّة عَصَبِيَّة.** gliocyte (= gliocyte)

**وَرَمٌ دَبْقِي.** gliocytoma (= glioma)

**وَرَمٌ دَبْقِي.** ورم مكون من نسيج - glioma دبق عَصَبِي في الجهاز العصبي المركزي ويطلق أحياناً على كل أنواع الأورام الدبقية.

**وَرَمٌ دَبْقِي.** - astrocytic g. (= astrocytoma) نَجْمِي الخَلايا.


**وَرَمٌ دَبْقِي نَمَائِي بَاطِنِي.** ورم - g. endophytum في الشبكية الذي يبدأ من طبقاتها الباطنة ثم ينتشر إلى مركز العقلة.



#### gland, pituitary


أقسام الغدة النخامية وبعض اتصالاتها وعلاقاتها: (1) الجسم الحلمي (2) البارزة الإنسية (3) الجذع القمعي (4) السويقة العصبية (5) الناتئ القمعي (6) النخامى العصبية (7) الفص الخلفي (8) الفص الأمامي (9) نسيج ضام (تربيق) (10) الجزء القاصي (11) الجزء المتوسط (12) الجزء الحديبي (13) النخامى الغدية (14) السويقة النخامية (15) قسم من التصالبة البصرية (16) السبيل الفوق البصري النخامي (17) السبيل الحديبي النخامي (18) للسبيل الوطائي النخامي.






gland, pituitary

تشريح الغدة النخامية وعلاقتها: (1) الغدة الصنوبرية (2) المهاد (3) الضفيرة المشيمية للبطين الثالث (4) القبو (5) الدقبة بين البطينين (6) الجسم الدفني (7) التلم الوطاني (8) الصوار الأمامي (9) الصليحة الانتهائية (10) الحنية الرمامية (11) الجسم الحلبي (12) صهريج التصالبة (13) التصالب البصري (14) حجاب السرج (15) الغدة النخامية (16) الجيب الوتدي (17) حاجز الأنف (18) الصهريج بين السويقتين (19) البلعوم الأنفي (20) صهريج الجسر.




gland pituitary

الغدة النخامية وعلاقتها في السطح السفلي للدماغ: (1) العصبان البصريان (2) الذروة الصدىية للدماغ (3) التصلية البصرية (4) السبيل البصري الأيمن (5) الغدة النخامية (6) العصب المحرك للعين (7) الحنية الرمادية (8) الجسمان الحليميان (9) العصب البكري (10) العصب ثلاثي التوائم (11) العصب المبعد (12) الجسر.



ب



ا

glla

صورتان للخلايا الدبقية في الدماغ (ا) ارتكاز نهاياتها على وعاء في المخ، (ب) خلايا دبقية نجمية في الطبقة الحبيبية في المخ.

- **ependymal g.** ورم دُبَقِيّ بَطْنَانِيّ عَصَبِيّ. ورم ضخّم وصلب ووعائي يصيب البطين الرابع.
- **g. exophytum** ورم دُبَقِيّ بَمَانِيّ ظَاهِرِيّ. ورم دُبَقِيّ يتولد في الشبكية ويبدأ من طبقاتها الظاهرة ثم ينتشر بعيداً عن مركز العقلة.
- **ganglionic g.** ورم دُبَقِيّ عُقْدِيّ. ورم عصبي يحوي خلايا عقدية ناضجة.
- **mixed g.** ورم دُبَقِيّ مُخْتَلَط. ورم يحوي خلايا من أنواع دبقية متعددة وفيه جزر من الدبقيات قليلة التفرغ ومن الدبقيات النجمية.
- **nasal g.** ورم دُبَقِيّ أَنْفِيّ. كتلة شبيهة بالورم تتكون من نسيج عصبي متبذ تتولد في تجويف الأنف.
- **optic g.** ورم دُبَقِيّ بَصَرِيّ. ورم العصب البصري أو التصلب البصري وهو بطيء النمو ويؤدي إلى فقدان البصر مع جحوظ العين وفقدان حركتها.
- **peripheral g. (= schwannoma)** ورم دُبَقِيّ محيطي؛ ورم شفاني.
- **g. retinae (= retinoblastoma)** ورم أَرُومَة الشبكيّة.
- **g. sarcomatosum (= gliosarcoma)** ساركومة دُبَقِيّة.
- **telangiectatic g.** ورم دُبَقِيّ مُتَوَسِّع الشعيرات. ورم دُبَقِيّ يحوي الكثير من الاوعية الدموية وخاصة الشعيرات.
- gliomatosis** تَكَثُّرُ الدَّبِق. كثرة تنامي الدبق العصبي خصوصاً في النخاع الشوكي في بعض حالات تكهف النخاع.
- glioneuroma** ورم دُبَقِيّ عَصَبِيّ. ورم دُبَقِيّ يحوي خلايا دبقية عصبية وخلايا دبقية أخرى.
- gliophagia** بَلْعَمَةُ الدَّبِق. بلعمة الخلايا الدبقية.
- gliosarcoma** ساركومة دبقية. ورم دُبَقِيّ خلوي مغزلي.
- gliosis** دُبَاق. كثرة الدبقيات النجمية في المناطق المصابة من الجهاز العصبي المركزي.
- **basilar g.** دُبَاق قَاعِيّ. دباق يصيب جذع الدماغ والمهاد والجسم المخطط.

- **cerebellar g.** دُبَاق مُخَيَخِيّ. دباق يصيب المخيخ.
- **diffuse g.** دُبَاق مُنْتَشِر. دباق يصيب كل أنسجة الدماغ وينتشر خلالها.
- **hemispheric g.** دُبَاق نَصْف كُرَوِيّ. دباق يصيب أحد نصفي كرة المخ فقط.
- **hypertrophic modular g.** دُبَاق ضَخَامِيّ عُقْدِيّ. دباق يتصف بتضخم الدماغ بشكل متناظر بسبب فرط تنسج دبقه العصبي.
- **isomorphic g.** دُبَاق إِسْوِيّ الشَّكْلِ. دباق يتصف بترتيب منتظم ومتوازٍ للألياف الدبقية.
- **lobar g.** دُبَاق قَصَبيّ. دباق يصيب أحد فصوص الدماغ.
- **perivascular g.** دُبَاق حَوْلِ الأَوْعِيّة. نوع من تصلب شرايين الدماغ يتصف بزيادة الدبق حول الأوعية.
- **spinal g.** دُبَاق نَخَاعِيّ. دباق النخاع الشوكي.
- **unilateral g. (= hemispheric g.)** دُبَاق وَحِيدُ الجَانِب. دُبَاق رَحْمِيّ. تكثر الأنسجة الدبقية العصبية في بطانة الرحم أو بطانة عنق الرحم.
- gliosome** جُسيم دُبَقِيّ. إحدى الذريرات الهيولية الصغيرة التي تشاهد في الخلايا الدبقية العصبية.
- globus hystericus** لُفْعَة هِسْتِيرِيّة. الحس الشخصي المزعج بوجود كتلة في البلعوم.
- globus pallidus** الكُرَةُ الشَّاحِبَة. القسم الأصغر والإنسي من النواة العدسية للدماغ والمفصول عن قشرتها بالصفحة النخاعية الوحشية كما تنقسم الصفحة النخاعية الإنسية للكرة إلى قسمين وحشي وإنسي ويرتبط كلاهما بارتباطات عديدة مع المهاد والجسم المخطط والدماغ المتوسط.
- g. p. lateralis** الكُرَةُ الشَّاحِبَة الوَحْشِيّة. القسم الأكبر والحشي من الكرة الشاحبة والمفصول عن قشرتها بالصفحة النخاعية الوحشية وعن القسم الإنسي بالصفحة النخاعية الإنسية.
- **g. p. medialis** الكُرَةُ الشَّاحِبَة الإِنْسِيّة.

القسم الأصغر والإنسي من الكرة الشاحبة والمفصول عن قسمها الوحشي بالصفحة النخاعية الإنسية.

### glomerulus, nonencapsulated

**nerve** كُبَيْبَةُ عَصَبِيَّةٍ غَيْرُ مُخَفَّفَةٍ. نهاية عصبية توجد في الأنسجة الضامة للكثير من الأعضاء تكون فيها للفروع الانتهازية للليف العصبي بنية كروية أو بيضوية تشبه الكبيبة.

**glomerulus, olfactory** كُبَيْبَةُ شَمْعِيَّة. كتلة كروية صغيرة مكونة من لبد عصبي كثيف يحوي التشابك الأول في السبيل الشمي.

**glossalgia** أَلَمُ اللُّسَان. ألم في اللسان.

**glossodynia (= glossalgia)** أَلَمُ اللُّسَان.

**glossokinesesthesia** جِسُّ حَرَكَةِ اللُّسَان. الشعور والإدراك بحركة اللسان.

**glossoplegia** شَلْلُ اللُّسَان. شلل اللسان وعادة ما يكون بجهة واحدة بسبب إصابة العصب تحت اللسان ويؤدي إلى انحراف اللسان إلى جهة الإصابة عند إبرزاه.

**glossoptosis** تَدَلِّي اللُّسَان. تدلي اللسان إلى الخلف والأسفل.

**glossospasm** تَشَنُّجُ اللُّسَان. تشنج عضلات اللسان.

**glutethimide** غُلُوتِيثِيمِيد. دواء مسكن ومنوم يستعمل عن طريق الفم.

**glycine** غَلِيْسِين. حمض أميني يوجد في العديد من البروتينات ويظن بأنه ناقل كيميائي ومثبط عصبي في الجهاز العصبي المركزي.

**gnathalgia** أَلَمُ الْفَكِّ. ألم في الفك.

**gnathodynia (= gnathalgia)** أَلَمُ الْفَكِّ.

**gnosia** الإِذْرَاك؛ الْمَعْرِفَةُ. قابلية الشعور بالإحساسات ومعرفة نوعها.

**gnosis** الإِذْرَاكِيَّة؛ الْعَرَفَانِيَّة. قابلية الشعور بالإحساسات وعواملها المرافقة لها والتعرف على أنواعها ومعانيها، وهي من وظائف القشرة المخية.

**gonalgia** أَلَمُ الرُّكْبَةِ.

**gradient** مَدْرُوج؛ مُنَحَدَّر. سرعة زيادة أو نقصان أية فعالية متغيرة.

**concentration g.** مَدْرُوجُ التَّرْكِيز. تباين تركيز بعض الشوارد على جهتي غشاء الخلية أو الليف العصبي مما يؤدي إلى انتقالها من الجهة الأكثر تركيزاً إلى الجهة الأخرى.

**electrical g.** مَدْرُوجُ كَهْرَبَائِي. تباين الشحنات الكهربائية لبعض الشوارد التي توجد على جهتي غشاء الخلية أو العصب مما يؤدي إلى اندفاعها عبر الغشاء من جهة لأخرى.

**graft** 1. طُعْم. 2. غَرْس. 1. أي نسيج أو عضو يستعمل للغرس أو الاغتراس 2. غرس، أو قام بعملية الغرس.

**nerve g.** طُعْمٌ عَصَبِي. إبدال جزء من عصب تآلف بآخر سليم.

**grafting** زَرْعُ الطُعْم. القيام بعملية الغرس.

**grandiose** مَهْوُوسُ الْعَظْمَةِ. شخص يبالغ بالاعتقاد بأهميته وعظمته وبالتوهم غالباً بثراته وقوته وشهرته وعظمته.

**grandiosity** هَوْسُ الْعَظْمَةِ. حالة الإصابة بالتوهم بالعظمة.

**grand mal** الصَّرَعُ الْكَبِير. انظر epilepsy.

**granulation** 1. تَحْبُّبٌ 2. كُبَيْبَةٌ. 1. عملية تكوين النسيج الحبيبي أو الحبيبات الهيولية 2. مادة حبيبية على سطح النسيج أو العضو أو في الهيولى.

**arachnoidal g's.** حُبَيْبَاتُ الْعَنْكَبُوتِيَّة. ارتفاعات صغيرة على سطح العنكبوتية تشاهد بالعين المجردة يعتقد البعض بأنها ضخامات الزغابات العنكبوتية التي تبرز في الجيب السهمي العلوي والاوردة المتصلة به وتكون هذه الزغابات البنيات التي يعود عن طريقها امتصاص السائل الدماغي النخاعي إلى الاوردة.

**cerebral g's. (= arachnoidal g.)** حُبَيْبَاتُ الْعَنْكَبُوتِيَّة.

**pacchionian g's. (= arachnoidal g.)** حُبَيْبَاتُ الْعَنْكَبُوتِيَّة.

**Virchow's g's.** حُبَيْبَاتُ فِيرشَاو. حبيبات تحوي اليافاً دقيقة وبطانية عصبية توجد في جدران البطينات المخية في داء الشلل العام.

**graphesthesia** جسُّ الكِتَابَةِ عَلَى الْجِلْدِ؛  
حَسُّ الْأَخَاطِيطِ. التَّحَسُّسُ بِالْكِتَابَةِ وَالْأَرْقَامِ الَّتِي  
تَكْتُبُ عَلَى سَطْحِ الْجِلْدِ وَمَعْرِفَتَهَا وَإِدْرَاكَهَا.

**graphoanalysis** تَحْلِيلُ الشَّخْصِيَّةِ مِنْ  
الْكِتَابَةِ. تَحْلِيلُ شَخْصِيَّةِ الْمَرْءِ وَأَخْلَاقِهِ وَقَابَلِيَّاتِهِ  
بِدْرَاسَةِ خَطِّهِ وَأَسْلُوبِ كِتَابَتِهِ.

**graphocatharsis** هَرْوَرُ كِتَابِيٍّ؛ التَّرْوِيجُ  
بِالْكِتَابَةِ. إِطْلَاقُ الْفِكَارِ وَالْمَشَاعِرِ الْمَكْبُوتَةِ لَا  
شُعُورِيًّا عِنْدَ إِغْرَاءِ الْمَرِيضِ عَلَى كِتَابَةِ أَفْكَارِهِ  
بِطَرِيقَةٍ تُولِّدُ لَدَيْهِ رَاحَةً نَفْسِيَّةً كَبِيرَةً.

**graphokinesesthesia** جسُّ حَرَكَاتِ الْكِتَابَةِ.  
حَسُّ حَرَكَاتِ الْكِتَابَةِ وَإِدْرَاكَهَا.

**graphomania** هَوَسُ الْكِتَابَةِ. الرِّغْبَةُ الْمَلْحَةُ  
فِي الْكِتَابَةِ دُونَ أَيِّ اعْتِبَارٍ لِمَحْتَوَاهَا.

**graphophobia** رُهَابُ الْكِتَابَةِ. التَّخَوُّفُ  
الْمَرَضِيُّ مِنَ الْكِتَابَةِ خُصُوصًا فِي حَالَاتِ الْقَلْقِ  
الشَّدِيدِ كَالطَّلَبِ مِنَ الْمَرِيضِ كِتَابَةَ اسْمِهِ أَوْ تَوْقِيعِهِ.

**graphorrhea** ثَرٌّ كِتَابِيٍّ. كِتَابَةُ الْمَرِيضِ  
لِصَفَحَاتٍ عَدِيدَةٍ بِكَلَامٍ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا أَيْةَ تَرَابُطٍ  
وَيَسْتَمِرُّ فِيهِ لِمَجْرَدِ الْكِتَابَةِ.

**graphospasm (= cramp, writer's)**  
تَشَنُّجُ الْكُتَّابِ. مَعْصُ الْكَاتِبِ.

**gray, central** السَّنْجَابِيَّةُ الْمَرْكَزِيَّةُ. الْمَادَّةُ  
السَّنْجَابِيَّةُ غَيْرُ الْمَتَمِيزَةِ الَّتِي تَحَافِظُ عَلَى مَوْقِعِهَا  
الْبَدَائِيَّ حَوْلَ الْبُطِينَاتِ وَالْقَنَاةِ الْمَرْكَزِيَّةِ.

**groove** أُخْدُودٌ؛ مِيزَابَةٌ؛ تَلَمٌّ. انْخِفَاضُ ضَحْلٍ  
وَطَوْلَانِيٍّ خُصُوصًا ذَلِكَ الَّذِي يَظْهَرُ أَثْنَاءَ التَّطَوُّرِ  
الْجَنِينِيِّ وَالَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي بَعْضِ الْعِظَامِ  
أَوْ الْأَسْنَانِ.

- anterolateral g. of medulla oblongata  
(= anterior ventrolateral sulcus of  
medulla oblongata) الْأُخْدُودُ الْأَمَامِيُّ  
الْوُخْشِيُّ لِلْبَصْلَةِ.

- anterolateral g. of spinal cord  
(= anterior ventrolateral sulcus of  
spinal cord) الْأُخْدُودُ الْأَمَامِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلنُّخَاعِ.

- basilar g. (= basilar pontine sulcus)  
التَلَمُّ الْقَاعِيُّ لِلْجَبْرِ.

- neural g. (= medullary g.) الْأُخْدُودُ الْعَصَبِيُّ.  
الْأُخْدُودُ الَّذِي يَتَوَلَّدُ عَنْ انْفِلَاقِ الصَّفِيحَةِ الْعَصَبِيَّةِ فِي  
الْجَنِينِ أَثْنَاءَ تَكْوِينِ الْأَنْبُوبِ الْعَصَبِيِّ فِيهِ.

- trigeminal g. أُخْدُودُ ثَلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ. الْأُخْدُودُ  
الْجَنِينِيُّ الَّذِي يَتَطَوَّرُ لِيَكُونَ عَقْدَةً ثَلَاثِيَّ التَّوَاتِمِ.

**guanidine hydrochloride** هَيْدُرُوكْلُورِيدُ  
الْغُوَانِيدِينِ. مَرْكَبٌ يَسْتَعْمَلُ فِي عِلَاجِ الْوَهَنِ  
الْعَضَلِيِّ الْوَبِيلِ.

**gustation** الذُّوقُ. حَسُّ الذُّوقِ أَوْ عَمَلِيَّةُ  
التَّذَوُّقِ.

**gustatism** ذُوقٌ مُحَرَّضٌ. حَسُّ الذُّوقِ الَّذِي  
يَتَوَلَّدُ بِصُورَةٍ غَيْرِ مُبَاشِرَةٍ بِمُنْبَهَاتٍ لَا ذُوقِيَّةٍ.

**gustatory** ذُوقِيٌّ. مَنْسُوبٌ أَوْ مُتَعَلِّقٌ  
بِحَسِّ الذُّوقِ.

1. خُنُوْتُهُ **gynandria (= gynandris)**  
2. أَنْثَى خُنُوْتِيَّةٌ كَاذِبَةٌ.

1. خُنُوْتُهُ 2. أَنْثَى خُنُوْتِيَّةٌ  
كَاذِبَةٌ 3. حَالَةٌ تَرَاجُلِ الْمَرْأَةِ.

**gynecomania (satyriasis)** شَبَقٌ.

**gynephilia (= satyriasis)** شَبَقٌ.

**gynephobia** رُهَابُ الْبِنَاءِ. التَّخَوُّفُ الْمَرَضِيُّ  
وَالْإِبْتِعَادُ عَنِ النِّسَاءِ.

**gyrectomy** قَطْعُ التَّلْفِيفِ. قَطْعُ أَوْ اسْتِنْصَالِ  
أَحَدِ تَلَاوِيفِ الْمَخِ أَوْ جُزْءٍ مِنَ الْقَشْرَةِ الْمَخِيَّةِ.

- frontal g. قَطْعُ التَّلْفِيفِ الْجَبْهِيِّ. قَطْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ  
مِنَ الْقَشْرَةِ الْجَبْهِيَّةِ فِي عِلَاجِ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ.

**gyri** تَلَاوِيفٌ. جَمْعُ تَلْفِيفٍ.

**gyrospasm** تَشَنُّجٌ دَوْرَانِيٌّ. تَشَنُّجُ الرَّأْسِ  
الدَّوْرَانِيِّ.

**gyrus** تَلْفِيفٌ. (ج: تَلَاوِيفٌ). أَحَدُ الِارْتِفَاعَاتِ  
الْمَتَعَرِّجَةِ مِنْ سَطْحِ الدِّمَاغِ وَالْمَوْلَدَةِ عَنْ انْطَوَاءِ  
الْقَشْرَةِ إِلَى دَاخِلِهِ.

- angular g. التَّلْفِيفُ الزَّائِيٌّ. تَلْفِيفٌ فِي الْفَصِصِ  
الْجِدَارِيِّ السُّفْلِيِّ الَّذِي يَتَقَوَّسُ فَوْقَ النِّهَايَةِ الْخَلْفِيَّةِ

- للتلم الصدغي الخلفي والمتصل بالتلفيف الصدغي الوسطي.
- **annectant gyri (= transitive gyri)** تَلَفِيفٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ؛ تَلَفِيفٌ عَابِرَةٌ.
- **gyri brevis insulae (= short gyri of insula)** التَّلَافِيفُ الْقَصِيرَةُ لِلْجَزِيرَةِ. التَّلَافِيفُ الْقَصِيرَةُ الْمُتَوَضِّعَةُ فِي الْجِهَةِ الرَّاسِيَةِ مِنَ الْجَزِيرَةِ.
- **Broca's g. (= Broca's convolution)** تَلَفِيفُ بَرْوَكَا.
- **callosal g. (= cingulate g.)** التَّلَفِيفُ الْجَزَامِيُّ؛ التَّلَفِيفُ الثَّقَنِي.
- **central g., anterior (= precentral g.)** التَّلَفِيفُ أَمَامَ الْمَرْكَزِيِّ؛ التَّلَفِيفُ الْمَرْكَزِيُّ الْأَمَامِي.
- **central g., posterior (= postcentral g.)** التَّلَفِيفُ خَلْفَ الْمَرْكَزِيِّ؛ التَّلَفِيفُ الْمَرْكَزِيُّ الْخَلْفِي.
- **cerebellar g. (= folia cerebelli)** تَلَفِيفُ مُخِيخِي. الْوَرَقَاتُ الْمُخِيخِيَّةُ.
- **cerebral gyri** تَلَافِيفُ الْمُخِّ. الْارْتِفَاعَاتُ الْمَتَعَرِّجَةُ عَلَى سَطْحِ الْمُخِّ وَالْمَوْلَدَةُ عَنْ طَيَاتِ قَشْرَتِهِ وَالْمَفْصُولَةُ عَنْ بَعْضِهَا بِالْأَتْلَامِ الْمُخِيَّةِ وَالْكَثِيرِ مِنْهَا ثَابِتَةٌ وَأَعْطِيَتْ أَسْمَاءَ خَاصَةً بِهَا.
- **cingulate g.** التَّلَفِيفُ الْجَزَامِيُّ. تَلَفِيفٌ مَقْوَسٌ مُرْتَبِطٌ بِسَطْحِ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ وَمَفْصُولٌ عَنْهُ بِالتَّلَمِ الثَّقَنِيِّ.
- **dentate g.** التَّلَفِيفُ الْمُسَنَّ. شَرِيطٌ مُسَنَّ مِنْ الْمَادَّةِ السَّنَجَابِيَّةِ تَحْتَ الْحَافَةِ الْإِنْسِيَّةِ لِلْحَصِينِ وَفِي أَعْمَاقِهِ. وَهُوَ قَشْرَةٌ بِدَائِيَّةٌ تَطَوَّرَتْ بِجَانِبِ الشَّقِّ الْحَصِينِيِّ وَيَتَكُونُ مِنْ طَبَقَاتٍ جَزِيئِيَّةٍ وَحَبِيبِيَّةٍ مُتَعَدِّدَةِ الْأَشْكَالِ.
- **fasciolar g.** التَّلَفِيفُ الشَّرِيطِي. أَمْتَادٌ خَلْفِيٌّ وَعُلَوِيٌّ لِلتَّلَفِيفِ الْمُسَنَّ الَّذِي يَكُونُ مَنطَقَةً انْتِقَالِيَّةً بَيْنَ التَّلَفِيفِ الْمُسَنَّ وَالسَّرِّ السَّنَجَابِيِّ.
- **fornicate g.** التَّلَفِيفُ الْمُقْوَسُ. الْجُزْءُ الْهَامِشِيُّ مِنَ الْقَشْرَةِ الْمُخِيَّةِ عَلَى الْجَانِبِ الْإِنْسِيِّ مِنْ نِصْفِ كُرَةِ الْمُخِّ وَالَّذِي يَشْمَلُ التَّلَفِيفَ الْحَزَامِيَّ وَالتَّلَفِيفَ الْمَجَاوِرَ لِلْحَصِينِ وَالْبَرْزُخَ وَالْمَعْقِفَ وَهُوَ يَكُونُ الْجُزْءَ الرَّئِيسِيَّ لِلْجِهَازِ الْحَوْفِيِّ.
- **frontal g., ascending (= precentral g.)** التَّلَفِيفُ الْجَبْهِيُّ الصَّاعِدُ؛ التَّلَفِيفُ أَمَامَ الْمَرْكَزِيِّ.
- **frontal g., inferior** التَّلَفِيفُ الْجَبْهِيُّ السُّفْلِي. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ أَسْفَلَ التَّلَمِ الْجَبْهِيِّ السُّفْلِيِّ وَيَقْسِمُهُ الْفُرْعَانُ الْأَمَامِيَّ وَالصَّاعِدَ مِنَ التَّلَمِ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْأَقْسَامِ الْحَاجَبِيَّةِ وَالْمَثَلَّةِ وَالْوَصَادِيَّةِ.
- **frontal g., medial** التَّلَفِيفُ الْجَبْهِيُّ الْإِنْسِي. السَّطْحُ الْإِنْسِيُّ لِلْفَصِّ الْجَبْهِيِّ الْمَفْصُولِ عَنِ التَّلَفِيفِ الْحَزَامِيِّ بِالتَّلَمِ الْحَزَامِيِّ وَالْمَتَّصِلِ بِالتَّلَفِيفِ الْجَبْهِيِّ الْعُلَوِيِّ مِنَ الْأَعْلَى وَالتَّلَفِيفِ الْمُسْتَقِيمِ مِنَ الْأَسْفَلِ.
- **frontal g., middle** التَّلَفِيفُ الْجَبْهِيُّ الْوَسْطِي. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ بَيْنَ التَّلَمَيْنِ الْجَبْهِيَيْنِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْأَمَامِ مِنَ التَّلَفِيفِ أَمَامَ الْمَرْكَزِيِّ.
- **frontal g. superior** التَّلَفِيفُ الْجَبْهِيُّ الْعُلَوِي. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ فَوْقَ التَّلَمِ الْجَبْهِيِّ الْعُلَوِيِّ وَيَمْتَدُّ إِلَى الْأَمَامِ مِنَ التَّلَفِيفِ أَمَامَ الْمَرْكَزِيِّ.
- **fusiform g.** التَّلَفِيفُ الْمُغَزَلِي. تَلَفِيفٌ فِي الْفَصِّ الصَّدْغِيِّ وَعَلَى السَّطْحِ السُّفْلِيِّ مِنْ نِصْفِ كُرَةِ الْمُخِّ بَيْنَ التَّلَفِيفِ الصَّدْغِيِّ السُّفْلِيِّ وَالتَّلَفِيفِ الْمَجَاوِرِ لِلْحَصِينِ.
- **geniculate g.** التَّلَفِيفُ الرُّكْبِيُّ. تَلَفِيفٌ آثَارِيٌّ يَوْجَدُ إِلَى الْأَمَامِ مِنَ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.
- **Heschl's gyri (= transverse temporal gyri)** التَّلَافِيفُ الصَّدْغِيَّةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ.
- **hippocampal g. (= parahippocampal g.)** التَّلَفِيفُ الْحَصِينِي؛ التَّلَفِيفُ الْمَجَاوِرُ لِلْحَصِينِ.
- **Infracalcarine g. (= lingual g.)** التَّلَفِيفُ تَحْتَ الْمَهْمَازِيِّ؛ التَّلَفِيفُ اللِّسَانِي.
- **Insular gyri** تَلَافِيفُ الْجَزِيرَةِ. التَّلَافِيفُ الَّتِي تَوْجَدُ عَلَى سَطْحِ الْجَزِيرَةِ وَالَّتِي تَشْمَلُ تَلَفِيفَ الْجَزِيرَةِ الطَّوِيلِ وَتَلَافِيفَ الْجَزِيرَةِ الْقَصِيرَةِ.
- **Insular g., long** تَلَفِيفُ الْجَزِيرَةِ الطَّوِيلِ. التَّلَفِيفُ الطَّوِيلُ عَلَى سَطْحِ الْجَزِيرَةِ وَالْمَتَّجِهَ نَحْوَ النَاحِيَةِ الْقَذَالِيَّةِ.
- **insular gyri, short** تَلَافِيفُ الْجَزِيرَةِ الْقَصِيرَةِ. التَّلَافِيفُ الْقَصِيرَةُ الَّتِي تَوْجَدُ فِي الْجِهَةِ الرَّاسِيَةِ مِنَ الْجَزِيرَةِ.

- limbic g. (= fornicate g.) التَلْفِيفُ الحُوفِيّ. التلّيف المقوس.

- lingual g. التَلْفِيفُ اللِّسَانِيّ. تلّيف في الفص القذالي وعلى السطح السفلي لنصف كرة المخ ويكون الحافة السفلية للتلم المهمازي كما يكون بالاشتراك مع الإسفين القشرة البصلية.

- marginal g. (= medial frontal g.) التلّيف الهامشي؛ التَلْفِيفُ الجَبْهِيُّ الإنْسِيّ.

- occipital g., inferior التَلْفِيفُ القَذَالِيّ السُّفْلِيّ. تلّيف على الجهة الخارجية من الفص القذالي يفصله التلم القذالي الوحشي عن التلّيف القذالي العلوي.

- occipital g., superior التَلْفِيفُ القَذَالِيّ العُلْوِيّ. تلّيف على الجدار الخارجي للفص القذالي يفصله التلم القذالي الوحشي عن التلّيف القذالي السفلي.

- occipitotemporal g., lateral التَلْفِيفُ القَذَالِيّ الصُّدْغِيّ الوَحْشِيّ. الجزء الوحشي من التلّيف المغزلي على السطح السفلي من نصف كرة المخ ويفصله التلم القذالي عن القسم الإنسي ويتصل على جهته الوحشية بالتلّيف الصدغي السفلي.

- occipitotemporal g., middle التَلْفِيفُ القَذَالِيّ الصُّدْغِيّ الوَسْطِيّ. الجزء الإنسي من التلّيف المغزلي وعلى السطح السفلي من نصف كرة المخ ويفصله التلم الجانبي عن التلّيف المجاور للحصين.

- olfactory gyri, lateral & medial التَلْفِيفُ الشَّمِيّ الوَحْشِيّ والإنْسِيّ. طبقات المادة السنجابية التي تغطي السطور الشمية الوحشية والإنسية.

- orbital gyri التَلْفِيفُ الحَجَاجِيّ. التلّيف المتعرج وغير المنتظمة الموجودة بالجهة الوحشية من التلم الشمي على السطح الحجاجي للفص الجبهي.

- paracentral g. (= paracentral lobule) الفُصِيصُ المجاور للمَزَكْر.

- parahippocampal g. التَلْفِيفُ المجاور للحَصِين. تلّيف على السطح السفلي لنصف كرة المخ واحد على كل من الجهتين ويقع بين الحصين والاتلام الجانبية.

- paraterminal g. التَلْفِيفُ المجاور لِلْإِنْتِهَائِيّ. صفيحة رقيقة من مادة سنجابية تقع أمام ركبة الجسم الثفني وعلى جهته البطنية.

parietal g. التَلْفِيفُ الجِدَارِيّ. واحد من تلافيف الفص الجداري.

- parietal g., ascending (= postcentral g.) التَلْفِيفُ الجِدَارِيّ الصَّاعِدُ؛ التلّيف خلف المركزي.

- postcentral g. التَلْفِيفُ خَلْفَ المَرْكَزِيّ. تلّيف في الفص الجداري يقع بين التلمين المركزي وخلف المركزي وهو الباحة الحسية الأولية لقشرة الدماغ.

- precentral g. التَلْفِيفُ أَمَامَ المَرْكَزِيّ. تلّيف الفص الجبهي الذي يقع بين التلمين المركزي وأمام المركزي وهو الباحة الحركة الأولية لقشرة الدماغ.

- preinsular gyri (= short insular gyri) التلافيف أمام الجزيرة؛ التَلْفِيفُ القَصِيرَةُ لِلْجَزِيرَةِ.

- g. rectus التَلْفِيفُ المُسْتَقِيم. تلّيف على السطح الحجاجي للفص الجبهي على الجهة الوحشية من التلم الشمي ومتصل مع التلّيف الجبهي الإنسي على الوجه الإنسي للفص.

- subcallosal g. (= paraterminal g.) التَلْفِيفُ تَحْتَ الثَّفْنِيّ؛ التلّيف المجاور لِلْإِنْتِهَائِيّ.

- supracallosal g. (= indusium griseum) التَلْفِيفُ فَوْقَ الثَّفْنِيّ. السَتر السنجابي.

- supramarginal g. التَلْفِيفُ فَوْقَ الهَامِشِيّ. تلّيف الفص الجداري السفلي الذي يدور حول النهاية العلوية للفرع الخلفي من الشق الوحشي والمتصل في الخلف مع التلّيف الصدغي العلوي.

- temporal g. تَلْفِيفُ صُدْغِيّ. أي من تلافيف الفص الصدغي.

- temporal g., inferior التَلْفِيفُ الصُّدْغِيّ السُّفْلِيّ. تلّيف الفص الصدغي الذي يقع بين التلم الصدغي السفلي والتلّيف القذالي الصدغي الوحشي ويتصل هذان التلّيفان في الحافة السفلية الوحشية من الفص الصدغي ببعضهما.

- temporal g., middle التَلْفِيفُ الصُّدْغِيّ الوَسْطِيّ. تلّيف الفص الصدغي الذي يقع بين التلمين الصدغيين العلوي والسفلي والذي يتصل في الخلف مع التلّيف الزاوي.

- temporal g., superior التَلْفِيفُ الصُّدْغِيّ العُلْوِيّ. تلّيف الفص الصدغي الذي يقع بين التلمين

الصدغي العلوي والوحشي والذي يتصل في الخلف مع التلافيف فوق الهامشي.

**- temporal gyri transverse** التَلَاوِيفُ  
الْصُدُغِيَّةُ الْمُسْتَقْرِضَةُ. تلافيف الفص الصدغي التي تؤثر النهاية الخلفية للتلافيف الصدغي العلوي وغالباً ما تقع في التلم الوحشي وأوضح هذه التلافيف هو

التلافيف المستعرض الأمامي (تلافيف هيشل) والذي يمثل المركز القشري للسمع.

**- transitive cerebral gyri** تَلَاوِيفُ الْمَخْ عابرة. طيات صغيرة متعددة على سطح المخ، غير ثابتة، ولذلك لا تكتسب أسماء معينة خاصة بها.  
**- uncinat g. (= uncus)** تَلَاوِيفُ الْمَعْقَف. المعقف.



# H

**habenula** العنَّان. أحد مكونات المهيد وهو البارزة الصغيرة فوق البارزة الظهرية الإنسية للمهاد وتقع أمام الصوار الظهري مباشرة وعلى الحافة الوحشية لمثلث العنَّان.

**habit** عادة. عملية ثابتة يمارسها الشخص ويكثر من تكرارها.

**habitus** 1. وَضْعَة 2. بِنْيَة؛ خِلْقَة. 1. وضع الجسم 2. بنية الجسم ومظهره.

**hallucination** هَلُوسَة؛ هَلَس. إدراك حسي داخلي دون وجود أي منبه له في المحيط الخارجي، أو الحس بوجود شيء في البيئة الخارجية دون وجود أثر لها.

**- auditory h.** هَلُوسَة سَمْعِيَّة. هلس يمكن أن يكون لأصوات موسيقية أو لأصوات حديث يدور بين عدة أشخاص أو هلس فكري.

**- gustatory h.** هَلُوسَة ذَوْقِيَّة. حس تذوق بعض المواد مع عدم وجودها في الفم.

**- haptic h.** هَلُوسَة لَمْسِيَّة. إحساس بحس لمسي أو حس تنبيهات كهربائية لأقسام من الجسم.

**- hypnagogic h.** هَلُوسَة تَنَوِيْمِيَّة. هلس غالباً ما يكون سمعي قبيل البدء بالنوم مباشرة أو عند الاستيقاظ منه.

**- hypnopompic h.** هَلُوسَة إِسْتَيْقَاطِيَّة. هلس يحدث عند أول الاستيقاظ من النوم وقبل الصحو التام منه.

**- induced h.** هَلُوسَة مُحْدَثَة. هلس محرَّض من قبل شخص آخر مثل المنوم المغنطيسي.

**- kinesthetic h.** هَلُوسَة حِسِّيَّة حَرَكَية. هلس إحساس بحركة بعض أقسام الجسم.

**- lilliputian h.** هَلُوسَة تَصْغِيرِيَّة. هلس يحس المصاب به بأن الأجسام والأشياء الموجودة في محيطه تبدو أصغر من حجمها الحقيقي.

**- olfactory h.** هَلُوسَة شَمِيَّة. هلس شم روائح غير موجودة.

**- h. of perception** هَلُوسَة إدراكية. هلس صوتي يتصف بسماع أصوات من خارج الجسم.

**- psychomotor h.** هَلُوسَة نفسية حركية. هلس يتصور المصاب به انتقال أجزاء من جسمه من مواضعها إلى مواضع أخرى فيه.

**- reflex h.** هَلُوسَة إِنْعَكَاسِيَّة. الحس بإحساس خاص في قسم من الجسم يختلف عن طبيعة المنبه المولد له فيتولد مثلاً حس رؤية أشخاص مجتمعين حول الشخص عند حقنه بمادة ما داخل عضله.

**- sexual h.** هَلُوسَة جِنْسِيَّة. حس تهيج جنسي عند تنبيه قسم لا جنسي من أقسام الجسم كالقدم مثلاً.

**- somatic h.** هَلُوسَة جَسَدِيَّة. هلس يشمل إدراك حركة أو فعالية جسمية تحدث في قسم من أقسام الحس.

**- stump h. (= phantom limb)** هَلُوسَة الجَذْمُور؛ طَرَفٌ شَبَحِيّ.

**- tactile h.** هَلُوسَة لَمْسِيَّة. هلس يشمل حس اللمس.

**- visual h.** هَلُوسَة بَصَارِيَّة. هلس يشمل حس البصر.

**hallucinative, hallucinatory** هَلُوسِيّ؛ هَلَسِيّ. يتصف بالهلوسة.

**hallucinogen** هَلُوسِيّ. عامل يولد الهلوسة.

**hallucinosis** هَلُاس. حالة تتصف بوجود هلوسة من دون أي فقدان للوعي.

**- organic h.** هَلَسَ عُضْوِي. حالة وجود هلوسة ناتجة من مرض عضوي معين في الدماغ من دون حدوث أي هذيان، ومن أسباب ذلك الكحولية المزمنة واستعمال العقاقير المهلوسة وبؤر النويات الدماغية.

**haloperidol** هَالُوبِيرِيدُول. دواء يستعمل في علاج بعض أنواع الذهان والعزات.

**halothane** هَالُوثَان. مخدر استنشاقى قوي يستعمل لبدء التخنيج وإدامته.

**hand** يَد. (ج: أيدي). القسم الأسفل من الذراع العلوي أسفل الساعد.

**- ape h.** يَدٌ قُرْدِيَّة. يد يكون إبهامها مبسوطاً دائماً.

**- benediction h.** يَدُ التَّبَرُّك. يد يكون فيها الخنصر والبنصر منثنيين مع ضعف التقريب والتباعد في الوسطى والسبابة ولكن يمكن بسطهما بصورة طبيعية كما يبقى الإبهام سوياً ويشاهد ذلك في شلل العصب الزندي وفي تكهف النخاع.

**- claw h.** يَدٌ مَخْلَبِيَّة. انظر clawhand.

**- club h.** حَنَفُ اليَد. انظر clubhand.

**- dead h.** يَدٌ مَيِّتَة. اضطراب مهني يصيب العمال الذين يستعملون أدوات أو آلات هزازة مما يولد ارتجاج اليد المستمر مع المها وازرقاقها الغامق ولكنها تشحب عند تعرضها للبرد.

**- drop h. (=wristdrop)** تَدَلِّي الرُّسْغ. يظهر الرسغ متدلياً. وينتج ذلك عن

**- flat h. (=manus plana)** يَدٌ رَحَاء.

**- frozen h.** يَدٌ مُتَبَيِّسَة. تيبس اليد الذي بسبب وذمتها التي تنتج عن رضحها.

**- phantom h.** يَدٌ شَبَحِيَّة. حس مذلي يشعر به المريض المقطوع اليد ويحس كأنها لا زالت في موضعها.

**- preacher's h. (=benediction h.)** يَدُ الوُعَاظ.

**- skeleton h.** يَدٌ هَيْكَلِيَّة. يد مصابة بضمور شديد وتبقى بوضع البسط وتشاهد في الضمور العضلي المترقي.

**- trench h.** يَدُ الْخَنَاقِ. تقعع عضلات اليد وعجزها بسبب عضة الصقيع التي تحدث في الخنادق كما حدثت في خنادق الحرب العالمية الأولى.

**- writing h.** يَدُ الْكِتَابَةِ. يد تأخذ وضع الكتابة وتشاهد في الشلل الرعاشي.

**handedness** يَدَوِيَّة. حالة تفضيل استعمال إحدى اليدين للقيام بالحركات الإرادية.

**- left h.** أيسرية؛ أعسرية. تفضيل استعمال اليد اليسرى عند القيام بالحركات الإرادية.

**- right h.** أَيْفَنِيَّة. تفضيل استعمال اليد اليمنى عند القيام بالحركات الإرادية.

**handicap** تَعَوُّق. أي عيب جسدي أو عقلي أو خاصية خلقية أو مكتسبة تمنع المرء أو تحدّد قيامه بفعالياته وأعماله الطبيعية.



hand, drop

شلل العصب الكعبري حيث يتعثر على المريض بسط رسغه أو إصابعه أو إبهامه ويظهر الرسغ متدلياً. وينتج ذلك عن انضغاط أو قطع هذا العصب.

**haphalgesia** ألم لَمَسِي. حس الألم عند لمس أجسام غير مخدشة أو عند مجرد لمس الجلد.

**haphophobia** رُهابُ اللَّمْس. تخوف المريض من أن يلمسه أحد.

**haut-mal** grand mal. انظر الكَبِير.

**headache (= cephalalgia)** صداع. ألم في الرأس.

**- anemic h.** صداع فقر الدم. صداع يتولد عن فقر الدم العام أو الموضعي في الرأس.

**- bilious h.** صداع صفراوي. صداع يترافق مع أعراض معدية معوية وعادة ما يكون صداعاً شقيقياً.

**- blind h. (=migraine)** الشقيقة.

**- cluster h. (=migrainous neuralgia)** صداع عنقودي: ألم عصبي شقيق.

**- congestive h.** صداع احتقاني. صداع يتولد عن احتقان الرأس أو فرط تبيغه.

**- cough h.** صداع السعال. صداع وخزي يتولد عن السعال الذي يشد على الأنسجة الحساسة للآلم.

**- dynamite h.** صداع المتفجرات. الصداع الشديد الذي يصيب الأشخاص الذين يستعملون المتفجرات.

**- exertional h.** صداع الإرهاق. صداع يتلو الإرهاق المولد من كثرة الحركات الشديدة ولا يدوم طويلاً.

**- functional h.** صداع وظيفي. صداع يتولد عن التوتر العاطفي أو عن أي من الاضطرابات العاطفية الأخرى.

**- helmet h.** صداع خوذي. صداع يصيب النصف الأعلى من الرأس.

**- histamine h., Horton's h. (=migrainous-neuralgia)** ألم عصبي شقيق.

**- hyperemic h. (=congestive h.)** صداع احتقاني.

**- lumbar puncture h.** صداع البزل القطني. صداع يحدث عند انتصاب الجسم يزول عند الاستلقاء يتولد بعد البزل القضي بسبب هبوط الضغط داخل القحف لتسرب السائل الدماغي النخاعي عن طريق إبرة البزل.

**- migralne h. (=migraine)** الشقيقة.

**- miners' h.** صداع عمال المناجم. الصداع الذي يصيب العمال في المناجم بسبب الغازات المولدة عن انفجار التروغلسيرين فيها.

**- Monday morning h.** صداع صباح الإثنين. صداع يطلق على شكوى المتمارضين أو المصابين بالسكر المعلق.

**- organic h.** صداع عضوي. صداع يتولد عن آفة عضوية في داخل القحف.

**- postcoital h.** الصداع التالي للجماع: صداع الجماع. صداع يحدث أثناء الجماع أو بعده ويصيب الذكور في الغالب وقد يدوم لعدة ساعات.

**- postspinal h. (=lumbar puncture h.)** الصداع التالي للبزل.

**- puncture h. (=lumbar puncture h.)** الصداع التالي للبزل.

**- pyrexial h.** صداع الحمى. الصداع الذي يتولد عن الحمى.

**- reflex h.** صداع إنعكاسي. صداع يترافق مع مرض بعض الأعضاء كالمعدة أو العين.

**- rhinogenous h.** صداع أنفي المنشأ. صداع يتولد عن مرض في الأنف.

**- sick h. (=migraine)** صداع مرضي: الشقيقة.

**- spinal h. (=lumbar puncture h.)** الصداع التالي للبزل القطني.

**- symptomatic h. (=reflex h.)** صداع أعراضي: صداع إنعكاسي.

**- tension h.** صداع التوتر. صداع يتولد عن العمل المرهق الطويل أو الإجهاد العاطفي أو كليهما والذي يؤثر بصورة خاصة على المنطقة القذالية.

**- toxic h.** صداع تسممي. صداع يتولد عن التسمم العام في الجسم.

**- vacuum h.** صداع الفراغ. صداع يتولد عن انسداد مخرج الجيب الجبهي.

**- vasomotor h. (=migrainous neuralgia=cluster h.)** صداع وعائي حركي: ألم عصبي شقيق.

**hearing** سمع. حس إدراك الأصوات.

**- color h. (=chromesthesia)** سمع لوني.

جِسْ لُونِي. ارتباط بعض الإحساسات الوهمية لبعض الألوان مع الإحساسات السمعية أو الذوقية أو الشمية الحقيقية.

سمِعْ إبْصاري؛ قِرَاءَةُ - visual h. (lip reading) الشِّفَاه.

فَقْدَانُ السَّمْعِ؛ صَمَمٌ. فقدان السمع الجزئي أو الكلي. hearing loss

صَمَمٌ توْصيلي. - conductive h.l. (= conduction deafness)

صَمَمٌ توْصيلي؛ صَمَمٌ النَّاقِلِيَّة. - paradoxical h.l. (= paradoxical deafness)

فَنَدٌ؛ فَصَامٌ سَادَج. مرض عقلي hebephrenia (= hebephrenic schizophrenia) يتصف بتصرفات عاطفية بدائية كالضحك أو البكاء أو السلوك الشاذ.

ثُقْبُ القَوَقعة. ممر يصل سقالة الطبلية بسقالة الدمليز عند قمة القوقعة. helicotrema

أَلَمٌ شِقْيِي. ألم في جهة واحدة hemalgia من الجسم.

نَزَفٌ دِمَاعِي. نزف hematoencephalon في الدماغ أو حوالبه.

وَرَمٌ دَمَوِي. تجمع موضعي hematoma للدم وعادة ما يكون متخثراً في عضو أو حيز أو نسيج أو بنية بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية.

وَرَمٌ دَمَوِي فَوْقَ الجَافِيَّة. تجمع - epidural h. دموي متخثر في الحيز فوق الجافية بسبب تخريب الشريان السحائي الوسطي مما يولد ضغطاً على الجافية وعلى الدماغ نفسه وقد ينفث خلال الخيمة ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يزال مبكراً.

وَرَمٌ دَمَوِي ( = epidural h.) خارجَ الجَافِيَّة. - extradural h.

وَرَمٌ دَمَوِي دَاخِلَ الدِّمَاع. - intracerebral h. تجمع دموي داخل الدماغ قد يؤدي إلى الموت وذلك حسب حجمه وموقعه في الدماغ.

وَرَمٌ دَمَوِي دَاخِلَ القِحْف. - intracranial h. ورم دموي داخل أي منطقة في القحف.

وَرَمٌ دَمَوِي تَحْتَ الجَافِيَّة. ورم - subdural h. دموي في الحيز تحت الجافية يتكون في الحالات

الحادة الناتجة عن رضح الدماغ من مزيج من الدم والسائل الدماغي النخاعي فيؤدي إلى انضغاط الدماغ. أما في الحالات المزمنة فيكون الورم مكوناً من الدم فقط ويتولد عادة نتيجة انقطاع أحد الأوردة عند إصابات الرأس المغلقة ويتكون النزف تدريجياً فيؤدي بعد فترة إلى الصداع والذهول والشلل النصفي في الجهة المعاكسة يتبعه توسع الحدقة وهذه علامة من علامات الانفتاق في الخيمة.

تَدَمِّي النُّخَاع. نزف في داخل hematomyelia النخاع الشوكي وعادة ما يكون في مادته السنجابية وينتج غالباً عن رضح النخاع ويتصف بشلل رخو مع اضطرابات حسية واسعة.

التَّهَابُ النُّخَاعِ الدُّمِّي. hematomyelitis التهاب النخاع الشوكي مع انصباب دموي في داخله.

تَقَنِّي النُّخَاعِ النُّزْفِي. hematomyelopore مرض يتسبب بتوليد أقنية في داخل النخاع بسبب النزف المولد فيه.

رَهَابُ (= hemophobia) hematophobia الدَّم.

فَقْدَانُ الذَّوْقِ الشَّقْيِي. فقدان hemiageusia حس الذوق في أحد نصفي اللسان.

أَلَمٌ شَقْيِي. ألم في أحد نصفي hemialgia الجسم.

وَهْنٌ عَضَلِي شَقْيِي. وهن hemiamyosthenia عضلي في أحد نصفي الجسم.

صَمَمٌ أَحَادِي؛ صَمَمٌ شَقْيِي. hemianacusia صمم في إحدى الأذنين.


تَسْكِينٌ شَقْيِي. تسكين في hemianalgesia أحد نصفي الجسم.

لا دِمَاعِيَّة شَقْيِيَّة. غياب hemianecephaly أحد نصفي الدماغ خلقياً.

خَدَرٌ شَقْيِي. خدر يصيب hemianesthesia أحد نصفي الجسم.

خَدَرٌ شَقْيِي (= h. cruciata) - alternate h. تبادلي.


خَدَرٌ شَقْيِي مُخِّي. خدر شقي ينتج - cerebral h. عن إصابة المحفظة الداخلية للنواة العنسية.



#### hematoma, epidural

صورة تبين بعض الأورام الدموية حوالى الدماغ:


- ١ - ورم دموي في الحفرة الخلفية: ورم دموي يتولد من الإصابات أو الكسور القفوية مما يسبب خلل القياس ونقص التوتر والرنح وأحياناً وذمة الحليمة البصرية والسبات المترقي.
- ب - ورم دموي تحت الجبهي: ورم يولد الصداع خلف الحجابي وضعف الافتهام والتفكير وضعف الذاكرة والتوهان المتقطع.




#### hematoma, epidural

ورم دموي فوق الجافية في الناحية الصدغية الجدارية: (1) انخساف شريان المشيمية الأمامي (2) انضغاط الشريان المخي الخلفي (3) انزياح جذع الدماغ للجهة المعاكسة وانضغاط الخيمة (4) انضغاط السبل القشرية النخاعية والسبل المرافقة الأخرى الذي يؤدي إلى خزل شقي بالنصف المقابل مع فرط المنعكسية الوترية وعلامة بابنسكي الموجبة (5) انفتاح اللوزة المخيخية مع انخساف الشريان المخيخي السفلي الخلفي (6) انضغاط العصب القحفي الثالث الذي يؤدي إلى توسع الحدقة والأطراف وشلل العصب الثالث (7) انفتاح الفص الصدغي إلى تحت الخيمة المخيخية (8) انزياح الأوعية المخية ونقطة سلفيان للجهة الإنسية.






↑  
الصدمة



#### hematoma, Intracerebral

- نزف داخل المخ يولد أوراماً دموية فيه، وهي تتولد  
(1) بالإصابة المباشرة.  
(2) بالاصطدام أو برجع الضربة.  
(3) بالنزف «التلقائي» بسبب امراض الشرايين او الدم.



hematoma, subdural

نزح الورم الدموي من تحت الجافية. لاحظ انزياح المخ والبطينات إلى الجهة المعاكسة.

- **crossed h. (=h. cruciata)**

خَذَرٌ شَقِيٌّ  
مُتَصَالِبٌ.

- **h. cruciata**

خَذَرٌ شَقِيٌّ مُتَصَالِبٌ. فقدان الحس من إحدى جهتي الوجه مع فقدان حسي الألم والحرارة على الجهة المعاكسة من الجسم ويتولد عن آفة وحشية في الجسر أو البصلة (النخاع المستطيل) تصيب الجذر الحسي لثلاثي التوائم والسبيل النخاعي المهادي.

- **mesencephalic h., pontile h.**

خَذَرٌ شَقِيٌّ دِمَاعِيٌّ مُتَوَسِطِيٌّ؛ خَذَرٌ شَقِيٌّ جَسْرِيٌّ. الخدر الشقي الذي يتولد عن إصابة الجسر أو الدماغ المتوسط.

- **spinal h.**

خَذَرٌ شَقِيٌّ نُخَاعِيٌّ. الخدر الشقي الذي يتسبب عن إصابة النخاع الشوكي.

**hemianopia**

عَمَى شَقِيٌّ. نقص الإبصار

أو العمى التام في نصف الساحة البصرية لإحدى العينين أو لكليتهما وقد تستعمل للدلالة على العمى في إحدى نصفي الساحة البصرية أو في كليتهما.

- **absolute h.**

عَمَى شَقِيٌّ مُطْلَقٌ. عمى كامل

للضوء واللون والشكل في نصف الساحة البصرية.

- **altitudinal h. (=horizontal h.)**

عَمَى شَقِيٌّ

أَفْقِيٌّ. عمى كامل في نصف الساحة البصرية العلوية أو السفلية.

- **bilateral h.**

عَمَى شَقِيٌّ بِالْجِهَتَيْنِ. عمى شقي

بالعينين.

- **binasal h.**

عَمَى شَقِيٌّ بِالْأَنْفَيْتَيْنِ. عمى

شقي بنصفي الساحة البصرية الأنفيتين.



- binocular h. (=bilateral h.) عَمَى شِقَائِي بِالْجَهْتَيْنِ.
- bitemporal h. عَمَى شِقَائِي بِالصُّدْغَتَيْنِ.  
عمى شقي بنصفي الساحة البصرية الصدغيتين.
- complete h. عَمَى شِقَائِي تَامَ. عمى شقي يصيب  
نصفي الساحة البصرية لكلا العينين.
- congruous h. عَمَى شِقَائِي مُتَطَابِق. عمى شقي  
مماثل حيث يكون العيب في نصفي الساحة البصرية  
للعينين المتناظرتين في الشكل والموقع والحجم  
والشدة.
- crossed h. عَمَى شِقَائِي مُتَصَالِب. عمى شقي  
أفقي يصيب نصف الساحة البصرية العلوية لإحدى  
العينين والنصف السفلي للعين الثانية.
- heteronymous h. عَمَى شِقَائِي مُفَايِر. عمى  
شقي يصيب نصفين متعاكسين من الساحتين  
البصريتين للعينين فيصيب مثلاً النصف الأيسر  
لإحدهما والنصف الأيمن للثانية.
- homonymous h. عَمَى شِقَائِي مُمَازِل. عمى  
شقي يصيب نفس نصف الساحة البصرية لكل من  
العينين إما النصف الأيمن أو الأيسر لكل منهما.
- incomplete h. عَمَى شِقَائِي نَاقِص. عمى  
شقي يصيب أقل من نصف الساحة البصرية.
- incongruous h. عَمَى شِقَائِي غَيْر مُتَطَابِق. عمى  
شقي مماثل ولكن العيب في أحد الشقين لا يشابه عيب  
الشق الثاني إما بالموقع أو بالسعة أو بالشدة.
- lateral h. (=homonymous h.) عَمَى شِقَائِي  
وَحْشِي. عمى شقي مماثل.
- nasal h. عَمَى شِقَائِي أَنْفِي. عمى شقي في  
النصفيين الأنفيين للساحتين البصريتين.
- quadrant h., quadrant h. (=qua-  
drantanopia) عَمَى شِقَائِي رُبْعِي.
- relative h. عَمَى شِقَائِي نِسْبِي. عمى شقي  
للألوان أو للشكل مع الاحتفاظ بالإبصار للضوء.
- temporal h. عَمَى شِقَائِي صُدْغِي. عمى شقي  
في النصفين الصدغيين للساحتين البصريتين.
- unilateral h. عَمَى شِقَائِي بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ.  
عمى شقي في إحدى العينين فقط.
- hemianopic أَعْمَى شِقَائِي. متعلق بالعمى  
الشقي أو مصاب به.

- hemianopsia (=hemianopia) عَمَى  
شِقَائِي.
- hemianosmia فَقَد حَسَّ الشَّم الشَّقِي؛  
خُسَامٌ شِقَائِي. فقدان حس الشم في أحد المنخرين.
- hemipraxis تَعَذُّرُ الْأَدَاءِ الشَّقَائِي. لا أدائية  
تصيب إحدى جهتي الجسم.
- hemiasynergia فَقَد التَّأَزَّرُ الشَّقَائِي. لا  
تآزرية في إحدى جهتي الجسم.
- hemiataxia رَنَحٌ شِقَائِي. رنح يصيب إحدى  
جهتي الجسم.
- hemiatheiosis كَنَعَ شِقَائِي. كنع يصيب  
إحدى جهتي الجسم.
- hemiatrophy ضُمُورٌ شِقَائِي. ضمور يصيب  
إحدى جهتي الجسم أو نصف أحد الأعضاء أو  
الأجزاء.
- facial h. ضُمُورٌ شِقَائِي وَجْهِي. ضمور أحد نصفي  
الوجه والذي يكون مترقياً أحياناً ولا يعرف له سبب  
واضح.
- progressive lingual h. ضُمُورٌ شِقَائِي لِسَانِي  
مُتَرَقِّ. ضمور أحد نصفي اللسان الجانبيين المترقي.
- hemiballism (= hemiballismus) رَفَنٌ شِقَائِي.  
رَفَنٌ شِقَائِي. تملل حركي  
شديد يشمل أحد جانبي الجسم وخاصة في الطرف  
العلوي منه ويتولد عن إصابة مخربة لنوى الوطاء.
- hemicephalia (= hemicephaly) اِنْعِدَامُ  
الْمُخِّ. لا مخية خلقية حيث ينعدم وجود المخ ومن  
الممكن أن توجد العقد القاعدية ولكن جذع الدماغ  
والمخيخ يكونان موجودين بصورة سوية.
- hemisphere نِصْفُ كُرَّةِ الْمَخِّ.  
hemisphere رَقَصٌ شِقَائِي. رقص يصيب  
إحدى جهتي الجسم.
- hemichorea عَمَى الْأَلْوَانِ الشَّقَائِي. عمى ألوان  
يصيب نصف ساحة إحدى العينين أو نصفيين  
متماثلين في ساحتي العينين.

**hemicorticectomy** قَطْعُ نِصْفِ كُرَةِ المَخ. قطع نصف كرة المخ من دون العقد القاعدية كعلاج للصرع المستعصي.

**hemicrania** 1. صُدَاعُ نِصْفِيٍّ؛ الشَّقِيقَةُ. 2. انعدام شِقِّ الدماغ. 1. صداع في إحدى جهتي الرأس. 2. الانعدام الخلقي لقسم من الدماغ.

**hemicraniectomy** قَطْعُ نِصْفِ القَحْف. قطع نصف قَبو القحف عند الخط الناصف ومن الأمام للخلف وقلبه للجانب للكشف عن أحد نصفي كرة المخ.

**hemicraniosis** فَرْطُ تَعَظُّمِ نِصْفِ القَحْف. فرط تعظم أحد نصفي القحف أو الوجه مع إصابة الدماغ والذي قد يتولد عن الورم البطاني (ورم بطانة) للجافية.

**hemicraniotomy (hemicraniectomy)** قَطْعُ نِصْفِ القَحْف.

**hemidecortication** تَقْشِيرُ نِصْفِ المَخ. إزالة نصف القشرة المخية.

**hemidysergia** فَقْدُ التَّأَوُّرِ الشَّقِي. خلل حركي في أحد جانبي الجسم.

**hemidysesthesia** خَلَلُ الإحْسَاسِ الشَّقِي. خلل الإحساس في أحد جانبي الجسم.

**hemidystrophy** خَلَلُ شَقِي. عدم تساوي تنامي جهتي الجسم.

**hemiepilepsy** صَرْعُ شَقِي. صرع يصيب إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemigeusia** تَذَوُّقُ نِصْفِيٍّ. وجود حس الذوق في جهة واحدة من اللسان.

**hemihypalgesia** نَقْصُ حِسِّ الأَلَمِ الشَّقِي. نقص الحساسية للألم في إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemihyperesthesia** فَرْطُ الحِسِّ الشَّقِي. فرط التحسس الشاذ في إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemihyperidrosis** فَرْطُ التَغَرُّقِ الشَّقِي. فرط التعرق الشاذ في إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemihypermetria** فَرْطُ القِيَاسِ الشَّقِي. فرط القياس في جهة واحدة من الجسم.

**hemihypertonia** فَرْطُ التَوَثُّرِ الشَّقِي. فرط التوتر في جهة واحدة من الجسم.

**hemihypesthesia** نَقْصُ الحِسِّ الشَّقِي. نقص الحس الشاذ في إحدى جهتي الجسم.

**hemihypoesthesia (= hemihypesthesia)** نَقْصُ الحِسِّ الشَّقِي.

**hemihypometria** نَقْصُ القِيَاسِ الشَّقِي. نقص القياس في جهة واحدة من الجسم.

**hemihypotonia** نَقْصُ التَوَثُّرِ الشَّقِي. نقص التوتر في إحدى جهتي الجسم.

**hemilaminectomy** اسْتِنْصَالُ نِصْفِ الصَّفِيحَةِ الفَقْرِيَّةِ. استئصال نصف الصفيحة الفقرية من إحدى جهتي الفقرة.

**hemilateral** نِصْفِيٍّ جَانِبِيٍّ. يصيب أحد النصفين الجانبيين.

**hemilesion** آفَةٌ شَقِيَّةٌ. آفة في إحدى جهتي نخاع الشوكي فقط.

**hemineurasthenia** وَهْنٌ عَصَبِيٌّ شَقِي. وهن عصبي يصيب إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemipalgia** أَلَمٌ عَيْنِيٌّ شَقِي. ألم يصيب إحدى العينين ونصف الرأس الذي على جهتها.

**hemipopia (= hemianopia)** عَمَى شَقِي. شَلَلٌ

**hemiparalysis (= hemiplegia)** شَقِي. فَالْج. خَدَرٌ شَقِيٌّ سَفْلِيٌّ.

**hemiparanesthesia** خدر النصف السفلي لإحدى جهتي الجسم.

**hemiparaplegia** شَلَلٌ شَقِيٌّ سَفْلِيٌّ. شلل النصف السفلي لإحدى جهتي الجسم.

**hemiparesis** خَزَلٌ شَقِيٌّ. وهن عضلي أو شلل جزئي يصيب إحدى جهتي الجسم.

**hemiparesthesia** مَذَلٌ شَقِيٌّ. شذوذ حسي في إحدى جهتي الجسم.

**hemiparetic** خَزَلِيٌّ شَقِيٌّ. منسوب إلى الخزل الشقي أو مصاب به.

**hemiparkinsonism** بَارَكَنْسُونِيَّةٌ شَقِيَّةٌ. باركنسونية تصيب إحدى جهتي الجسم فقط.

- hemiplegia** فالج؛ شلل شقي. شلل إحدى جهتي الجسم.
- **h. alternans hypoglossica** فالج تحت اللساني المقابل. فالج مع آفة العصب تحت اللساني في الجهة المقابلة.
- **alternate h.** فالج متناوب. شلل يصيب أحد أقسام الجسم في إحدى جهتيه وقسماً آخر منه في الجهة المقابلة.
- **alternating oculomotor h. (= Weber's syndrome)** الشلل النصفي المتصالب لمحرك العين.
- **ascending h.** فالج متسلق. شلل متسلق في أحد نصفي الجسم.
- **capsular h.** فالج محفطي. فالج ينتج عن آفة المحفظة الداخلية.
- **cerebral h.** فالج دماغي. فالج يتسبب عن آفة دماغية.
- **contralateral h.** فالج مقابل. فالج في جهة الجسم المقابلة لجهة الآفة الدماغية التي تسببه.
- **crossed h. (= alternate h.)** فالج متصالب.
- **h. cruciata (= alternate h.)** فالج متصالب.
- **facial h.** شلل وجهي شقي. شلل في أحد نصفي الوجه مع عدم إصابة الجسم بأي شلل.



hemiplegia

حالة فالج (شلل تصفي). يشاهد المريض يسير مع عدم حركة الذراع المصاب الذي يبقى قريباً من الجسم وهو منتن جزئياً عند العرفق.

- **faciobrachial h.** شلل وجهي عضدي شقي. شلل يصيب أحد نصفي الوجه والذراع العلوي بنفس الجهة من الجسم.
- **faciolingual** شلل وجهي لساني شقي. شلل نصف الوجه واللسان.
- **flaccid h.** فالج رخو. فالج مع فقدان توتر العضلات المشلولة وفقدان المنعكس الوتري فيها.
- **Infantile h.** فالج طفلي. فالج يصيب الولدان ويتسبب عن نزيف أو خثار دماغي يحدث أثناء الولادة أو قبلها.
- **puerperal h.** فالج نفاسي. فالج يصيب النساء بعد الولادة مباشرة.
- **spastic h.** فالج تشنجي. فالج مع فرط توتر العضلات المشلولة وزيادة المنعكسات الوتريّة فيها.
- **spinal h.** فالج نخاعي. فالج يتولد نتيجة آفة في النخاع الشوكي.
- **Wernicke-Mann h.** فالج فزنيكة - مان. شلل شقي جزئي في أطراف إحدى جهتي الجسم.
1. فالجني 2. مفلوج. متعلق **hemiplegic** بالفالج أو مصاب به.
- hemirachischisis** انشقاق السيساء النصفي. انشقاق السيساء من دون تدلي النخاع الشوكي منه.

**hemiscotosis (= hemianopia)** عمى شقي.

**hemiseptum** نصف الحاجز. نصف أي حاجز خصوصاً الحاجز الشفاف للدماغ.

- **h. cerebri** نصف حاجز الدماغ. النصف الوحشي للحاجز الشفاف للدماغ.

**hemispasm** تشنج شقي. تشنج في إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemisphere** نصف الكرة. نصف أية كرة وخصوصاً نصف الكرة المخية أو نصف الكرة المخية.

- **cerebellar h.** نصف الكرة المخيخية. قسم المخيخ على جانب دودته.

- **cerebral h.** نصف الكرة المخية. أي من نصفي كرة المخ المفصولين عن بعضهما في الوسط بالشق

المخي الطولاني ويحوي تجويف البطين الجانبي وتغطيه طبقة من المادة السنجابية وهي قشرته ويكون نصفاً كرة المخ أكبر قسم من دماغ الإنسان.

**dominant h.** - نصفُ الكُرّة السائد. نصف كرة المخ المتخصص أكثر من النصف الثاني في تنسيق الحواس والسيطرة على الكثير من وظائف الجسم مثل اللغة والكلام وتفضيل العمل بأحد الأعضاء المزدوجة كاليدين في الحركات الإرادية. ومثال ذلك نصف كرة المخ الأيسر في الأشخاص اليمينيين الذين يفضلون استعمال يدهم اليمنى كما يهيمن النصف الأيسر على وظيفة الكلام عند هؤلاء الأشخاص.

**hemispherectomy** - إَسْتِنْصَالُ نِصْفِ الكُرّة. قطع نصف كرة المخ.

**hemithermoanesthesia** - فُقْدَانُ حِسِّ الحَرَارَةِ الشَّقِيّ. فقدان حس الحرارة في إحدى جهتي الجسم.

**hemitonia (= hemihypertonia)** - فَرْطُ التَوَثُّرِ الشَّقِيّ.

**hemitremor** - رُعَاشٌ شَقِيّ. رعاش في إحدى جهتي الجسم فقط.

**hemivagotomy** - غَلْبَةُ أَحَدِ المُبْهَمِينَ. فرط استثارية العصب المبهم في إحدى جهتي الجسم.

**hemorrhage** - نَزْفٌ. تسرب الدم من أحد الأوعية.

**brain h.** - نَزْفٌ دِمَاعِيّ. نزف إلى داخل بنية الدماغ.

**cerebral h.** - نَزْفٌ مُخِيّ. نزف إلى داخل المخ.

**epidural h. (= extradural h.)** - نَزْفٌ خَارِجَ الجَافِيَةِ. نزف خارج الجافية.

**extradural h.** - نَزْفٌ خَارِجَ الجَافِيَةِ. نزف داخل القحف في الحيز خارج الجافية.

**intracerebral h.** - نَزْفٌ دَاخِلَ المُخِّ. نزف في داخل المخ.

**Intramedullary h. (= hematomyelia)** - نَزْفٌ نُخَاعِيّ.

**subarachnoid h.** - نَزْفٌ تَحْتَ العَنَكَبُوتِيَّة. نزف داخل القحف في الحيز تحت العنكبوتية.

**subdural h.** - نَزْفٌ تَحْتَ الجَافِيَةِ. نزف مخي في الحيز تحت الجافية.

**hepatalgia** - أَلَمٌ كَبِدِيّ. ألم الكبد.

**hepatolenticular** - كَبِدِيّ عَدَسِيّ. نسبة إلى الكبد والنواة العدسية.

**hereditary** - وِرَاثِيّ. ما ينقل جينياً من الوالدين للأبناء.

**heredity** - وِرَاثَةٌ. انتقال الصفات والخِلات من الوالدين للأبناء.

**autosomic h.** - وِرَاثَةٌ جَسَدِيَّة. وراثة الصفات والخِلات بالجينات الموجودة في الصبغيات الجسدية.

**sex linked h.** - وِرَاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالْجِنْس. انتقال الصفات والخِلات بواسطة الجينات الموجودة في الصبغي الجنسي.

**x-linked h.** - وِرَاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِأَكْس. وراثة مرتبطة بالجنس تنتقل بواسطة الجينات الموجودة في الصبغي أكس.

**heredoataxia** - زَنْجٌ وِرَاثِيّ. رنج ينتقل بالوراثة.

**heredodegeneration** - تَنَكُّسٌ وِرَاثِيّ. تنكس ينتقل وراثياً بسبب مرض وراثي.

**heredopathia atactica polyneuriformis (= Refsum's disease)** - اِعْتِلَالٌ وِرَاثِيّ رَنَحِي عَصَبِي مُتَعَدِّد.

**hermaphrodite** - خُنْثَى. (ج: خُنَائِي) شخص يتصف بالخنوثة.

**hermaphroditism** - خُنُوْتَةٌ. حالة تتصف بوجود أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية لدى الشخص ومن الممكن أن تكون خنوثة حقيقية أو أن تكون خنوثة كاذبة حيث تظهر أعضاء أحد الجنسين أكثر وضوحاً من أعضاء الجنس الآخر.

**hernia** - فَتَقٌ. (ج: فُتُوق). بروز عروة أو جزء من عضو أو نسيج خلال فتحة شاذة في الجسم.

**brain h.** - فَتَقٌ دِمَاعِيّ. تبارز جزء من الدماغ خلال فتحة شاذة أو عيب في القحف (كما يحدث بعد عملية استئصال ورم الدماغ) أو خلال منجل المخ أو خيمة المخيخ أو خلال تلمة الخيمة أو الثقبية العظمى.

**cerebral h. (= brain h.)** - فَتَقٌ دِمَاعِيّ.

**herniation** - اِنْفِتَاقٌ. توليد الفتق.

**caudal transtentorial h.** - اِنْفِتَاقٌ ذَنْبِيّ خِلَالِ

- خَيْمَةٍ. انفتاق الدماغ بالاتجاه الذنبى خلال فرجة الخيمة.
- **cingulate h.** انفتاق الجَزَامِي. انفتاق التلفيف الجَزَامِي خلال منجل المخ.
- **disk h.** انفتاق القُرْص. انفتاق النواة اللبية للقرص بين الفقار خلال الحلقة اللببية للقرص.
- **foraminal h.** انفتاق ثُقْبِي. انفتاق خلال فتحة تشريحية مثل انفتاق اللوزة المخيخية خلال الثقبية العظمى أو انزياح السويقة المخية بالاتجاه الراسي خلال تلمة الخيمة.
- **h. of intervertebral disk (= disk h.)** انفتاق القُرْص.
- **rostral transtentorial h.** انفتاق متقاربي خلال الخَيْمَةِ. بروز جزئي للنص الصدغي خلال تلمة الخيمة بسبب زيادة الضغط فوق الخيمة أثناء الولادة.
- **subfalcial h.** انفتاق تحت المنجل. انفتاق الجهة الإنسية لنصف كرة المخ تحت الحافة السفلية لمنجل المخ.
- **tonsillar h.** انفتاق اللُّوْزَةِ. بروز لوزة المخيخ خلال الثقبية العظمى وزيادة الضغط على النخاع المستطيل (البصلة).
- **transtentorial h.** انفتاق خلال الخَيْمَةِ. انزياح بعض البنيات الدماغية الإنسية للأسفل خلال تلمة الخيمة بسبب ضغط الكتلة فوق الخيمة على البنيات الواقعة أسفل منها وحتى على جذع الدماغ.
- **uncal h. (= transtentorial h.)** انفتاق الشَّص. هربس؛ خلا. مرض جلدي التهابي
- herpes** يولده فيروس الهربس (الحلا) يتصف بتكوين مجموعات من الحويصلات الصغيرة.
- **h. zoster** هربس نطاقي؛ خلا نطاقي. خلا عدواني حاد يتحدد ذاتياً يسببه فيروس خاص ويصيب العقد الحسية ومناطق تعصيبها ويتصف بالم عصبي شديد على طول منطقة توزيع العصب المصاب مع مجموعات من الحويصلات الصغيرة المكسدة فوق منطقة القطاع الجلدي الذي يناسب العصب المصاب وعادة ما يصيب قطاعاً جلدياً واحداً أو بضعة قطاعات وفي جهة واحدة من الجسم ومن الممكن أن يبقى الالم العصبي إلى ما بعد زوال المرض.
- **h. zoster ophthalmicus** هربس نطاقي

عَيْنِي. خلا منطقي يصيب فرع العصب العيني من العصب ثلاثي التوائم ويتصف بطفح جلدي حويصلي على قاعدة حمامية على طول مسار العصب المصاب ويسببه ذلك الم راح مع التهاب الملتحمة وأحياناً التهاب القرنية والصلبة أو القرنية والهدايب وشلل عضلات خارج العين والأطراف وتوسع الحدقة.

**herpesencephalitis (= herpes encephalitis)** التهاب الدماغ الهربسي (الخلطي).

**herpetophobia** رهَابُ الزَّوَاجِف. الخوف من الزواحف والبرمائيات.

**hersage** تمشيط العَصَب. تفريق الالياف العصبية للعصب المحيطي بشطر أغمارها وفصل الالياف عن بعضها في المنطقة المصابة من العصب.

**heteresthesia** تَبَايُن الحِس. تباين درجة الحس في المناطق المتجاورة من الجلد على سطح الجسم.

**heteroganglionic** رَابِط العُقْد. ما يربط مختلف العقد الودية.

**heterolalia (= heterophasia)** كَلَامٌ مُغَايِر. كَلَامٌ مُغَايِر. النطق بكلمات غير التي يقصدها المتكلم.

**heterophasis (= heterophasia)** كَلَامٌ مُغَايِر.

**heterophemia (= heterophasia)** كَلَامٌ مُغَايِر.

**heterosexuality** اِسْتِهَاءُ الْمُغَايِر. انجذاب جنسي نحو الجنس المغاير.

**heterosmia** شَمُّ مُغَايِر. حالة شم الروائح بخلاف رائحتها.

**heterotopia** قَوْضُعٌ مُغَايِر. توضع شاذ لأجزاء أو أعضاء أو أنسجة في مواضع غير مواضعها الطبيعية في الجسم.

**heterotrophia** اِضْطِرَابُ التَغْذِيَةِ. اضطراب في تغذية الجسم.

**hexobarbital** هِكْسُوبَارِبِيْتَال. دواء مسكّن يستعمل عن طريق الفم.

**hiatus** فُرْجَة. هوة أو فتحة أو فلاح.

**- neural h.** الفُرْجَة العَصْبِيَّة. فتحة في الانبوب العصبي أثناء مرحلة انغلاقه في الجنين.

**hiccup (= hiccup)** فُواق.

**hiccup** فُواق. تقلص تشنجي لإرادي للحجاب الحاجز يولد بداية تنفسية سرعان ما تثبط بصورة فجائية بانسداد المزمار مولداً الصوت الخاص بالفواق.

**hillock** بُرُوز. ارتفاع صغير من بنية أو عضو.

**- axon h.** سُرَّة المِخْوَار. التوسيع المخروطي للمحوار عند نقطة اتصاله بجسم العصبون.

**hilum** نَقِير. انخساف أو وهدة في أحد الأعضاء يدخل أو يخرج من خلالها عصبه وأوعيته.

**- h. of caudal olivary nucleus** نَقِيرُ النَوَاةِ الزَيْتُونِيَّةِ الدَّنْبِيَّة. اللب الأبيض للنواة الزيتونية الدنبية للنخاع المستطيل (البصلة) والذي يبرز بصورة خاصة على جهتها الإنسية.

**- h. of dentate nucleus** نَقِيرُ النَوَاةِ المُسَنَّنَةِ. اللب الأبيض للنواة المسننة للمخيخ.

**hindbrain (= rhombencephalon)** الدِّمَاغُ المَوْخَر.

**hippocampus** الحُصَيْن. ارتفاع مقوس من مادة سنجابية تمتد على طول قاع القرن الصدغي للبطين الجانبي. وهو يحوي سبع طبقات وهي ابتداء من ناحية البطين: البطانة العصبية، الشكوة، الطبقة الموجهة، الطبقة الهرمية، الطبقة الشعاعية، الطبقة الجوبية ثم الطبقة الجزيئية.

**- h. minor (= calcar avis)** الحُصَيْن الصغير؛ مِهْمَازُ الطَّيْرِ.

**hippus (= pupillary athetosis)** كَنَعُ الحَذَقَة. التوسع والتقلص النظاميان المبالغان والشاذان لبؤبؤ العين وغير المتعلقين بتغيرات شدة الضوء أو تثبيت العينين.

**hirsutism** شَعْرَانِيَّة؛ زَيْب. كثرة الشعر الشاذ عند النساء خصوصاً ذلك الذي يشبه نمط التوزيع الذكوري عند البالغين.

**histamine** هِسْتَامِين. مادة تتولد من نزع

كربوكسيل الهستيدين وتوجد في كل أنسجة الجسم وخاصة في الخلايا البدنية وخلايا الدم القعدة وتوجد بأعلى تركيز في الرئتين ولها تأثيرات عديدة في الجسم ومنها توسيع الشعيرات وتقليص معظم العضلات الملساء وتحفيز الإفرازات المعدية وتسريع القلب.

**hodoneuromere** قُسَيْمٌ عَصْبِيٌّ جَنِينِي. أحد قسيمات الجذع الجنيني مع عصبه النخاعيين وفروعهما.

**holoprosencephaly** عَدَمُ انْشِطَارِ الدِّمَاغِ المَقْدَم. عيب خلقي يترافق مع عيب تنامي منتصف الوجه.

**holorachischisis** انْشِقَاقُ النُّخَاعِ الكَامِل. انشقاق السيساء التام مع شق في كل النخاع الشوكي.

**holotonia (= holotetanus)** تَوَثُّرِيَّة شَامِلَة. تشنُّج كل عضلات الجسم.

**homalocephalus** مُسَطَّحُ الرَّأْس. شخص ذو رأس مسطح.

**homatropine** هُومَاتروپِين. مادة كيميائية مضادة للفعل الكولينّي تشبه الاتروبين في عملها ولكنها أضعف منه.

**homeostasis** الإِسْتِقْبَاب. حالة الثبات والاستقرار في حالات ووظائف الجسم السوية ويسيطر عليها الجهاز المركزي بمساعدة عملية التغذية الراجعة للوظائف المختلفة مثل ثبات درجة حرارة الجسم.

**homeothermy** ثَبَاتُ الحَرَارَة. ثبات درجة حرارة الجسم رغم التغيرات المختلفة في درجة حرارة البيئة المحيطة به.

**homoeroticism** اشتِهَاءُ المِثَالِ؛ جُنُوسِيَّة؛ لِسَاط. جنسانية نحو شخص آخر من نفس الجنس.

**homogenous** مُتَجَانِس. مكون من عناصر أو عوامل متشابهة ومتماثلة في كل أقسامه.

**homosexual** لِسَاطِي؛ سِحَاقِيَّة؛ جُنُوسِي. توجه الجنسية نحو شخص آخر من نفس الجنس.

homosexuality: انجذاب للمائل؛ لواط؛

سحاق؛ جُنُوسِيَّة. انجذاب جنسي نحو شخص آخر من نفس الجنس.

- female h. (= lesbianism) سَحَاق.

homotype نَمَطٌ مُرَاتِي. تناظر عكسي مع عضو مائل مثل تناظر اليدين أو القدمين.

hormone هُرمُون. مادة يولدها عضو في الجسم أو بعض خلاياه ولها وظيفة تحكّمية معينة على وظائف عضو أو أعضاء أخرى في الجسم وتولده عادة إحدى الغدد الصماء ولكن قد تولد بعض أنواعه خلايا لاغذية خاصة.

horn قَرْن. بروز مدبب كقرون رؤوس الحيوانات أو بنيات مشابهة لها.

- h. of Ammon (= hippocampus) قَرْنُ آمُون: الحَصِين.

- anterior h. of lateral ventricle (= cornu frontale ventriculi lateralis) القَرْنُ الجَبْهِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ.

- anterior h. of spinal cord (= cornu ventrale medullae spinalis) القَرْنُ البُطْنِيّ لِلنُّخَاع.

- dorsal h. of spinal cord (= cornu dorsale medullae spinalis) القَرْنُ الظَّهْرِيّ لِلنُّخَاع.

- frontal h. of lateral ventricle (= cornu frontale ventriculi lateralis) القَرْنُ الجَبْهِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ.

- gray h's. of spinal cord (= gray columns) الأَعْمَدَةُ السِّنْجَابِيَّة.

- inferior h. of lateral ventricle (= cornu temporale ventriculi lateralis) القَرْنُ الصَّدْغِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ.

- lateral h. of spinal cord (= cornu lateralis medullae spinalis) القَرْنُ الوَحْشِيّ لِلنُّخَاع.

- occipital h. of lateral ventricle (= cornu occipitale ventriculi lateralis) القَرْنُ القَذَالِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ.

- posterior h. of lateral ventricle (= cornu occipitale ventriculi lateralis) القَرْنُ القَذَالِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ.

- posterior h. of spinal cord (= cornu dorsalis medullae spinalis) القَرْنُ الظَّهْرِيّ لِلنُّخَاع.

- temporal h. of lateral ventricle (= cornu temporalis ventriculi lateralis) القَرْنُ الصَّدْغِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ.

- ventral h. of spinal cord (= cornu ventralis medullae spinalis) القَرْنُ البُطْنِيّ لِلنُّخَاع.

hydatid عُذَارِي. 1. كيسة عذارية. 2. أية بنية كيسية.

- h. cyst كَيْسَةُ عُذَارِيَّة. انظر cyst.

hydranencephaly مَوَةُ الرُّأْسِ اللَّامُخِيّ: مَوَةُ انعدام المخ. عدم وجود نصفي كرة المخ مع امتلاء حيز الرأس الذي يشغله عادة بالسائل الدماغي النخاعي.

hydrargyromania هَوَسٌ زُهَيْفِيّ المُنْشَأ. اختلال عقلي يسببه التسمم بالزئبق.

hydrencephalocele (= encephalocystocele) قَبْلَةُ الدماغ الموهية؛ قَبْلَةُ دماغية كيسية.

hydrencephalomeningocoele قَبْلَةُ دِمَاغِيَّة سَحَائِيَّة مَائِيَّة. بروز انفتاق خلال عيب قحفي للسحايا الممتلئة بالسائل الدماغي النخاعي وبعض المادة الدماغية.

hydrencephalus (= hydrocephalus) مَوَةُ الرُّأْسِ.

hydrencephaly (= hydrocephalus) مَوَةُ الرُّأْسِ.

hydrocephalocele (= encephalocystocele) قَبْلَةُ دِمَاغِيَّة كَيْسِيَّة.

hydrocephalus مَوَةُ الرُّأْسِ. حالة توسع بطينات الدماغ وعادة ما يكون ذلك بسبب انسداد مجاري السائل الدماغي النخاعي والذي يترافق



hydrocephalus

مَوء الدماغ الطفلي يظهر تضخم راس الطفل وانحراف العينين للأسفل مع تفارق دروز الجمجمة.



hydrocephalus

مَوء الدماغ: مقطع محوري بالمرنان (resonator) يظهر توسع البطينين الجانبيين.

مع تجمع السائل في داخل القحف الذي يكون عادة بضغط عالٍ ولكنه قد يكون بضغط سوي. وهو

عادة ما يتصف بضخامة الرأس وبروز الجبهة وضمور الدماغ والتخلف العقلي والاختلاجات. وقد يكون المرض خلقياً أو مكتسباً مع بداية مفاجئة أو بطيئة متروية.

**مَوء الرأس المستطرق:** communicating h.

**مَوء الرأس المُتَّصِل.** مَوء الرأس الذي لا يترافق مع انسداد مجرى السائل الدماغى النخاعى الذي يمر خارجاً من الدماغ إلى القناة النخاعية بحرية ولكنه لا يمتص فيتجمع.

**مَوء الرأس الفَرَاغِيّ.** h. ex vacuo مَوء الرأس

الذي يتولد ليملا الفراغ الذي ينتج عن ضمور الدماغ.

**noncommunicating h. (= obstructive**

**h.) مَوء الرأس الإنْسِدَادِيّ.**

**مَوء الرأس الخفي:** normal-pressure occult h.

**إِسْوِي الضَّغْط:** مَوء الرأس إسْوِي الضَّغْط الخَفِيّ. مَوء الرأس الذي يتصف بالخرف والرنح ولس البول مع وجود دليل بالتصوير الدماغى الهوائى على مَوء الرأس وهو يتصف بضخامة البطينات المترافق مع عدم كفاءة الاحياز تحت العنكبوتية ولكن مع إسوية ضغط السائل النخاعى الشوكى. ويظهر عادة عند منتصف العمر وفي الشيخوخة.

**مَوء الرأس الإنْسِدَادِيّ.** obstructive h. مَوء الرأس

الذي يتولد عن انسداد مجرى السائل الدماغى النخاعى.

**مَوء الرأس الأذُنِيّ.** otitic h. مَوء الرأس

الذي يتولد عن انتشار التهاب الأذن الوسطى إلى داخل تجويف القحف.

**مَوء الرأس الثَّانَوِيّ.** secondary h. مَوء

الرأس الذي ينتج عن التهاب السحايا.

**مَوء الرأس (= hydrocephalus) hydrocephaly**

الرأس.

**عَطَشٌ لِلْمَاء.** hydrodipsia العطش للماء.

**هَوَسٌ شَرَبِ الْمَاء.** hydrodipsomania

نوبة صرعية تتصف بالعطش الذي لا يروى.

**هَوَسٌ شَرَبِ الْمَاء.** hydroencephalocele (= encephalocystocele) قِنَلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ كِنَسِيَّةٌ.



**hydromeningitis** التهاب السحايا الموهي. التهاب السحايا مع انصباب مصلي.

**hydromeningocele** قيلة سحائية موهية. بروز السحايا خلال عيب في القحف أو العمود الفقري مكوناً كيسة تحوي السائل الدماغي النخاعي.

**hydromicrocephaly** صغر الرأس الموهي. صغر الرأس مع كثرة السائل النخاعي الدماغي الشاذة.

**hydrophobia** 1. رهَابُ الماء 2. داء الكلب. 1. الخوف والغصص والكام عند محاولة شرب الماء في الطور العصبي الحاد من داء الكلب والذي يتسبب عن ألم تشنج البلعوم والحنجرة 2. داء الكلب.

**hyoscyamine** هيوسيامين. قلواني مضاد للفعل الكولينيني وذو فعل واستعمالات مشابهة للأتروبين ولكنه ذو تأثير مركزي ومحيطي أشد منه.

**hypacusia, hypacusis** ضعف السمع. (= hypoacusis)

**hypalgesia** نقص حس الألم. قلة الإحساس بالألم.

**hypalgia** (= hypalgesia) نقص حس الألم.

**hypanakinesia** (= hypokinesia) نقص الحركة.

**hypanakinesis** (= hypokinesia) نقص الحركة.

**hyperactivity** فرط النشاط. فرط فعالية الجسم كعرض لاختلال دماغي.

**purposeless h.** فرط النشاط اللامستهدف. تتولد في بعض أمراض الدماغ العضوية فعالية نشطة من غير هدف الاستجابة لأبسط المنبهات.

**hyperacusis** حدة السمع؛ فرط السمع. حالة تسمع فيها الأصوات عالية أي أعلى من شدتها الحقيقية.

**hyperaffectivity** فرط العاطفية. فرط الحس العاطفي لأبسط المنبهات.

**hyperalgesia** فرط التألم؛ شدة التألم. فرط حساسية الألم.

**- auditory h.** فرط التألم السمعي. حالة التألم الشديد عند سماع الأصوات.

**- muscular h.** فرط التألم العضلي. حالة التألم العضلي الشديد عند القيام بأبسط الحركات.

**hyperalgia** (= hyperalgesia) فرط التألم.

**hyperanacinesia** (= hyperkinesia) فرط الحركة؛ تحراك.

**hyperanakinesia** (= hyperkinesia) فرط الحركة؛ تحراك.

**hyperaphia** (= tactile hyperesthesia) فرط حس اللمس.

**hyperarousal** شدة النقطة. حالة فرط التوتر النفسي والفيزيولوجي والذي يتصف بنقص التحمل للألم والارق والتعب والتوتر العصبي.

**hypercenesthesia** فرط الابتهاج؛ فرط الانشراح. حالة الشعور بالانشراح والبهجة المفرطة.

**hypercinesia** (= hyperkinesia) فرط الحركة؛ تحراك.

**hypercryalgia** فرط الحساسية للبرد. فرط حس البرد.

**hypercryesthesia** (= hypercryalgia) فرط الحساسية للبرد.

**hyperdynamia** فرط النشاط العضلي. فرط الديناميكية.

**hyperenergia** فرط الطاقة. فرط النشاط الجسمي العام أو الطاقة.

**hypererethism** فرط الهيجية. الهيجية المفرطة.

**hyperergasia** (= hyperergia) فرط النشاط. فرط الفعاليات الوظيفية الجسمية الشاذة.

**hyperesthesia** فرط الحس. فرط الحس للمنبهات.

**- acoustic h.** (= hyperacusis) حدة السمع؛ فرط حس السمع.

- auditory h. (= hyperacusis) حِدَّةُ السَّمْعِ؛ فرطُ حسِّ السَّمْعِ.

- cerebral h. فرطُ الحِسِّ المُخِّي المنشأ. فرط الحس بسبب آفة مخية.

- gustatory h. (= hyperguesia) حِدَّةُ الذَّوْقِ؛ فرطُ الذَّوْقِ.

- muscular h. فرطُ الحِسِّ العَضَلِيّ. فرط حس العضلات للآلم والتعب.

- olfactory h. (= hyperosmia) فرطُ الشَّمِّ.

- oneiric h. فرطُ الحِسِّ النُّوْمِيّ. فرط الحس أو فرط التَّألم أثناء النوم أو عند الاحتلام.

- optic h. فرطُ الحِسِّ البَصَرِيّ. فرط حس العين للضوء.

- tactile h. فرطُ الحِسِّ اللمسِيّ. فرط حس اللمس.

hyperesthetic مُفرطُ الحِسِّ. منسوب لفرط الحس أو مصاب به.

hypergenitalism (= hypergonadism) فرط وظيفية الغدة التناسلية؛ فرط القُنْدِيَّة.

hypergeusesthesia (= hyperguesia) حِدَّةُ الذَّوْقِ؛ فرطُ حِسِّ الذَّوْقِ.

hypergeusia حِدَّةُ الذَّوْقِ؛ فرطُ حِسِّ الذَّوْقِ. زيادة الحساسية للذوق.

hypergia (= hypoergia) نَقْصُ النِّشَاطِ. قلة فعالية الجسم الشاذة.

hypergnosis فرطُ الإدراك. مبالغة الإدراك بحيث يوسع الشخص الفكرة إلى قصة فكرية فلسفية كما يحدث في الذهان الكبريائي (الزور).

hypergonadism فرط وظيفية الغدة التناسلية؛ فرطُ القُنْدِيَّة. حالة تنتج عن أو تتصف بفرط فعالية الغدة التناسلية الشاذة مع فرط نمو الأعضاء التناسلية وتناميها المبكر.

hyperhedonia فرطُ التَّلَذُّذِ. فرط السرور المرضي بالفعاليات المناسبة.

hyperirritability فرطُ الهَيُّوجِيَّة. فرط الاستثارية المرضي والاستجابة حتى للمنبهات الضعيفة جداً.

hyperkinesia فرطُ الحَرَكَاتِ. فرط الفعاليات الحركية أو النشاط العام.

hypermania هُوسٌ مُفرط. حالة هوس مفرط مع توتر حاد وتوهان وكثرة الكلام وفرط الحركة.

hypermetria فرطُ القِيَّاسِ. حالة تتصف بالحركة العضلية المفرطة التي تتعدى حدود الهدف المقصود منها.

hypermimia فرطُ الإِيْمَاءِ. كثرة الإيماء والتعابير أثناء الكلام.

hypermnesia حِدَّةُ الذَّاكِرَةِ. حدة الذاكرة وتزاحم الذكريات.

hypermnesic حَادُ الذَّاكِرَةِ. 1. شخص حاد الذاكرة أو ما يتعلق بحدة الذاكرة 2. مفرط الفعاليات الدماغية والفكرية.

hypermotility فرطُ التَّحَرُّكِ. فرط الحركة المرضي أو كثرتها كما يحدث في الجهاز الهضمي.

hypermyotonia فرطُ التَّوَتُّرِ العَضَلِيّ. فرط توتر العضلات.

hypermyotrophy فرطُ التَّنَامِي العَضَلِيّ. فرط نمو العضلات.

hyperorexia فرطُ الشَّهْيَةِ. زيادة الشهية الشاذة.

hyperosmia فرطُ حِسِّ الشَّمِّ. فرط حس الشم.

hyperosphresia (= hyperosmia) فرطُ حِسِّ الشَّمِّ.

hyperostosis فرطُ التَّعْظُمِ. ضخامة العظام.

- h. corticalis generalisata فرطُ التَّعْظُمِ القشري الشَّامِل؛ فرط تعظم الجمجمة الشامل. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية يتصف بتصلب عظام الجمجمة والفك والترقوة والاضلاع والعظام الطويلة مع ارتفاع فسفتاز الدم ويبدأ عادة عند سن البلوغ ويؤدي أحياناً إلى ضمور العصب البصري والصمم الإدراكي بسبب انضغاط العصبين البصري والسععي بعظام قاعدة القحف المتخذة.

- h. cranii فرطُ تَعْظُمِ القَحْفِ. فرط التعظم الذي يشمل عظام القحف.

فَرْطُ تَعَظُّمٍ بَاطِنِ الْجَبْهِيِّ. **h. frontalis Interna** -  
فَرْطُ تَعَظُّمٍ وَسَمَكِ اللُّوْحِ الدَّاخِلِيِّ لِلْعَظْمِ الْجَبْهِيِّ وَالَّذِي  
يَكُونُ عَادَةً مُتَرَاكِبًا مَعَ فَرْطِ الْإِشْعَارِ وَالْبَدَانَةِ وَغَالِبًا مَا  
يَصِيبُ النِّسَاءَ عِنْدَ سِنِ الْيَاسِ.

فَرْطُ النَّالُمِ. فَرْطُ الْاسْتِجَابَةِ **hyperpathia**  
لِلْمُنْبَهَاتِ الْمُؤَلِّمَةِ.

فَرْطُ النَّشَاطِ الْعَقْلِيِّ. **hyperphrenia**  
1. هِجَاجٌ فِكْرِي شَدِيدٌ 2. نَشَاطٌ فِكْرِي شَدِيدٌ.

فَرْطُ الْإِسْتَقْطَابِ. زِيَادَةُ **hyperpolarization**  
الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّحْنَتَيْنِ الْكَهْرِبَايَتَيْنِ عَلَى جِهَتِي غِشَاءِ  
الْخَلِيَّةِ أَوْ الْعَصَبِ مِمَّا يَزِيدُ شِدَّةَ الْجَهْدِ الْكَهْرِبَايِيِّ  
عَبْرَهُ.

مُفَرْطُ النَّشَاطِ الْعَقْلِيِّ. يَتَصَفُّ **hyperpragic**  
بِفَرْطِ انْشِغَالِ الْفِكْرِ.

فَرْطُ الْفَعَالِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. فَعَالِيَّةٌ **hyperpraxia**  
عَقْلِيَّةٌ مَفْرُطَةٌ شَاذَةٌ.

فَرْطُ الْإِسْتِغْرَاقِ. فَرْطُ التَّرَكِيزِ **hyperprosexia**  
عَلَى نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ اسْتِثْنَاءِ كُلِّ الْآفَكَارِ الْآخَرَى.

فَرْطُ الْإِنْعِكَاسِيَّةِ. مِبَالِغَةٌ **hyperreflexia**  
الْمُنْعَكَسَاتِ.

فَرْطُ الْإِنْعِكَاسِيَّةِ الْمُسْتَقَلَّةِ. **h. autonomic** -  
نُوبَاتٌ انْتِبَاطِيَّةٌ مِنْ ارْتِفَاعِ ضَغْطِ الدَّمِ وَبَطْءِ الْقَلْبِ  
وَتَعَرُّقِ الْجَبْهَةِ وَالصَّدَاعِ الشَّدِيدِ بِسَبَبِ تَعَدُّدِ الْمَثَانَةِ  
وَالْمُسْتَقِيمِ وَتَحَدُّثِ عِنْدَ إِصَابَةِ الْأَعْصَابِ الْحَشْوِيَّةِ فَوْقَ  
مُسْتَوًى تَفَرُّعِهَا.

فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ. فَرْطُ **hypersensibility**  
التَّحَسُّسِ لِمَادَةٍ أَوْ مِنْهٍ مُعَيَّنٍ.

مُفَرْطُ الْإِحْسَاسِ. 1. مُصَابٌ **hypersensitive**  
بِفَرْطِ الْإِحْسَاسِ الشَّاذِ 2. مَنْ يَتَصَفُّ بِقَابِلِيَّةِ  
الْاسْتِجَابَةِ الْخَاصَّةِ أَوْ الْعَامَةِ بِأَعْرَاضٍ وَعَلَامَاتٍ  
نُوعِيَّةٍ خَاصَّةٍ عِنْدَ مَلَامَسَةِ بَعْضِ الْمَوَادِّ الَّتِي لَا  
تُؤْدِي إِلَى آيَةٍ اسْتِجَابَةٍ عِنْدَ الْأَشْخَاصِ الْأَسْوِيَاءِ أَوْ  
عِنْدَ تَطْبِيقِهَا عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْسَادِهِمْ.

فَرْطُ التَّحَسُّسِ. حَالَةٌ **hypersensitivity**  
الْاسْتِجَابَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ لِبَعْضِ الْمَوَادِّ الْغَرِيبَةِ الَّتِي تُولَدُ  
اسْتِجَابَةً مُنَاعِيَّةً مَفْرُطَةً لَهَا.

فَرْطُ الْجِنْسَانِيَّةِ. فَرْطُ الرِّغْبَةِ **hypersexuality**  
أَوْ الْفَعَالِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ الشَّاذَّةِ.

فَرْطُ النَّوْمِ. كَثْرَةُ النَّوْمِ. **hypersomnia**

**hypersomnolence (= hypersomnia)**  
فَرْطُ الْوَسْنِ. اضْطِرَابُ النَّوْمِ الَّذِي يَشْمَلُ كَثْرَةَ  
النَّوْمِ وَفَرْطَ الْوَسْنِ أَثْنَاءَ النَّهَارِ.

فَرْطُ التَّوَثُّرِيَّةِ. فَرْطُ التَّوَتَرِ **hypersthenia**  
أَوْ الْقُوَّةِ.

فَرْطُ تَوَثُّرِ الْوُدِيِّ. **hypersympathicotonus**  
حَالَةٌ فَرْطِ تَوَتَرِ الْجِهَازِ الْعَصْبِيِّ الْوُدِيِّ.

فَرْطُ هَيَاجِيَّةِ الْجِهَازِ **hypertarachia**  
الْعَصْبِيِّ. فَرْطُ هِجَاجِ الْجِهَازِ الْعَصْبِيِّ.

فَرْطُ التَّحَسُّسِ الْخَرَّارِيِّ. **hyperthermalgesia**  
فَرْطُ التَّحَسُّسِ لِلْحَرَارَةِ.

فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ **hyperthermesthesia**  
الْخَرَّارِيَّةِ. فَرْطُ الْحَسَّاسِيَّةِ لِلْحَرَارَةِ.

فَرْطُ التَّوَثُّرِ. حَالَةٌ فَرْطِ التَّوَتَرِ **hypertonia**  
الْعَضَلِيِّ وَزِيَادَةُ مَقَاوِمَةِ الْعَضَلَاتِ لِلتَّمْدِيدِ الْمُنْفَعِلِ.

نَقْصُ **hypesthesia (= hyposthesia)**  
الْحِسِّ.

مُنَوَّمٌ. 1. عَامِلٌ يُولِدُ النَّوْمَ **hypnagogic**  
2. يَحْدُثُ قَبْلَ النَّوْمِ كَالْهَلَسِ الَّذِي يَحْدُثُ قَبْلَ النَّوْمِ  
أَوْ فِي بَدَنِهِ.

مُنَوَّمٌ. (ج: مُنَوَّمَاتٌ). عَامِلٌ **hypnagogue**  
يُولِدُ النَّوْمَ أَوْ النِّعَاسَ.

الْمُتَوَنِّمِي. الَمْ يَحْدُثُ أَثْنَاءَ النَّوْمِ. **hypnalgia**

نُومِي. مُتَعَلِّقٌ بِالنَّوْمِ أَوْ مُحَرِّضٌ لَهُ. **hypnic**

تَحْلِيلُ تَنَوُّيمِي. تَحْلِيلُ **hypnoanalysis**  
نَفْسِيٍّ بَعْدَ تَنَوُّيمِ الْمَرِيضِ.

تَخْدِيرُ تَنَوُّيمِي. **hypnoanesthesia**  
التَّخْدِيرُ بِوَسْطَةِ التَّنَوُّيمِ.

مُنَوَّمٌ. عَامِلٌ يَحْرُضُ عَلَى **hypnogenic**  
النَّوْمِ أَوْ حَالَةِ تَنَوُّيمِيَّةٍ.

مُنَوَّمٌ. **hypnogenous (= hypnogenic)**

شَبِيهُ التَّنَوُّيمِ. حَالَةٌ شَبِيهِةٌ بِالتَّنَوُّيمِ **hypnoid**  
أَوْ بِحَالَةِ التَّنَوُّيمِ.

سَبَخٌ؛ نَوْمٌ إِنْتِبَاطِيٌّ؛ تَغْفِيقٌ. **hypnolepsy**  
انْظُرْ **narcolepsy**.

**hypnopedi** تَعَلَّمَ نَوْمِي. التعلّم أثناء النوم  
كسماع التسجيلات الموسيقية وتعلّمها.

**hypnophobia** رُهابُ النَّوْم. الخوف غير  
الطبيعي من النوم.

**hypnosia** نَعَاسٌ مُسْتَحْكِم. نعاس شديد  
ومستمر ولا يمكن التحكم فيه.

**hypnosis** تَنْوِيم. حالة تتصف بتغيير وعي  
الشخص والتي يولدها لديه شخص أو أشخاص  
آخرون وتتصف بتركيز الانتباه والزيادة المفرطة  
في الاستجابة للإيحاءات والأوامر والإرشادات  
وتثبيط أي نكران لديه للمعتقدات وإيقاف قدرته  
على التحكم المنطقي الدقيق أو السيطرة على  
مداركه العامة والخاصة، وعلى قدرته في التحكم  
في حركاته وجعله يستجيب لما يوحى له من أفكار  
أو بما يؤمر بالقيام به من حركات بصورة لاإرادية.

**hypnotherapy** الْمُعَالَجَةُ بِالتَّنْوِيم. معالجة  
الأمراض بالتنويم.

**hypnotic** 1. مُنَوِّم 2. تَنْوِيمِي. دواء وعامل  
منوم أو ما يتعلق بالتنويم.

**hypnotism (= hypnosis)** تَنْوِيم إِيحَائِي.  
تنويم بالإيحاء.

**hypnotization** تَنْوِيم. عملية توليد التنويم  
لدى الشخص.

**hypnotize** نَوِّم. يقوم بعملية التنويم.

**hypoactive** قَاصِرُ النِّشَاط؛ خامل. شخص أو  
عضو قاصر النشاط.

**hypoactivity** قُصُورُ النِّشَاط. قصور نشاط  
وفعالية العضو أو إحدى الوظائف.

**hypoacusis** ضَعْفُ السَّمْع. قَلَّةُ السمع  
وضعفه أو وقره.

**hypoadrenalism** قُصُورُ الكُظُر. قصور  
فعالية الغدة الكظرية.

**hypoadrenocorticism** قُصُورُ قَشْرَةِ الكُظُر. قصور  
قلة إفراز قشرة الغدة الكظرية الشاذ أو المرضي  
كما في داء أديسون.

**hypoaffective** بَلِيدُ العَاطِفَةِ. ضعيف  
الشعور العاطفي.

**hypoalgesia (= hypalgesia)** نَقْصُ حِسِّ  
الألم.

**hypoboulia** ضَعْفُ الإِرَادَةِ. ضعف المحفزات  
والدوافع والإرادة.

**hypobulia (= hypoboulia)** ضَعْفُ  
الإِرَادَةِ.

**hypochondria (= hypochondriasis)**  
مُزَاق.

**hypochondriac** مَمرُوق. مريض مصاب  
بالمزاق.

**hypochondriacal (= hypochondriac)**  
مَمرُوق.

**hypochondriasis** مُزَاق. اضطراب عقلي  
يتصف بانشغال البال بالوظائف الجسمية والشك  
بإحساساته الطبيعية السوية كحس ضربات قلبه أو  
التعرق أو حركات أمعائه أو بآية اختلالات بسيطة  
في جسمه كالآلام البسيطة أو تورّم غدة ليفية  
والشك بأنها علامات أمراض خطيرة لديه وتحتاج  
إلى رعاية طبية خاصة ولن تنفع معه نصائح  
الاطباء وتطمينه على سلامته وإنما يزيده ذلك من  
الشك والإلحاح في طلب عناية طبية أكثر.

**hypocinesia (= hypokinesia)** نَقْصُ  
الحَرَكَ.

**hypodynamia** نَقْصُ القُوَّة. نقص قوة  
الجسم وديناميته.

**hypoequilibrium** نَقْصُ الحِسِّ لِلدَّوَار  
وللتوازن. نقص الحس للمنبهات التي تولد الدوار  
عادة أو نقص أو فقدان الاستجابة لتغيرات أوضاع  
الجسم وللتوازن والذي يتولد عن الحس بفقدان  
التوازن.

**hypoergasia** نَقْصُ التَّفَاعُلِيَّة؛ نَقْصُ النِّشَاط.  
القلة الشاذة للفعاليات الوظيفية.

**hypoergic** نَاقِصُ التَّفَاعُلِيَّة. شخص مصاب  
بقلة نشاطاته وضعف استجاباته للمنبهات.

**hypoergy** نَقْصُ التَّفَاعُلِيَّة. الضعف الشاذ  
في النشاط والاستجابة.

**hypoesthesia** نَقْصُ الحِسِّ. قَلَّةُ الشعور  
بالمنبهات.

- acoustic h. (= hypoacusis) ضَعْفُ السَّمْعِ.
- auditory h. (= hypoacusis) ضَعْفُ السَّمْعِ.
- gustatory h. (= hypogeusia) ضَعْفُ الذَّوْقِ.
- tactile h. (= hypopselaphesia) ضَعْفُ جِسِّ اللَّفْسِ.

**hypoaesthetic** نَاقِصُ الْجِسِّ. منسوب إلى ضعف الحس أو مصاب به.

**hypofunction** قُصُورٌ وَظِيفِي. قَلَّةُ الْوِظِيفَةِ وَضَعْفُهَا.

**hypogeusia, hypogeusesthesia** ضَعْفُ الذَّوْقِ. ضعف حس الذوق.

**hypohypnotic** خَفِيفُ النَّوْمِ. حالة النوم غير العميق.

**hypokinesia** نَقْصُ الْحَرَكَاتِ. حالة قَلَّةِ الْحَرَكَةِ أو ضعف الفعاليات الحركية.

**hypokinesis (= hypokinesia)** نَقْصُ الْحَرَكَاتِ.

**hypokinetic** نَاقِصُ الْحَرَكَاتِ. مصاب بقلّة الحركة أو بقصورها.

**hypomania** هَوَسٌ خَفِيفٌ. حالة شذوذ مزاجي شبيه بالهوس ولكنه أخف منه حدّة.

**hypomelancholia** سَوْدَاوِيَّةٌ خَفِيفَةٌ. حالة تشبه السوداوية ولكنها أخف منها.

**hypometria** قُصُورُ الْقِيَاسِ. حالة تتصف بقلّة الحركة العضلية التي لا تمكن العضو المحرك من الوصول إلى هدفه.

**hypomnesia** ضَعْفُ الذَّاكِرَةِ. ضعف الذاكرة الشاذ.

**hypomotility** نَقْصُ الْحَرَكَةِ. قَلَّةُ حَرَكَةِ أَى عَضْوٍ وَضَعْفُهَا.

**hypomyotonia** قَلَّةُ التَّوَثُّرِ الْعَضَلِيّ. قَلَّةُ وَنَقْصُ تَوَثُّرِ الْعَضَلَاتِ.

**hyponoia** بِلَادَةٌ عَقْلِيَّةٌ. تَلَبُّدُ الْفَعَالِيَّاتِ الْفِكْرِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ.

**hypopallescsthesia** نَقْصُ جِسِّ الْإِهْتِزَازِ. الضعف الشاذ بحس الاهتزاز.

**hypophonia** ضَعْفُ التَّصَوُّيْتِ. ضعف قدرة المريض على التصويت ويكاد أن يكون كلامه همساً.

**hypophrenia** تَخَلُّفٌ عَقْلِيّ. يشمل كل أنواعه، العته والبله والأفن.

**hypophyseal (= hypophysial)** نُخَامِيّ.

**hypophysectomy** اسْتِنْصَالُ النُّخَامِيَّةِ. استئصال الغدة النخامية.

**hypophysial** نُخَامِيّ. منسوب للجهاز البابي النخامي.

**hypophysiportal** بَابِيّ نُخَامِيّ. منسوب للجهاز البابي النخامي.

**hypophysioprivic** نَاقِصُ الْإِفْرَازِ النُّخَامِيّ. منسوب إلى نقص إفراز النخامى أو مصاب به.

**hypophysiotropic** نُخَامِيّ التَّوَجُّه. عامل يؤثر على فعالية الغدة النخامية.

**hypophysis** النُّخَامِيَّةُ. الغدة النخامية بقسميها العصبي والغدي.

- h. cerebri النُّخَامِيَّةُ. الغدة النخامية.

**hypophysitis** إِنْتِهَابُ النُّخَامِيَّةِ. التهاب الغدة النخامية.

**hypopituitarism** قُصُورُ النُّخَامِيَّةِ. قَلَّةُ أو توقّف وظائف النخامية الامامية بسبب مرضي أو لإزالتها جراحياً أو بتشقيتها.

**hypopotentia** نَقْصُ الْقُوَى. ضعف جهد الشخص أو ضعف الجهد والفعالية الكهربائية للدماغ.

**hypopraxia** نَقْصُ الْإِدَائِيَّةِ. نقص الفعالية الشاذ.

**hypoprosody** رَتَابَةُ الْكَلَامِ. الكلام الخالي من التباين في شدته أو نظمه أو نغمته والذي يجري بوتيرة واحدة.

**hypopselaphesia (= tactile hypoaesthesia)** ضَعْفُ جِسِّ اللَّفْسِ. نقص أو فتور حس اللمس.

**hyporeactive** ناقص التفاعلية. متصف بالضعف الشاذ في استجاباته للمنبهات.

**hyporeflexia** ضعف الإنعكاسية. ضعف المنعكسات.

**hyposensitive** ناقص التحسس. يتصف بالضعف الشاذ في إحساساته.

**hyposensitivity** نقص التحسس. الضعف الشاذ للتحسس بالمنبهات.

**hyposensitization (= desensitization)** إنقاص التحسس. إنقاص التحسس أو إزالته.

**hyposexuality** ضعف الرغبة الجنسية.

**hyposmia** ضعف الشم. ضعف حس الشم الشاذ.

**hyposomnia** أرق. انظر insomnia.

**hyposphresia (= hyposomia)** ضعف التشوؤ الجسمي.

**hyposthenia (= weakness)** ضعف؛ وهن.

**hypostheniant (= debilitant)** مُضعف.

**hyposthenic** ضعيف. شخص مصاب بالضعف.

**hyposympathicotonus** قصور التوتر الودي؛ تخاذل الودي. نقص توتر الجهاز العصبي الودي المستقل.

**hyposynergia** نقص التآزرية. ضعف التناسق العضلي.

**hypothalamic** وطياني. متعلق بالوطاء أو منسوب إليه.

**hypothalamotomy** بضع الوطاء. بضع الأقسام الخلفية الوحشية للوطاء في معالجة بعض الأمراض النفسية.

**hypothalamus** الوطاء. القسم البطني من الدماغ البيني الذي يكون قاع البطين الثالث وجزءاً من جداره الجانبي ويشمل تشريحياً الباحة أمام البصرية والسبيل البصري والتصالبة البصرية والأقسام الحلمية والحديدية الرمادية والقمع والنخامية العصبية. وتعتبر النخامية العصبية من

الناحية الفيزيولوجية مستقلة عنه وتقوم النوى الوطائية بالوظائف القشرية الدماغية البينية التي تنشط وتتحكم وتنسق الفعاليات المستقلة المحيطة وأنشطة الغدد الصماء والعديد من الوظائف الجسدية كتنظيم توازن الماء في الجسم ودرجة حرارته والنوم وتناول الغذاء وتطوير الخواص الجنسية الثانوية، كما يفرز الوطاء هرموني الأوسيتوسين والفازوبرسين والعديد من العوامل المحررة التي تتحكم في وظائف النخامية الغدية.

**hypothyria** بلادة الإنفعالات. قلة الإحساس والتوتر العاطفي.

**hypothyrmism** قصور التوتة. ضعف نشاط التوتة.

**hypothyroidism** قصور الدرقية. ضعف نشاط الغدة الدرقية.

**hypotonia** نقص التوتر. حالة نقص توتر العضلات الهيكلية ونقص مقاومتها للتمديد المنفعل.

**benign congenital h.** نقص التوتر الخلقي الحميد. حالة في الولدان تتصف بالضعف والترهل منذ ولادتهم وتنتج عن الضعف العضلي غير المترقي.

**h. oculi** نقص توتر المقلة. نقص الضغط داخل المقلة.


**hypotonic** ناقص التوتر. محلول ذو توتر أقل من توتر المحلول المعياري.

**hypsarrhythmia** لانظمية مفردة؛ اضطراب النظم المفرط. لانظمية مخطط كهربائية الدماغ الشاذة التي تشاهد أحياناً في الأطفال وتتصف بموجات عشوائية عالية الفولطية وبطيئة مع سفاة والتي تبدأ من عدة بؤر وتنتشر إلى كل باحات القشرة وتترافق مع نوبات تشنجية ورمع عضلي وغالباً ما تترافق مع التخلف العقلي.

**hepsicephaly (= oxycephaly)** تسنم الرأس.

**hypsokinesis** ترنح خلقي قياسي. ترنح المريض أو انحناؤه للخلف وسقوطه عند وقوفه الذي يشاهد في حالات الشلل الرعاشي ومتلازمة الرعاش العضلي.

**hysteralgia (= metralgia)** ألم الرجم.



#### hypothalamus

الاتصالات الواردة والصادرة إلى الوطاء: (1) البصلة الشمعية (2) السبيل البصري النخامي العلوي (3) السبيل الأحنوبي النخامي (4) اللاودي القحفي (5) الودي (6) عصب وربي (7) عقدة بين الفقرات (8) فرع أبيض (9) فرع سنجابي (10) سلسلة العقد الودية (11) اللاودي العجزي (12) النخاع العجزي (الشدف 4-2) (13) النخاع الصدري (الشدف 12-1) (14) النواة الظهرية للعصب المبهم (15) نواة العصب الوجهي (16) الحزمة الطولانية الظهرية (17) السبيل الحلمي المهادي (18) من الحصين (19) القيو.

**hysteria** هِسْتِيرِيَا؛ هُرَاع. 1. مرض يصيب النساء غالباً ويتصف بشكاوى جسدية متعددة من دون أن تكون لها أسباب مرضية جسدية وتترافق عادة بأعراض محاكية للأعراض العصبية كالعرة والشرد والشلل وعدم الحركة وانعدام الصوت أو النساوة 2. عصاب هستيري.

**- anxiety h.** هِسْتِيرِيَا القَلَق. اضطراب رهابي يتصف برهاب معين من دون سبب ظاهر ويؤدي إلى تجنب كل الحالات التي قد يوجد فيها أي أثر للعامل الرهابي ويسيطر هذا الخوف على كل حياة العصاب وفعالياته.

**- conversion h.** هِسْتِيرِيَا تحويلية. اضطراب يتصف بأعراض من دون وجود أي مرض عضوي مسبب لها ومن الممكن أن يشمل أعراضاً حسية أو حركية أو حشوية كالشلل أو العرة أو العذل أو التقيؤ أو النساوة أو الشرد أو تضاعف الشخصية أو فقدانها.

**- convulsive h.** هِسْتِيرِيَا إختلاجية. هستيريا تحويلية تكون فيها نوبات شبه صرعية كابرز عرض من أعراضها.

**- dissociative h.** هِسْتِيرِيَا تفارقية. هستيريا تتصف بالنساوة وفقدان الشخصية وعدم معرفتها.

**- fixation h.** هِسْتِيرِيَا التَثَبُّث. هستيريا تركز فيها الأعراض على مرض عضوي معين كاستمرار السعال العصبي بعد الإصابة بالشاموق

**- grand h. (= major h.)** الهِسْتِيرِيَا الكَبِيرَة.

**- major h.** الهِسْتِيرِيَا الكَبِيرَة. هستيريا تتصف بنوبات شبيهة بالصرع مع عرض عاطفي مثير.

**- minor h.** الهِسْتِيرِيَا الصَّغِيرَة. نوع من الهستيريا التحويلية التي يحتفظ فيها المريض بوعيه أثناء نوبات الاختلاج.

**- monosymptomatic h.** هِسْتِيرِيَا أَحَادِيَّةُ العَرَض. هستيريا تتصف بعرض واحد كالصرع مثلاً من دون أية أعراض عقلية.

**- traumatic h.** هِسْتِيرِيَا رَضِيَّة. هستيريا تحويلية تظهر بعد إحدى الإصابات الجسمية.

**hysteric** هِسْتِيرِي؛ مُهْسِتِر. متعلق بالهستيريا أو مصاب بها.

**hysterics** هَسْتَرَة؛ هِسْتِيرِيَّة. مصطلح يطلق على نوبات الانفجار العاطفي الشديد.

**hysterodynia (= metrodynia)** وَجَعُ الرِّجَم.

**hysteroepilepsy** هِسْتِيرِيَا صَرْعِيَّة. نوبات هستيرية تشابه نوبات الصرع.



# I

1. **عِلَاجِيّ 2. تَطْبِيبِيّ.** iatric -

1. منسوب للدواء 2. منسوب للطبيب.

**عِلَاجِيّ الْمُنْشَأُ: تَطْبِيبِيّ الْمُنْشَأُ.** iatrogenic

ما يتولد عن العلاج الطبي للمريض.

**نَشْبِيّ: نَوْبِيّ.** ictal منسوب إلى النوبة أو يتصف

بها أو ناتج عنها أو نوبة الصرع.

**فِكْرَة.** idea صورة عقلية دماغية.

**فِكْرَة أَصِيلَة: فِكْرَة ذَاتِيَّة.** - autochthonous i.

الْمُنْشَأُ. فِكْرَة مُثَابِرَة تنبع من لاوعي الشخص تظهر

له كأنها غرست فيه من مصدر خارجي.

**فِكْرَة إِجْبَارِيَّة.** - compulsive i. فِكْرَة تقتحم

فكر الشخص وتعاوده وتثبت فيه بالرغم من إرادته

وبالرغم من معرفته بأسبابها وقد تجبره أحياناً على

القيام بأعمال غير مرغوبة.

**فِكْرَة سَائِذَة.** - dominant i. فِكْرَة مرضية شاذة

تتحكم في كل أفعال المصاب وأفكاره.

**فِكْرَة ثَابِتَة.** - fixed i. فِكْرَة ملازمة للشخص تلون

كل أفعاله وتتحكم فيها، ولا يمكنه تغييرها حتى عند

معرفته بأسبابها.

**فِكْرَة** - imperative i. (= compulsive i.)

مُسْتَحْوَذَة: فِكْرَة قَهْرِيَّة: وسواس.

**فِكْرَة مُسْتَحْوَذَة: فِكْرَة مُقَحَّمَة.** - obtrusive i. فِكْرَة

وسواسية تعاود إقحام نفسها باستمرار في تفكير

الشخص بالرغم من معرفته بعدم صلاحيتها وعدم

انسجامها مع نفسيته.

**فِكْرَة مَرْجِعِيَّة.** - i. of reference, referential i. فِكْرَة

افتراض الشخص بأن أقوال وأفعال الآخرين تتعرض

له. أو أن جميع الأحداث الخارجية في محيطه تعود

عليه بالشر والضرر كالمطر أو الرعد مما يؤدي به بالشعور بأنها كلها موجهة ضده.

**مِثَالِيّ.** ideal معيار الكمال الذي يتمناه الشخص ويسعى لتحقيقه.

**مِثَالِيَّةُ الذَّات.** - ego i. الصورة التي يتمنى الشخص

تحقيقها لذاته والتي يسعى للوصول إليها غالباً ما

يضع نصب عينيه شخصية - وغالباً ما تكون احد

والديه - يعتقد ما مثالية ويحاول تقليدها.

**إِفْتِكَار.** ideation تكوين الأفكار والمفاهيم.

**إِفْتِكَارِيّ.** ideational منسوب للافتكار أو مولد عنه.

1. **إِسْتِعْرَاف 2. تَغْيِينُ** identification

الهُوِيَّة. عملية دفاعية لا واعية ينمط الشخص فيها

نفسه بنمط شخص آخر.

**هُوِيَّة.** identity مجموعة الصفات التي تعرف

الشخص بنفسه والتي يتعرف الآخرون عليه

بواسطتها.

**هُوِيَّةُ الذَّات.** - ego i. الشعور بوحدة الذات وتكامل

شخصيتها.

**هُوِيَّةُ الْجِنْس.** - gender i. إدراك الشخص ومعرفته

بجنسه فيما إذا كان ذكراً أم أنثى وذلك بمعرفة

خواصه الجنسية ومعاملة الآخرين له.

**فِكْرِيّ الْمُنْشَأُ.** ideogenetic متعلق بالفعاليات

العقلية والفكرية ومولد بتأثيرها.

**حَرَكَِيّ فِكْرِيّ (= ideomotor)** ideokinetic

التَحْفِيز.

**حَرَكَة فِكْرِيَّةُ التَّحْفِيز.** ideomotion حركة

عضلية لا إرادية ولا انعكاسية ولكنها محرّضة بفكرة

سائدة.

**ideomotor** حَرَكَيْ فِكْرِي التَّخْفِيز. متعلق بحركة لإرادية تحفزها فكرة سائدة.

**ideomuscular** عَضَلِيْ فِكْرِي التَّخْفِيز. توليد حركة عضلية لإرادية بتأثير فكرة أو هلاس.

**ideophobia** رُهَابُ التَّفْكِير. الخوف المرضي من الأفكار أو من التفكير.

**ideophrenia (= delirium)** هَذْيَان.

**idiocy** عَقَّة. تخلف عقلي شديد يقل فيه حاصل الذكاء عن 25.

عَقَّة مُطْلَق. **- absolute i. (= profound i.)** عته شديد.

عَقَّة كُمْنِي. **- amaurotic i.** اسم لأنواع من امراض اختزان الشحوم ويكون النوع الخلقي منه مميّتا بعد حوالي الشهر الواحد من الولادة أما النوع الذي يصيب الاطفال فهو مرض تاي ساكس والنوع الذي يصيب الاحداث يظهر حوالي سن العاشرة ويؤدي إلى الموت هند البلوغ. وهي كلها اضطرابات تنكسية عصبية.

كَنَع. **- athetotic i. (= athetosis)**

عَقَّة صَغِيرُ **- Aztec i. (= microcephalic i.)** الرأس.

عَقَّة فُذْمَانِي. فدامة مع تخلف عقلي **- cretinoid i.** شديد.

عَقَّة مَقُولِي. **- Kalmuk i. (= mongolian i.)**

عَقَّة صَغِيرُ الرَّأْس. **- microcephalic i.** تخلف عقلي وخيم مع صغر الرأس.

عَقَّة مَقُولِي. تخلف عقلي شديد **- mongolian i.** يرافق متلازمة داون.

عَقَّة تَصَرُفِي؛ عَقَّة أَخْلَاقِي. سوء **- moral i.** الاخلاق والتصرف الشديدين من دون تخلف عقلي.

عَقَّة وَخِيم. تخلف عقلي شديد. **- profound i.**

عَقَّة كُمْنِي **- spastic amaurotic axonal i. (= infantile neuroaxonal dystrophy)**

مُخَوَارِي تَشْنُجِي؛ حَتْلُ مُحَوَارِي عَصْبِي طُفُولِي.

تَلْفُظٌ مُعِيب؛ غَضْفُضَة. تلفظ **idioglossia** ناقص غير مفهوم.

تَنْوِيمٌ ذَاتِي. تنويم محرّض **idihypnotism** ذاتياً.

مَعْتَوَة أَيْلَه. مصاب بتخلف **idio-imbecile** عقلي بين البله والعتة.

لُغَة ذَاتِيَّة. النطق بكلمات خاصة **idiolalia** يضعها الشخص نفسه ولا يفهمها غيره.

نُطْقٌ ذَاتِي الْمَعَانِي. التلغظ بكلمات **idiologism** غير مفهومة إلا للمتكلم نفسه.

عَضَلِي تَلْقَانِي. حالة عضلية **idiomuscular** ذاتية من دون أي تأثير عصبي عليها وتحصل عادة في العضلات المتنكسة فقط.

مُتَعَكِّسٌ ذَاتِي الْإِحْدَاث. منعكس في **idioreflex** أحد الأعضاء يتولد عن سبب من داخل العضو نفسه.

تَشْنُجٌ مُوَضَّع. تشنج في منطقة **idiospasm** محدودة.

مَعْتَوَة. مصاب بالعتة. **idiot**

مَعْتَوَة عَالِم. شخص شديد **- i.-savant** التخلف العقلي في الكثير من النواحي وبالرغم من ذلك يمتلك ملكات عقلية معينة ممتازة جداً في بعض النواحي كالذاكرة الحادة أو القدرة على حل المسائل الرياضية أو المهارة الموسيقية.

ذاتي التغذية. من يتمكن من اختيار **idiotrophic** غذائه بنفسه.

أُنَانِي؛ **idiotropic (= egocentric)** ذَاتِي التَّرْكِيز.

مَرَضٌ عَاطِفِي. يطلق **illness, emotional** على المرض النفسي غير العضوي.

**illness, mental (= mental disorder)** مَرَضٌ نَفْسِي.

**illness, psychosomatic (= psychosomatic disorder)** مَرَضٌ نَفْسِي جَسَدِي.


اِنْخِدَاع. انطباع حسي خاطيء أو **illusion** سوء تفسير للمنبهات الحسية الحقيقية.

اِنْخِدَاعِي. متعلق بالانخداع أو **illusional** متصف به.

صَوْرَة. رسم أو إدراك شبيه بالاحساس **image** بجسم أو بمادة حقيقية.

صَوْرَة الْجِسْم. الصورة المجسمة التي **- body i.**

- مفاجئة 2. الدفعة أو النبضة العصبية.  
 دَفْعَةٌ عَصَبِيَّةٌ. العملية nerve i.(=neural i.)  
 الكهركيميائية التي تنتقل على طول الالياف العصبية.
- إِنْدِفَاع. الطاعة العمياء للدوافع  
 impulsions  
 الداخلية من دون أي اعتبار لقبولها من قبل الآخرين  
 من دون أي اعتبار لقبولها من قبل الآخرين أو  
 الذات النفسية وتشاهد عند الأطفال أو عند البالغين  
 ضعيفي الحالات النفسية.
- بَطُلٌ؛ عَطْلٌ. يعطل فعالية  
 inactivate  
 العضو أو فعالية عامل آخر كالدواء مثلاً.
- قُصُور؛ عَدَمُ الْكِفَايَةِ. حالة  
 inadequacy  
 أو صفة الشخص القاصر أو غير الكفوء.
- عَرِيْمُ الْكِفَايَةِ؛ غَيْرُ كَافٍ.  
 inadequate  
 1. ناقص النضوج النفسي أو الاجتماعي ولا يتمكن  
 من التلاؤم مع مجتمعه 2. عامل قاصر عن تنفيذ  
 وظيفة أو عملية معينة.
1. انْعِدَامُ الشَّهْيَةِ 2. انْعِدَامُ  
 inappetence  
 المُبَادَرَةِ. 1. انعدام الشهية للطعام 2. انعدام  
 الرغبة في العمل أو في القيام بأية وظيفة فكرية أو  
 جسدية.
- عَرِيْمُ الثَّقَنِي. عديم الجسم الثفني  
 incallosal  
 والذي يتصف عادة بالتخلف العقلي.
- غَشِيَانُ الْمَحَارِم. الاتصال الجنسي  
 incest  
 مع من تحرّم الشرائع أو التقاليد الاجتماعية الزواج  
 منهم من ذوي القربى.
- ثُلْمَةٌ. (ج: ثُلَم). قطع أو تثلم أو  
 incisura  
 انخساف على حافة العظم أو أية بنية عصبية أو  
 غيرها.
- الثَّلْمَةُ الْمُخَيَّيَةُ  
 i. verbelli anterior  
 الأمامية. ثلمة واسعة على السطح الأمامي للمخيخ  
 تحتها الأكمة السفلية والسويقة المخيخية العلوية.
- الثَّلْمَةُ الْمُخَيَّيَةُ  
 i. cerebelli posterior  
 الخلفية. ثلمة بين نصفي كرة المخيخ على وجهه  
 الخلفي تحوي منجل المخيخ.
- الثَّلْمَةُ الْأَوْجِيَّة. أخدود مستعرض  
 i. fastigii  
 على السطح البطني للصفحة المخيخية للمخيخ  
 الجنيني المتنامي.
- يدركها الشخص لجسمه والتي تسجل في قشرة مخه  
 بإدراك الأوضاع المختلفة والمتغيرة دوماً لجسمه.  
 - eidetic i. صُورَةٌ تَذَكُّرِيَّةٌ. إبصار صوري دقيق  
 لأجسام أو أحداث سبق رؤيتها في الماضي.
- memory i. جِسْمٌ تَذَكُّرِيٌّ. صورة حسية  
 يتذكرها الشخص لإحساسات سابقة.
- mental i. صُورَةٌ فِكْرِيَّةٌ. إدراك فكري  
 لأجسام أو لمادة كما تصورها الحواس.
- motor i. صُورَةٌ حَرَكِيَّةٌ. النموذج الدماغي  
 المنسق لحركات الجسم المحتملة.
- sensory i. صُورَةٌ حِسِّيَّةٌ. صورة منسقة تتكون  
 في الدماغ بواسطة إحدى الحواس أو عدة حواس  
 مشتركة.
- عدم التوازن. 1. عدم المقدرة  
 imbalance  
 على المحافظة على التوازن عند الوقوف 2. عدم  
 التوازن بين العضلات.
- عدم التوازن المُسْتَقْلِي.  
 - autonomic i.  
 1. رنج مستقل 2. أي اضطراب للجهاز العصبي  
 المستقل.
- عدم التوازن (=vagotonia)  
 - sympathetic i.  
 الوُدِّي؛ غَلَبَةُ الْمُبْهِم.
- عدم التوازن الْوَعَائِي الْحَرَكِي.  
 - vasomotor i.  
 اضطراب الجهاز العصبي المستقل المحرك للأوعية.
- أَبْلَهٌ. شخص مصاب بالبله.  
 imbecile
- الْبَلَهَةُ. تخلف عقلي متوسط أو  
 imbecility  
 شديد يكون حاصل الذكاء فيه بين 25-49
- بَلَهَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ. (=moral insanity)  
 - moral i.  
 إِمْبِيْرَامِيْن. دواء مضاد للاكتئاب
- impiramine  
 ويستعمل أيضاً في بول الفراش عند الأطفال.
- غَرْسُ الْعَصَب. عملية  
 implantation, nerve  
 غرس جزء من عصب في محفظة عصب آخر  
 متنكس.
- انطباع. تأثير تولده المنبهات  
 impression  
 أو العوامل الخارجية على الفكر والجسم والحواس.
- انطباعٌ قَاعِدِيّ؛  
 impression, basilar  
 تسطح القاعدة. أنظر platybasia
- دَفْعَةٌ. (ج: دفعات). 1. دفعة شديدة  
 impulse



Impulse, nerve

الدفعات العصبية التي تتولد في الليف العصبي عند تنبيهه بمنبهات ذات شدة مختلفة (من 1.0 إلى 0.0001). ويمثل انقطاع الخط الأبيض الفترة التي وضع فيها التنبيه. كما يلاحظ أن فترة الكمون تزداد طولاً عند تناقص شدة التنبيه. ويلاحظ أيضاً أن المنبه إذا الشدة (0.001) هو أضعف منه يولد الاستجابة ولذلك يسمى المنبه الأصغري. وتمثل الخطوط البيضاء المتقطعة في أسفل كل تسجيل فترة (0.2) الثانية.

- **الثَّلْعَةُ الجَبْهِيَّةُ.** ثلعة في الحافة فوق **i. frontalis** الحجاجية للعظم الجبهي تتمحور أحياناً إلى شكل ثقبية يمر من خلالها العصب والأوعية فوق الجبهية.

- **الثَّلْعَةُ أَمَامَ القَذَالِيَّةِ.** ثلعة **i. preoccipitalis** بالقرب من النهاية الخلفية للحافة السفلية الوحشية لنصف كرة المخ وهناك خط يوصلها بالشق الجداري القذالي يحدد الفصين الصدغي والجداري عن الفص القذالي.

- **الثَّلْعَةُ الصَّدْغِيَّةُ.** شق صغير بين **i. temporalls** معقف التليف جنب الحصين وقمة الفص الصدغي.

- **ثُلْعَةُ الحَيَمَةِ المُخَيَّخِيَّةِ.** **i. tentorii cerebelli** فتحة في القسم الأمامي من المخيخ مكونة من الحافة الأمامية الحرة للخيمة والسرَج الظهري للوتدي ويحتلها بصورة رئيسية الدماغ المتوسط والقسم الأمامي

للسطح العلوي لدودة المخيخ.

سَلْسُ. عدم المقدرة على **incontinence** التحكم في الإفراغ، كإفراغ البول أو البراز.

- **fecal i.** سَلْسُ البراز. عدم السيطرة على عضلات المصرّة الشرجية مما يولد إفراغ البراز والغازات بصورة لاإرادية.

- **intermittent i.** سَلْسُ مُتَقَطِّع. فقدان التحكم في إفراغ البول عند الحركة المفاجئة أو عند الضغط على المثانة بسبب قطع السبيل الإرادي للتبول فوق المركز القطني.

- **overflow i.** سَلْسُ المَفْضُض. سلس البول بسبب ضغط البول المتبقي في المثانة بعد انقباضها الأقصى.

- **paradoxical i. (=overflow i.)** سَلْسُ مُتَنَاقِض. سلس البول بسبب

- **paralytic i.** سَلَسٌ شَلَلِيّ. سلس البراز والبول  
بسبب شلل المصبرات الشرجية والمثانية والناجم عن  
آفة المراكز القطنية.

- **passive i.** سَلَسٌ لَا فاعِل. سلس البول عندما  
تكون المثانة ممتلئة ولا يمكنها إفراغ بولها بالطريقة  
الطبيعية ولكن البول يتقاطر بمجرد الضغط على  
المثانة.

- **rectal i. (=fecal i.)** سَلَسُ الْبِرَازِ. المصاب بسلس البول

- **urinary i.** سَلَسُ الْبُولِ. فشل التحكم السوي  
بالمصبرات المثانية والإحليلية مما يؤدي إلى تقاطر  
البول اللاإرادي المستمر.

**incontinent** مَسْلُوسٌ. المصاب بسلس البول  
أو البراز.

**incontinentia (=incontinence)** سَلَسٌ.

**incoordination** لَا تَنَاسُقٌ. عدم أو قلة  
إحكام الحركات العضلية أو فشل الأعضاء من العمل  
المنسق.

**incus** السُّنْدَانُ. العظيمة الوسطى بين عظيما  
الأذن الوسطى الثلاث.

**index** 1. مَنَسَّبٌ. (ج: مَنَاسِب) 2. السَّنَابَةُ.  
1. كمية غير محددة عادة هي النسبة بين كميتين  
مقيستين ومضروبة بمئة (100). 2. إصبع الكف  
الثاني المجاور للإبهام.

- **cephalic i.** الْمَنَسَّبُ الرَّأْسِيّ. مئة مرة لأعظم  
عرض للرأس مقسومة على أعظم طول له.

- **cephalo- orbital i.** الْمَنَسَّبُ الرَّأْسِيّ الْحَاجَاجِيّ. مئة مرة لأعظم سعة  
للحف مقسومة على سعة  
الحجاجين.

- **cephalospinal i.** الْمَنَسَّبُ الرَّأْسِيّ الْخُخَاعِيّ. نسبة مساحة الثقبة العظمى بالامتار المربعة إلى سعة  
الجوف القحفي بالسنتيمترات المكعبة.

- **cerebral i.** الْمَنَسَّبُ الدِّمَاغِيّ. نسبة أعظم عرض  
لتجويف القحف إلى أعظم قطر أمامي خلفي له.

- **cerebrospinal i.** الْمَنَسَّبُ الدِّمَاغِيّ الْخُخَاعِيّ. الرقم الذي نحصل عليه عند ضرب الضغط الدماغي  
الخخاعي الأخير بكمية السائل المسحوب في عملية بزل  
النخاع وقسمته بعد ذلك على ضغطه الأولي.

- **cranial i.** الْمَنَسَّبُ الْقُحْفِيّ. أكبر عرض للقحف  
مضروباً بمئة ومقسوماً على طوله.

**indifference, belle** سَدَرٌ جَمِيلٌ. عدم مبالاة  
المريض وعدم اهتمامه بأعراضه أو بإعاقته  
ويشاهد ذلك في بعض أنواع الهستيريا.

**indolent** 1. قَلِيلُ الْإِيْلَامِ 2. بَطِيءُ النُّمُو.  
1. يولد قليلاً من الألم أو لا يولد ألماً بالمرّة.  
2. بطيء النمو كالورم البطيء.

**induction of anesthesia** تحريض التخدير.  
في التبخير الاستنشاق، هي الفترة من بدء التخدير  
حتى مرحلة التخدير الجراحي الكامل.

**infantilism** الطَّفَالَةُ. حالة تتصف بدوام  
صفات وخواص الطفولة لدى البالغين وتتصف  
بالتخلف العقلي وقصور تنامي الأعضاء التناسلية  
وغالباً، ولكن ليس دائماً، بالقزامة.

- **Brissaud's i. (=infantile myxedema)** طِفَالَةُ  
بَرِيْسَاوْد: الْوُدْمَةُ الطِّفْلِيَّةُ الْمُخَاطِطِيَّةُ.

- **cachetic i.** طِفَالَةُ دَنَفِيَّةٍ. طِفَالَةٌ تَتَوَلَدُ مِنْ  
العدوى أو التسمم المزمن.

- **dysthyroidal i.** طِفَالَةُ إِغْتِلَالِ الدَّرَقِيَّةِ.  
طِفَالَةٌ تَتَوَلَدُ عَنْ عَيْبٍ فِي وَظَائِفِ الْغَدَةِ الدَّرَقِيَّةِ.

- **hypophysial i.** طِفَالَةُ نُخَامِيَّةٍ. طِفَالَةٌ تَتَوَلَدُ  
عَنْ قَلَّةِ إِفْرَازِ هَرْمُونَاتِ النُّمُو وَمُوجِبَةً الْغَدَّةَ التَّنَاسَلِيَّةَ  
التي تفرزها النخامية الغدية.

- **sexual i.** طِفَالَةُ جَنْسِيَّةٍ. تخلف التطور الجنسي  
كالذي يحدث في الحثل الشحمي التناسلي.

- **universal i.** طِفَالَةٌ عَامَّةٌ. طِفَالَةٌ مَعَ قَزَامَةٍ عَامَةٍ  
وغياب الصفات الجنسية الثانوية.

**infarction** إِخْتِشَاءٌ. توليد الاحتشاء أو  
الاحتشاء نفسه والذي يعني منطقة نخر تخثري في  
النسيج بسبب إقفاره الذي يتولد عن انسداد دورته  
الدموية وغالباً ما يكون بسبب خثرة أو صمّة في  
الأوعية.

- **cerebral i.** إِخْتِشَاءٌ دِمَاقِيّ. حالة إقفار دماغي  
تولد عيباً عصبياً مزمناً في مواضع توزيع أحد شرايين  
الدماغ.

**infection** عَدْوِيّ. مهاجمة الجراثيم للجسم  
وتكاثرها في أنسجته ومن الممكن أن تبقى العدوى  
متوضعة أو تنتشر إلى باقي أنحاء الجسم.

**infecundity** عَقْم. عدم الإلقاح.

**inferiority, psychopathic (=antisocial personality)** شخصية معتلة اجتماعياً؛ شخصية لا اجتماعية.

**infiltration, paraneural (=paraneural anesthesia)** إزْتِشَاح حَوْل الْعَصَب.

**inflammation** إلتِهَاب. استجابة موضعية وقائية تولدها إصابات الأنسجة أو تخريبها وتستهدف القضاء على العامل المخرب أو تحديده أو عزله مع الأنسجة المخربة. ويتصف عادة بالالتهاب والإحمرار والحرارة والتورم وفقدان أو تقليل وظيفة العضو أو النسيج المصاب.

**infrapsychic** تحت مستوى الشعور؛ لاشعوري. تلقائي دون الوعي النفسي.

**infundibuloma** وَرَمُ الْقَمْع. ورم قمع الوطاء.

**infundibulum** قَمْع. بنية بشكل ممر قمعي الشكل. ويستعمل الاصطلاح بمفرده للدلالة على قمع الوطاء المكون من البارزة الناصفة وساق القمع.

**I. hypothalami** قَمْعُ الْوُطَاء. كتلة قمعية الشكل أمام الحدة الرمامية تمتد إلى النخامى العصبية وتسمى أيضاً سويقة النخامى.

**inheritance** وَرَاثَة. اكتساب الصفات والخواص بانتقالها من الآباء للأبناء.

**inhibition** تَنْبِيْط. 1. إيقاف أو تأخير. 2. في التحليل النفسي هو الامتناع الواعي أو اللاشعوري للدرجات أو للدوافع.

**- antldromic i. (=recurrent i.)** تثبيط معاكس للمسيرة؛ تَنْبِيْطٌ رَاجِع.

**- associative i.** تَنْبِيْطٌ تَرَابُطِي. 1. حصر أو إضعاف ترابط نفسي أو وظيفي ثابت بتوليد ترابط جديد يترايط مع الترابط القديم. 2. مقاومة توليد أي ترابط جديد يحل محل ترابط قديم راسخ.

**- autogenous i.** تَنْبِيْطٌ ذَاتِي الْمَنْشَأ. تثبيط انعكاسي يحدث عند نقطة التنبيه.

**- central i.** تَنْبِيْطٌ مَرْكَزِي. تثبيط تنبيه العصبونات الذي يتم في داخل الجهاز العصبي المركزي.

**- end-product i.** تَنْبِيْطٌ بِالْمَحْصُولِ الْنِهَائِي. تثبيط الفعالية بالمحصول النهائي الذي تولده وهو تثبيط بالتغذية الراجعة (الارتجاع).

**- feedback i.** تَنْبِيْطٌ بِالْأَرْتِجَاع. تثبيط بالتغذية الراجعة. تثبيط العمليات الأولية للفعالية بالمحصول النهائي الذي تولده.

**- proactive i.** تَنْبِيْطٌ بِالْأَثَرِ الرَّجْعِي. تثبيط تثبيت التعلم الحديث بتأثير التعلم القديم.

**- reciprocal i.** تَنْبِيْطٌ مُتَبَادِل. تثبيط مجموعة من العضلات بتنبيه العضلات الضادة لها وهذه خاصية تتولد عن التعصيب المتبادل للعضلات.

**- retroactive i.** تَنْبِيْطٌ الْبَكْرِي الرَّجْعِي. تثبيط التعليم الحديث لذكرى التعلم القديم.

**- Wedensky i.** تَنْبِيْطٌ وَدَنْسْكِي. حصر جزئي للتوصيل في العصب يمكنه توصيل النبضات بطيئة التردد من دون تمكنه توصيل النبضات سريعة التردد.

**iniencephaly** إِنْقِدَالُ الدُّمَاغ. عيب خلقي يتصف بضخامة الثقبية العظمى وغياب التواءات الصفيحية والشوكية للفقرات العنقية والصدرية وأحياناً القطنية أيضاً مع نقص عدد الفقرات واندغامها الشاذ وبذلك يحتل الدماغ والقسم الأكبر من النخاع الشوكي تجويفاً واحداً كبيراً مشتركاً بينهما.

1. حَقْنٌ. 2. إِحْتِقَان. 1. إدخال سائل بالضغط إلى الأنسجة أو الأوعية. 2. امتلاء أو تجمع مفرط للدم في أحد الأنسجة أو الأعضاء.


**injury** إَصَابَة. ضرر أو تخريب لأحد الأنسجة أو الأعضاء وغالباً ما يطلق على الضرر المولد من تأثير خارجي.

**innate (= 1. hereditary 2. inborn)** 1. مُتَأَصِّل؛ مَوْزُوْث. 2. وِلَادِي؛ خَلْقِي.

**innervation** تَعْصِيْب. 1. توزيع ونشر الأعصاب في أحد أعضاء الجسم أو في أحد أقسامه


2. تجهيز أحد أقسام الجسم بالطاقة العصبية أو بالمنبه العصبي.

1. double - تفصيص مزدوج. تعصيب أحد أقسام الجسم بنوعين من الأعصاب مثل الأعصاب الودية واللاودية أو المستقلة والجسدية.



Innervation

التعصيب الحسي لجلد الأطراف العلوية: (1) فوق الترقوي (2) الإبطي (3) العصب العضدي الجذلي الخلفي (فرع من العصب الكعبري) (4) العصب العضدي الجذلي السفلي الوحشي (فرع من العصب الكعبري) (5) العصب الوربي العضدي والعصب العضدي الجذلي الإنسي (6) العصب الساعدي الجذلي الإنسي (7) العصب الساعدي الجذلي (فرع من الكعبري) (8) العصب الساعدي الجذلي الوحشي (نهاية العصب العضلي الجذلي) (9) العصب الكعبري (الفرع السطحي) (10) العصب الزندي (11) العصب الناصف.



## Innervation

التغذية العصبية «المسقط» على عظام اليد للأعصاب الحسية: (1) منظر خلفي (ب) منظر أمامي (1) العصب الزندي (باللون الأزرق) (2) العصب الناصف (باللون الأحمر) (3) العصب الكعبري (باللون الأخضر)

- **multiple i.** تَغْصِيبٌ مُتَعَدِّدٌ. وجود أكثر من صفيحة انتهائية حركية واحدة على أحد الألياف العضلية.
- **pleurisegmental i.** تَغْصِيبٌ مُتَعَدِّدُ الشُدُفَاتِ. تعصيب إحدى البنيات الجسمية أو الأعضاء بالألياف عصبية مستعدة من عدة شُدُفات من النخاع الشوكي.
- **polyneuronal i.** تَغْصِيبٌ مُتَعَدِّدُ العَصَبُونَاتِ. تعصب الألياف العضلية بأكثر من عصبون واحد كما هو الحال في الكثير منها وفي الياف داخل المغزل.
- **reciprocal i.** تَغْصِيبٌ مُتَبَادِلٌ. تعصيب العضلات الموجودة حول أحد المفاصل بالألياف حركية بترتيب زوجي بحيث يؤدي تنبيه أحدهما إلى تثبيط العصب الثاني.
- **inoccipitia** إِنْعِدَامُ الْفَصِّ الْقَذَالِيِّ. عدم تَكُونِ الْفَصِّ الْقَذَالِيِّ لِلدِّمَاغِ أو نقص في تَكُونِهِ.
- **inoglia (= fibroglia)** دِبْقٌ لِيَفِي.
- **inomyositis (= fibromyositis)** إِنْهَابٌ



- عَضَلِي لِيَفِي.**  
**insane** مَجْنُون. مختل عقلياً.  
**insanity** جُنُون. اختلال عقلي وعادة ما يستعمل للدلالة على عدم مسؤولية المصاب عن تصرفاته حتى عندما تكون جنائية.  
**- acute confusional i.** جُنُون تَخْلِيطِي حَادٍ. هذيان يتصف ببداية حادة ويترافق مع النسابة القصيرة المدى والتوهان.  
**- impulsive i.** جُنُون إِنْدَفَاعِي. رغبة جامحة للتصرف والعمل الاعتدائي.  
**- moral i.** جُنُون أَخْلَاقِي. جنون يتصف بفقدان القيم والتصرفات الأخلاقية.  
**- i. of negation** جُنُون الْإِنْكَار. جنون يتصف بتوهم انعدامي كتوهم المصاب بعدم وجود جسم له.  
**- senile i. (= senile dementia)** خَرَفٌ شَيْخُوخِي.  
**insenescence** تعمير: إِنْشِيَاخ. عملية التقدم في العمر.  
**insensible** لَامَحْسُوس؛ غَيْر حَسَّاس.  
 1. ما لا يحس أو يدرك بالحواس 2. فاقد الوعي أو الحواس.  
**insertion** مَفْرُز؛ غُرْز. موقع ارتكاز واتصال العضلة في العظم أو في جزء الجسم الذي يحركه.  
**insheathed** مُتَغَمَّد. بنية محاطة بغمد كالليف العصبي، مثلاً.  
**insight** الْبَصِيرَةُ. في الطب النفسي، هي معرفة المريض بأن شكواه وأعراض مرضه ناتجة عن اضطراب أو شذوذ مرضي مع معرفته بأسباب ذلك وعواقبه.  
**insomnia** أَرْقٌ. 1. عدم المقدرة على النوم 2. سهاد شاذ.  
**insomniac** مُؤَرَّق. شخص مصاب بالارق.  
**insomnic** أَرْقِي؛ مُؤَرَّق. يتصف بالارق أو مصاب به.  
**instinct** غَرِيْزَة؛ فِطْرَة. مجموعة من الاستجابات الأصلية غير المتعلمة أو المكتسبة من المحيط تتصف بها بعض الأجناس وتكون خاصة
- aggressive i. (= death i.)** غَرِيْزَة الْمَوْت.  
**- death i.** غَرِيْزَة الْمَوْت. الغريزة اللاشعورية التي تدفع الكائن إلى الانحلال والموت وهي عكس غريزة الحياة كما تصورها فرويد.  
**- ego i.** غَرِيْزَة الْإِنَّا. أية غريزة غير الغريزة الجنسية التي تدفع للحفاظ على الذات.  
**- herd i.** غريزة القطيع؛ غَرِيْزَة التَّجْمَع.  
 الغريزة التي تدفع الكائن ليكون عضواً في جماعة ولينسجم معهم في مقاييسهم ومثلهم وتصرفاتهم وأفكارهم.  
**- life i.** غَرِيْزَة الْحَيَاة. الغريزة التي تدفع الكائن للقيام بالأعمال البناءة التي تحافظ على حياته وعلى تكاثر نوعه.  
**- mother i.** غَرِيْزَة الْأُمُوْمَة. السلوك المعقد للام الذي يضمن لها الحفاظ على أبنائها ورعايتها لهم.  
**- sexual i. (= life i.)** الغريزة الجنسيّة. هي غريزة (= life i.) الحياة التي تستهدف الحفاظ على النوع.  
**instinctive** غَرِيْزِيّ؛ فِطْرِيّ. تصرف طبيعي يقوم به الكائن حتى من دون تسيبيه.  
**insula** الْجَزِيرَة؛ الْفَص الْجَزِيرِيّ. أنظر lobus insularis  
**insulae of Peyer (= lobus insularis)** جُزُر باير؛ الْفَص الْجَزِيرِيّ.  
**integration** تَكَاْمُل. تجميع أقسام متعددة وتنظيمها بشكل منسّق متكامل.  
**integrative** مُتَكَاْمِل. فعالية أو نظام متكامل ومنسّق.  
**intellect** الْفَكْر؛ الْعَقْل؛ الذَّهْن. التفكير والفهم والعقل وخصوصاً تلك الفعاليات التي تتعرف على العلاقات بين مختلف الأفكار وإدراكها وتقييمها وتسببها.  
**intellectualization** تَفَكِير؛ اسْتَدْهَان. وظيفة أو آلية لاشعورية يحلّ فيها المرء الأمور ويسببها ويقدر نتائجها وبذلك يتجنب مجابهة الحوادث الضارة ويتوقى القلق والضرر.  
**intelligence** ذَكَاء. القدرة على الفهم والإدراك والمقدرة على التعلّم السريع وتطوير الاستجابات

لتناسب الحالات الطارئة. كما أنه يدل على المقدرة على فهم الإشارات وحل المسائل ومجابهة المشاكل.

حاصل الذكاء. انظر quotient. - i. quotient

**intercalatum (= substantia nigra)**

المادة المقحمة؛ المادة السوداء.

**intercourse** اتّصال. اتصال متبادل.

جماع. اتّصال جنسي. - sexual i. (= coitus)

**interictal** بين النوبات. يحدث بين النوبات.

**intermittent** مُتَقَطِّع. يحدث في فترات متقطعة تفصلها فترات خالية من الفعالية

**interneuron** عَصْبُونٌ بَيْنِيّ؛ عَصْبُونٌ مُتَوَسِّط. أي عصبون في سلسلة من العصبونات يقع بين العصبون الأولي والعصبون الأخير.

**internode** بين العقدتين؛ راجية. قطعة تقع بين عقدتين.

بين عقدتي رانفييه. شدة - i. of Ranvier من الليف العصبي تتوسط بين عقدتي رانفييه متجاورتين.

**internuncial** عَصْبُونٌ مُتَوَسِّط. عصبون متوسط ينقل الدفعات بين العصبونات أو بين المراكز العصبية.

**interoceptive** داخليّ الاستقبال. صفة المستقبلات التي تستقبل المنبهات من الأقسام والسطوح الداخلية للجسم.

**interoceptor** مُسْتَقْبِلٌ دَاخِلِيّ. المستقبل الذي يستقبل المنبهات من أقسام الجسم الداخلية ومن سطوحه الداخلية.

**interofection** الإِسْتِجَابَةُ لِلْمُنْبَهَاتِ الدَاخِلِيَّةِ. استجابة الجسم للتغيرات التي تحدث في داخل الجسم والتي يولدها الجهاز العصبي الودي.

**interofective** داخليّ التَنَبُّيه. ما ينبه داخل الجسم. ويستعمل المصطلح لوصف تنبيه الجهاز العصبي المستقل الذي ينبه داخل الجسم.

**interpial** بين طبقتي الحَنُون. بين طبقتي الأم الحنون.

خُنْتِي. فرد يتصف باختلاط في صفاته الجنسية الذكرية والأنثوية بدرجات متفاوتة ويشمل ذلك أعضائه الجنسية وسلوكه الجنسي.

**intradural** داخل الجافية. داخل الأم الجافية أو تحتها.

**introspection** تأمُّلٌ بَاطِنٌ. ملاحظة وتحليل الأفكار والمشاعر الذاتية والتحليل الذاتي للفرد.

1. انْطَوَائِيّ 2. أَنَايِيّ. 1. شخص مركّز كل اهتمامه على ذاته 2. شخص مركّز كل اهتمامه على منفعة ذاته.

**invert (= homosexual)** مُنْخَرِفٌ؛ يَقْلِبُ.

**involuntary** لا إراديّ. ما يحدث من دون إرادة المرء.

أَوْب. 1. تغيير رجوعي لكل الجسم أو لأحد أعضائه كالذي يحدث في الأعضاء الجنسية للام بعد ولادة جنينها لتعود إلى حجمها السوي 2. التنكس المترقي الذي يحدث مع تقدم العمر الذي يتصف بذبول الأنسجة والأعضاء.

أَوْب شَيْخُوخِيّ. التنكس المترقي الذي يحدث عند الشيخوخة مع ذبول الأعضاء والأنسجة. - senile i.

**ipsilateral** بِنَفْسِ الْجَانِبِ. ما يقع أو يؤثر في أو يتعلق بنفس الجهة.

**IPSP (= inhibitory postsynaptic potential)** الجهد المثبط بعد المشبكي.

**iQ (= intelligence quotient)** حاصل الذكاء. انظر quotient.

**iridalgia** ألَمُ الْقَرْحِيَّةِ.

**iridoparalysis (= iridoplegia)** شَلْلُ الْقَرْحِيَّةِ. شلل مصرة القرصية.

**iridoplegia** شَلْلُ الْقَرْحِيَّةِ. شلل مصرة القرصية وفقدانها لوظائفها الحركية.

شَلْلُ الْقَرْحِيَّةِ التَّكْيُفِيّ. - accommodation i. عدم تضيق الحدقة عند تكيف العين للبصر القريب.

- **complete i.** شَلْلُ الْفَرْجِيَّةِ التَّامَ. عدم تضيق الحدة لأي من المنبهات.
- **reflex i.** شَلْلُ الْفَرْجِيَّةِ الْمُعْكَسِي. عدم تضيق الحدة عند تنبيه العين بالضوء أو عند تنبيه الجلد.
- **sympathetic i.** شَلْلُ الْفَرْجِيَّةِ الْوُدِّي. عدم توسع الحدة عند تنبيه الجلد بالمنبهات المؤلمة.
- irreversibility** اللاعكوسية. خاصية عدم الانعكاس.
- **i. of conduction** اللاعكوسية التوصيلية. المبدأ الذي ينص على أن مسلك أي منعكس يسمح بمرور الدفقات العصبية باتجاه واحد فقط.
- irreversible** لا عكوس. لا يمكن أن ينعكس.
- irritability** هيوجية؛ تهيجية. 1. خاصية البنية أو العضو الهيج أو استجابته للمنبهات. 2. الاستجابة الشاذة للمنبهات الضعيفة.
- **muscular i.** الهيجية العضلية. استجابة العضلات السوية للمنبهات.
- **myotatic i.** هيوجية التمدد العضلي. قدرة العضلة على التقلص استجابة لتعديدها.
- **nervous i.** الهيجية العصبية. 1. قدرة العصب على توصيل النبضات العصبية. 2. الاستثارية المرضية للجهاز العصبي.
- irritable** هيوج. 1. قادر على الاستجابة للمنبهات. 2. حساس بصورة شاذة للمنبهات.
- irritant** مُهَيِّج. 1. يولد التهيج. 2. عامل يولد التهيج.
- irritation** 1. تَهْيِيج. 2. تَهْيِيج. 1. التنبيه. 2. حالة فرط الاستثارية والحساسية.
- **cerebral i.** تَهْيِيجُ مُخِّي. المرحلة الثانية من ارتجاج الدماغ الذي يتصف بفرط استثارية الدماغ.
- **direct i.** تَهْيِيجُ مُبَاشِر. تهيج يتولد عن التنبيه المباشر للجزء أو للعضو.
- **functional i.** تَهْيِيجُ وَظِيفِي. تهيج يتولد عن اختلال وظيفي من دون أية إصابة عضوية أو فرط استثارية العضو بسبب فعاليته الوظيفية المفرطة.
- **meningeal i.** تَهْيِيجُ سِحَاثِي. تهيج السحايا بسبب التهابها أو نزفها مما يؤدي إلى الصداع وتيبس الرقبة.

- **spinal i.** تَهْيِيجُ سِنْسَانِي. صَمَلُ السيساء والمه بسبب آفة أو مرض العمود الفقري.
- **sympathetic i.** تَهْيِيجُ تَعَاطِفِي. التهاب أحد الأعضاء نتيجة لالتهاب عضو آخر مناسب له كالتهاب إحدى العينين عند التهاب العين الثانية.
- ischemia** إِقْفَار. نقص الدم في أحد الأقسام أو الأعضاء بسبب تضيق أوعيته الوظيفي أو بسبب انسدادها المرضي.
- ischialgia** أَلَمُ الْوَرَكِ؛ أَلَمُ الْإِسْكَ. وجع عظم الورك.
- ischiodynia (= ischialgia)** أَلَمُ الْوَرَكِ؛ أَلَمُ الْإِسْكَ.
- island of Reil (= insula)** الْجَزِيرَةُ.
- isocarboxazid** إيزوكاربوكسازيد. دواء يستعمل كمضاد للاكتئاب.
- isocortex (= neopallium)** الْقَشْرَةُ الْحَدِيثَةُ.
- isoelectric** كَهْرَسَاوِي؛ مُتَسَاوِي التَّكْهَرِب. لا يظهر أي فرق في الجهد الكهربائي.
- isometric** إِسْنَوِي الطُّوْل. المحافظة على طول ثابت.
- **i. contraction** تَقْلُصُ إِسْنَوِي الطُّوْل. تقلص العضلة من دون تغيير طولها مع زيادة توترها.
- isopotential** إِسْنَوِي الْجَهْد؛ تَسَاوِي الْجَهْد. تساوي الجهد الكهربائي على طرفي غشاء الليف العصبي مثلاً.
- isothermognosis** حِسُّ حَرَارِي إِسْنَوِي. شذوذ مرضي يحس المريض فيه حساً حرارياً للمنبهات الحارة والباردة والمؤلمة على حدٍ سواء وبدرجة واحدة تقريباً.
- isotonic contraction** تَقْلُصُ إِسْنَوِي التَّوْتَر. تقلص العضلة من دون تغيير توترها ولكنها تقصر طولياً.
- isotransplant (= isograft)** غَرْيَسَةٌ إِسْنَوِيَّة. طعم بين فردين متشابهين جينياً كالطعم بين التوائم المتشابهين.

**isthmus** بَزْرُخ. توصيلة ضيقة بين بنيتين كبيرتين.

- **i. gyri cinguli** بَزْرُخُ التَّلْفِيفِ الحَزَامِيِّ. الجزء الضيق من التلّيف الحزامي الذي يرتبط مع التلّيف حول الحصين في منطقة ذنب الجسم الثفني.

**itching (= pruritus)** حَكَّة. مِفْغِر. مسلك أو ممر أنبوبي.

- **i. ad infundibulum** مِفْغِرُ القَمْع. المر بين البطين الثالث للدماغ والقمع.

- **i. e tertio ad quartum ventriculum** المَسَالُ المُخِّي. (= **aqueductus cerebri**)

- **i. of Sylvius (= aqueductus mesencephali)** مَسَالُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط.

# J

**jacksonian epilepsy** صَرْعٌ جَاكْسُونِيّ. انظر epilepsy.

**jargonaphasia** حُبْسَةٌ رَاطِنَةٌ. حبسة تتصف بدمج عدة كلمات ببعضها.

**jaw** فَكٌّ. أي من البنييتين العظميتين، الفك العلوي أو الفك السفلي، في الجمجمة واللتين تحملان الأسنان.

**- drop j.** فَكٌّ سَاقِطٌ. المرحلة الشللية في داء الكلب حيث يتدلى الفك السفلي.

**Jerk** نَفْضَةٌ. حركة منعكسية فجائية ولا إرادية.

**- Achilles j. (= triceps surae reflex)** نَفْضَةٌ الكَاكِل.

**- ankle j. (= triceps surae reflex)** نَفْضَةٌ الكَاكِل.

**- biceps j. (= biceps reflex)** مُنْعَكْسُ ذَاتِ الرَّأْسَيْنِ.

**- elbow j.** مُنْعَكْسُ المِرْفَقِ. الانثناء الإرادي للمرفق عند طرق وتر العضلة ذات الرأسين أو العضلة ثلاثية الرؤوس.

**- jaw j. (= jaw reflex)** مُنْعَكْسُ الْفَكِّ.

**- knee j. (= patellar reflex)** نَفْضَةُ الرُّكْبَةِ.

**- myoclonic j. (= myoclonus)** رَمَعٌ عَضَلِيّ.

**- nystagmoid j's.** نَفْضَاتٌ رَأْسِيَّةٌ. حركات قفزية أنية جانبية للعين لا تدوم طويلاً ومن الممكن حدوثها عند النظر للجانب.

**- pendular knee j.** نَفْضَةُ الرُّكْبَةِ النُّوَاسِيَّةِ.

نفضة الركبة التي تشاهد في داء الرقص والتي تحدث عند طرق وتر الرضفة حيث تتحرك الساق أماماً وخلفاً لعدة مرات.

**- quadriceps j. (= knee j.)** نَفْضَةُ رُبَاعِيَّةِ الرُّؤُوسِ. تقلص العضلة رباعية الرؤوس النفضي عند طرق وتر الرضفة.

**- tendon j. (= tendon reflex)** مُنْعَكْسُ الوَتَرِ.

**- triceps surae j. (= ankle j.)** نَفْضَةُ ثَلَاثِيَّةِ الرُّؤُوسِ الرُّبَلِيَّةِ. تقلص نفضي للعضلة ثلاثية الرؤوس الربلية عند طرقها أو طرق وتر الكاحل.

**junction** مُوَصِلٌ. (ج: مَوَاصِلُ). محل التقاء أو اتصال عضوين أو نسيجين أو بنيتين متباينتين.


**- myoneural j. (= neuromuscular j.)** مُوَصِلٌ عَصَبِيّ عَضَلِيّ.

**- neuromuscular j.** مُوَصِلٌ عَصَبِيّ عَضَلِيّ. محل اتصال ليف عصبي حركي مع الليف العضلي الهيكلي الذي يغذيه وتكون نهاية هذا العصب الحركي الصفيحة الحركية الانتهائية كما تكون منطقة الليف العضلي المقابلة لها الصفيحة تحت العصبية ويفصلها عن بعضهما الفتح التشابكي حيث يفرز الأسيتيل كولين من نهاية العصب الحركي الذي ينتشر عبر الموصل إلى الليف العضلي وينبهه.

**juvenile** 1. يَفَعِيّ؛ حَدَثٌ 2. يَافِعٌ.

1. متعلق بالأحداث أو الشباب أو الأحداث غير الناضجين 2. حدث صغير السن أو طفل 3. خلية بين مرحلتي النضوج والفجاجة.

**juxtaspinal** مُجَاوِرُ السَّيْسَاءِ. بجوار العمود الفقري.



jerk, knee

وضع الانبساط

شكل يبين منعكس الوتر (نفضة الركبة أو منعكس الوتر الرضفي). ويلاحظ انبساط الساق عند طرق وتر الرضفة الباسطة الذي يرتكز على الظنبوب تحت الركبة. (1) العصب الوارد من العضلة الباسطة (2) العصب الحركي للعضلة الباسطة (3) العصب الحركي إلى العضلة المثنية (4) العضلة الباسطة (5) الوتر الرضفي (6) العضلة المثنية.

# K

**kakergasia (= merergasia)** اضْطِرَابٌ وَظِيفِي. أي اضطراب يؤدي إلى فقدان القدرة الجزئي أو الكلي على القيام بأي عمل أو وظيفة كما يحدث في حالات العصاب.

**kakesthesia (= cacesthesia)** إِحْسَاسٌ شَاذٌ. أي نوع من الإحساسات الشاذة أو المضطربة.

**kakosmia (= cacosmia)** رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ؛ استكراه الرائحة. شَمَ رائحة كريهة دون منبه حقيقي.

**kathisophobia (= akathisia)** قُصَاصٌ؛ رُهَابُ الْجُلُوسِ. الخوف الشديد من الجلوس.

**kentrokinesis (= centrokinesia)** حَرَكَةٌ مَرْكَزِيَّةٌ التَّنْبِيهِ.

**kernicterus** يَرَقَانٌ نَوَوِيٌّ. حالة تتصف بأعراض عصبية وخيمة مع ارتفاع مستوى بليروبين الدم الذي يؤدي إلى انصبغ النوى القاعدية والجسم الشاحب والنواة المذنبة وقشرة النواة العدسية والنوى المخيخية والبصلية والمادة السنجابية للمخ بالصبغ الأصفر، كما أنها تترافق مع تخريب واسع في الجهاز العصبي وهي تتولد عن اليرقان الوليدي الوخيم.

**kinesalgia** أَلَمُ الْحَرَكَةِ. الألم الذي يرافق الجهد العضلي عند الحركة.

**kinesia (= kinetosis)** اضْطِرَابٌ حَرَكِيٌّ الْمُنْشَأ. أي اضطراب جسمي يتولد عن الحركات غير الاعتيادية مثل داء الحركة.

**kinesialgia (= kinesalgia)** أَلَمُ الْحَرَكَةِ.

**kinesiatics (= kinesiotherapy)**

مُعَالَجَةُ بِالْحَرَكَةِ.

**kinesi- esthesiometer** مِقْيَاسُ الْحِسِّ الْحَرَكِي. آلة لقياس أو تقدير حس الحركة.

**kinesimeter** 1. مِقْيَاسُ الْحَرَكَةِ  
2. مِقْيَاسُ الْحِسِّ السَّطْحِي. 1. آلة القياس الكمي للحركة. 2. آلة لفحص إحساسات سطح الجسم.

**kinesiology** عِلْمُ الْحَرَكَةِ. مجموع الدراسات عن حركات جسم الإنسان.

**kinesiometer (= kinesimeter)**

1. مِقْيَاسُ الْحَرَكَةِ 2. مِقْيَاسُ الْحِسِّ السَّطْحِي.

**kinesioneurosis** عُصَابٌ حَرَكِيٌّ. اضطراب عصبي وظيفي يتصف باضطرابات حركية مثل التشنج والعزات.

**kinesiotherapy (= kinesitherapy)**

مُعَالَجَةُ بِالْحَرَكَةِ. معالجة الأمراض بالحركة.

**kinesodic** نَاقِلُ الدَّفْعَاتِ الْحَرَكِيَّةِ. ناقل للنبضات العصبية الحركية.

**kinesthesia** الْحِسُّ الْحَرَكِيٌّ. الحس الذي يدرك حركة ووزن ووضع مختلف أقسام الجسم وخصوصاً تغيير زوايا المفاصل عند حركتها.

**kinesthesiometer** مِقْيَاسُ الْحِسِّ الْحَرَكِيِّ.

**kinesthesia (= kinesthesia)** الْحِسُّ الْحَرَكِيٌّ.

**kinetosis** اضْطِرَابٌ حَرَكِيٌّ الْمُنْشَأ. انظر kinesia.

**kinetotherapy (= kinesiotherapy)**

مُعَالَجَةُ بِالْحَرَكَةِ.

**kleptomania** هَوَسُ السَّرْقَةِ. هوس لا يقاوم يدفع المريض للسرقة وعادة ما تكون لمواد لها قيمة رمزية فقط وهي عادة ما تكون لا شعورية للمريض .

**kleptomaniac** مُهَوَّسُ السَّرْقَةِ. مصاب بهوس السرقة.

**knee** رُكْبَةٌ. المفصل بين الفخذ والساق.

**knismogenic** مُدْغِدِغٌ. ما يولد الدغدغة.

**knob** زَرٌّ. كتلة مكورة أو نتوء مكور.

**- synaptic k's.** أَقْدَامٌ أَنْتِهَائِيَّةٌ. انظر end feet.

**koniocortex** الْقَشْرَةُ الْمُحَبَّبَةُ. القشرة الحبيبية للمناطق الحسية للمخ.

**krauomania** عَرَّةٌ نَظْمِيَّةٌ. عرة تتصف بحركات نظمية مثل دوران الرأس أو حركات توازن الجسم.

**kuru** كُورُو. مرض عصبي عائلي مترق ومميت يتصف بفترة حضانة طويلة ويسببه فيروس خاص يؤدي إلى اعتلال الدماغ وتخريبه.


**kwashiorkor** كُوَأَشِيرُكُورٌ. متلازمة تتولد عن نقص البروتين الشديد وتتصف بتخلف النمو وبتغير لون الجلد والشعر والوذمة واضطرابات مرضية في الكبد مع تليفه ونخره ومع اضطرابات عقلية وزهول.

**kyphoscoliosis** جَنْفٌ حُدَابِيٌّ. انحناء السيساء الخلفي والجانبى.

**kyphosis** حُدَابٌ. زيادة تحذب السيساء الشاذة في المنحنى الصدري كما يشاهد عند النظر إليه من الجانب.

**kyphotic** 1. أَخْذَبٌ؛ حَذْبَاءٌ 2. حُدَابِيٌّ. مصاب بالحذاب أو منسوب إليه.





**kyphosis**

حداب الرقبة وتضييق القناة الشوكية حيث تؤدي الإصابات الانضغاطية أو كسور الفقرات الرقبية إلى تضيق القناة الشوكية وانضغاط النخاع فيها فتؤدي حركات الرقبة إلى نبضان مستمر في منطقة الإصابة مع سحقها. كما يؤدي الثني الأمامي للرقبة (ب) إلى سحق منطقة الإصابة وتشوهها وتمدد الرقبة وإجهادها.

# L

**lability** تَقَلُّلٌ؛ عَدَمُ الْإِسْتِقْرَارِ؛ عَطُوبِيَّةٌ. عدم الاستقرار العاطفي مع تغير الحالة العاطفية السريع.

**labyrinth** اللَّيْثُ. جهاز مكون من تجاويف وأقنية متصلة ببعضها. ويطلق المصطلح على جهاز الأذن الداخلية الذي يقوم بوظيفة حس التوازن والوضع.

**bony l.** اللَّيْثُ الْعَظْمِيّ. الهيكل العظمي للأذن الداخلية الذي يحيط بالتيه الغشائي.

**cochlear l.** اللَّيْثُ الْقَوَقَعِيّ. جزء التيه الغشائي الذي يشمل حيز اللفاف المحيطية والقناة القوقعية وهي آلة السمع الداخلية.

**endolymphatic l. (= membranous l.)** اللَّيْثُ الْغِشَائِيّ.

**membranous l.** اللَّيْثُ الْغِشَائِيّ. جهاز من أكياس وأنابيب ظهارية متصلة ببعضها يتكون من قناة اللفاف الباطنة والكيس والقريبة والقوقعة والأقنية الهلالية ويوجد في داخل التيه العظمي ويفصله عنه حيز اللفاف الظاهرة وينقسم إلى قسمين التيه القوقعي والتيه الدهليزي.

**osseous l. (= bony l.)** اللَّيْثُ الْعَظْمِيّ.

**vestibular l.** اللَّيْثُ الدِّهْلِيْزِيّ. جزء التيه الغشائي الذي يشمل الكيس والقريبة والأقنية الهلالية.

**laceration** تَهْتِكٌ؛ تَمَرُّقٌ؛ انْهَتَاكٌ. عملية التمزق أو جرح متمزق.

**lacuna** جَوْبَةٌ. حفرة صغيرة أو كهف مجوف.

**cerebral lacunae** جَوْبَاتٌ دِمَاعِيَّةٌ. باحات صغيرة من احتشاءات إقفارية دماغية تتولد من انسداد

الشريان الدماغي المتوسط أو الدماغي الخلفي أو الشرايين القاعدية تشاهد في حالات ارتفاع الضغط أو التصلب الشرياني.

**lag** تَلَكُّؤٌ. الفترة الزمنية بين وضع التنبيه وبدء الاستجابة.

**lagnesis (= satyriasis)** شَبَقٌ. فرط الرغبة الجنسية الشاذة في الذكور التي لا تشبع.

**lagnosis (= lagnesis)** شَبَقٌ.

**lagophthalmos (= lagophthalmus)**

عَيْنٌ أَرْثُيَّةٌ. عدم القدرة على غلق العينين بصورة كاملة.

**lallation** تَمَثُّمَةٌ؛ لَجَلَجَةُ الْأَطْفَالِ. نوع كلام الأطفال والصبيان.

**lalognosis** إِدْرَاكُ الْكَلَامِ. فهم الكلام المسموع ومعرفة مدلوله.

**lalopathy** خَلَلُ النُّطْقِ. أي اضطراب في الكلام.

**lalophobia** وَهَابُ الْكَلَامِ. التخوف من الكلام.

**laloplegia** شَلْلُ النُّطْقِ. شلل أعضاء النطق.

**lalorrhea (= logorrhea)** ثَرَوَرَةٌ.

**lamelia** صُفَّاحَةٌ. صفيحة رقيقة كصفيحة العظم.

**lamina** صَفِيْحَةٌ. طبقة رقيقة مسطحة ويستعمل المصطلح بمفرده للدلالة على صفيحة قوس الفقرة.

**l. affixa** الصَّفِيْحَةُ اللَّاصِقَةُ. شريط من البطانة العصبية يحيط بالوريد المهادي المخطط والسطر الانتهائي في القسم المركزي من البطين الجانبي.

**alar l., l. alaris** الصَّفِيْحَةُ الْجَنَاحِيَّةُ. أي من المنطقتين الطوليتين للأنبوب العصبي الجنيني بالجهة الظهرية للتمم المحدد والذي يتطور منه العمود

- السنجابي الظهري للنخاع الشوكي والمراكز الحسية للدماغ.
- **laminae albae cerebelli** **الصفائحُ المَخِيخِيَّةُ** البَيضاء. لب المادة البيضاء الذي يسند ورقات القشرة المخيخية.
- **I. arcus vertebralis** **صَفِيحَةُ قَوْسِ الْفِقْرَةِ**. إحدى اللوحتين العريضتين اللتين تبرزان من سويقتي قوسي الفقرة اللتين تلتصقان في الخط الوسطي للفقرة لتكتملا القسم الظهري للقوس وتكونا قاعدة الناتئ الشوكي.
- **basal I., I. basalis** **الصفائحَةُ القَاعِيَّةُ**. إحدى المنطقتين الطوليتين للأنبوب العصبي الجنيني بالجهة البطنية للتم المحدد يتطور منها العمود السنجابي البطني للنخاع الشوكي والمراكز الحركية للدماغ.
- **I. chorioidea epithelialis ventriculi lateralis** **الصفائحَةُ المَشِيمَائِيَّةُ الظَّاهِرِيَّةُ** للبطين الجانبي. البطانة العصبية التي تبطن البطين الجانبي للمخ.
- **I. chorioidea epithelialis ventriculi quarti** **الصفائحَةُ المَشِيمَائِيَّةُ الظَّاهِرِيَّةُ** للبطين الرابع. البطانة العصبية التي تبطن البطين الرابع للدماغ.
- **I. cinerea terminalis (= I. terminalis hypothalami)** **الصفائحَةُ الوِطَائِيَّةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ**.
- **epithelial I. (= I. epithelialis)** **الصفائحَةُ الظَّاهِرِيَّةُ**. البطانة العصبية التي تغطي الصغيرة المشيمية.
- **I. granularis, externa corticis cerebri** **الصفائحَةُ الحَبِيبِيَّةُ الظَّاهِرَةُ لِقَشْرَةِ المَخ**. الطبقة الثانية من قشرة المخ والمكونة من العديد من الخلايا الهرمية الصغيرة ومن الخلايا الحبيبية ذات المحاور القصيرة.
- **I. granularis interna corticis cerebri** **الصفائحَةُ الحَبِيبِيَّةُ البَاطِنَةُ لِقَشْرَةِ المَخ**. الطبقة الرابعة من قشرة المخ والتي تزدهم بالعديد من الخلايا الحبيبية ذات المحاور القصيرة وبعض الخلايا الهرمية الصغيرة والتي يعبر من بينها العديد من الالياف العصبية باتجاه مستعرض.
- **laminae medullares cerebelli** **الصفائحُ المَخِيخِيَّةُ البَيضاء** (= laminae albae cerebelli).
- **I. medullaris lateralis corporis striati** **الصفائحَةُ النُّخَاعِيَّةُ الوَحْشِيَّةُ للجِسْمِ المَخْطَط**. طبقة من مادة بيضاء تفصل الكرة الشاحبة الوحشية عن قشرة النواة العدسية.
- **I. medullaris medialis corporis striati** **الصفائحَةُ النُّخَاعِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ للجِسْمِ المَخْطَط**. طبقة من مادة بيضاء تقسم الجزء الإنسي من النواة العدسية (الكرة الشاحبة) إلى قسمين وحشي كبير وإنسي صغير.
- **laminae medullares thalami interna and externa** **الصفائحُ النُّخَاعِيَّةُ المَهَادِيَّةُ البَاطِنَةُ والظَّاهِرَةُ**. طبقتان من الالياف العصبية المعقدة في المهاد الظهري.
- **I. medullaris transversa corporis quadrigemini (= stratum album profundum corporis quadrigemini)** **الطبقة العَمِيقَةُ البَيضاءُ لِلْجِسَامِ الرُّبَاعِيَّةِ**.
- **I. molecularis corticis cerebri** **الصفائحَةُ الجُرَيْبِيَّةُ لِقَشْرَةِ المَخ**. الطبقة السطحية الأولى لقشرة المخ وهي أعلى طبقاته الست وتتكون بصورة رئيسية من الياف عصبية مغمدة مرتبة باتجاه تماسي وهي تحوي نهايات تغصنية من خلايا الطبقات العميقة وبعض الالياف القشرية الواردة وبعض خلايا كاهال الممتدة أفقياً وبعض أنواع الخلايا العصبية الأخرى.
- **I. multiformis corticis cerebri** **الصفائحَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ الأشْكَالِ لِقَشْرَةِ المَخ**. الطبقة السادسة من طبقات قشرة المخ المكونة من أنواع مختلفة من الخلايا العصبية وبصورة رئيسية خلايا مغزلية الشكل وغير منتظمة تمر محاورها إلى المادة البيضاء لقشرة نصف كرة المخ.
- **I. plexiformis corticis cerebri (= I. molecularis corticis cerebri)** **الصفائحَةُ الهمِيمَةُ الظَّاهِرَةُ لِقَشْرَةِ المَخ**. الطبقة الثالثة من طبقات قشرة المخ الست المكونة من المنطقة الداخلية من الخلايا الهرمية المتوسطة الحجم وطبقة الخلايا الهرمية الخارجية وخلايا أخرى تمتد تغصناتها ومحاورها إلى الطبقات الأخرى.

- **I. pyramidalis ganglionaris corticis cerebri** (= **I. pyramidalis interna corticis cerebri**) **الصَّفِيحَةُ الْهَرَمِيَّةُ الْعُقْدِيَّةُ لِقَشْرَةِ الْمَخ.**
- **I. pyramidalis interna corticis cerebri** **الصَّفِيحَةُ الْهَرَمِيَّةُ الْبَاطِنَةُ لِقَشْرَةِ الْمَخ.** الطبقة الخامسة من طبقات قشرة المخ المكونة من أكبر الخلايا الهرمية (خلايا مارتينوتي وخلايا بتز) والتي تتعابر معها سطور من اليااف عصبية مرتبة بصورة افقية وتترك محاور هذه الخلايا الهرمية هذه الطبقة إما كاليااف إسقاطية أو ترابطية أو صوارية.
- **I. quadrigemina** (= **I. tecti mesencephali**) **صَفِيحَةُ سَقْفِ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط.**
- **I. reticularis** **الصَّفِيحَةُ الشَّبَكِيَّة.** الغشاء الزجاجي المثقب الذي يغطي عضو كورتني.
- **Rexed's laminae** **صَفَائِحُ رِيكْسِد.** مخطط معماري لتصنيف بنيات النخاع الشوكي مبني على الصفات الخلوية لعصبونات المناطق المختلفة للمادة السنجابية. وهو يحوي تسع صفائح (1-9) تمتد خلال النخاع موازية للعمودي المادة السنجابية الظهري والبطني، وطبقة عاشر (10) تحيط بالقناة المركزية وتتكون من الصوارين الظهري والبطني والمادة الهلامية المركزية.
- **rostral I.** (= **I. rostralis**) **الصَّفِيحَةُ الرَّاسِيَّة.** الجزء الانتهائي الرقيق لمنقار الجسم القطني الذي ينزل أمام الصوار الأمامي وأمام المادة المثقبة الأمامية والتلفيف جنيب الانتهائي.
- **I. septi pellucidi** **صَفِيحَةُ الْحَاجِزِ الشَّاف.** إحدى الصفيحتين العموديتين المفصولتين عن بعضهما بحيز فلهي الشكل مكوناً الحاجز الشفاف بينهما.
- **I. tecti mesencephali** **صَفِيحَةُ سَقْفِ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط.** طبقة متداخلة من المادتين السنجابية والبيضاء في سقف الدماغ المتوسط من حيث تبدأ الاكيمات السفلية والعلوية.
- **terminal I. of hypothalamus** **الصَّفِيحَةُ الْإِنْتِهَائِيَّةُ لِلْوَطَاء.** صفيحة رقيقة مستمدة من الدماغ الانتهائي تمتد إلى الأعلى من التصالبة البصرية والردب أمام البصري مكونة الجدار الأمامي للبطين الثالث للدماغ.
- **white laminae of cerebellum** (= **laminae albae cerebelli**) **الصَّفَائِحُ الْمَخِيخِيَّةُ الْبَيْضَاء.**
- laminectomy** **إِسْتِثْصَالُ الصَّفِيحَةِ.** استئصال القوس الخلفي للفقرة.
- laminotomy** **قَطْعُ الصَّفِيحَةِ.** قطع صفيحة الفقرة.
- lancinating** **رَامِح.** ينقض كالسهم أو يقطع بجدة.
- **I. pain** **أَلَمٌ رَامِح.** انظر pain.
- laryngalgia** **أَلَمُ الْحَنْجَرَةِ.** ألم في الحنجرة.
- laryngismus** **تَشَنُّجُ الْحَنْجَرَةِ.** تشنج في الحنجرة.
- **I. stridulus** **تَشَنُّجُ الْحَنْجَرَةِ الصُّرِيرِي.** حالة تتصف بتشنج الحنجرة الفجائي مع تنفس صريري وزراق وقد تحدث في التهابات الحنجرة أو كمرض مستقل يرافق بعض الأمراض كالرخذ مثلاً.
- laryngoplegia** **شَلْلُ الْحَنْجَرَةِ.** شلل في الحنجرة.
- laryngospasm** **تَشَنُّجُ الْحَنْجَرَةِ.** تشنج الحنجرة وانسداده.
- lassitude** **إِنْهَاق.** ضعف وتعب شديد.
- latent** **كَامِن.** غير ظاهر أو خامل.
- **I. period** **فَتْرَةُ الْكُمُون.** انظر period.
- laterality** **الْجَانِبِيَّة.** النسبة إلى إحدى جهتي الجسم وتفضيل استعمال أعضاء من نفس الجهة (كاليد أو الذراع أو القدم أو العين) عند القيام بالحركات والفعاليات الوظيفية الإرادية.
- **crossed I.** **الْجَانِبِيَّةُ التَّصَالِبِيَّة.** تفضيل استعمال أعضاء الجهة المعاكسة في القيام بالحركات والفعاليات الإرادية كاستعمال إحدى العينين واليد المعاكسة لها.
- **dominant I.** **الْجَانِبِيَّةُ السَّائِدَة.** تفضيل استعمال أعضاء إحدى جهتي الجسم في القيام بالحركات والوظائف الإرادية.
- laterodeviation** **إِنْحِرَافٌ جَانِبِيٌّ.** انحراف لأحد الجانبين.
- lateroflexion** **إِنْثْنَاءٌ جَانِبِيٌّ.** انثناء لأحد الجانبين.

**lateroposition** تَوَضُّعٌ جَانِبِيٌّ. انزياح الجسم وتوضُّعه في أحد الجانبين.

**lateropulsion** إِنْسِيَاقٌ جَانِبِيٌّ. الانسياق اللاإرادي لأحد الجانبين عند السير.

**lathyrism** التَّسْمُّمُ بِالْجُلْبَانِ. التسمم ببذور نبات الجلبان الذي يتصف بالشلل السفلي التشنجي والالام وفرط الحس والمذل.

**laughter** ضَحْكٌ. سلسلة حركات زفيرية تشنجية لإرادية (جزئياً) مع إصدار أصوات غير مترابطة تدل غالباً على الفرح أو كمنعكس الدغدغة أو كعرض هستيري.

**- compulsive l.** ضَحْكٌ قَسْرِيٌّ. ضحك عميق بدون سبب.

**- forced l. (= obsessive l. = compulsive l.)** ضَحْكٌ قَسْرِيٌّ.

**law** قَانُونٌ. حقيقة أو مبدأ ثابت ومنتظم.

**- all or none l.** قَانُونُ الْكُلِّ أَوْ الْعَدَمِ. انظر all or none.

**- Babinski's l.** قَانُونُ بَابِنْسْكِ. قانون يقارن بين استجابة شخص سليم للتيه مع آخر مصاب بالتيه فعند تنبيه الشخص السليم بمنبه كهربائي فإنه يميل إلى جهة القطب الموجب أما المصاب بمرض التيه فإنه يقع للجهة التي يميل نحوها اختياريًا. أما في حالة تخريب التيه الكامل فلا يتأثر الشخص بالتنبيه أبداً.

**- l. of contrary innervation (= Meltzer's l.)** قَانُونُ التَّعْصِيبِ الْمُتَعَاكِسِ. القانون الذي ينص (l.) على أن هناك قوتين متعاكستين تسيطران على كل الفعاليات الحيوية وهي التحفيز والزيادة من ناحية والتثبيط والنقصان من الناحية الأخرى.

**- Cushing's l.** قَانُونُ كُوشِنْغ. قانون ينص على أن ارتفاع ضغط داخل القحف يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدرجة أعلى قليلاً من ضغط السائل الدماغي النخاعي المؤثر على البصلة (النخاع المستطيل).

**- l. of denervation** قَانُونُ إِزَالَةِ التَّعْصِيبِ. إزالة تعصيب أية بنية أو عضو تزيد من حساسيتهما للمنبهات الكيميائية.

**- Dubois-Reymond l.** قَانُونُ دِيُبُوَا - رِيْمُونْد. قانون ينص على أن العامل المؤثر في تنبيه العضل أو

العصب الحركي هو سرعة تغيير شدة التيار المنبه في أية لحظة وليست شدته المطلقة.

**- Edinger's l.** قَانُونُ أَدِينْغَر. تؤدي الزيادة التدريجية في وظيفة العصبون إلى زيادة نموه ولكن زيادتها غير المنتظمة أو المفرطة تؤدي إلى ضموره وتنكسه.

**- Elliot's l.** قَانُونُ إِيْلِيُوت. تتولد فعالية الأدرينالين عند تنبيه نهاية العصب الودي.

**- Ewald's l.** قَانُونُ إِيْوَالْد. أن الرأرة المولدة عن تيار اللعاف الباطنة في إحدى الأقنية الهلالية تكون باتجاه مواز لمستوى تلك القناة.

**- l. of exaltation (= Dubois-Reymond l.)** قَانُونُ الإثَارَةِ. تعتمد استجابة العصب الحركي التي تظهر عند تقلص العضلة التي يغذيها على تغيير شدة التيار الكهربائي المنبه له وليست على شدته المطلقة.

**- l. of facilitation** قَانُونُ التَّيَسُّيْرِ. عند مرور نبضات عصبية خلال سلسلة معينة من العصبونات مرة واحدة ومن غير مرورها في غيرها ثم تعود لتمر في نفس السلسلة في مرات أخرى تقل عند ذلك مقاومة السلسلة لها بل وتيسر مرورها.

**- l. of fatigue** قَانُونُ التَّعَبِ. عند استمرار عمل إحدى العضلات أو مجموعة من العضلات حتى تتعب يكون حاصل ضرب مجموع العمل الذي قامت به في سرعته ثابتة دائماً.

**- Fechner's l.** قَانُونُ فَيْشْنَر. إن شدة الإحساس الذي يتولد من المنبهات المتغيرة يتناسب طردياً مع لوغاريتم شدة المنبه.

**- Flatau's l.** قَانُونُ فَلَاتَاو. كلما زاد طول ليف النخاع الشوكي كلما كان موقعه أقرب إلى محيطه وتدفعه الألياف القصيرة إلى الجانب.

**- Flechsig's l. (= myelogenetic l.)** قانون فليكسيغ لإنتاج الميالين.

**- Flourens' l.** قانون فلورينز. يؤدي تنبيه القناة الهلالية إلى رأرة باتجاه مستوى القناة.

**- Gudden's l.** قانون غيران. يتجه تنكس النهاية الدانية للعصب المقطوع نحو جسم الخلية.

**- Hilton's l.** قانون هيلتون. إن العصب الذي يغذي أحد المفاصل يغذي أيضاً العضلات التي تحركه والجلد الذي يحيط به.

- قانون التّوصيل I. of isolated conduction** - المنعزل. لا تنتقل موجة النبضة العصبية المارة في أحد الأعصاب إلى عصب آخر إلا عند نهاياته.
- قانون جاكسون I. - Jackson's I.** - العصبية تخليقاً هي أول الوظائف اضمحلالاً.
- قانون كالر. I. - Kahler's I.** - تمر الفروع الصاعدة للجذور الخلفية للأعصاب الشوكية في داخل النخاع الشوكي بالتتابع من منطقة الجذر حتى المستوى الناصف.
- قانون لاندوزي I. - Landouzy-Grasset I.** - غراسيت. في حالة إصابة نصف كرة المخ يميل الرأس إلى جهة الإصابة عند وجود شلل أو إلى جهة العضلات المصابة عند وجود تشنج فيها.
- قانون لابيك. I. - Lapieque's I.** - عكسياً مع قطر الليف العصبي.
- قانون ملتزر I. (= I. of contrary innervation)** - قَانُونُ التَّعْصِيبِ الْمُتَعَاكِسِ. يتم
- قانون ميالين. I. - myelogenetic I.** - تتنخ الاليف العصبية للدماغ المتنامي بتتال معين بحيث تنضج وتنخ الاليف الخاصة بالترتيب الذي تطورت به الاجهزة فتتنخ الياف الجذور الامامية أولاً وتتلوها الياف السبيل الهرمي.
- قانون نرنست. I. - Nernst's I.** - المنبه لفعالية العضلة طردياً مع الجذر التريعي لذبذبه.
- قانون فلوغر. I. - Pflüger's I.** - يتنبه السبيل العصبي عند المهبط عند بدء التنبيه الكهربائي وعند المصعد عند قطع التنبيه.
- قانون بريفوست. I. - Prévost's I.** - في حالة إصابة الدماغ الجانبية يدور الرأس إلى الجهة المصابة.
- psychophysical I. (= Weber-Fechner I.)** - القَانُونُ النَّفْسِيّ الْجَسَدِيّ.
- I. of referred pain** - قَانُونُ الْأَلَمِ الْمُحَوَّلِ. يتولد الألم المحول عند تهيج الأعصاب الحساسة لحسّ الألم عند وضع المنبه على سطح الجسم.
- refreshment I. - refreshment I.** - قَانُونُ الْإِنْعَاشِ. تعتمد سرعة انعاش العضلة المتعبة على سرعة تجهيزها بالدم الشرياني.
- Ritter-Vall I. - Ritter-Vall I.** - قَانُونُ رِيْتَر - فَالِي. ينتشر فرط

الهيوجية الاولى وفقدانها الثانوي في العصب المقطوع باتجاه محيطي بعيداً عن مركزه العصبي.

**قانون شرويدر I. - Schroeder Van der Kolk's I.** - قَانُونُ دِرْكُولِك. تنتشر الأعصاب الحسية للعصب المختلط إلى العضلات التي تنبها الاليف العصبية الحركية للعصب نفسه.

**قانون شيرنغتون. I. - Sherrington's I.** 1. يغذي كل جذر شوكي خلفي منطقة معينة من الجلد بالرغم من احتمال تغذية المنطقة نفسها بالياف من الشدقات النخاعية المجاورة. 2. عند استلام عضلة لمنبه حركي يقلصها تستلم العضلة الضادة لها منبهاً عصبياً يرخيها في ذات الوقت.

**I. of specific irritability** - قَانُونُ الْهَيُوجِيَّةِ النوعية. يستجيب كل عصب حسي لنوع واحد من المنبهات ويولد نوعاً واحداً من الإحساس في الحالات السوية. وفي الحالات الشاذة يمكن أن ينبه بنوع مغاير من المنبهات ولكنه يولد نفس النوع من الإحساس.

**قانون ستوكس. I. - Stokes' I.** - تصاب بالشلل عادة العضلة الكائنة فوق الغشاء الملتهب.

**قانون توينبي. I. - Toynbee's I.** - في حالات مرض الدماغ الناجم عن التهاب الاذن يصاب المخيخ وجيوب الخشاء الجانبية كما يصاب المخ من سقف الطبل.

**Van der Kolk's I. (= Schroeder van der Kolk's I.)** - قَانُونُ فَان دِرْكُولِك.

**قانون والر. I. (= Wallerian I.) - Waller's I.** - قطع الاليف العصبية الحسية لجذر النخاع الشوكي على الجهة المركزية لعقدته لا تنتكس الاليف الكائنة على جهتها المحيطية بل تنتكس تلك الاليف التي تبقى مرتبطة بالنخاع.

**قانون ويبر. I. - Weber's I.** - يحافظ التغيير في شدة المنبه الذي يولد أصغر تغيير في الحس المدرك على نسبة ثابتة تقريباً بالنسبة لكل الاجهزة الحسية.

**قانون ويبر - فشنر. I. - Weber-Fechner I.** - يزداد الإحساس بشدد متساوية بمتتالية حسابية عندما تزداد شدة المنبه بمتتالية هندسية.

**طبقة. layer** - كتلة نسيجية صفيحية الشكل ومنظمة السماكة تقريباً ومن الممكن أن تتراكم عدة طبقات منها فوق بعضها كما هو الحال في طبقات الجلد مثلاً.

- fusiform l. of cerebral cortex (= lamina multiformis corticis cerebri) **الطبقة المفزلية الشكل لقشرة المخ.**
- ganglionic l. of cerebellum (= stratum gangliosum cerebelli) **الطبقة العقدية للمخيخ.**
- ganglionic l. of cerebral cortex (= lamina pyramidalis interna corticis cerebri) **الطبقة العقدية لقشرة المخ: الطبقة المتعددة الأشكال لقشرة المخ.**
- ganglionic l. of optic nerve **الطبقة العقدية للعصب البصري.** طبقة الجزء العصبي للشبكة التي تحوي عصبونات متعددة الأقطاب تكون محاورها العصب البصري.
- ganglionic l. of retina **الطبقة العقدية للشبكية.** طبقة القسم العصبي للشبكة التي تحوي العصبونات ثنائية الأقطاب.
- granular l. of cerebellum (= stratum granulosum cerebelli) **الطبقة الحبيبية لقشرة المخيخ.**
- granular l. of cerebral cortex, external (= lamina granularis externa corticis cerebri) **الطبقة الحبيبية الظاهرة لقشرة المخ.**
- gray l's. of cranial colliculus (= strata grisea et alba colliculi) **الطبقات السنجائية للأكتيمات الدماغية.**
- medullary l's. of thalamus (= laminae medullares thalami) **طبقات المهاد النخاعية.**
- molecular l. of cerebellum (= stratum moleculare cerebelli) **الطبقة الجزيئية للمخيخ.**
- molecular l. of cerebral cortex (= lamina molecularis corticis cerebri) **الطبقة الجزيئية لقشرة المخ.**
- multiform l. of cerebral cortex (= lamina multiformis corticis cerebri) **الطبقة المتعددة الأشكال لقشرة المخ.**
- nerve fiber l. **طبقة الألياف العصبية.** في الشبكة تقع بين طبقة الخلايا العقدية والغشاء المحدد الباطن وتتكون من محاور الخلايا العقدية وتتمر خلال الصفيحة المصفوية لتكون العصب البصري.
- neuroepidermal l. (= ectoderm) **الأيديم الظاهر.**
- neuroepithelial l. of retina (= layer of rods & cones) **طبقة العصبي والمخاريط للشبكية.**
- nuclear l. of cerebellum (= stratum granulosum cerebelli) **الطبقة النووية للمخيخ.**
- plexiform l. of cerebellum (= stratum molecularis cerebelli) **الطبقة الضفيرية الشكل للمخيخ.**
- plexiform l. of cerebral cortex (lamina molecularis corticis cerebri) **الطبقة الضفيرية الشكل لقشرة المخ.**
- Purkinje l. (= Purkinje cell l.) **طبقة خلايا بركنجي.** طبقة من الخلايا من قشرة المخيخ بين الطبقتين الجزيئية السطحية والحبيبية ويعتبرها البعض أعمق أقسام الطبقة الجزيئية.
- pyramidal l. of cerebral cortex, external (= lamina pyramidalis externa corticis cerebri) **الطبقة الهرمية الخارجية لقشرة المخ.**
- subcallosal l. **الطبقة تحت الثفني.** طبقة الألياف العصبية على القسم السفلي من الجسم الثفني.
- white l's. of cerebellum (= laminae albae cerebelli) **طبقات المخيخ البيضاء.**
- zonal l. of cerebral cortex (= l. molecularis corticis cerebri) **الطبقة الجزيئية لقشرة المخ.**
- zonal l. of quadrigeminal body (= stratum zonale corporis quadrigemini) **الطبقة المنطقية للجسم الرباعي.**
- zonal l. of thalamus (stratum zonale thalami) **الطبقة المنطقية للمهاد.**

1. رصاص 2. اتجاه: قياد. 1. معدن  
الرصاص 2. اتجاه في التخطيط الكهربائي للدماغ أو للقلب.

**تَعَلُّم**. عملية تلاؤمية سلوكية طويلة **learning** تحدث تغييراً في سلوك الشخص وتولد نتيجة الخبرة وتكسب الكائن استجابات جديدة.

**تَعَلُّمُ تَرَابُطِي**. تعلم ترابط وظيفي بيل **associative** - حدثين يثبت حدوث أحدهما الحدث الآخر.

**تَعَلُّمُ اجْتِنَابِي**. نوع من التدريب **avoidance l.** يتعلم فيه الحيوان التجريبي اجتناب منه مؤلم بالقيام باستجابة حركية اجتنابية.

**تَعَلُّم** **conditioning l. (= conditioning)** إشرطي؛ إشرط؛ تكييف.

**تَعَلُّمُ تَمْيِيزِي**. تعلم الاستجابة **discriminative l.** لبعض المنبهات الخاصة وعدم الاستجابة لغيرها.

**تَعَلُّمُ تَقْلِيدِي**. تعلم يعتمد على التقليد **imitative l.** الواعي لتصرفات وسلوك شخص أو أشخاص آخرين.

**تَعَلُّمُ تَبْصُرِي**. أعلى أنواع التعلم الذي **insight l.** يتصف بمقدرة الشخص على تقييم الخبرات السابقة لحل مشكلة آتية أو لتحقيق أهداف مرغوبة.

**تَعَلُّمُ فَعَال**. **instrumental l. (= operant l.)**

**تَعَلُّمُ كَامِن**. تعلم يحدث من دون تعزيز **latent l.** ولكنه يظهر عند إضافة أي تعزيز أو منح أي ثواب.

**تَعَلُّمُ فَعَال**. نوع من التعلم يعتمد على **operant l.** الإشرط الفعال حيث يزداد احتمال توليد أية استجابة عند تعزيز المنبه وبهذه الطريقة من الممكن تعليم الحيوان التجريبي استجابات معقدة غير اعتيادية.

**تَعَلُّمُ إدْرَاكِي**. تعلم يتصف بتطوير **perceptual l.** وتحويل فهم الأمور وإدراكها.

**تَعَلُّمُ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْحَالَةِ**. **state-dependent l.** تعلم يتم عندما يكون الشخص بحالة نفسية معينة ومن الممكن تذكره عندما يكون المرء بنفس هذه الحالة مرة ثانية.

**التَعَلُّمُ بِالتَّجَرِبَةِ وَالْخَطَا**. **trial-and-error l.** تعلم يتم بالتجربة بتكرار المنبهات والتعرف على المفيد منها والضار والصحيح والغلط.

**leioasthenia** وَهْنُ الْعَضَلَاتِ الْمَلْسَاءِ.

**leiodystonia** حَثَلُ الْعَضَلَاتِ الْمَلْسَاءِ.

**leiomyoma** ورم العضلات الملساء. وهو ورم حميد.

**leiomyosarcoma** ساركومة عَضَلِيَّة ملساء.

ساركومة تحوي خلايا مغزلية كبيرة من العضلات الملساء تتكون في الرحم أو خلف الصفاق.

**فَتِيل**. (ج: أَفْتِلَة). شريط أو حزمة **lemniscus** من الألياف العصبية في داخل الجهاز العصبي المركزي.

**الْفَتِيلُ الْوَحْشِي**. **lateral l. (= l. lateralis)** سبيل طولاني من الألياف العصبية التي تمتد إلى الأعلى خلال المادة السقيفية للجسر والمكونة بصورة خاصة من الياف تبدأ من النوى القوقعية المعاكسة والجسم المنحرفي وتصلد لتنتهي في الأكمة السفلية والجسم الركيبي الإنسي.

**الْفَتِيلُ الْإِنْسِي**. **medial l. (= l. medialis)** سبيل يبدأ من الألياف المقوسة الداخلية للنواتين الإسفينية والناحلة والذي يعبر إلى الجهة المعاكسة في القسم السفلي من البصلة ليتسلق أولاً بين الزيتونتين ثم خلال الجزء الظهري للجسر على ظهر النوى الجسرية ثم يستمر خلال سقيفة الدماغ المتوسط لينتهي في القسم البطني الخلفي للمهاد ويحمل هذه السبيل دفعات حسية من الجهة المقابلة للجسم.

**السَّبِيلُ الْبَصْرِي**. **optic l. (= tractus opticus)**

**l. sensitivus (= sensory l. = medial l.)** **الْفَتِيلُ الْجَسْمِي**.

**الْفَتِيلُ النُّخَاعِي**. قسم **spinal l. (= l. spinalis)** السبيل النخاعي المهادي الذي يوجد في الجسر والدماغ المتوسط والذي يكون حزمة منتشرة بين الفتيلين الوحشي والإنسي وهو يحمل دفعات حواس الألم والحرارة واللمس من الجهة المعاكسة من الجسم وينتهي في القسم البطني الخلفي للمهاد.

**فَتِيلٌ ثَلَاثِي** **trigeminal l. (= l. trigeminalis)** الثوائم. الياف تنقل دفعات حسية من نوى العصب ثلاثي الثوائم إلى القسم البطني الخلفي للمهاد على الجهة المعاكسة وهي تتسلق مختلطة مع الفتيل النخاعي وجوار الفتيل الإنسي.

**شَلْلُ الْمَرِيء**. **lemoparalysis**

**تَضْيِيقُ الْمَرِيء**. **lemostenosis**

**إِسْتِجَابَةُ التَّطْوِيل**. **lengthening reaction** تطويل للعضلات الباسطة يسمح بثني الطرف.

**lenticular** عَدْسِي. 1. متعلق بالعدسة



2. متعلق بالنواة العدسية.
- lenticulo-optic** عَدَسِيٌّ مِهَادِي. متعلق بالنواة العدسية والمهاد البصري.
- lenticulostriate** عَدَسِيٌّ مُخَطَّطِي. متعلق بالنواة العدسية والجسم المخطط.
- lenticulothalamic** عَدَسِيٌّ مِهَادِي. متعلق بالنواة العدسية والمهاد.
- leprosy** الجُدَام. مرض عدواني متري مزمن تولده المتفطرة الجذامية ويتصف بأفات ورمية حُبَيْبِيَّة أو تغذوية عصبية في الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب والعظام والأحشاء.
- leptocephalic** أَمَقُّ الرَّأْس. مصاب بمق الرأس.
- leptocephaly** مَقَقُّ الرَّأْس. طول الرأس الشاذ مع ضيقه.
- leptomeninges** السَّحَايَا الرِّقِيَّة. الأم الحنون والعنكبوتية يسميان معاً بالرققتين.
- leptomeningioma** وَرَمٌ سَحَائِي رَقِيق؛ وَرَمٌ السَّحَايَا الرِّقِيَّة.
- leptomeningitis** إِلْتِهَابُ السَّحَايَا الرِّقِيَّة. التهاب الأم الحنون والعنكبوتية الدماغية أو النخاعية.
- I. interma** إِلْتِهَابُ السَّحَايَا الدَّاخِلِيَّة. التهاب الأم الحنون.
- sarcomatous I.** إِلْتِهَابُ السَّحَايَا السَّارِكُومِي. احتشاء ساركومي منتشر في الأم الحنون.
- leptomeningopathy** إِعْتِلَالُ السَّحَايَا الرِّقِيَّة. أي مرض يصيب السحايا الرقيقة.
- leptomeninx** سَحَاءَةٌ رَقِيَّة. مفرد السحايا الرقيقة.
- lesbian** سَحَايَّة. أنثى تشتهي ممارسة الجنس مع مثيلاتها من النساء.
- lesbianism** سَحَاق. جنوسية أنثوية.
- lesion** آفة. (ج: آفات). تقطع الأنسجة المرضي أو الرضحي أو فقدان وظيفة أحد أقسام الجسم.
- central I.** آفة مَرْكَزِيَّة. آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- local I.** آفة مَوْضِعِيَّة. آفة في الجهاز العصبي تولد أعراضاً موضعية في الجسم.
- lower motor neuron I.** آفة العَصَبُون الحَرَكِي السُّفْلِي. آفة في الأعصاب الحركية خارج الجهاز العصبي المركزي.
- organic I.** آفة عُضُويَّة. آفة تولد تغييراً عضوياً في بنية العضو المصاب.
- structural I. (= organic I.)** آفة بَنِيَوِيَّة. آفة عضوية.
- systemic I.** آفة جَهَازِيَّة. آفة تصيب أحد أجهزة الجسم أو أعضائه المترابطة وظيفياً.
- trophic I.** آفة تَغْذُويَّة. آفة تولد اضطراباً في تغذية أحد الأعضاء.
- upper motor neuron I.** آفة العَصَبُون الحَرَكِي العُلُوي. المتلازمة الهرمية وهي آفة تصيب الألياف العصبية الحركية المركزية.
- lethal** مُمِيت. عامل يسبب الموت.
- lethargy** وَسَنٌ؛ نَوَام. حالة نعاس شديد شاذ أو ذهول مع تعب أو تخلف أو نقص النشاط الجسمي أو الفكري ويمكن أن تنتج عن آفة عضوية أو اختلال وظائف الجهاز العصبي أو مرض عقلي.
- hypnotic I.** وَسَنٌ تَنُويِمِي. وسن ينتج عن التنويم.
- hysteric I. (= hypnotic I.)** وَسَنٌ هِسْتِيرِي. وسن تنويمي.
- induced I. (= hypnotic I.)** وَسَنٌ مُحْدَث. وسن تنويمي.
- lucid I.** وَسَنٌ وَاعٍ. فقدان الإرادة على العمل والحركة رغم كون المصاب واعٍ وقادر على الكلام.
- lethetal (= amnesic)** نَسَاوِيٌّ؛ مُفْقَدُ الذَّاكِرَةِ.
- lethologica (= aphasia nominal)** حُبْسَةٌ إِسْمِيَّة.
- leucotomy (= leukotomy)** بَضْعُ الفَصِّ الجَبْهِي.
- leukencephalitis** إِلْتِهَابُ بَيْضَاءِ الدُّمَاغ. التهاب المادة البيضاء للدماغ.

**leukodystrophy** حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ. اضطراب مادة الدماغ البيضاء.

**- globoid l., globoid cell l.** حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ. انظر Krabbe's disease.

**- hereditary cerebral l. (= Pelizaeus-Merzbacher disease)** حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الدُّمَاغِيَّةِ الْوَرِاثِيَّ

**- Krabbe's l. (= Krabbe's disease)** دَاءُ كِرَابَّة

**- metachromatic l.** حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُتَبَدِّلِ اللَّوْنِ. نوع وراثي جسدي متنح من حثل المادة البيضاء يتسبب عن ترسب الشحميات السفنغولية في الأنسجة العصبية وغير العصبية مع فقدان النخاعين المنتشر في الجهاز العصبي المركزي ويبدأ عادة في الأطفال في سن الثالثة مع العمى واختلالات الحركة والصمم والتخلف العقلي والاختلاج.

**- spongiform l. (= Canavan's disease)** حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ الْإِسْفَنْجِي الشَّكْلِ.

**- sudanophilic l.** حَثَلُ الْمَادَّةِ الْبَيْضَاءِ أَلْيَفِ الْفُلُونِ السُّودَانِيَّ. مجموعة من الأمراض متباينة المنشأ تشمل حثل المادة البيضاء الكظري ويتصف بتخريب النخاعين وتنصبغ فيه المواد المخربة بلون أحمر قاني بالملونات الشحمية.

**leukoencephalitis** الْتِهَابُ بَيْضَاءِ الدُّمَاغِ. التهاب المادة البيضاء الدماغية.

**leukoencephalopathy** اِغْتِلَالُ بَيْضَاءِ الدُّمَاغِ. أية مجموعة من الأمراض التي تصيب مادة الدماغ البيضاء وخصوصاً مادة نصفي الكرة المخيتين وعادة ما تصيب الولدان والأطفال.

**- metachromatic l.** اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ الْمُتَبَدِّلِ اللَّوْنِ. اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ a. **- progressive multifocal l.** اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ الْمُتَرَقِّي الْمُتَعَدِّدِ الْبُؤَرِ. داء مميت يتسبب غالباً عن إصابة فيروسية، يتصف بزوال نخاعين المادة البيضاء وقد يحدث في ساق الدماغ والمخيخ أيضاً.

**- subacute sclerosing l. (= subacute sclerosing parencephalitis)** اِغْتِلَالُ الْبَيْضَاءِ الْمُصَلَّبِ دُونَ الْحَادِ.

**leukoencephaly (= leukoencephalopathy)** اِغْتِلَالُ بَيْضَاءِ الدُّمَاغِ.

**leukomyelitis** اِلْتِهَابُ بَيْضَاءِ النُّخَاعِ. التهاب المادة البيضاء للنخاع الشوكي.

**leukomyelopathy** اِغْتِلَالُ بَيْضَاءِ النُّخَاعِ. أي مرض يصيب ببيض النخاع الشوكي.

**leukotome** مِبْضَعُ الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. قُنْيٌ تمرر خلاله عروة سلكية لإجراء عملية بضع الفص الجبهي.

**leukotomy (= lobotomy prefrontal)** بَضْعُ الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. عملية بضع المادة البيضاء للفص الجبهي.

**- transorbital l.** بَضْعُ الْفَصِّ الْجَبْهِيِّ عِبْرَ الْحَجَاجِ. بضع المادة البيضاء للفص الجبهي عبر الصفيحة الحاجية.

**level** مُسْتَوًى. (ج: مُسْتَوَيَات). 1. الموقع النسبي أو الدرجة أو التركيز النسبي 2. مركز دماغي نخاعي لربط وتنسيق الدفعات العصبية فالمستوى الأول هو النخاعي والثاني هو ساق الدماغ والثالث قشرته.

**- l's. of consciousness** مُسْتَوَيَاتُ الْوُعْيِ. درجات الإحساس واليقظة وهي السهاد اليقظ alert wakefulness والوسن lethargy والخمود أو تَغَيِّمِ الوعي obtundation والذهول stupor والسبات أو الغيبوبة coma.

**- isoelectric l.** مُسْتَوًى تَسَاوِي الكهرباثية. مستوى جهد الراحة للخلية وهو مستوى الخط القاعدي للمخطط الكهربائي للقلب.

**levodopa** لِيْفُودُوبَا. مادة بيضاء تستعمل كدواء لمعالجة داء باركنسون.

**libido** شَبَقٌ؛ كَرَجٌ؛ الرغبة الجنسية. 1. الشهوة الجنسية 2. قوة الحياة الجنسية النشطة.

**limb** طَرْفٌ. 1. إحدى الزوائد المزدوجة للجسم وهما الطرفان العلويان والسفليان 2. بنية تشبه الذراع أو الساق.

**- l. of internal capsule, anterior** الدَّرَاعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْمَحْفَظَةِ الدَّاخِلِيَّةِ. قسم المحفظة الداخلية للدماغ الذي يفصل النواتين المذنبة والعنسية عن بعضهما وهو يحوي التشععات المهادية الامامية والسبيل الجبهي الحنكي.

**- phantom l.** طَرَفٌ شَبَحِيٌّ. حس بوجود الطرف بعد بتره وكأنه لا زال في موضعه، كما قد يشعر المريض بالآلم منقطعة أو متواصلة وكأنها صادرة من الطرف المقطوع.

**limbic** حُوفِيٌّ. متعلق بالحوف أو الحافة.

**- l. system** الجهاز الحُوفِيٌّ. انظر system.

**limen** عَتَبَةٌ. مصطلح عام للدلالة على نقطة البدء أو الحافة أو عتبة البنية أو المنبه.

**- l. insulae** عَتَبَةُ الْجَزِيرَةِ. النقطة التي تتصل عندها قشرة الجزيرة على السطح السفلي لنصف كرة المخ مع قشرة الفص الجبهي.

**liminal** حَدِّيٌّ؛ أَصْغَرِيٌّ. أصغر حد من المنبه تدركه الحواس.

**liminometer** مِقْيَاسُ الْعَتَبَةِ. آلة تقيس شدة المنبه الذي يطبق على الوتر لغرض قياس عتبة المنعكس المولد.

**lingula** لُسْنِيْن. (ج. لُسْنِيْنَات). بنية شبيهة باللسان الصغير.

**- l. cerebelli.** لُسْنِيْنُ الْمُخِيخ. القسم البطني للفص الخلفي للمخيخ حيث يلتصق الشراع البصلي القحفي.

**liquor cerebrospinalis (=fluid cerebrospinal)** السَّائِلُ الدَّمَاعِي النَّخَاعِي. انظر fluid.

**lissencephalia** انعدام التلافيف.

**lissencephalic** عديم التلافيف. ذو مخ فيه القليل من التلافيف الضحلة أو معدوم التلافيف ويشاهد ذلك في العديد من الحيوانات.

**lissencephaly** انعدام التلافيف.

**lissive** مُرَّحٌ إِسْوَانِيٌّ. يرخي تشنج العضلات من دون التأثير على وظائفها.

**lobe** فَصٌّ. (ج. قُصُوصٌ). جزء محدد ومعين من أحد الأعضاء خصوصاً من الدماغ أو الرئة أو الكبد.

**- anterior l. of hypophysis (=adenohypophysis)** النَخَامِيَّةُ الغُدِّيَّة.

**- anterior l. of pituitary gland (=adenohypophysis)** النَخَامِيَّةُ الغُدِّيَّة.

**- caudate l. of cerebrum (=insula)** الْجَزِيرَةُ: الفص الذنبي للمخ.

**- l. of cerebellum, anterior (=lobus rostralis cerebelli)** الفَصُّ الْمُنْقَارِيُّ لِلْمُخِيخ.

**- l. of cerebellum, cranial (=lobus rostralis cerebelli)** الفَصُّ الْمُنْقَارِيُّ لِلْمُخِيخ.

**- l. of cerebellum, middle (=lobus caudalis cerebelli)** الفَصُّ الذَّنْبِيُّ لِلْمُخِيخ.

**- cuneate l. (=cuneus)** الإسْفِين.

**- frontal l.** الفَصُّ الْجَبْهِيُّ. القسم الأمامي من نصف كرة المخ.

**- gracile l/ of cerebellum (=lobulus paramedianus cerebelli)** الفُصَيْصُ الْمُخِيخِيَّ الْمَجَاوِرُ لِلنَّاصِفِ

**- limbic l. (=gyrus fornicatus)** التَلْفِيفُ الْمُقْوَس.

**- neural l.** فَصٌّ عَصَبِيٌّ.

**- l. of neurohypophysis (=lobus nervosus neurohypophyseos)** النَخَامِيَّةُ العَصَبِيَّة. الفص العصبي للنخامية العصبية.

**- occipital l.** الفَصُّ الْقَذَالِيٌّ. القسم الخلفي من نصف كرة المخ.

**- olfactory l. (=lobus olfactorius)** الفَصُّ الشَّمِّيُّ.

**- parietal l.** الفَصُّ الْجَذَارِيٌّ. القسم العلوي المركزي من نصف كرة المخ.

**- piriform l. (=piriform area)** الفَصُّ الْكُمُثْرِيُّ الشَّكْل. الباحة الكمثرية الشكل.

**- posterior l. of hypophysis (=neurohypophysis)** النَخَامِيَّةُ العَصَبِيَّة.

**- prefrontal l.** الفَصُّ أَمَامُ الْجَبْهِيِّ. قسم الفص الجبهي من الدماغ الذي يقع أمام التلفيف الصاعد.

**- quadrangular l. of cerebellum (=lobulus quadrangularis cerebelli)** الفُصَيْصُ الْمُرَبَّعُ لِلْمُخِيخ.

**- quadrate l. of cerebral hemisphere** الطَّلُّ: الفَصُّ الْمُرَبَّعِي لِنِصْفِ كُرَةِ الْمَخ. الفص أمام الإسفين.

- semilunar l., inferior (=lobulus semilunaris inferior) **الفُصَيْصُ الهَلَالِي السُّفْلِي**.

- semilunar l., superior (=lobulus semilunaris superior) **الفُصَيْصُ الهَلَالِي العُلَوِي**.

- temporal l. **الفَصُّ الصَّدْغِي**. الفَصُّ السفلي الوحشي لنصف كرة المخ

**lobectomy** **إِسْتِنْصَالُ الفَصِّ**. استئصال أحد الفصوص سواء من المخ أو الكبد أو الرئة أو الغدة الدرقية.

**lobotomy** **بَضْعُ الفَصِّ**. قطع الفص. وفي الدماغ هو قطع كل ألياف أحد الفصوص.

- frontal l. (=prefrontal l.) **بَضْعُ الفَصِّ الجَبْهِي**. عملية تقطع أثناءها كل ألياف الفص الجبهي بمبضعه الخاص الذي يمرر خلال ثقب ثقب في القحف.

- transorbital l. **بَضْعُ الفَصِّ عبر الحَجَاج**. بضع الفص الجبهي بإدخال المبضع خلال الصفيحة الحاجبية.

**lobule** **فُصَيْص**. فص صغير.

- anterior l. of pituitary gland (=lobus anterior hypophyseos) **الفَصُّ الأَمَامِي لِلنَّخَامِيَّة**.

- central l. of cerebellum (=lobulus centralis cerebelli) **الفُصَيْصُ المَرْكَزِي للمُخَيِّخ**.

- falciform l. (=cuneus) **الإِسْفِين**.

- paracentral l. (=lobulus paracentralis) **الفُصَيْصُ المَجَاوِر للمَرْكَزِي**.

- paramedian l. (=lobulus gracilis cerebelli) **الفُصَيْصُ المَجَاوِر للنَّاصِف؛ الفُصَيْصُ المُخَيِّخِي النَّاحِل**.

**lobulus** **فُصَيْص**. فص صغير.

- l. centralis cerebelli **الفُصَيْصُ المَرْكَزِي للمُخَيِّخ**. جزء الفص القحفي للمخ الذي يقع بين اللسين والقنة والذي يستقر على اللسين وعلى الشراع البصلي الامامي.

- l. gracilis cerebelli **الفُصَيْصُ النَّاحِل**

للمُخَيِّخ. جزء من الفص الذنبي لنصف كرة المخ يقع بين الفصيصات الذنبية والهلالية وثلاثي البطينين.

- paracentral l. **الفُصَيْصُ المَجَاوِر للمَرْكَزِي**. فصيص على السطح الإنسي لنصف كرة المخ متصل مع التلفيفين أمام ووراء مركزي الفصين الجبهي والجداري ويحده من الأسفل التلم الحزامي ويتكون بصورة رئيسية من مراكز حسية وحركية للطرف السفلي من الجسم.

- l. paramedianus cerebelli (=l. gracilis cerebelli) **الفُصَيْصُ المَجَاوِر للنَّاصِف؛ الفُصَيْصُ المُخَيِّخِي النَّاحِل**.

- l. parietalis inferior **الفُصَيْصُ الجِدَارِي السُّفْلِي**. الفصيص الذي يكون القسم الخلفي من الجزء الوحشي من الفص الجداري للمخ يقع تحت التلم داخل الجداري وفوق الفرع الخلفي للشق المخي الوحشي وخلف التلم وخلف المركزي وهو يحوي التلفيفين فوق الهامشي والزواوي ويتحكم في نصف الكرة السائد بوظائف الكلام.

- l. parietalis superior **الفُصَيْصُ الجِدَارِي العُلَوِي**. القسم الخلفي من الجزء العلوي من الفص الجداري للمخ ويقع خلف التلم خلف المركزي وأمام الشق الجداري القذالي وفوق التلم داخل الجداري وهو يجوي باحات ارتباطية خاصة بالوظائف الحسية العامة.

- l. quadrangularis cerebelli **الفُصَيْصُ المُرَبَّع المُخَيِّخِي**. جزء الفص القحفي لنصف كرة المخ الذي يقع بين الشقين وراء المركزي والاولي والمتصل مع القنة.

- l. semilunaris caudalis **الفُصَيْصُ الهَلَالِي الذَّنْبِي**. جزء الفص الذنبية لنصف كرة المخ المتصل مع حلبة الدودة.

- l. semilunaris cranialis (=l. semilunaris rostralis) **الفُصَيْصُ الهَلَالِي القَحْفِي؛ الفَصُّ الهَلَالِي المنْقَارِي**.

- l. semilunaris inferior (=l. semilunaris caudalis) **الفص الهلالي السفلي؛ الفُصَيْصُ الهَلَالِي الذَّنْبِي**.

- l. semilunaris rostralis **الفُصَيْصُ الهَلَالِي المنْقَارِي**. جزء نصف كرة المخ المتصل مع ورقة الدودة.

- **l. semilunaris superior (=l. semi-lunaris rostralis)** الفص الهلالي العلوي؛ الفصُّ المُنْحَنُ الهَلَالِيّ المنقاري.

- **l. simplex cerebelli** الفصُّ البسيط لِلْمُخَيخ. جزء الفص الذنبى لنصف كرة المخ المتصل مع الحدة.

**lobus (=lobe)** فَص. (ج: فُصُوص).

- **l. anterior cerebelli (=cranialis cerebelli)** الفصُّ الأَمَاقِي لِلْمُخَيخ.

- **l. anterior hypophyseos (=adenohypophysis)** النُخَامِيَّةُ الغُذِيَّة.

- **l. caudalis cerebelli** الفصُّ الذَنبِي لِلْمُخَيخ. جزء المخ الذي يفصله الشق الأولي عن الفص القحفي ويفصله الشق الظهري الوحشي عن الفص الندفي العقدي ويحوي الحدة وورقة الدودة وحدبتها والهرم واللهاة والفصيص البسيط والفصيصين الهلاليين القحفي والذنبى.

- **lobi cerebri** فُصُوصُ المَخ. المناطق المحددة من قشرة المخ التي تحددها الشقوق والاتلام والخطوط المصطلحية والتي تشمل الفصوص الجبهي والجداري والصدغي والقذالي.

- **l. flocculonodularis** الفصُّ النُذْفِي العُقَيْدِي. جزء رئيسي من المخيح يحوي الندتين الجانبيتين وسويقاتهما والعقيدات.

- **l. frontalis** الفصُّ الجَبْهِيّ. القسم الامامي من نصف كرة المخ الذي يمتد من القطب الامامي حتى التلم المركزي.

- **l. insularis** الفصُّ الجَزِيرِيّ. جزء قشرة المخ الذي يقع في عمق التلم الوحشي والذي يحيطه التلم الدائري تقريبا ويغطي ويخبأ بالوصاد المجاور.

- **l. nervous hypophyseos (=neurohypophysis)** النُخَامِيَّةُ العَصَبِيَّة.

- **l. occipitalis** الفصُّ القَذَالِيّ. القسم الخلفي من نصف كرة المخ والذي يمتد من القطب الخلفي حتى الشق الجداري القذالي على السطح الإنسي ويتصل بالفص الجداري على الوجه الوحشي للمخ.

- **l. olfactorius** الفصُّ الشَّمِّيّ. مصطلح يطلق على الجهاز الشمي في السطح السفلي للفص الجبهي

للدماغ ويتكون من البصلة الشمية والسبيل والمثلث الشميين.

- **l. parietalis** الفصُّ الجِدَارِيّ. الفص العلوي المركزي لنصف كرة المخ الذي يفصله من الأسفل التلم الوحشي عن الفص الصدغي ولكنه يتصل به عند نهايته الخلفية ويفصله التلم المركزي عن الفص الجبهي ويتصل بالفص القذالي عند نهايته الخلفية على السطح الوحشي ولكنه مفصول عنه على جهته الإنسية بالتلم الجداري القذالي.

- **l. posterior cerebelli (=l. caudalis cerebelli)** الفصُّ الذَنبِي لِلْمُخَيخ.

- **l. posterior hypophyseos (=neurohypophysis)** الفصُّ الخلفي للنخامية؛ النُخَامِيَّةُ العَصَبِيَّة.

- **l. rostralis cerebelli** الفصُّ المنقاري لِلْمُخَيخ. جزء المخ الذي يقع أمام الشق الأولي ويحوي اللسين والفصيص المربع.

**1. تَوَضُّع**، **2. تَوَضُّع**، **1. تعيين localization** موقع أو موضع أية أفة أو عملية. **2. تحديد الوضع** في منطقة محددة.

**تَوَضُّع دِمَاغِيّ**. تحديد موضع مختلف **l. cerebral** محتويات الدماغ أو توضع مختلف وظائف الدماغ في مناطق معينة منه.

**ضَرْزَر**. **lockjaw (=trismus)**

**تَحَرُّك**. الحركة أو القابلية على **locomotion** الحركة والانتقال من موضع لآخر.

**تَحَرُّكِيّ**. متعلق بالحرك أو **locomotor** ما يؤثر في الجهاز الحركي للجسم.


**مَوْضِع**. (ج: مَوَاضِع). موقع في **locus** أحد أقسام الجسم.

المَوْضِعُ الأزرق. **l. caeruleus (=l. coeruleus)**

المَوْضِعُ الأزرق. **l. ceruleus (=l. coeruleus)**

المَوْضِعُ الأزرق. بارزة منصبة **l. coeruleus** في الزاوية العلوية في قاع الدماغ.

المَوْضِعُ الأزرق. **l. ferrugineus (=l. coeruleus)**



localization, sensory

التوزيع المقطعي للقطاعات الجلدية على الوجهين الخلفي للجسم (1) وعلى وجهه الأمامي (2)، وتشير الحروف C إلى القطاعات الرقبية و T إلى القطاعات الصدرية و L إلى القطاعات القطنية و S إلى القطاعات العجزية، كما تشير الأرقام إلى أرقام القطاعات. كما ظهرت المناطق الرقبية باللون الأصفر والمنطقة الصدرية العلوية والأطراف العلوية باللون الأحمر والمنطقة الصدرية السفلية والبطنية باللون البنفسجي ومنطقة الجسم السفلي والأطراف السفلية باللون الأزرق.

- المَاةُ**  
- l. niger (=substantia nigra) السُّودَاءُ.
- النَّوَاةُ الحَمْرَاءُ.**  
- l. ruber (=red nucleus)
- حُبْسَةُ كَلَامِيَّة.** اختلال وظائف الكلام المركزية كالحبسة أو انعدام النطق.  
logagnosia
- حُبْسَةُ كِتَابِيَّة.** عدم المقدرة على التعبير عن الأفكار بالكتابة.  
logagraphia
- حُبْسَةُ إِدْرَاكِيَّة.**  
logamnesia (=receptive aphasia)
- حُبْسَةُ تَغْبِيرِيَّة.**  
logaphasia (=expressive aphasia)
- حُبْسَةُ الفَهْم.** اضطراب دماغي يتصف بعدم مقدرة المريض على فهم الكلام.  
logasthenia
- رَمْعُ الكَلَام.** ترديد مقاطع آخر الكلمات.  
logoclonia
- رَمْعُ الكَلَام.**  
logoklony (=logoclonia)
- حُبْسُ**  
logokoposis (=word deafness) **ة سَمْعِيَّة.** صمم الكلمات وعدم فهم الكلمات المسموعة.
- ثَرْثَرَة؛ هَذَر.** كثرة الكلام.  
logomania
- إِغْتِلَالٌ كَلَامِي.** أي اضطراب في وظائف الكلام.  
logopathy
- شَلْلٌ كَلَامِي.** شلل أعضاء الكلام أو النطق.  
logoplegia
- هَذَر؛ ثَرْثَرَة.** كثرة الكلام وسرعته.  
logorrhea
- تَشْنُجُ الكَلَام.** نطق الكلمات التشنجي.  
logospasm
- عُرْوَة.** (ج: عُرَى). تقوس حاد في بنية خيطية الشكل أو آلة ذات قوس طرفي.  
loop
- دَائِرَة مُغْلَقَة.** جهاز يؤثر فيه النتائج على الدخل.  
- closed l.
- عُرْوَة غَامَا.** قوس منعكسي يتكون من خلايا القرن الأمامي التي تنبه اليافها الغامية الحزم  
- gamma l.
- العضلية داخل المغزل فتتقلص وتولد نبضات واردة تمر خلال الجذر الخلفي إلى خلايا القرن الأمامي فتولد منعكس التمدد.
- عُرْوَة غَامَا.**  
- Granit l. (=gamma l.)
- العُرْوَة الرَقَبِيَّة.**  
- l. of hypoglossal nerve (=ansa cervi-callis)
- العُرْوَة**  
- lenticular l. (=ansa lenticularis) **العَدْسِيَّة.**
- دَائِرَة مُفْتُوحَة؛ عُرْوَة مُفْتُوحَة.** جهاز يؤثر فيه الدخل على النتائج وعلى الدخل.
- العُرْوَة السُّوَيْفِيَّة.**  
- peduncular l. (=ansa peduncularis)
- عُرَى الأعصابِ النُّخَاعِيَّة.**  
- l's. of spinal nerves (=ansae nervorum spinalium)
- العُرْوَة**  
- subclavian l. (=ansa subclavia) **تَحْتَ التَّرْقَوِيَّة.**
- قَعَسٌ.** التقعر الأمامي في تقوس العمود الفقري القطني والرقبي كما يشاهد من الجانب.
- أَلَمُ القَطَن؛ قُطَان.** ألم في المنطقة القطنية.
- أَلَمُ القَطَن الإِقْفَارِي.** ألم منطقة أسفل الظهر والأليتين بسبب القصور الوعائي كما يحدث في انسداد نهاية الأبر.
- جُنُون.**  
lunacy (=insanity)
- مَجْنُون.**  
lunatic (=insane)
- ثُنَائِي (LSD) lysergic acid diethylamide**  
إثيلاميد حَمْضُ اللِّيسَرْجِيك. مادة محرّضة للهلوسة تولد من قلوانيات الأروغوت ولها فعل محاكي الودي ومحصر لفعل السيروتونين فتغير مزاج المريض ووظائفه الحسية والهلوسة والتوهم والحس المشترك وفقدان الشخصية الذاتية.
- رُهَابُ الكَلْب.** الخوف من داء الكلب.  
lyssophobia

# M

**macrencephalia (= macrencephaly)** ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ.

**macrencephaly** ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ. فرط نمو الدماغ.

**macrocephalia (= macrocephaly)** ضَخَامَةُ الرَّأْسِ.

**macrocephalic (= macrocephalous)** ضَخْمُ الرَّأْسِ.

**macrocephalous** ضَخْمُ الرَّأْسِ. ذو رأس ضخم جداً.

**macrocephaly** ضَخَامَةُ الرَّأْسِ. ضخامة الرأس الشاذ.

**macroencephaly (= macrencephaly)** ضَخَامَةُ الدِّمَاغِ.

**macroesthesia** حَسٌّ تَضَخُّيمِيٌّ. حس المواد وإدراكها بأنها أكبر من حجمها الحقيقي.

**macrogenitosomia** ضَخَامَةُ تَنَاسُلِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ. ضخامة الأعضاء التناسلية المفرطة.

**- m. precox (= epiphyseal syndrome)** ضَخَامَةُ تَنَاسُلِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ مُبَكِّرَةٍ.

**macroglia** دَبَقٌ عَصَبِيٌّ كَبِيرِيٌّ. دبق عصبي من أصل أديمي ظاهري يشمل الخلايا النجمية والخلايا الدبقية القليلة التغصن.

**macrogyria** ضَخَامَةُ التَّلَافُيفِ. نقص في عدد أتلان المخ مع زيادة مادة المخ مما يولد ضخامة في حجم التلافيف.

**macula** بُقْعَةٌ. بقعة أو تتخُن أو تتَغَيَّر في لون منطقة صغيرة بالنسبة للمناطق المحيطة بها.

**- cerebral m. (= tache cerebrale)** لُطَخَةٌ مُخْنِيَّةٌ.

**- m. retinae** بُقْعَةُ الشَّبَكِيَّةِ. بقعة صغيرة منخفضة صفراء اللون بعرض حوالي 3 درجات وبالجبهة الوحشية وقليلًا إلى الأسفل من القرص البصري وهي النقطة الحساسة لرؤية الألوان وللتمييز البصري.

**maculocerebral** بُقْعِيٌّ دِمَاغِيٌّ. متعلق ببقعة الشبكية والدماغ.

**madness (= insanity)** جُنُونٌ.

**maladjustment** سُوءُ التَّلَاؤُمِ. فشل الشخص في ملاءمة حاجاته النفسية مع محيطه.

**malady (= disease)** مَرَضٌ؛ دَاءٌ.

**malaise** وَغْغَةٌ؛ فُتُورٌ. شعور غامض بعدم الراحة أو الاستقرار الجسدي.

**malaria, cerebral** مَلَارِيَا دِمَاغِيَّةٌ. اختلاط وبيل ومميت أحياناً للملاريا المنجلية التي تصيب الدماغ وتتصف بالصداع والتخليط والظواهر النفسية التي تتطور إلى الهذيان والغيبوبة أو ارتفاع درجة الحرارة المفاجيء التي تبقى عالية مولدة الاختلاج والغيبوبة.

**maldevelopment** سُوءُ التَّنَامِي. النمو والتنامي الشاذان.

**malformation (= deformity)** تَشَوُّهُ؛ شَوَّةٌ. العيب الشكلي الذي يتولد عن سوء التنامي الشاذ.

**malfunction (= dysfunction)** خَلَلٌ وَظِيفِيٌّ.

**malignancy** خَبَائِثَةٌ. 1. الاستعداد للتطور النوعي، وصفة الآفات الخبيثة. 2. السرطان وخاصة ذلك الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت.

**malignant** خَبِيثٌ. الاستعداد للتطور التدريجي



إلى الأسوأ الذي يؤدي إلى الموت وله خواص الكشم والغزو والانتقال كما يحصل في الأورام الخبيثة.

**malingerer** مُتَعَارِض. شخص يحاول التمارض.

**malingering** تَمَارُض. شخص يحاول إرادياً أن يتحايل ويبالغ في أعراض مرضه أو إصابته أو يتصنعها لتحقيق رغبة مستهدفة.

**malleation** نَقْضَانُ الْيَدِ. نقضان عضلات اليد الحاد وارتعاشها.

**mammalgia (= mastalgia)** أَلَمُ الثَدِي.

**mania** هُوسٌ. 1. اضطراب المزاج الذي يتصف بالتيه والتعالي والهيّاج وفرط الاستثارية والفعالية مع سرعة التفكير والنطق وتوارد الخواطر 2. كما يعني المصطلح عند ربطه باسم آخر الوسواس القسري بأحد الأمور مثل هوس العشق أو هوس السرقة.

**- aknetic m.** هُوسٌ لَأَحْرَكِي. متلازمة هوسية تتصف باللاحركية بدل فرط الحركة.

**- m. à potu (= delirium tremens)** هَذْيَانٌ إِرْتِعَاشِيّ.

**- Bell's m. (= delirious m.)** هُوسٌ هَذْيَانِيّ.

**- brooding m. (= obsessive rumination)** إِجْتِرَازٌ وَسْوَاسِيّ.

**- dancing m. (= choreomania)** هُوسٌ رَقْصِيّ.

**- delirious m.** هُوسٌ هَذْيَانِيّ. اشد أنواع الهوس ويشاهد خاصة في الذهان الهوسي الاكتئابي مع هياج نفسي حركي وهط قد يؤدي إلى الموت ومن خواصه الرئيسية التوهان الجزئي أو الكلي.

**- depressive m.** هُوسٌ إِكْتِيَابِيّ. حالة تشاهد في الذهان الهوسي الاكتئابي تظهر فيها أعراض اكتئابية ضمن الأعراض الهوسية.

**- doubting m. (folle du doute)** هُوسٌ تَشَكُّكِيّ. حالة مرضية تتصف بعدم تمكن المصاب من اتخاذ أي قرار مهما كان تافهاً وهي حالة قسرية.

**- periodical m.** هُوسٌ دَوْرِيّ. هوس يعاود بنوبات دورية.

**- persecution m.** هُوسٌ إِضْطِهَاد. هوس المصاب بشعوره الخاطئ باضطهاد الآخرين له.

**- puerperal m.** هُوسٌ نِفَاسِيّ. هوس يتلو الولادة وهو عرض للذهان النفاسي.

**- reactive m.** هُوسٌ إِسْتِجَابِيّ. هوس يتولد استجابة لحوادث خارجية طارئة كال فشل أو الخسارة أو فقدان عزيز أو قريب.

**- religious m.** هُوسٌ دِينِيّ. هوس يتولد عن اعتقادات دينية خاطئة أو شاذة.

**- unproductive m.** هُوسٌ غَيْرُ مُفْعِم. حالة تتصف بسلوك شبيه بالهوس مع كبت المريض لأفكاره وسكوته.

**maniac** مَهْوُوس. شخص مصاب بالهوس.

**maniacal** مَهْوُوس. مصاب بالهوس.

**manic-depressive** هُوسِيّ - إِكْتِيَابِيّ. تناوب بين نوبات الهوس والاكتئاب.

**mannerism** النُصْنَع. أي حركات نمطية أو عادات يتعلمها الشخص ويكررها دائماً وتكون خاصة به.

**mannitol** مَانِيْتُول. دواء يستعمل لتقليل ضغط داخل العين أو ضغط السائل الدماغي النخاعي.

**mantle** رِبْطَة. غطاء أو ستر أو طبقة.

**- brain m. (= pallium)** قَشْرَةُ الْمَخ. الطبقة الخارجية التي تغطي المخ.

**MAO (= monamine oxidase)** أُكْسِيدَازُ أَحَادِيّ الْأَمِين.

1. سَقْلِيّ **marasmatic (= marasmic)** 2. سَقْل. منسوب للسفل أو مصاب به.

**marasmus** سَقْل. حالة سوء تغذية بروتينية - سَعْرِيّة في الأطفال خصوصاً في السنة الأولى من أعمارهم. تتصف بتخلف النمو والضمور المترقي للعضلات وشحم تحت الجلد ولكن مع الاحتفاظ بالشهية واليقظة الفكرية وقد تنتج عن العدوى والالتهابات.

**marche a petits pas** مَشْيَةُ الْخَطَوَاتِ الْقَصِيرَةِ. مشية يخطو فيها المريض خطوات قصيرة تشاهد في الصمل التصلبي الشرياني الدماغي.

**margim** هَامِش؛ حَافَة. حافة أو هامش أحد الأعضاء أو البنات التشريحية.

**margo (= margin)** هامش؛ حافة.  
**- m. Inferior cerebri** الحافة السفلية للمخ.  
 الحافة السفلية الوحشية لنصف كرة المخ.  
**- m. Inferolateralis cerebri (= m. Inferior cerebri)** الحافة السفلية الوحشية للمخ.  
**- m. inferomedialis cerebri (= m. inferior cerebri)** الحافة السفلية الإنسية للمخ.  
**- m. medialis cerebri** الحافة الإنسية للمخ.  
 الحافة السفلية الإنسية لنصف كرة المخ.  
**- m. superior cerebri** الحافة العلوية للمخ.  
 الحافة العلوية الإنسية لنصف كرة المخ.  
**- m. superomedialis cerebri (= m. superior cerebri)** الحافة العلوية الإنسية للمخ.  
**mariahuana, mariajuana (= marihuana)** الحشيش.  
**mariguana, marihuana** الحشيش.  
 مستحضر من أوراق وزهور نبتة الحشيش الذي يصنع بشكل سكاثر ويدخن بسبب خواصه الشمعية.  
**marijuana (= marihuana)** الحشيش.  
**marrowbrain (= myelencephalon)** الدماغ البصلي.  
**masculation** إذكاء. ثنائي الصفات الذكورية.  
**masculine** مُذكر. منسوب للجنس المذكر أو يتمتع بصفات ذكورية.  
**masculinity** ذُكورة. امتلاك الصفات الذكورية.  
**masculinization** إذكاء. التطور السوي للصفات الجنسية الذكورية في الذكور أو تنامي أو تنمية الصفات الذكورية الثانوية في الإناث.  
**masculinize** يُذكر. توليد صفات ذكورية في الأنثى أو حتّى نمو الصفات الذكورية في الذكر البالغ.  
**masochism** مَارُوخِيَّة. شذوذ جنسي تشبع فيه الرغبة الجنسية بضرب الشخص أو إهانته أو تعذيبه من قبل شخص آخر.  
**masochist** مَارُوخِيّ. مصاب بالماروخية.  
**mastodynia** وجع الثدي. ألم في الثدي.  
**mastoid** 1. خُشاء 2. ثديي. 1. الناتئ 2. الخشائي للعظم الصدغي 2. ثديي الشكل.

**mastoidalgia** ألم الخشاء. ألم في الخشاء أو في منطقة الناتئ الخشائي.  
**masturbation** الإستمناء. التنبيه الذاتي للأعضاء التناسلية لغرض التلذذ الجنسي.  
**mating** تَزَاوُج. تزواج أفراد من جنسين مختلفين وخاصة لغرض التوالد.  
**matter** مَادَّة. 1. كل ما يحتل حيزاً 2. قيح.  
**- gelatinous m. (= substantia gelatinosa)** المادّة الهلاميّة.  
**- gray m. of nervous system (= substantia grisea)** مادّة الجهاز العصبي السنجابية.  
**- white m. of nervous system (= substantia alba)** مادّة الجهاز العصبي البيضاء.  
**maturation** 1. نضج 2. تَقْنِيح. 1. مرحلة أو عملية النضوج الكامل وبلوغ النضج العقلي والعاطفي الكامل للمرء 2. تقيح.  
**mature** 1. نَضُج 2. ناضج، راشد. شخص ناضج أو يمر بمرحلة النضوج أو بعملية النضوج.  
**maturity** الرُشد؛ النُضُج. مرحلة بلوغ أعلى درجات النضج والتطور.  
**matutinal** صَبَاحِيّ. متعلّق بالصباح أو يحدث أثناءه.  
**mazodynia (= mastodynia)** وجع الثدي.  
**meatus** صِمَاخ. ممر أو فتحة في الجسم.  
**- external acoustic m.** الصمّاخ السَمْعِيّ الظاهر. العمر من الأذن الخارجية حتى غشاء الطبل.  
**- internal acoustic m.** الصمّاخ السَمْعِيّ الباطن. العمر الذي تمر منه الأعصاب الوجهي والوسطي والسمعي الدهليزي والشريري التيهي.  
**mechanoreceptor** مُسْتَقْبِلَة آليّة. مستقبلّة تتنبه بالضغط الآلي أو بالانفتال مثل مستقبلات اللمس والصوت والتقلص العضلي.  
**mecocephalic (= dolichocephalic)** طَوِيلُ الرَّأْس.  
**mecystasis** فَيَاثُ التَوَثُّر. حالة عدم

تغير توتر العضلة التقلصي أو الارتخائي بالرغم من تغيير طولها.

### medazepam hydrochloride

هيدروكلوريد الميدازيبام. دواء مهدئ.

**medulla** 1. نُخَاع 2. لُب. مصطلح عام يعني القسم الداخلي للعضو أو البنية.

- **adrenal m. (= m. glandulae suprarenalis)** لُب الكُظُر.

- **m. glandulae suprarenalis** لُب الكُظُر. القسم الأحمر القهوائي الداخلي واللين من غدة الكظر والذي يولد ويخزن الكاتيكولامين.

- **m. oblongata** البَصَلَة؛ النُخَاع المُسْتَطِيل. مخروط النسيج العصبي المتصل بالجسر من الأعلى وبالنخاع الشوكي من الأسفل والذي يقع أمام المخيخ. ويكون القسم العلوي من سطحه الخلفي قاع الجزء السفلي من البطين الرابع وهو يحوي سبلاً عصبية صاعدة وهابطة وتجمعات من الخلايا العصبية التي تسيطر على الكثير من الوظائف الحيوية كالتنفس والدوران والحواس الخاصة.

- **spinal m. (= m. spinalis)** النُخَاع الشوكي؛ قسم الجهاز العصبي المركزي الذي يوجد في القناة الفقرية والذي يمتد من الثقبة العظمى حيث يتصل بالنخاع المستطيل حتى القسم العلوي من المنطقة القطنية حيث ينتهي بين الفقرات الصدرية الثانية عشر والقطنية الثالثة وغالباً بجانب القرص الفقري بين الفقرتين الأولى والثانية وهو يتكون من اللب السنجابي الداخلي الذي تكثر فيه الخلايا العصبية والطبقة الخارجية المكونة من المادة البيضاء التي تكثر فيها الألياف العصبية المغمدة. وتحيط بالنخاع الشوكي ثلاثة أغشية، هي الأم الحنون والعنكبوتية والأم الجافية، وينبع منه 31 عصباً شوكياً هي 8 أعصاب رقمية و 12 عصباً صدرياً و 5 أعصاب قطنية و 5 أعصاب شوكية وعصب عصعصي واحد، وهو ينقل السبل العصبية من وإلى الدماغ.

1. نُخَاعِي 2. لُبِّي 3. نَقِي؛ نَقَوِي. **medullary** نسبة إلى لب أو نخاع الأعضاء أو نقي العظام.

**medullary cancer** سَرَطان لُبِّي. انظر cephaloma.

**medullated (= myelinated)** نُخَاعِيْنِي؛ ذو ميالين.

**medullectomy** إِسْتِنْصَالُ النُّخَاع. استئصال نخاع أو لب أحد الأعضاء.

**medulloblast** أُرُومَةُ نُخَاعِيَّة. خلية جنينية غير مميزة في الأنبوب العصبي الجنيني تتطور إلى أرومة عصبية أو أرومة إسفنجية.

**medulloblastoma** وَرَمُ الأُرُومَةِ النُّخَاعِيَّة. ورم مخيخي يتكون من خلايا دبقية عصبية غير مميزة وهي حساسة جداً للإشعاع ويتولد في الأغلب في الأطفال من سقف البطين الرابع أو من جواره.

**medulloepithelioma** وَرَمُ ظَهَارِي نُخَاعِي. ورم دماغي نادر يتكون من الخلايا الظهارية العصبية الابتدائية التي تبطن الأحياز الأنبوبية للدماغ.

**megacephaly (= megalcephaly)** ضَخَامَةُ الرُّأْس.

**megalencephalon** دِمَاعٌ ضَخْم. دماغ ضخم بصورة شاذة.

**megalencephaly (= macrencephaly)** ضَخَامَةُ الدِّمَاغ.

**megalgalia** أَلَمٌ مُفْرِط. ألم شديد مثل ألم الروماتزم العضلي.

**megalocephalia (= megalcephaly)** ضَخَامَةُ الرُّأْس.

**megalcephalic** ضَخْمُ الرُّأْس.


**megalocephaly** ضَخَامَةُ الرُّأْس. ضخامة حجم الرأس بصورة شاذة.

**megalomania** هَوَسُ العَظْمَةِ. اقتناع الشخص واعتقاده غير المسبب بعظمته أو بقوته أو بذكائه المفرط أو بطيبته وتسمى هذه الأعراض أوهام العظمة.

**megalomaniac** مَهْوَوسٌ بِالْعَظْمَةِ. مصاب بهوس العظمة.

**megrin (= migraine)** الشَّقِيْقَة.

**melagra** أَلَمٌ عَضَلَاتِ الأطراف.



medulla spinalis

مقطع في الحبل الشوكي مع سحايه وأعصابه في القناة الفقرية في منطقة الرقبة: (1) العنكبوتية (2) الأم الحنون (3) الجذر الخلفي للعصب الشوكي (4) الأم الجافية (5) العقدة الشوكية (6) الرباط المسنن (7) الجذر الأمامي للعصب الشوكي (8) الفرع الموصل للعصب الشوكي (9) الفرع الأولي الأمامي للعصب الشوكي (10) الغدد العصبية (11) الفرع الأولي الخلفي للعصب الشوكي (12) العقدة الشوكية (13) الحيز تحت العنكبوتية (14) الأم الجافية (15) الحيز تحت الجافية (16) الحيز فوق الجافية (17) الطبقة السحائية للأم الجافية.

**melalgia**

ألم الأطراف.

**melancholia**

السوداوية؛ مالمخوليا؛

مالمخوليا. مصطلح كان يستعمل للدلالة على ما يشار إليه اليوم بالاكتئاب وكان يعتقد بأنه ينتج عن الصفراء السوداء ولكن المصطلح يستعمل اليوم للدلالة على حالة الاكتئاب الشديد.

- m. agitata (= agitated m. = agitated depression) سوداوية هياجية.

- m. attonita سوداوية جامودية. فصام مع ذهول جامودي.

- climacteric m. السوداوية الإيسية. اكتئاب الإياس عند انقطاع الحيض.

- m. hypochondriaca سوداوية مراقية. اكتئاب مترافق مع المراق.

- involutional m. سوداوية أويية. اكتئاب يحدث في أواخر منتصف العمر في شخص لم يصب سابقاً بأي مرض عقلي بالرغم من احتمال كونه شخص متصلب وعنود.

- m. simplex سوداوية بسيطة. اكتئاب من دون أية أروام.

- m. stuporosa (= m. attonita) سوداوية جامودية.

سوداوي. مصاب بالسوداوية. melancholic

**melancholy (= melancholia)** السُّودَاوِيَّة.

**melanoameloblastoma** وَرَمٌ مِلَانِيّ مِلَانِيّ.

ورم عصبي ملاني أديمي ظاهر.

**melanoblast** أُرُوْمَةُ الْمِلَانِيَّة. خلية تنشا

من العرف العصبي والتي تتحول إلى خلية ملانية.

**melanoblastoma (= malignant**

**melanoma)** وَرَمٌ مِلَانِيّ خَبِيث. ورم أرومة

الملانية.

**melanoma** وَرَمٌ مِلَانِيّ. ورم يتولد من

الخلايا الملانية للجلد والأنسجة الأخرى ويمكن أن يتولد في الأم الحنون أو ملتحمة العين أو العين.

**melosalgia** أَلَمُ الْأَطْرَافِ السُّفْلِيَّة.

**membrane** غِشَاء. طبقة نسيجية رقيقة تغطي

أحد السطوح أو تبطن أحد التجاويف أو تقسم أحيانا بعض الأعضاء.

**- synaptic m.** غِشَاءُ التَّشَابُك. الغشاء الذي يفصل نهاية المحاور عن جسم العصبون الذي يتشابك معه.

**- tectorial m.** الْغِشَاءُ السَّقْفِيّ. غشاء ليفي متين يرتبط بالقسم القاعدي من العظم القذالي ويمتد إلى السطح الظهري لجسم الفقرتين الرقبيتين الثانية والثالثة.

**memory** ذَاكِرَة. الملكة العقلية التي بواسطتها

يمكننا أن نتذكر إحساساتنا وانطباعاتنا وأفكارنا السابقة.

**- anterograde m. (= remote m.)** ذَاكِرَة السَّابِق. ذاكرة الحوادث الماضية مع عدم إمكان إضافة ذكريات جديدة إليها أو ذاكرة حوادث بعد الإصابة.

**- eye m. (= visual m.)** ذَاكِرَة بَصَرِيَّة.

**- iconic m.** ذَاكِرَة صُورِيَّة. المرحلة الأولى في تكوين الذاكرة البصرية حيث يستمر تأثير صورة العنبر البصري لفترة قصيرة بعد التنبه تتم خلالها عملية تسجيل الذاكرة البصرية.

**- Immediate m. (= short-term m.)** ذَاكِرَة آنِيَّة؛ ذاكرة قَصِيْرَة الْمَدَى.

**- kinesthetic m.** ذَاكِرَة حَرَكِيَّة. ذاكرة حركات الأطراف وأقسام الجسم الأخرى.

**- long-term m.** ذاكرة مديدة؛ ذَاكِرَة طَوِيلَة الْمَدَى. ذاكرة تحفظ لفترة زمنية طويلة.

**- recent m.** ذَاكِرَة حَدِيْفَة. ذاكرة الحوادث التي حدثت للمرء قبل فترة قصيرة تقاس بالساعات أو الأيام أو الأسابيع.

**- remote m.** ذَاكِرَة بَعِيْدَة. ذاكرة للحوادث البعيدة التي حدثت للمرء منذ سنين طويلة.

**- retrograde m.** ذاكرة راجعة؛ ذَاكِرَة السَّابِق. ذاكرة للحوادث التي حدثت للشخص قبل الإصابة أو قبل واقعة معينة.

**- rote m.** ذاكرة خائبة؛ ذَاكِرَة الصَّم. ذاكرة الشخص أو تعلمه لمادة أو لجملة أو مقاطع دون فهم معانيها بل لمجرد حفظها لإعادة ترديدها بشكلها المحفوظ تماماً.

**- screen m.** ذاكرة حاجبة؛ ذَاكِرَة دَرِيْثِيَّة. ذاكرة واعية يحملها الشخص كدرية تقيه ذكرى ذاكرة أخرى مؤلمة له أو تزججه عاطفياً.

**- short-term m.** ذاكرة وجيزة؛ ذَاكِرَة قَصِيْرَة الْمَدَى. ذاكرة تدوم لفترة قصيرة (ثوانٍ أو دقائق) قبل أن تختفي إلا إذا عززت بعنبر آخر.

**- subconscious m.** ذَاكِرَة دُونِ الْوَعْي. ذاكرة لأحداث لا يتذكرها الشخص بصورة اعتيادية أو طبيعية ولكنها محفوظة لديه من دون وعيه وقد يتذكرها في حالات خاصة أو تحت ظروف معينة.

**- visual m.** ذَاكِرَة بَصَرِيَّة. ذاكرة لانطباعات بصرية.

**menalgia (= dysmenorrhea)** عُسر الحيض. أَلَمُ الْحَيْض. الألم الذي يرافق الحيض.

**meningeal** سِحَائِيّ. متعلق بالسحايا.

**meningematoma** وَرَمٌ دُمَوِيّ سِحَائِيّ.

ورم دموي في الأم الجافية.

**meningeocortical** سِحَائِيّ قَشْرِيّ. متعلق بالسحايا وقشرة الدماغ.

**meningioma (= meningioma)** وَرَمٌ سِحَائِيّ.

رَفُو السَّحَائِيّ.

**meningeorrhaphy** السَّحَائِيّ. (ف: سِحَاءَة). الأغشية

الثلاثة التي تغلف الدماغ والنخاع الشوكي وهي الأم الجافية والأم الحنون وبينهما العنكبوتية.

**meninghematoma (= meninge-matoma)** وَرَمٌ دَمَوِيٌّ سِحَاطِيٌّ.

**meningina (= pia-arachnoid)** الْأَمُّ الْحَنُونُ وَالْعَنْكَبُوتِيَّةُ.

**meninginitis** إِلْتِهَابُ الْحَنُونِ وَالْعَنْكَبُوتِيَّةِ.


**meningioma** وَرَمٌ سِحَاطِيٌّ. ورم صلب بطيء النمو وعادة ما يكون ذا أوعية ويحدث غالباً على طول الأوعية السحائية والجيب العلوي الطولاني ويغزو الجافية والقحف مما يؤدي إلى تآكله وترققه.

**- angioblastic m. (= angioblastoma)** سِحَاوُومُ الْأَرْوَمَةِ الْوِعَائِيَّةِ.

**meningiomatosis** تَكَوُّنُ وَرَامٍ سِحَاطِيٍّ. تَكَوُّنُ عِدَّةِ أَوْرَامٍ سَحَاطِيَّةٍ.


**meningism** تَهَيُّجٌ سِحَاطِيٌّ؛ حَالَةٌ سِحَاطِيَّةٌ. علامات وأعراض تهيج سحاطي يترافق مع حمى حادة أو تجفاف من دون أي عدوى سحاطية ظاهرة.

**meningismus (= meningism)** تَهَيُّجٌ سِحَاطِيٌّ.



#### meninges

مقطع جبهى عبر القحف يظهر فروة الرأس وعظام الجمجمة والسحايا وقشرة المخ: (1) الوريد المشبرى الجداري (2) تحبيبات عنكبوتية (3) العظم الجداري (4) الأم الجافية (5) العنكبوتية (6) الأم الحنون (7) الحيز تحت العنكبوتية (8) المادة البيضاء (9) المادة السنجابية لقشرة المخ (10) الأم الحنون (11) الحيز تحت العنكبوتية (12) العنكبوتية (13) الأم الجافية (14) اللوحة الداخلية (15) خلا اللوحتين (16) اللوحة الخارجية (17) سفاق الخوذة (18) الأدمة (19) البشرة (20) الجلد (21) الجيب السهمي العلوي مع تحبيبات عنكبوتية (22) الدرز السهمي.



#### meninges

مقطع عرضي للنخاع الشوكي وأغشيته واليافه في القناة الشوكية: (1) الجافية (2) العنكبوتية (3 و 4 و 7 و 8) النسيج الضام والأربطة بين الحنون والعنكبوتية التي تثبت النخاع داخلها (5) النسيج فوق الحنون الذي يحيط بالنخاع (6) شعيرات النسيج فوق الحنون.

**meningitic** (متعلق) بِالتَّهَابِ السَّحَايَا.  
متعلق بالتَّهَابِ السَّحَايَا أو مصاب بها.

**meningitides** التَّهَابَاتُ السَّحَايَا.

**meningitis** التَّهَابُ السَّحَايَا. التهاب السحايا فإذا ما أصاب الأم الجافية سمي التهاب الجافية أما إذا أصاب الأم الحنون والعنكبوتية فيسمى التهاب السحايا الرقيقة.

**- aseptic m.** التَّهَابُ السَّحَايَا العقيم. نوع خفيف من التهاب السحايا تولده في الغالب بعض الفيروسات.

**- basilar m.** التَّهَابُ السَّحَايَا القَاعِيَّة. التهاب سحايا قاعدة الدماغ.

**- benign lymphocytic m. (= viral m.)** التَّهَابُ السَّحَايَا السَّرَطَانِيَّة. تسمية خاطئة لغزو سرطاني منتشر في السحايا من دون أي التهاب فيها.

**- cerebral m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الدُّمَاغِيَّة. التهاب سحايا الدماغ.

**- cerebrospinal m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الدُّمَاغِيَّة والنَّخَاعِيَّة. التهاب سحايا الدماغ والنخاع الشوكي.

**- chemical m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الكِيمِيَاوِيَّة. التهاب السحايا الطاهر الناتج عن تهيجها بمواد كيميائية غريبة في الحيز تحت العنكبوتية.

**- cryptococcal m.** التَّهَابُ السَّحَايَا بِالمُسْتَحْفِيَّات. التهاب السحايا الذي تسببه المستحفيات وقد يكون حاداً وغالباً ما يكون مزمناً وقد تشاهد هذه الفطريات في السائل الدماغي النخاعي.

**- eosinophilic m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الحَفْضِيَّة. التهاب السحايا اليوزيني. التهاب يتولد عن الإصابة ببعض الطفيليات وقد يتولد أحياناً عن السرطان الخبيث ويتصف بالصداع والصمل القفوي والتقير ونقص الحساسية وزيادة الخلايا الحمضة بالسائل الدماغي النخاعي.

**- epidemic cerebrospinal m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الدُّمَاغِيَّة النَّخَاعِيَّة الوَبَائِيَّة. التهاب حاد يتصف بعدوى مصلية قححية في السحايا الدماغية والنخاعية وتولده النيسرية السحائية وتشبه أعراضه أعراض التهاب الحاد مع ظهور بقع حمامية أو هربسية أو نزفية في الجلد.

**- external m. (= pachymeningitis externa)** التَّهَابُ ظَاهِرِ الجَافِيَّة.

**- gummatous m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الصَّمْغِيَّة. التهاب السحايا أثناء الدور الثالث للزهري حيث يظهر العديد من البقع الصمغية في السحايا.

**- internal m. (= pachymeningitis interna)** التَّهَابُ السَّحَايَا الغَاثَرَة: التَّهَابُ باطنِ الجَافِيَّة.

**- lymphocytic m. (= viral m.)** التَّهَابُ السَّحَايَا الْفَيْرُوسِيَّة.

**- meningococcal m. (= epidemic cerebrospinal m.)** التَّهَابُ السَّحَايَا الدُّمَاغِيَّة والنَّخَاعِيَّة الوَبَائِيَّة.

**- Mollaret's m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الْفُولَارَتِيَّة. نوبات حمى راجعة مع صداع ووعكة وأعراض سحائية واستجابات التهابية بمفصصات النوى في السائل الدماغي النخاعي.

**- mumps m.** التَّهَابُ السَّحَايَا النُّكَافِيَّة. التهاب سحايا طاهر ثانوي للإصابة بداء النكاف.

**- necrotoxic reactiva m.** التَّهَابُ السَّحَايَا السَّمِّي النَّاجِر. حالة تتصف بتلين بؤري في بعض مناطق الدماغ مع أعراض وعلامات تهيج السحايا مما يدل على تغيرات التهابية في قشرة الدماغ.

**- occlusive m.** التَّهَابُ السَّحَايَا المُسَدِّ. التهاب السحايا الرقيقة في الأطفال الذي يؤدي إلى انسداد الفتحات الإنسية والناصفية للبطين الرابع.

**- m. ossificans** التَّهَابُ السَّحَايَا التَّعْظُمِيَّة. التهاب السحايا الدماغية الذي يولد تعظماً أو تكلساً.

**- otitic m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الْأَذْنِيَّ العُنْشَا. التهاب السحايا الذي يولده التهاب الأذن الوسطى المزمن.

**- plague m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الطَّاعُونِيَّة. التهاب السحايا الثانوي لمرض الطاعون الدبلي الذي يتولد عن انتشار العدوى إلى السحايا خلال الدم.

**- posterior m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الْخَلْفِيَّة. التهاب سحايا منطقة المخيخ.

**- purulent m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الْقَيْحِيَّة. التهاب السحايا الذي يولد القيح.

**- Quincke's m. (= acute aseptic m.)** التَّهَابُ السَّحَايَا الْعَقِيمِ الْحَاد.

**- septicemic m.** التَّهَابُ السَّحَايَا الْإِنْتَانِيَّة. التهاب السحايا المترافق مع تسمم الدم الإنتاني.



- m. serosa (= serous m.) التهاب السحايا المصلي.

- m. serosa circumscripta التهاب السحايا المُحَدَّد. التهاب السحايا الذي يولد تجمع مصلي كيسي مع التصاق السحايا والذي يولد أعراضاً تشبه أعراض الأورام.

- m. serosa circumscripta cystica التهاب السحايا المصلي الكيسي المُحَدَّد. التهاب السحايا المزمن الذي يولد أكياساً مليئة بسائل مصلي.

- serous m. التهاب السحايا المصلي. التهاب السحايا مع نضح مصلي إلى البطينات والأحياز تحت العنكبوتية وتغيرات بسيطة أو معتدلة في السائل الدماغي النخاعي.

- simple m. التهاب السحايا البسيط. التهاب السحايا الذي يترافق مع نضح مصلي وفبريني.

- spinal m. التهاب السحايا النخاعية. التهاب سحايا النخاع الشوكي.

- sterile m. التهاب السحايا العقيم. التهاب السحايا الذي لا ترافقه أية عدوى كذلك الذي يتولد عن حقن مادة تباينية في تصوير النخاع.

- m. sympathetica التهاب السحايا التَّعَاطُفِي. التهاب السحايا الذي يتولد عن التهاب المناطق المجاورة لها والذي يتصف بزيادة حادة في ضغط السائل الدماغي الشوكي مع زيادة الألبومين والخلايا فيه بالرغم من بقائه عقيماً وقد تظهر علامات التهاب السحايا فيه.

- torula m. (= torular m. = cryptococcal m.) التهاب السحايا بالمُستَحَفِّيات. التهاب السحايا بعدوى بالمستحفيات.

- tuberculous m. التهاب السحايا السُّلِّي. التهاب السحايا الشديد بالمتفطرات السلية التي تنتشر في الغالب من الرئة المصابة.

- viral m. التهاب السحايا الفيروسي. التهاب السحايا الذي يتولد عن الإصابة بأنواع الفيروسات والذي يتصف بالوعكة والحمى والصداع والغثيان ووجود الخلايا في السائل الدماغي النخاعي مع ألم البطن وتيبس الرقبة والظهر. ولهذا المرض دورة قصيرة من دون أية اختلاطات.

التهاب شرايين السحايا. meningoarteritis التهاب شرايين السحايا.

وَرَمٌ ملائي سحائي. meningoblastoma ورم ملائي سحائي أولي خبيث.

قَيْلَة سَحَائِيَّة. بروز انفتاقى meningocele للسحايا خلال عيب في القحف (قيلة سحائية قحفية) أو في العمود الفقري (قيلة سحائية فقارية).

داء - spurious m. (= Billroth's disease) بيلرُوت.

meningocephalitis (= meningoencephalitis) التهاب الدماغ والسحايا.

meningocerebritis (= meningoencephalitis) التهاب الدماغ والسحايا.

meningococcemia عدوى الدم بالسحائيات. عدوى الدم بالمكورات السحائية.

meningococci المَكُورَاتُ السَحَائِيَّة.

meningococcosis داء المكورات السحائية. عدوى بالمكورات السحائية.

meningococcus المَكُورَة السَحَائِيَّة. جرثوم النيسرية السحائية.

meningocortical سحائي قشري. متعلق بالسحايا وقشرة الدماغ.

meningocyte خلية سحائية. خلية منسجة سحائية.

meningoencephalitis التهاب الدماغ والسحايا.

- eosinophilic m. (= eosinophilic meningitis) التهاب الدماغ والسحايا الحمضي.

- mumps m. التهاب الدماغ والسحايا النُكَافِي. التهاب حميد يصيب الأطفال وتسببه الفيروسات النكافية ويتصف بالحمى والتقيؤ والصلل القفوي والوسن والتهاب الغدة النكفية والصداع والاختلاج وآلم البطن والإسهال والتهديان.

- primary amebic m. التهاب الدماغ والسحايا الأميبي الأولي. التهاب نادر ومميت عادة يتصف بالحمى والتقيح وتولده أميبة النيفليريا أو الهارتمنيللا وتدخل غالباً إلى الدماغ خلال مناخر الأنف إلى البصلة

الشمية وأعصاب الدماغ ثم إلى السحايا والدماغ وقد تنتقل بعض أنواع الأميبة إلى الدماغ من مناطق أخرى في الجسم مصابة بالعدوى.

**التهاب - syphilitic m. (= general paresis)** التهاب الدماغ الزهري: الخَرَلُ العام.

**meningoencephalocele** قَيْلَةُ دِمَاجِيَّة سَحَائِيَّة. بروز انفتاق السحايا ومادة الدماغ خلال كسر أو عيب في القحف.

**meningoencephalomyelitis** التَّهَابُ الدِّمَاغِ والسَّحَايَا والنُّخَاع.

**meningoencephalomyelopathy** اغْتِلَالُ الدِّمَاغِ والسَّحَايَا والنُّخَاع. أي مرض يصيب الدماغ والسحايا والنخاع الشوكي.

**meningoencephalopathy** اغْتِلَالُ الدِّمَاغِ والسَّحَايَا. داء لا التهابي يصيب الدماغ والسحايا.

**meningofibroblastoma (= meningioma)** وَرَمٌ أرومي ليفي: وَرَمٌ سَحَائِي.

**meningogenic** سَحَائِيٌّ المَنْشَأ. ما ينشأ أو يتولد في السحايا.

**meningoma (= meningioma)** وَرَمٌ سَحَائِي.

**meningomalacia** تَلَيُّنُ السَّحَايَا. تليين الأغشية السحائية.

**meningomyelitis** التَّهَابُ السَّحَايَا والنُّخَاع. التهاب النخاع الشوكي وسحايها.

**meningomyelocele** قَيْلَةُ سَحَائِيَّة نَخَاعِيَّة. انفتاق جزء من النخاع وسحايها خلال عيب في العمود الفقري.

**meningomyeloencephalitis** التَّهَابُ السَّحَايَا والنُّخَاع والدِّمَاغ.

**meningomyelorradiculitis** التَّهَابُ السَّحَايَا والنُّخَاع والجُذُور.

**meningo-osteophlebitis** التَّهَابُ السِّفْحَاقِ وأوردة العَظْم.

**meningopathy** اغْتِلَالُ السَّحَايَا. أي مرض يصيب السحايا.

**meningorachidian** سَحَائِيٌّ نَخَاعِيٌّ. نسبة للنخاع الشوكي وسحايها.

**meningoradicular** سَحَائِيٌّ جَذْرِيٌّ. نسبة إلى السحايا الشوكية وجذور النخاع الشوكي.

**meningoradiculitis** التَّهَابُ السَّحَايَا والجُذُور. التهاب جذور أعصاب النخاع الشوكي وسحايها.

**meningorecurrence** التَّهَابُ السَحَايَا النَّاجِسُ: رَجْعَةُ سَحَائِيَّة. التهاب السحايا الزهري الراجع في المرضى المصابين بالزهري عند معالجتهم بالأدوية المضادة له.

**meningorrhagia** نَزْفٌ سَحَائِيٌّ. نزف من السحايا الدماغية أو النخاعية.

**meningorrhea** ثَوٌّ سَحَائِيٌّ. انصباب دموي بين السحايا أو فوقها.

**meningothelioma (= meningioma)** وَرَمٌ سَحَائِي.

**meningovascular** وَعَائِيٌّ سَحَائِيٌّ. نسبة إلى الأوعية السحائية.

**meninx** سِخَاءَةٌ. أي غشاء خصوصاً أحد الأغشية الدماغية أو النخاعية.

**menopausal** إِيَّاسِيٌّ. متعلق بالإياس أو يتصف به.

**menopause** إِيَّاس. توقف الحيض لدى الإناث الذي يحدث لديهن حوالي سن الخمسين.

**- artificial m.** إِيَّاسٌ اصطناعي. الإياس الذي يتم بطرق صناعية كالعمليات الجراحية أو التشعيع.

**- m. praecox** الإِيَّاسُ المُبَكِّر. توقف الإباضة المبكر الذي قد يحدث بسبب نقص الخلايا المنتشة الأولية أو التمنيع الذاتي أو نقص الاستجابة للهرمون الموجه للغدد التناسلية المكتسب.

**mental** 1. عَقْلِيٌّ؛ نَفْسِيٌّ 2. ذَقْنِيٌّ. 1. متعلق بالعقل أو النفس 2. متعلق بالذقن.

**mentality** عَقْلِيَّة؛ نَفْسِيَّة. 1. القدرة والإمكانية العقلية 2. أسلوب التفكير.

**mentation (= mental activity)** تَعَقُّل. فعالية عقلية.

**meperidine hydrochloride** هِيدِرُوكُلُورِيد

المبيريدين. دواء مسكن يستعمل قبل التخدير أو بعد العمليات أو الولادة وله مفعول قصير المدى.

**mephenesin** مِفينيسين. دواء مُرَخٍّ للعضلات يستعمل عن طريق الفم.

**mephenoxalone** مِفينوكسألون. دواء مهدئ.

**mephenytoin** مِفينيتوين. دواء يستعمل للتحكم في نوبات الصرع الكبير ونوبات الصرع الجاكسونية والتفسي الحركية المقاومة للأدوية الأخرى.

**mephobarbital** مِفوباربیتال. دواء باربيتوري طويل المفعول يستعمل كمهدئ في حالات القلق والتوتر والتجسس ومضاد الاختلاج في الصرعين الكبير والصغير ويستعمل عن طريق الفم.

**mepivacaine hydrochloride**

هِيذُرُوكُلُورِيد المِيفِيفَاكَاثِين. دواء يستعمل كمخدر موضعي بحقنه حول العصب المحيطي أو حول الأم الجافية ليعمل كمخدر إحصاري.

**meprobamate** مِبرُوبَامَات. دواء مهدئ ومرخ عضلي ومضاد للاختلاج ويستعمل كمهدئ للقلق والتوتر أو كمنوم أو في الاضطرابات العضلية الهيكلية وفي حالات الاختلاج الصرعي.

**meprylcaine hydrochloride**

هِيذُرُوكُلُورِيد المِبرِيلِكَاثِين. دواء يستعمل كمخدر موضعي بحقنه حول الأعصاب المحيطية.

**meralgia** أَلَمُ الْفَخْذ. ألم في منطقة الفخذ.

أَلَمُ الْفَخْذِ الْمَذَلِّي. داء يتصف **m. paresthetica** بالمذل والألم والتئمل في السطح الخارجي للفخذ في المنطقة التي يغذيها العصب الفخذي الجلدي الوحشي وينتج عن انحصار العصب في المنطقة الأربية.

**merergasia (= kakergasia)** إِضْطِرَابٌ وَظِيفِي. أي اضطراب يؤدي إلى عدم المقدرة على القيام بالعمل أو بالوظائف كالذي يحصل في حالات العصاب.

**merocoxalgia** أَلَمُ الْفَخْذِ وَالْوَرَك. ألم في الفخذ ومنطقة الورك.

**meroencephaly** نَقْصُ الدِّمَاغِ الْجُرْئِي. النقص الخلقي لجزء من الدماغ كالمخيخ أو الجسم الثفني.

**meroergasia (= neurosis)** عَصَابٌ؛ اِعْتِلَالٌ نَفْسِي.

**merorachischisis** اِنْتِشَاقُ النُّخَاعِ الْجُرْئِي. انشقاق قسم من النخاع الشوكي.

**merosmia** فَقْدَانُ الشَّمِّ الْجُرْئِي. فقدان حس الشم لبعض المواد.

**mesaxon** متوسطة المحوار؛ مُلتَصِقٌ غِشَائِي المِخْوَار. الغشاءان المتوازيان اللذان يعلمان تلامس حافتي الخلية الغمدية (خلية شوان) التي تغلف المحوار.

**mescaline** مِسْكَالِين. سم قلواني في أزهار بعض النباتات يولد توهم الألوان والموسيقى.

**mescalism** التَّسَمُّ بِالمِسْكَالِين. تسمم بزهور المسكالين.

**mesencephal (= mesencephalon)** الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّط.

**mesencephalitis** اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ دِمَاقِي مَسْئِطِي نَخَامِي. متعلق بالدماغ المتوسط والغدة النخامية.

**mesencephalon (= midbrain)** الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّط. قسم الدماغ الذي يتطور من الحويصلة الوسطية للحويصلات الثلاث الابتدائية للأنبوب العصبي الجنيني والذي يحوي السقف وسويقتي المخ ويقع بين الدماغين المقدم والمؤخر.

**mesencephalotomy** بَضْعُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ. بضع الدماغ المتوسط جراحياً خصوصاً في منطقة السبل الناقلة لحس الألم لمعالجة الألم العسير.

**mesmerism (= hypnotism)** المِسمَرِيَّة؛ تَنْوِيمٌ مِغْنَاطِيْسِي؛ تَنْوِيمٌ إِحَايِي.

**mesocephalon (= mesencephalon)** الدِّمَاغُ الْمُتَوَسِّط.

**mesoglia (= 1. microglia 2. oligodendroglia)** 1. دَبْقِيَّةٌ صَغِيرَةٌ 2. دَبْقِيَّةٌ قَلِيلَةُ التَّغْصُن.

**mesoglioma (= 1. microglioma 2. oligodendrogloma)** 1. وَرَمٌ دَبْقِي صَغِيرٌ 2. وَرَمٌ دَبْقِي قَلِيلُ التَّغْصُن.

**mesorachischisis** **إِنْشِقَاقُ السِّيسَاءِ الْجُرْثِيِّ**.  
شق النخاع الشوكي والسيءاء الجرثوي.

**mesoridazine** **مِيرُورِيدَازِين**. دواء مضاد  
للذهان يستعمل في علاج الكحولية والفصام  
والأعراض العصبية النفسية والمشاكل السلوكية  
في التخلف العقلي وفي متلازمة الدماغ المزمنة  
ويستعمل عن طريق الفم أو الحقن داخل العضل.

**metabolism** **إِسْتِقْلَابٌ**: أيضٌ. مجموع  
العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تولد المواد  
الحية للجسم والطاقة الضرورية لفعالياته.

**metabutethamine hydrochloride**  
**هَيْدُرُوكْلُورِيدُ المِتَابُوتِيْتَامِين**. دواء يستعمل  
كمخدر موضعي في طب الأسنان أو بحقنه حول  
العصب في التخدير الموضعي.

**metabutoxycaine hydrochloride**  
**هَيْدُرُوكْلُورِيدُ المِتَابُوتُوكْسِيكَايْن**. دواء يستعمل  
كمخدر موضعي في طب الأسنان.

**metallesthesia** **تَحَسُّسُ الْفِلْزَات**. التعرف على  
المعادن بواسطة حس اللمس.

**metaplexus** **ضَفِيرَةٌ تَالِيَةٌ**: ضَفِيرَةُ البُطَيْن  
الرَّابِع. الضفيرة المشيمية للبطين الرابع.

**metapsyche (= metencephalon)**  
**الدِّمَاغُ التَّالِي**.

**metapsychology** **عِلْمُ النَّفْسِ البَدِيل**: علم  
ما بعد النفس. مصطلح يطلق على بعض النظريات  
البديلة حول الوظائف العقلية وبنياتها، وبالرغم من  
أنها تبدو منطقية ولكن ليس هناك من أدلة تسندنها  
تجريبياً.

**metastasis** **1. نَقِيلَةٌ 2. إِنْتِقَالٌ**. 1. انتقال  
المرض من موقع لآخر في الجسم كانتقال الخلايا  
السرطانية من العضو المصاب إلى أعضاء أو  
مناطق أخرى في الجسم. 2. نمو كائنات دقيقة أو  
خلايا مرضية في عضو آخر بعيد عن موقعه  
الأولي.

**metathalamus** **المِهَادُ التَّالِي**. قسم الدماغ  
البيني أسفل النهاية الذنبية لظهر المهاد يتكون من  
الجسمين التركيبين الوحشي والإنسي.

**metencephal (= metencephalon)**

**الدِّمَاغُ التَّالِي**.

**metencephalon (= after brain)** **الدِّمَاغُ**  
التَّالِي. 1. القسم الأمامي من الدماغ المؤخر الذي  
يحوي المخيخ والجسر وقد يستعمل المصطلح  
للدلالة على الجسر وهو الحويصلة الأمامية من  
الحويصلتين الدماغيتين اللتين تتولدان في الدماغ  
المؤخر في الجنين 2. الحويصلة الأمامية من  
الحويصلتين اللتين تتكونان عند تمايز الدماغ  
المؤخر في الجنين.

**metencephalospinal** **مَتَعَلِّقٌ بِالنَّخَاعِ**  
التَّالِي والنخاع. نسبة إلى الدماغ التَّالِي (المخيخ  
والجسر) والنخاع الشوكي.

**metepencephalon (= myelen-  
cephalon)** **الدِّمَاغُ البَصَلِي**.

**methadone hydrochloride** **هَيْدُرُوكْلُورِيدُ**  
**المِيثَادُون**. دواء له خواص شبيهة بخواص  
المورفين والهيريون وله قابلية توليد الإدمان  
مثلها وهو يستعمل كمسكن ومهدئ في متلازمة  
الامتناع عن المخدرات في معالجة إدمان الهيروين  
ويستعمل عن طريق الفم أو بالحقن داخل العضل أو  
تحت الجلد.

**methamphetamine** **مِيثَامِفِيْتَامِين**. دواء  
محاكي للودي من فصيلة الأمفيتامين يؤدي سوء  
استعماله إلى الإدمان.

**- m. hydrochloride** **هَيْدُرُوكْلُورِيدُ**  
**المِيثَامِفِيْتَامِين**. دواء يستعمل بصورة رئيسية كمنبه  
مركزي في علاج الاكتئاب النفسي وحالات الاعتلال  
النفساني والشروع والنوم الانتيابي (السيخ) والسمنة  
الخارجية المنشأ وتهذئة الأطفال مفرطي الحركة وبعد  
التبنيخ النخاعي.

**metharbital** **مِيثَارْبِيْتَال**. دواء مضاد  
للاختلاج يستعمل في علاج نوبات الصرع الكبير  
والصغير والرمع العضلي ونوبات الصرع المختلطة  
ويستعمل عن طريق الفم.

**methixine hydrochloride** **هَيْدُرُوكْلُورِيدُ**  
**المِيثِكْسِين**. دواء مضاد لتشنج العضلات الملساء  
يستعمل في حالات المغص المعوي والمعددي.

**methomania** هُوسُ الكُحُول. هوس المشروبات الكحولية.

**methsuximide** مِثْسُكْسِيمِيد. دواء يستعمل في علاج الصرعين الصغير والنفسي الحركي.

**metiapine** مِتْيَابِين. دواء يستعمل في علاج الفصام.

**metonymy** تَبْدِيلُ الكَلِمَات. اختلال الكلام في مرضى الفصام تستعمل فيه كلمات بديلة ومقلوبة ولكنها ليست بعيدة عن الاسماء الصحيحة.

**metopodynia** صُدَاعُ جَبْهِيّ. صداع القسم الجبهي من الرأس.

**metopon** 1. مُقَدِّمُ الجَبْهِيّ المُقَطَّب 2. مِيتُوبُون. 1. القسم الامامي من المستوى الوسطي بين الحاجبين أو مقدمة الفص الجبهي للدماغ. 2. مادة تستخلص من المورفين تستعمل لتسكين الألم.

**metralgia** أَلَمُ الرَّجَم.

**metrodynia** وَجَعُ الرَّجَم.

**metrostasis** ثَبَاتُ الطَّوْل. حالة بقاء طول الليف العضلي ثابتاً في حالتي تقلصه وانبساطه.

**micrencephalia (= micrencephaly)** صِغَرُ الدُّمَاغ. صغر الدماغ الشاذ.

**microcephalia (= microcephaly)** صِغَرُ الرَّاس. صغر الدماغ والذي غالباً ما يترافق مع التخلف العقلي.

**microcephalous** صِغِيرُ الرَّاس. شخص صغير الرأس جداً وبصورة شاذة.

**microcephaly** صِغَرُ الرَّاس. صغر الرأس لدرجة شاذة مع تخلف عقلي.

**microcrania** صِغَرُ القَاف. صغر القحف الشاذ حيث تكون كل أقطاره أقصر من الحد السوي وتظهر منطقة الوجه كبيرة نسبةً لحجم الجمجمة.

**microencephaly (= micrencephaly)** صِغَرُ الدُّمَاغ. صغر الدماغ الشاذ.

**microglia** دَبَقُ صِغَرِيّ؛ دَبَقِيَّات. الخلايا الخالية الصغرية اللاعصبية ذات المنشأ الاديمي

المتوسط والتي تكون قسماً من البنية السائدة للجهاز العصبي المركزي وهي ذات أشكال مختلفة وقد تكون لها استطالات دقيقة وطويلة وهي خلايا مهاجرة وتعمل كخلايا بلعمية للفضلات التي تطرحها الانسجة العصبية.

**microgliocyte (= microgliocyte)** خلية دَبَقِيَّة؛ خَلِيَّةٌ دَبَقِيَّةٌ صِغَرِيَّة.

**microgliocyte (= microglia cell)** خَلِيَّةٌ دَبَقِيَّةٌ صِغَرِيَّة. الخلية الاولى التي تتطور لتولد الدبق الصغري.

**microgliomatosis** دُبَاقُ صِغَرِيّ؛ تكثر الدبق الصغري. حالة تكون أورام تحوي دبقاً صغرياً.

**microgyria (= polymicrogyria)** تَعَدُّدُ التَّلَافِيفِ الصِغَرِيَّة.

**microgyrus** تَلَفِيفٌ صِغَرِيّ. تلفيف دماغي صغري شاذ.

**microinfarct** اِحْتِشَاءٌ صِغَرِيّ. احتشاء صغير جداً بسبب انسداد الدوران في إحدى الشعيرات أو الشريينات.

**micromania** هُوسُ الصُّغَارَةِ. هوس الاستصغار والاستضال.

**micromyelia** صِغَرُ النُّخَاع. صغر النخاع الشوكي الشاذ.

**microneurosurgery** جِرَاحَةُ الأعصاب المِجْهَرِيَّة. جراحة تجري باستعمال المجهر والأدوات الصغيرة على أوعية الجهاز العصبي وبنياته الدقيقة.

**micropolygyria (= polymicrogyria)** تَعَدُّدُ التَّلَافِيفِ الصِغَرِيَّة.

**microsthenic** وَاهِنُ العَضَلَات. شخص ذو عضلات واهنة.

**microthrombosis** خُثَارٌ صِغَرِيّ. وجود عدة خثرات صغرية في بعض الشعيرات أو الشريينات.

**microthrombus** خَثَرَةٌ صِغَرِيَّة. خثرة صغرية في شعيرة أو في وعاء دموي صغير.

**midbrain (= mesencephalon)** الدِّمَاغُ  
المُتَوَسِّطُ.

**midfrontal** وَسَطُ الْجَبْهَةِ. وسط جبهة الرأس.

**migraine** الشَّقِيْقَةُ. نوبات دورية لصداع  
وعائِي وعادة في المنطقة الصدغية وفي جهة  
واحدة من الرأس ويترافق عادة مع الهيجوية  
والغثيان أو التقيؤ والإمساك أو الإسهال ورهاب  
الضوء، ويسبق النوبات عادة تضيق الشرايين  
القحفية مع أعراض بادرية خصوصاً في العين  
ويتلو ذلك توسع الأوعية.

**- abdominal m.** الشَّقِيْقَةُ البَطْنِيَّةُ. الشقيقة التي  
تظهر فيها الأعراض البطنية كالغثيان والتقيؤ  
والإسهال.

**- acute confusional m.** الشَّقِيْقَةُ التَّخْلِيْطِيَّةُ  
الحَاذَةُ. نوع نادر من الشقيقة يحدث في الأطفال  
ويتصف بنوبات تخلطية وتوهان وهياج وقلق  
وتوجس وقد لا يظهر الصداع عند البدء ولكنه يظهر  
دائماً في الأخير.

**- cervical m.** الشَّقِيْقَةُ الرَّقِيْبِيَّةُ. نوبة ألم شديد  
في العنق وعادة ما يكون في قفا الرقبة أو في المنطقة  
القذالية في جهة واحدة أو في الجهتين.

**- epileptic m.** الشَّقِيْقَةُ الصَّرْعِيَّةُ. 1. حدوث  
الشقيقة والصرع في نفس الوقت لدى الشخص.  
2. صداع يشبه الشقيقة يسبق أو يتلو نوبة الصرع.  
3. ظاهرة هراعية حسية أو بصرية تشبه أورة الشقيقة  
ولكنها تحدث في الصرع البؤري أو الجزئي.

**- facioptegic m.** الشَّقِيْقَةُ المُشْلِلَةُ لِلوَجْهِ. شلل  
وجهي نصفي عابر يحدث في نوبة الشقيقة.

**- fulgurating m.** الشَّقِيْقَةُ الصَّاعِقَةُ. نوبة  
شقيقة شديدة تبدأ بصورة مفاجئة.

**- hemiplegic m.** الشَّقِيْقَةُ الْفَالِجِيَّةُ. نوبة  
شقيقة تترافق مع شلل نصفي أو خزل نصفي عابر.

**- ophthalmic m.** الشَّقِيْقَةُ الْعَيْنِيَّةُ. نوبة شقيقة  
تترافق مع غمش العين أو أية اختلالات بصرية أخرى.

**- ophthalmoplegic m.** الشَّقِيْقَةُ الشَّلَلِيَّةُ  
العَيْنِيَّةُ؛ الشقيقة الشالَّة للعَيْن. الشقيقة الدورية  
التي تترافق مع شلل العين.

**milnenperone** مِلْنَبِرُون. دواء يستعمل  
كمهدئ.

**milieu** الوَسْطُ. المحيط.

**- m. exterieur** الوَسْطُ الْخَارِجِي. الوسط المحيط  
بالجسم.

**- m. interieur** الوَسْطُ الدَّاخِلِي. وسط داخل  
الجسم وهو وسط الدم واللف المحيط بالخلايا.

**mimesis** مُحَاكَاة. مشابهة أحد الأمراض لمرض  
آخر في الجسم.

**mimetic** مُحَاكِي. مشابه لوظيفة أو مرض  
جسمي آخر.

**mimic (= mimetic)** مُحَاكِي.

**mimination** مَأْمَأَة. إدخال حرف الـ «م»  
في وسط الكلمات عند نطقها.

**mimosis (= mimosis)** مُحَاكَاة.

**mind** الْعَقْل. وظيفة أو ملكة الدماغ التي يعي  
المرء بواسطتها محيطه وما يدور فيه وانتشار ذلك  
في المكان والزمان ويدرك المرء بواسطته مشاعره  
وعواطفه ورغباته وذكرياته ويمكنه من أن يسبب  
الأمور ويعقلها ويتخذ الإجراء المناسب بشأنها.

**minuthesis** وَهْنٌ جَسْمِيّ. نقص الإحساس  
النفساني الجسدي لأحد أعضاء الحس عند تنبيهه  
المستمر لفترة طويلة.

**miopragia** وَهْنٌ وَظِيفِيّ. نقص الفعالية  
الوظيفية.

**miosis** تَقْبِضُ الحَدَقَةِ. تقبض الحدقة وصغرها.  
**- Irritative m. (= spastic m.)** تَقْبِضُ الحَدَقَةِ  
التَّشْنُجِيّ.

**- paralytic m.** تَقْبِضُ الحَدَقَةِ الشَّلَلِيّ. تقبض الحدقة.  
بسبب شلل العضلة موسعة الحدقة.

**- spastic m.** تَقْبِضُ الحَدَقَةِ التَّشْنُجِيّ. تقبض  
الحدقة بسبب تشنج العضلة مضيقة الحدقة.

**- spinal m.** تَقْبِضُ الحَدَقَةِ النُّخَاعِيّ. تقبض الحدقة  
بسبب مرض النخاع الشوكي.

**misanthropia** كُرْهُ الْبِشَر.

**misogamy** كُرْهُ الزَّوْاج. كره الزواج ورفضه.

**misogyny** كُرْهُ النِّسَاء.

**mittelschmerz (= intermenstrual  
pain)** أَلَمُ الْقَرْء؛ أَلَمُ بَيْنَ الْحَيْضَيْن. الألم

في الفترة بين حيزين متتالين، ويترافق ذلك في الغالب مع الإباضة.

**النهاية المُنبّهة.** أي (**mittor** = **neuromittor**) من نهايات العصبون التي تولد دفعة عصبية أو تنبه مستقبلات العصبون المجاور.

**ذَاكِرِيّ.** (**mnemonic** = **mnemonic**)

1. ذَاكِرِيّ 2. مُقْوِي الذاكرة. **mnemonic** متعلق بالذاكرة أو يتصف بها أو يحفزها.

**تقوية الذاكرة:** تَطْوِيرُ الذَّاكِرَةِ. **mnemonics** عملية تطوير الذاكرة وتحفيزها بمختلف الطرق والأساليب.

**تحرك:** حَرَاك. 1. القدرة على الحركة **mobility** أو التحرك أو التحريك.

**تَحْرِيك.** عملية تحريك جسم **mobilization** ثابت أو تحفيز مواد مخزونة على الحركة أو تمكين أحد الأعضاء المثبتة من الحركة ككفك التصاقات العظم الركابي وتمكينه من الحركة.

**رُتَّةُ عَضَلِيَّةِ الْمُنْشَأ.** عسر **mogiathria** الكلام نتيجة خلل عضلات النطق.

**تَلَاثَةٌ.** (**mogilalia** = **stuttering**)

**عُسْرُ التَّصْوِيت.** صعوبة **mogiphonia** توليد الأصوات.

**أَحَادِيّ الْأَمِين.** (**monamine** = **monoamine**)

**أَحَادِيّ الْأَمِينِيّ الْفِعْل.** (**monoaminergic** = **monoaminergic**)

**أَحَادِيّ الْأَمِينِيّ الْفِعْل.** **أَحَادِيّ الْمَخَوَار.** عصبون له محوار **monaxon** واحد.

**مُتَعَلِّقٌ بِأَحَدِيّ الْحَوَاس.** متعلق **monesthetic** بإحدى الحواس أو يصيب إحدى الحواس فقط.

**الْمَغُولِيَّة.** مصطلح قديم يصف **mongolism** متلازمة داون للشبه الشديد بين شكل وجه المصاب بها ووجه سكان منغوليا.

**أَحَادِيّ الْأَمِين.** جزئي أميني **monoamine** يحوي مجموعة أمينية واحدة مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين (النورابينفرين).

**أَكْسِيدَازُ أَحَادِيّ الْأَمِين.** (**monoamine oxidase (MAO)** = **amine oxidase**)

إنزيم يؤثر على أحاديّات وثنائيات الأمين.

**أَحَادِيّ الْأَمِينِيّ الْفِعْل.** **monoaminergic**

عصبونات تفرز مواد أحادية الأمين كناقلات عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين.

**تَخْدِيرُ أَحَادِيّ.** تنبج **monoanesthesia** عضو واحد أو أحد أقسام الجسم فقط.

**رَقَصٌ أَحَادِيّ.** رقص يصيب **monochorea** أحد الأذرع فقط.

**هَوَسٌ أَحَادِيّ.** هوس يتصف **monomania** بالتركيز على موضوع أو فكرة واحدة.

**شَلَلٌ عَضَلِيّ أَحَادِيّ.** **monomyoplegia** شلل يصيب عضلة واحدة فقط.

**إِلْتِهَابُ الْعَضَلَةِ الْأَحَادِيّ.** **monomyositis** التهاب يصيب العضلة ذات الرأسين فقط وبصورة دورية.

1. **أَحَادِيّ الْعَصَب 2.** أحادي **mononeural** العصبون. 1. متعلق بعصب واحد أو مغذى بفروع عصب واحد فقط. 1. ذو عصبون واحد فقط.

**أَحَادِيّ الْعَصْبُون.** ذو عصبون **mononeuric** واحد فقط.

**إِلْتِهَابُ الْعَصَبِ الْأَحَادِيّ.** **mononeuritis** التهاب عصب واحد فقط.

**إِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الْمُتَعَدَّة.** **m. multiplex** التهاب عدة أعصاب متفرقة في ذات الوقت.

**إِعْتِلَالُ عَصْبِيّ أَحَادِيّ.** **mononeuropathy** داء يصيب عصباً واحداً فقط.

**إِعْتِلَالُ عَصْبِيّ قَحْفِيّ.** مرض أحد **- cranial m.** الأعصاب القحفية كمرض العصب القحفي السابع في داء بيل.

**خَزَلٌ أَحَادِيّ.** خزل يصيب **monoparesis** أحد أطراف الجسم.

**مَذَلٌ أَحَادِيّ.** مذل **monoparesthesia** يصيب أحد أطراف الجسم.

**نُطْقٌ أَحَادِيّ.** حبسة يتمكن **monophasia** المصاب بها من نطق كلمة أو مقطع واحد فقط.

**شَلَلٌ أَحَادِيّ.** شلل أحد أطراف **monoplegia** الجسم.

**monoplegic** أَحَادِي الشَّلَل. مصاب بالشلل الأحادي أو منسوب إليه.

**monosexual** أَحَادِي الْجِنْس. الذي يظهر صفات أحد الجنسين فقط.

**monosynaptic** أَحَادِي التَّشَابُك. سبيل أو منعكس ذو تشابك واحد فقط.

**monticulus cerebelli** النَّاتِيءُ الْمُخَيَّخِي. ناتئ أو القسم المركزي من الدودة العليا.

**mood** مِزَاج. حالة عاطفية ثابتة ويمكنها عندما تكون متطرفة أن تغير أسلوب حياة صاحبها وآراءه وقد يكون المزاج كثيباً أو مرحاً.

**mood-congruent** مُنْسَجِمٌ مَعَ الْمِزَاج. الهلوسة المنسجم مع مزاج الشخص والذي يحدث خلال نوبة هوسية أو اكتئابية.

**mood-incongruent** غَيْرُ مُنْسَجِمٍ مَعَ الْمِزَاج. هلوسة وتوهم غير منسجم مع المزاج يحدث في حالات الفصام والاضطرابات النفسانية الأخرى.

**moron** مَافُون. إحدى درجات التخلف العقلي يكون حاصل الذكاء فيها (50-69)، وهو تخلف معتدل نسبياً.

**moronity** أَفَن. تخلف عقلي معتدل.

**morphine** مُورْفِين. عقار قلواني يستخلص من الأفيون وهو مسكن شديد الفعالية ويؤدي استعماله الطويل إلى الإدمان.

1. **morphinism** المَورْفِينِيَّة 2. إِذْمَانُ المَورْفِين. حالة مرضية تتولد عن سوء استعمال المورفين لمدة طويلة أو إدمانه.

**morphinist** مُدَمِّنُ المَورْفِين. شخص مصاب بالإدمان على المورفين.

**morphinium (= morphine)** مُورْفِين.

**motility** تَحَرُّك. القدرة على الحركة الذاتية.

**motivation** دَافِع. في علم النفس هو أي من القوى التي تنشط السلوك وتدفع المرء إلى تحقيق أي من رغباته أو الحصول على أي من احتياجاته.

**motive** حَافِز؛ دَافِع. في علم النفس هي الحالة التي تدفع بالشخص على القيام بسلوك معين يستهدف تحقيق أي من رغباته.

**achievement m.** حَافِزُ إِنْجَازِي. الرغبة في الانجاز لغرض الانجاز نفسه.

**- aroused m.** حَافِزُ مُسْتَنَار. حافز يؤثر على السلوك بصورة فعالة والذي يستدل عليه من طبيعة السلوك نفسه.

**motoceptor** مُسْتَقْبِلُ حَرَكي. إحدى المستقبلات الحسية في العضلة كعضو غولجي في الوتر أو في المفزل العضلي.

**motofacient** مُحَرِّك. ما يولد الحركة ويطلق على طور النشاط العضلي الذي يساعد العضلة على حركتها الفعلية.

**motoneuron** عَصْبُونٌ حَرَكي. عصبون ذو وظيفة حركية وهو عصبون صادر ينقل الدفعات الحركية إلى الأعضاء المنفذة.

**- alpha m's.** عَصْبُونَاتُ الْفَا الحَرَكيَّة. عصبونات القرن الأمامي للنخاع الشوكي التي تعطي ألياف ألفا العصبية التي تغذي ألياف العضلات الهيكلية.

**- gamma m's.** عَصْبُونَاتُ غَامَا الحَرَكيَّة. عصبونات القرن الأمامي للنخاع الشوكي التي تعطي ألياف غاما العصبية التي تغذي الألياف داخل المغازل العضلية.

**- heteronymous m's.** العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة. العفافية. العصبونات الحركية التي تغذي عضلات غير تلك التي تصدر منها الدفعات الواردة.

**- homonymous m's.** العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة. المعاملة. العصبونات الحركية التي تغذي العضلات التي تصدر منها النبضات العصبية الواردة.

**- lower m's.** العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة السُّفْلِيَّة. عصبونات حركية محيطية توجد في أجسام خلايا في القرن الأمامي للنخاع الشوكي وتوزع أليافها إلى العضلات.

**- peripheral m's** العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة المُحِيطِيَّة. عصبونات في قوس المنعكس العصبي المحيطي تستلم الدفعات العصبية من العصبونات الوسيطة لتنتقلها إلى العضلات الإرادية.

**- upper m's.** العَصْبُونَاتُ الحَرَكيَّة العُلْوِيَّة. عصبونات القشرة الدماغية التي تنقل الدفعات العصبية من القشرة الحركية إلى النوى الحركية للأعصاب القحفية أو إلى العمود السنجابي الأمامي للنخاع الشوكي.



**motor** حَرَكَِيّ. 1. عصب أي عضلة أو مركز عصبي متحكم في الوظيفة الحركية 2. ما يحفز الحركة أو منسوب إليها.

**m. oculi (= oculomotor nerve)** العَصَبُ مُحَرِّكُ الْعَيْنِ.

**movement** حَرَكَة. (ج: حَرَكَات). 1. عملية الحركة 2. عملية التَقَوُّط.

**- active m.** حَرَكَة فَاعِلَةٌ. حركة إرادية تقوم بها عضلات الشخص نفسه.

**- adversive m.** حَرَكَة تَوَجُّهِيَّة. حركة متجهة نحو الجذع أو حركة متجهة نحو جهة البنية العصبية المركزية المنبهة.

**- ameboid m.** حَرَكَة أَمِيبَانِيَّة. حركة الاميبة التي تتم بجريان الهيولي إلى الأقدام الكاذبة التي تقدم جسم الاميبة وتحركه.

**- angular m.** حَرَكَة زَاوِيَّة. حركة تغير زاوية المفصل بين عظمين.

**- assistive m.** حَرَكَة مُسَاعِدَةٌ. حركة تستعمل في العلاج الطبيعي حيث يساعد المعالج المريض على القيام ببعض حركات أطرافه المشلولة ومن الممكن أن تكون حركات فاعلة أو لا فاعلة.

**- associated m.** حَرَكَة مُتَرَابِطَةٌ. حركات أقسام من الجسم تتم متزامنة مع بعضها البعض مثل حركات العينين والأجفان.

**- associated contralateral m.** حَرَكَة مُتَرَابِطَةٌ بِالْجَانِبِ الْمُقَابِلِ. حركة لا إرادية في الجهة المشلولة من المريض المفلوج عند قيامه بحركة إرادية في الجهة السليمة.

**- athetoid m.** حَرَكَة كُنْعَانِيَّة. حركة تشبه الحركات التي تشاهد في الكنع.

**- automatic m.** حَرَكَة تَلْقَائِيَّة. حركة لاإرادية ينبهها الجهاز العصبي الذاتي.

**- bowel m.** التَقَوُّط. حركة الأمعاء والتغوط.

**- choreic m's.** حَرَكَات رَقْصِيَّة. الحركات النفضية غير المنتظمة التي تحدث في مجموعات من العضلات في داء الرقص.

**- ciliary m's.** حَرَكَات هَدْبِيَّة. الحركات المستمرة التي تقوم بها أهداب بعض الأعضاء أو الخلايا.

**- circus m.** حَرَكَة دَائِرِيَّة. مشية دورانية خاصة وهي حركة التفاضية متعثرة تحدث في آفات الدماغ ومراكز الأعصاب القاعدية.

**- contralateral associaed m. (= associated contralateral m.)** حَرَكَة مُتَرَابِطَةٌ بِالْجَانِبِ الْمُقَابِلِ.

**- dystonic m.** حَرَكَة مُخْتَلَّة التَوَثُّر. حركة كنعانية كبيرة مضخمة.

**- forced m.** حَرَكَة قُسْرِيَّة. حركة تتولد عن إصابة أحد المراكز الحركية أو السبل العصبية الحركية.

**- Frenkel's m's.** حَرَكَات فَرَنْكِل. سلسلة من حركات دقيقة يقوم بها المريض المصاب بالرنح بغرض استعادة توازنه وتناسق حركته.

**- passive m.** حَرَكَة لَا فَاعِلَةٌ. حركة قسم أو طرف من أطراف الجسم تجري بفعل قوة خارجية ومن دون أن يبذل فيها الجسم أي جهد.

**- rapid eye m. (REM)** حَرَكَة الْعَيْنِ السَّرِيعَةِ. حركة العينين المتقارنة والسريعة التي تحدث أثناء النوم العميق (نوم حركات العين السريعة).

**- reflex m.** حَرَكَة إِنْعَكَاسِيَّة. حركة لا إرادية نمطية يحفزها منبه خارجي وتتم خلال مركز عصبي والتي تحدث خلال القوس المنعكسية.

**- saccadic m.** حركة رمشية؛ حَرَكَة قَفْزِيَّة. حركة العين السريعة عندما تقفز من موقع تثبيت واحد إلى موقع آخر.

**- spontaneous m. (= automatic m.)** حَرَكَة تَلْقَائِيَّة؛ حَرَكَة عَفْوِيَّة.

**- synkinetic m.** حَرَكَة مُرَافَقَةٌ. حركات ثانوية صغيرة لاواعية ترافق الحركات الإرادية الكبيرة مثل حركات الوجه التي ترافق حركات الإجهاد الشديد.

**- voluntary m.** حَرَكَة إِرَادِيَّة. حركة فاعلة يقوم بها الشخص عن وعي تام.

**mover** مُحَرِّك. الذي يولد الحركة.

**- prime m.** الْمُحَرِّكُ الرَّئِيسِيّ. العضلة التي تعمل بصورة مباشرة في تنفيذ إحدى الحركات المرغوبة.

**multisynaptic (= polysynaptic)** مُتَعَدِّد المُشَابِك؛ عَدِيدُ التَشَابِكَات.

**muscle** عُضْلَةٌ. نسيج أساسي في الجسم

تمتلك خلاياه القدرة على التقلص مما يمكن الجسم أو أحد أقسامه على الحركة.

- agonistic m. عَضَلَةٌ مُضَادَّةٌ. عضلة تضادها في عملها عضلة ضادة (مناهضة).

- antagonistic m. عضلة مناهضة؛ عَضَلَةٌ ضَادَّةٌ. عضلة تضاد في عملها عمل عضلة أخرى تسمى العضلة الشادة.

- antigravity m's. عَضَلَاتٌ مُقَاوِمَةٌ لِلْجاذِبِيَّةِ. عضلات تقاوم فعل الجاذبية التي تحاول جذب الجسم للأسفل وبذا تحافظ على وضعه.

- articular m. (= musculus articularis) عَضَلَةٌ مَفْصَلِيَّةٌ.

- m. atony وَثِي عَضَلِيّ. atony انظر

- cardiac m. عَضَلٌ قَلْبِيّ. عضل القلب المكون من الألياف عضلية مخططة لا إرادية.

- m. clonus رَمَعٌ عَضَلِيّ. clonus انظر

- m. contraction تَقَلُّصُ العَضَلَةِ. انظر contraction

- m. contracture تَقَفُّعُ العَضَلَةِ. انظر contracture

- m. cramp مَعْصُ العَضَلَةِ. انظر cramp

- emergency m's. عَضَلَاتٌ الطَّوَارِيءِ. عضلات لا يحتاجها الجسم في الحالات الاعتيادية للقيام بوظائفه الطبيعية لكنها تساعد عضلات الحركات الكبيرة عند قيامها بحركة شديدة أو طارئة.

- extensor m. عَضَلَةٌ بَاسِطَةٌ. عضلة تقوم ببسط أحد الأجزاء أو الأطراف.

- fast m. (= white m.) عَضَلَةٌ سَرِيعَةٌ. عضلة بيضاء.

- flexor m. عَضَلَةٌ مُنْغِنَةٌ. عضلة تقوم بثني أحد الأجزاء أو الأطراف.

- involuntary m. عَضَلَةٌ لَإِزَادِيَّةٍ. عضلة لا تقع تحت السيطرة الإرادية وهي غالباً غير مخططة عند العضلة القلبية.

- nonstriated m. عضلة غير مخططة؛ عَضَلَةٌ مَلْسَاءٌ. عضل لا إرادي وهو نوع من العضل لا يحوي خطوطاً عرضانية على أليافه.

- plain m. (= nonstriated m.) عَضَلَةٌ مَلْسَاءٌ.

- red m. عَضَلَةٌ حُمْرَاءُ. عضلة حمراء قانية اللون

توجد في بعض الحيوانات اللبونة وتتكون من الألياف غامقة غنية بالمتقدرات والغلوبيين العضلي والهيولي العضلية ولكنها تحوي خطوطاً عرضية باهتة اللون وتقوم بتقلصات بطيئة ومتناوبة لفترات طويلة. لذلك فإنها تسمى عضلات بطيئة ولا تعب بسهولة.

- skeletal m's. العَضَلَاتُ الِهَيْكَلِيَّةُ. عضلات مخططة ترتكز على العظام وعادة ما تعبر حول أحد المفاصل.

- slow m. (= red m.) عَضَلَةٌ بَطِيئَةٌ.

- smooth m. (= nonstriated m.) عَضَلَةٌ مَلْسَاءٌ. عضلة لا إرادية لا مخططة.

- somatic m's. (= skeletal m's.) عَضَلَاتُ هَيْكَلِيَّةٌ.

- m. spindle مِفْزَلٌ عَضَلِيّ. انظر spindle

- striated m. عَضَلَةٌ مُخَطَّطَةٌ. عضلة توجد في أليافها خطوط عرضية وعادة هي عضلات إرادية إلا العضلة القلبية فهي مخططة ولكنها لا إرادية.

- striped m. (= striated m.) عَضَلَةٌ مُخَطَّطَةٌ.

- synergic m's. (= synergistic m's.) عَضَلَاتٌ تَآزُرِيَّةٌ.

- m. tone (muscular tension) التَوَثُّرُ العَضَلِيّ. انظر tension

- tonic m. (= red m.) عَضَلَةٌ حُمْرَاءُ؛ عَضَلَةٌ تَوَثُّرِيَّةٌ.

- m. tremor رُعَاشٌ عَضَلِيّ. انظر tremor

- m. twitch نَفْضَانٌ عَضَلِيّ. انظر twitch

- twitch m. (= white m.) عَضَلَةٌ بَيْضَاءُ؛ عَضَلَةٌ نَفْضَانِيَّةٌ.

- unstriated m. (= nonstriated m.) عَضَلَةٌ مَلْسَاءٌ. عضلة غير مخططة.

- visceral m. عَضَلَةٌ حَشَوِيَّةٌ. الألياف عضلية توجد بصورة رئيسية في الأحشاء المجوفة وكلها عضلات حشوية ملساء ما عدا تلك الألياف الحشوية التي توجد في القلب فهي الألياف مخططة ولكنها لا إرادية.

- voluntary m. عَضَلَةٌ إِزَادِيَّةٌ. عضلة تحت سيطرة الإرادة وهي غالباً ما تكون عضلة مخططة.

- white m. عَضَلَةٌ بَيْضَاءُ. الألياف عضلية فاقعة اللون تحوي القليل من الهيولي العضلية والأليافها أسمك عادة من الألياف العضلات الحمراء وأسرع منها عملاً ولذلك تسمى العضلات السريعة.

**muscular** عَضَلِيّ. متعلق بالعضل أو مكون منها.  
**musculature** المَجْمُوع العَضَلِيّ: العضل.  
 الجهاز العضلي للجسم أو لأحد أعضائه.

**musculoskeletal** عَضَلِيّ هَيْكَلِيّ. متعلق  
 بالمجموعة العضلية والجهاز الهيكلي للجسم.  
**musculi** عَضَلَات. جمع عضلة.

**musculus** عَضَلَة. عضو يتقلص ويرتخي  
 فيحرك بذلك الجسم كله أو أحد أعضائه.

- **musculi abdominis** عَضَلَات البَطْن.

- **m. abductor digiti minimi manus**  
 (= **abductor muscle of little finger**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة لِخَنَصِرِ اليَد. عضلة في اليد يغذيها  
 العصب الزندي.

- **m. abductor digiti minimi pedis**  
 (= **abductor muscle of little toe**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة لِخَنَصِرِ القَدَم. عضلة يغذيها الفرع السطحي  
 للعصب الأخمصي الوحشي.

- **m. abductor digiti quinti manus** (= **m.**  
**abductor digiti minimi manus**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة لِخَنَصِرِ اليَد.

- **m. abductor digiti quinti pedis** (= **m.**  
**abductor digiti minimi pedis**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة لِخَنَصِرِ القَدَم.

- **m. abductor hallucis** (= **abductor**  
**muscle of great toe**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة لِإِبْهَامِ القَدَم. عضلة يغذيها العصب الأخمصي الإنسي.

- **m. abductor policis brevis** (= **short**  
**abductor muscle of thumb**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة لِإِبْهَامِ القَصِيرَة. عضلة يغذيها العصب الناصف.

- **m. abductor policis longus** (= **long**  
**abductor muscle of thumb**)  
 العَضَلَة المَبْعُدَة الطَوِيلَة لِإِبْهَامِ. عضلة يغذيها العصب بين  
 العظام الخلفي.

- **m. adductor brevis** (= **short adductor**  
**muscle**)  
 العَضَلَة المَقْرَبَة القَصِيرَة. عضلة  
 تقرب وتدور وتثني الفخذ ويغذيها العصب السدادي.

- **m. adductor hallucis** (= **adductor**  
**muscle of great toe**)  
 العَضَلَة المَقْرَبَة لِإِبْهَامِ القَدَم. عضلة يغذيها العصب الأخمصي الوحشي.

- **m. adductor longus** (= **long adductor**  
**muscle**)  
 العَضَلَة المَقْرَبَة الطَوِيلَة. عضلة تقرب  
 وتدور وتثني الفخذ ويغذيها العصب السدادي.

- **m. adductor magnus** (= **great adductor**  
**muscle**)  
 العَضَلَة المَقْرَبَة الكَبِيرَة. ولها قسمان  
 سطحي يمدد الفخذ ويغذيها العصب الوركى وقسم  
 عميق يقرب الفخذ ويغذيها العصب السدادي.

- **m. adductor minimus** (= **smallest**  
**adductor muscle**)  
 العَضَلَة المَقْرَبَة الصَغِيرَة. عضلة تقرب  
 الفخذ ويغذيها العصبان الوركى  
 والسدادي.

- **m. adductor policis** (= **adductor**  
**muscle of thumb**)  
 العَضَلَة المَقْرَبَة لِإِبْهَامِ. عضلة تقرب  
 الإبهام وتقايله مع باقي الأصابع ويغذيها  
 العصب الزندي.

- **m. anconeus** (= **anconeus muscle**)  
 العَضَلَة المَرَفَقِيَّة. عضلة تمدد الساعد ويغذيها  
 العصب الكعبري.

- **m. antitragicus** (= **antitragus muscle**)  
 عَضَلَة المَرْرَة. عضلة تغير القليل جداً من شكل الأذن  
 أو موقعها في الإنسان ويغذيها العصبان الصدغي  
 والأذني الخلفي.

- **musculi arrectores pilorum** (= **arrector**  
**muscles of hair**)  
 العَضَلَات نَاصِبَة الشَّعْر. عضلات ترفع وتوقف شعر الجلد وتغذيها الأعصاب  
 الودية.

- **m. articularis** (= **articular muscle**)  
 عَضَلَة مَفْصِلِيَّة. عضلة تنغرز إحدى نهايتيها في الغشاء  
 الزليلي للمفصل.

- **m. articularis cubiti** (= **articular**  
**muscle of elbow**)  
 عَضَلَة المَرَفَقِ المَفْصِلِيَّة. بعض ألياف السطح العميق للعضلة الثلاثية الرؤوس  
 العضدية التي تنغرز في الرباط الخلفي والغشاء  
 الزليلي لمفصل المرفق.

- **m. articularis genu** (= **m. articularis**  
**genus**)  
 عَضَلَة الرُّكْبَة المَفْصِلِيَّة.

- **m. articularis genus** (= **articular**  
**muscle of knee**)  
 عَضَلَة الرُّكْبَة المَفْصِلِيَّة. عضلة  
 ترفع محافظة مفصل الركبة ويغذيها العصب الفخذي.

- m. aryepiglotticus (= aryepiglottic muscle) **العضلة الطَرَجَاليَّةُ اللُّسَانِ المَرْمَاريَّةُ.** اسم يطلق على حزمة غير ثابتة من العضلة الطرجالية التي تتأصل من قمة الغضروف الطرجالي وتنغرز في الحافة الوحشية للسان المزمار (الفلكة).
- m. arytenoideus obliquus (= oblique arytenoid muscle) **العضلة الطَرَجَاليَّةُ المَائِلَةُ.** عضلة تغلق مدخل الحنجرة ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- m. arytenoideus transversus (= transverse arytenoid muscle) **العضلة الطَرَجَاليَّةُ المُسْتَقْرِضَةُ.** عضلة تقرب الغضاريف الطرجالية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- m. auricularis anterior (= anterior auricular muscle) **العضلة الأذنيَّةُ الأماميَّةُ.** عضلة تسحب الأذن إلى الامام ويغذيها العصب الوجهي.
- m. auricularis posterior (= posterior auricular muscle) **العضلة الأذنيَّةُ الخلفيَّةُ.** عضلة تسحب الأذن للخلف ويغذيها العصب الوجهي.
- m. auricularis superior (= superior auricular muscle) **العضلة الأذنيَّةُ العلويَّةُ.** عضلة ترفع الأذن للأعلى ويغذيها العصب الوجهي.
- muscoli auricularii (= auricular muscles) **العضلات الأذنيَّةُ.** العضلات الأذنية الداخلية التي تمتد بين أقسام صيوان الأذن وتشمل العضلات الحتاريتين الكبيرة والصغيرة والزئمة والمرزة والأذنيتين المائلة والمستعرضة.
- m. biceps brachii (= biceps muscle of arm) **العضلة ذات الرأسين العضدية.** عضلة تثني الساعد وتبسط اليد ويغذيها العصب العضلي الجليدي.
- m. biceps femoris (= biceps muscle of thigh) **العضلة ذات الرأسين الفخذية.** عضلة تثني الساق وتبسط الفخذ ويغذي رأسها الطويل العصب الظنبوبي ورأسها القصير العصب الشظوي.
- m. brachialis (= brachial muscle) **العضلة العضدية.** عضلة تثني الساعد ويغذيها العصبان الكعبري والعضلي الجليدي.
- m. brachioradialis (= brachioradial muscle) **العضلة العضدية الكعبريَّة.** عضلة تثني الساعد ويغذيها العصب الكعبري.
- m. broncho-oesophageus (= bronchoesophageal muscle) **العضلة القصبيَّة المَرْمَاريَّةُ.** اسم يطلق على حزم من الياف عضلية تتأصل من جدار القصبة اليسرى تسند عضلات المريء.
- m. buccinator (= buccinator m.) **العضلة المُبَوِّقَةُ.** عضلة تضغط على الوجنة وتسحب زاوية الفم ويغذيها الفرع الشدقي للعصب الوجهي.
- m. buccopharyngeus (= pars buccopharyngea muscili constrictoris pharyngis superioris) **العضلة الشدقيَّة البلعوميَّة.** القسم الشدقي البلعومي للعضلة المضيق للبلعوم العلوية.
- muscoli bulbi (= extraocular muscles) **عَضَلَاتُ المَقْلَةِ.** العضلات الإرادية الست التي تحرك مقلة العين وهي المستقيمات العلوية والسفلية والوحشية والإنسية والمائلتان العلوية والسفلية.
- m. bulbo cavernosus (= m. bulbospongiosus) **العضلة البَصَلِيَّةُ الكَهْفِيَّةُ.**
- m. bulbospongiosus (= bulbocavernosus m.) **العضلة البَصَلِيَّةُ الكَهْفِيَّةُ.** عضلة تضيق بصلة الإحليل ويغذيها العصب الفرجي.
- m. caninus (= m. levator anguli oris) **العضلة الرَّافِعَةُ لزاوية الفم.**
- muscoli capitis (= muscles of the head) **عَضَلَاتُ الرَّأْسِ.**
- m. ceratocricoides (= ceratocricoid muscle) **العضلة القَرْنِيَّةُ الحَلَقِيَّةُ.** اسم لحزمة عضلية تتأصل من الغضروف الحلقي وتنغرز في السطح السفلي لقرن الغضروف الدرقي.
- m. ceratopharyngeus (= pars ceratopharyngea muscili constrictoris pharyngis medii) **العضلة القَرْنِيَّةُ البلعوميَّة.** الجزء القرني البلعومي للعضلة مضيق البلعوم الإنسية.

- **m. ciliaris (= ciliary muscle)** **الْعَضَلَةُ**  
الْهَدْبِيَّةُ. عضلة عينية داخلية تعمل على تغيير شكل عدستها ويغذيها عصب لا ودي يسير مع العصب محرك العين.
- **musculi coccygei (= coccygeal muscles)** **الْعَضَلَاتُ** الْعُضْغُصِيَّةُ. العضلات التي تعمل على العصعص وتشمل العضلة العصعصية والعضلة العجزية العصعصية.
- **m. coccygeus (= coccygeal muscle)** **الْعَضَلَةُ** الْعُضْغُصِيَّةُ. عضلة تسند وترفع العصعص ويغذيها العصبان العجزيان الثالث والرابع.
- **musculi colli (= neck muscles)** **عَضَلَاتُ** الرَقَبَةِ. وتشمل العضلة القصية الترقوية الخشائية والعضلة الرقبية الطويلة والفوق الالامية والتحت الالامية والعضلات الاخمصية.
- **m. compressor naris (= pars-transversa muscui nasalis)** **الْجُزْءُ** الْمُسْتَعْرِضُ لِلْعَضَلَةِ الْأَنْفِيَّةِ.
- **m. constrictor pharyngis inferior (= inferior constrictor muscle of pharynx)** **الْعَضَلَةُ** مُضَيِّقَةُ الْبُلْعُومِ السُّفْلِيَّةِ. عضلة تغذيها الاعصاب اللسانية البلعومية والحنجري الظاهري والراجع والصفيرة البلعومية.
- **m. constrictor pharyngis medius (= middle constrictor muscle of pharynx)** **الْعَضَلَةُ** مُضَيِّقَةُ الْبُلْعُومِ الْوَسْطِيَّةِ. عضلة تغذيها الصفيرة البلعومية للعصب المبهم والعصب اللساني البلعومي.
- **m. constrictor pharyngis superior (= superior constrictor muscle of pharynx)** **الْعَضَلَةُ** مُضَيِّقَةُ الْبُلْعُومِ الْفُوقِيَّةِ. عضلة تغذيها الصفيرة البلعومية للعصب المبهم.
- **m. coracobrachialis (= coracobrachial muscle)** **الْعَضَلَةُ** الْفَرَاوِيَّةُ الْعُضْدِيَّةُ. عضلة تثني الذراع وتقربه ويغذيها العصب العضلي الجذلي.
- **m. corrugator supercillii** **الْعَضَلَةُ** الْمُعْضِنَةُ فَوْقَ الْهَدْبِيَّةِ. النهاية الإنسية للقوس فوق الهدبي والتي تسحب الجفن للأسفل وللجهة الإنسية ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. cremaster (= cremaster muscle)** **الْعَضَلَةُ** الْمُشْمِرَّةُ. عضلة ترفع الخصية للأعلى ويغذيها الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي.
- **m. crico-arytenoideus lateralis (= lateral cricoarytenoid muscle)** **الْعَضَلَةُ** الْخَلْقِيَّةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ الْوُحْشِيَّةُ. عضلة تقرب الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. crico-arytenoideus posterior (= posterior cricoarytenoid muscle)** **الْعَضَلَةُ** الْخَلْقِيَّةُ الطَّرْجَهَالِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ. عضلة تباعد الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. cricopharyngeus (= pars cricopharyngea muscui constrictoris pharyngis inferioris)** **الْعَضَلَةُ** الْخَلْقِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ. الجزء الحلقي البلعومي من العضلة المضيقية للبلعوم السفلية.
- **m. cricothyroideus (= cricothyroid muscle)** **الْعَضَلَةُ** الْخَلْقِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ. عضلة تشد وتوتر الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري العلوي.
- **m. cruciatus (= cruciate muscle)** **عَضَلَةُ** مُتَصَالِبَةٍ. عضلة تكون أليافها مرتبة بشكل متصالب على شكل X.
- **m. cutaneus (= cutaneous muscle)** **عَضَلَةُ** جُلْدِيَّةُ. عضلة مخططة تنفرز في الجلد.
- **m. dartos (= dartos muscle)** **الْعَضَلَةُ** السِّلْخِيَّةُ. ألياف عضلية غير مخططة في الغلالة السلخية وتساعد طبقتها العميقة في تكوين حاجز الصفن وقد يستعمل المصطلح للدلالة على الغلالة السلخية كلها.
- **m. deltoideus (= deltoid muscle)** **الْعَضَلَةُ** الدَّالِيَّةُ. عضلة تبعد اليافها الامامية الذراع وتثني بينما تبعد اليافها الخلفية الذراع وتبسطه ويغذيها العصب الإبطي.
- **m. depressor anguli oris (= depressor muscle of angle of mouth)** **الْعَضَلَةُ** الْخَافِضَةُ لِرَآوِيَةِ الْفَمِ. عضلة يغذيها العصب الوجهي.
- **m. depressor labii inferioris (= depressor muscle of lower lip)** **الْعَضَلَةُ** الْخَافِضَةُ لِلشَّفَةِ السُّفْلَى. عضلة يغذيها العصب الوجهي.

- **m. depressor septi nasi (depressor muscle of nasal septum)** **الْعَضَلَةُ الْخَافِضَةُ لِجَاغِزِ الْأَنْفِ.** عضلة يغذيها العصب الوجهي وهي تضيق المنخر وتخفّض حاجز الأنف.

- **m. depressor supercillii (= super-ciliary depressor muscle)** **الْعَضَلَةُ الْخَافِضَةُ فَوْقَ الْهَدَبِيَّةِ.** اسم يطلق على بضعة الياف من الجزء الحجاجي من عضلة العين الدويرية التي تنغرز في الحاجب الذي تخفّضه.

- **m. detrusor vesicae (= detrusor muscle of bladder)** **الْعَضَلَةُ النَاقِضَةُ الْمَثَانِيَّةِ.** حزم من الألياف العضلية الملساء تكون الغلاف العضلي للمثانة ومرتبطة بطبقتين طولانية ودائرية وعند تقلصها تدفع البول وتطرّحه للخارج.

- **musculi diaphragmatis pelvis (= the muscles of the pelvic diaphragm)** **عَضَلَاتُ حِجَابِ الْحَوْضِ.**

- **musculi diaphragmatis urogenitalis (= the muscles of the urogenital diaphragm)** **عَضَلَاتُ حِجَابِ الْبُولِيِّ التَّنَاسُلِيِّ.**

- **m. digastricus (= digastric muscle)** **الْعَضَلَةُ ذَاتُ الْبُطْنَيْنِ.** عضلة ترفع العظم اللامي والفك السفلي ويغذي العصب الفكي اللامي قسمها البطني الأمامي بينما يغذي العصب الوجهي قسمها البطني الخلفي.

- **m. dilator naris (= pars alaris muscui nasalis)** **الْعَضَلَةُ مُوسِّعَةُ الْمُنْخَرِ.** القسم الجناحي للعضلة الأنفية.

- **m. dilator pupillae (= dilator muscle of pupil)** **الْعَضَلَةُ مُوسِّعَةُ الْحَدَقَةِ.** عضلة تغذيها الأعصاب الودية.

- **musculi dorsi (= dorsal muscles)** **عَضَلَاتُ الظُّهْرِ.**

- **m. epicranius (= epicranial muscle)** **عَضَلَةُ الشَّوَاةِ.** الغطاء العضلي للفرجة الذي يشمل العضلتين القذالية الجبهية والصدغية الجدارية والخوذة السفاقية.

- **m. epltrochleoanconaeus (= epitrochleoanconeus muscle)** **الْعَضَلَةُ**

الْبُكَيرِيَّةُ الْمَرْفَقِيَّةُ. شريط من الألياف العضلية يوجد أحياناً ويتأصل من ظهر اللقمة الإنسية للعضد وينغرز على الجهة الإنسية من الناتئ الزجج ويغذيه فرع من العصب الزندي

- **m. erector spinae (= erector muscle of spine)** **الْعَضَلَةُ النَّاصِبَةُ لِلْفَقَارِ.** ألياف من العضلات السطحية والعميقة للظهر تتأصل من العجز وشوكات الفقرات القطنية والصدريتين الحادية عشرة والثانية عشرة وعرف الحرقفة ثم تنقسم لتنغرز باسم العضلات الحرقفية الضلعية والطولى والشوكية.

- **m. extensor carpi radialis brevis (= short radial extensor muscle of wrist)** **العضلة بإسطة الرسغ الكعبرية القصيرة.** عضلة تبسط مفصل الرسغ وتبعده ويغذيها العصب الكعبري.

- **m. extensor carpi radialis longus (= long radial extensor muscle of wrist)** **العضلة بإسطة الرُّسْغِ الْكُفْبَرِيَّةِ الطَّوِيلَةِ.** عضلة تبسط مفصل الرسغ وتبعده ويغذيها العصب الكعبري.

- **m. extensor carpi ulnaris (= ulnar extensor muscle of wrist)** **الْعَضَلَةُ بِإِسْطَةِ الرُّسْغِ الزَّنْدِيَّةِ.** عضلة تبسط وتقرب مفصل الرسغ ويغذيها العصب الكعبري العميق.

- **m. extensor digiti minimi (= extensor muscle of little finger)** **الْعَضَلَةُ بِإِسْطَةِ الْخِنْصِرِ.** عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق.

- **m. extensor digiti quinti proprius (= m. extensor digiti minimi)** **الْعَضَلَةُ بِإِسْطَةِ الْخِنْصِرِ.**

- **m. extensor digitorum (= extensor muscle of fingers)** **الْعَضَلَةُ الْبَاسِطَةُ لِأَصَابِعِ الْيَدِ.** عضلة تبسط مفصل الرسغ والسلاميات ويغذيها العصب الكعبري العميق.

- **m. extensor digitorum brevis (short extensor muscle of toes)** **الْعَضَلَةُ بِإِسْطَةِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ.** عضلة تبسط أصابع القدم ويغذيها العصب الشظوي العميق.

- **m. extensor digitorum communis (= m. extensor digitorum)** **الْعَضَلَةُ بِإِسْطَةِ أَصَابِعِ الْيَدِ.**

- m. extensor digitorum longus (= long extensor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةُ.** عضلة تبسط أصابع القدم ويغذيها العصب الشظوي العميق.
- m. extensor hallucis brevis (= short extensor muscle of great toe) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ.** اسم يطلق على جزء العضلة باسطة القدم القصيرة الذي يصل إبهام القدم.
- m. extensor hallucis longus (= long extensor muscle of great toe) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةُ.** عضلة تثني مفصل الكاحل للخلف وتبسط إبهام القدم ويغذيها العصب الشظوي العميق.
- m. extensor indicis (= extensor muscle of index finger) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ السَّيَّابَةِ.** عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق.
- m. extensor indicis proprius (= m. extensor indicis) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ السَّيَّابَةِ.**
- m. extensor pollicis brevis (= short extensor muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الإِبْهَامِ الْقَصِيرَةِ.** عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق.
- m. extensor pollicis longus (= long extensor muscle of thumb) **الْعَضَلَةُ بِاسِطَةُ الإِبْهَامِ الطَّوِيلَةِ.** عضلة يغذيها العصب الكعبري العميق وهي تبسط وتبعد الإبهام.
- musculi extremitatis inferioris (= musculi membri inferioris) **عَضَلَاتُ الطَّرَفَيْنِ السُّفْلَيْنِ.**
- musculi extremitatis superioris (= musculi membri superioris) **عَضَلَاتُ الطَّرَفَيْنِ الْعُلَوَيْنِ.**
- musculi faciales et masticatores (= facial and masticatory muscles) **عَضَلَاتُ الْوَجْهِ وَالْمَضْغِ.**
- m. fibularis brevis (= m. peroneus brevis) **الْعَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الْقَصِيرَةُ.**
- m. fibularis longus (= m. peroneus longus) **الْعَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الطَّوِيلَةُ.**
- m. fibularis tertius (= m. peroneus tertius) **الْعَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الثَّالِثَةُ.**
- m. fixator baseos stapedis (= fixator muscle of base of stapes) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ قَاعِدَةِ الرُّكَّابِيِّ.** عضلة تثبت قاعدة الركابي وتمنعها من الاندفاع بشدة نحو النافذة الدهليزية وبذا فهي تضاد فعل العضلة الموترة للطلبل.
- m. flexor accessorius (m. quadratus plantae) **الْعَضَلَةُ الْأَخْمَصِيَّةُ الْمُزْبِجَةُ.**
- m. flexor carpi radialis (= radial flexor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ الْكَعْبَرِيَّةُ الْمُزْبِجَةُ لِلرُّسْغِ.** عضلة تثني الرسغ وتبعده ويغذيها العصب الناصف.
- m. flexor carpi ulnaris (= ulnar flexor muscle of wrist) **الْعَضَلَةُ الزَّنْدِيَّةُ الْمُزْبِجَةُ لِلرُّسْغِ.** عضلة تثني الرسغ وتقربه ويغذيها العصب الزندي.
- m. flexor digiti minimi brevis manus (= short flexor muscle of little finger) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ الْخِنْصَرِ الْقَصِيرَةِ.** عضلة يغذيها العصب الزندي.
- m. flexor digiti minimi brevis pedis (= short flexor muscle of little toe) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ إِصْبَعِ الْقَدَمِ الصَّغِيرِ الْقَصِيرَةِ.** عضلة يغذيها العصب الاخمصي الوحشي.
- m. flexor digitorum brevis (short flexor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقَصِيرَةِ.** عضلة يغذيها العصب الاخمصي الإنسي.
- m. flexor digitorum longus (= long flexor muscle of toes) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الطَّوِيلَةِ.** عضلة تثني أصابع القدم وتبسط القدم ويغذيها العصب الظنبوبي الخلفي.
- m. flexor digitorum profundus (= deep flexor muscle of fingers) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ الْعَمِيقَةِ.** عضلة تثني السلاميات القاصية ويغذيها العصبان الزندي وبين العظمين الأمامي.
- m. flexor digitorum sublimis (= m. flexor digitorum superficialis) **الْعَضَلَةُ مُثَبِّتَةُ أَصَابِعِ السُّطْحِيَّةِ.**

- مُثَنِّية أصابع اليد السطحية. عضلة تثني السلاحيات الوسطية ويغذيها العصب الناصف.
- m. flexor hallucis brevis (= short flexor muscle of great toe) **العضلة مُثَنِّية إبهام القدم القصيرة.** عضلة يغذيها العصبان الأخمصيان الإنسي والوحشي.
- m. flexor hallucis longus (= long flexor muscle of great toe) **العضلة مُثَنِّية إبهام القدم الطويلة.** عضلة يغذيها العصب الظنبوبي الخلفي.
- m. flexor pollicis brevis (= short flexor muscle of thumb) **العضلة مُثَنِّية إبهام اليد القصيرة.** عضلة تثني الإبهام وتقربه ويغذيها العصبان الزندي والناصف.
- m. flexor pollicis longus (= long flexor muscle of thumb) **العضلة مُثَنِّية إبهام اليد الطويلة.** عضلة يغذيها العصب بين العظمين الأمامي.
- m. frontalis (= venter frontalis musculi occipitofrontalis) **العضلة الجبهية.** البطن الجبهية للعضلة القذالية الجبهية.
- m. fusiformis (= fusiform muscle) **العضلة المغزلية.** عضلة مغزلية الشكل الياها متوازية مع محورها الطولي وتتقارب على وتر كل من النهايتين.
- m. gastrocnemius (= gastrocnemius muscle) **عضلة الساق.** عضلة ذات رأسين تثني الكاحل نحو الأخمص وتثني مفصل الركبة ويغذيها العصب الظنبوبي.
- m. gemellus inferior (= inferior gemellus muscle) **العضلة التوأمية السفلية.** عضلة تدور الفخذ للخارج وتغذيها الصغيرة العجزية.
- m. gemellus superior (= superior gemellus muscle) **العضلة التوأمية العلوية.** عضلة تدور الفخذ للخارج وتغذيها الصغيرة العجزية.
- m. genioglossus (= genioglossus muscle) **العضلة الذقنية اللسانية.** عضلة تبرز اللسان وتخسفه ويغذيها العصب تحت اللساني.
- m. geniohyoideus (= geniohyoid muscle) **العضلة الذقنية اللامية.** عضلة ترفع العظم اللامي وتسحبه مع العصب تحت اللساني.
- m. glossopalatinus (= m. palatoglossus) **العضلة الحنكية اللسانية.**
- m. glossopharyngeus (= glossopharyngea musculi constrictoris pharyngis superioris) **العضلة اللسانية البلعومية.** الجزء اللساني البلعومي من العضلة مضيق البلعوم العلوي.
- m. gluteus maximus (= greatest gluteal muscle) **العضلة الألوية العظمى.** عضلة تبسط وتبعد وتدور الفخذ للخارج ويغذيها العصب الألوي السفلي.
- m. gluteus medius (= middle gluteal muscle) **العضلة الألوية الوسطى.** عضلة تبعد الفخذ ويغذيها العصب الألوي العلوي.
- m. gluteus minimus (= least gluteal muscle) **العضلة الألوية الصغرى.** عضلة تبعد الفخذ وتدوره للداخل ويغذيها العصب الألوي العلوي.
- m. gracilis (= gracilis muscle) **العضلة الناجلة.** عضلة تقرب الفخذ وتثني مفصل الركبة ويغذيها العصب السدادي.
- m. heliis major **عضلة الحتار الكبيرة.** عضلة تشد جلد القناة السمعية ويغذيها العصبان الأذني الصدغي والأذني الخلفي.
- m. heliis minor **عضلة الحتار الصغيرة.** حزمة عضلية صغيرة أمام حافة الحتار ويغذيها العصبان الصدغي والأذني الخلفي.
- m. hyoglossus (= hyoglossal muscle) **العضلة اللامية اللسانية.** عضلة تخسف اللسان وتسحبه للأمام ويغذيها العصب تحت اللساني.
- m. iliacus (= iliac muscle) **العضلة الحرقفية.** عضلة تثني الفخذ والجذع على الطرف السفلي ويغذيها العصب الفخذي.
- m. iliococcygeus (= iliococcygeal muscle) **العضلة الحرقفية العضصية.** عضلة تساعد في إسناد أحشاء الحوض وتقاوم ارتفاع الضغط داخل البطن ويغذيها العصبان العجزيان الثالث والرابع.
- m. iliocostalis (= iliocostal muscle) **العضلة الحرقفية الضلعية.** القسم الوحشي للعضلة الناصبة للفقار.



- m. iliocostalis cervicis (= iliocostalis muscle of neck) **العَضَلَةُ الحَرْقِفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ الرَقَبِيَّةُ**. عضلة تبسط العمود الفقري الرقبى وتغذيها فروع من الأعصاب الرقبية.
- m. iliocostalis dorsi (= m. iliocostalis thoracis) **العَضَلَةُ الحَرْقِفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ**.
- m. iliocostalis lumborum **العَضَلَةُ الحَرْقِفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ القَطَنِيَّةُ**. عضلة تبسط العمود الفقري القطني وتغذيها فروع من الأعصاب الصدرية والقطنية.
- m. iliocostalis thoracis (= iliocostalis muscle of thorax) **العَضَلَةُ الحَرْقِفِيَّةُ الصِّلَعِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ**. عضلة تبسط العمود الفقري الصدري وتقوم بتغذيها فروع من الأعصاب الصدرية.
- m. iliopsoas (= iliopsoas muscle) **العَضَلَةُ الحَرْقِفِيَّةُ القَطَنِيَّةُ**. عضلة مركبة من العضلتين الحرقفية والقطنية الكبيرة.
- muscoli incisivi labii inferioris (= Incisive muscles of inferior lip) **العَضَلَاتُ القَاطِعِيَّةُ الشَّفَوِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. حزم صغيرة من الألياف العضلية من عضلة الفم الدويرية التي تتصل من الحفرة القاطعية للفك السفلي وتمتد إلى جهتها وتمتد جانبياً إلى زاويتي الفم.
- muscoli incisivi labii superioris (= incisive muscles of superior lip) **العَضَلَاتُ القَاطِعِيَّةُ الشَّفَوِيَّةُ العُلْوِيَّةُ**. حزم صغيرة من الألياف العضلية التي تتصل من الحفرة القاطعية للفك العلوي وتمتد إلى جهتيها وتمتد جانبياً إلى زاويتي الفم.
- m. Incisurae helicis **عَضَلَةُ الثَّلَمَةِ الحِقَارِيَّةُ**. حزمة عضلية غير ثابتة تمتد إلى الامام من العضلة الزمنية للأذن لتعبر تلمة الصماخ الغضروفي.
- muscoli infrahyoid (= infrahyoid muscles) **العَضَلَاتُ تَحْتَ اللِّامِي**. العضلات التي تثبت العظم اللامي بعظام القص والرقوة والكتف وتشمل العضلات القصية اللامية والكتفية والقصية الدرقية والدرقية اللامية.
- m. infraspinalis (= infraspinal muscle) **العَضَلَةُ تَحْتَ الشُّوكَةِ**. عضلة تدور العضد وحشياً ويغذيها العصب فوق الكتف.

- muscoli intercostalis externi (= external intercostal muscles) **العَضَلَاتُ الوَزْبِيَّةُ الظَّاهِرَةُ**. عضلات تقرب الأضلاع نحو بعضها أثناء عملية التنفس وحركات الزفير وتغذيها الأعصاب الوربية.
- muscoli intercostalis interni (= internal intercostal muscles) **العَضَلَاتُ الوَزْبِيَّةُ البَاطِنَةُ**. عضلات تقرب الأضلاع نحو بعضها أثناء عملية التنفس وحركات الزفير وتغذيها الأعصاب الوربية.
- muscoli intercostalis intimi (= innermost intercostal muscles) **العَضَلَاتُ الوَزْبِيَّةُ الأَعْمَقُ**. طبقة الألياف العضلية المفصولة عن العضلات الوربية الباطنية بالأعصاب الوربية.
- muscoli interossei dorsales manus (dorsal interosseous muscles of hand) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ الظَّهْرِيَّةِ لليد**. أربع عضلات تبعد وتنثني السلاميات القصوية ويغذيها العصب الزندي.
- muscoli interossei dorsales pedis (= dorsal interosseous muscles of foot) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ الظَّهْرِيَّةِ للقدم**. أربع عضلات تنثني وتبعد أصابع القدم ويغذيها العصب الخامس الوحشي.
- muscoli interossei palmaris (= palmar interosseous muscles) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ لِلرَّاحَةِ**. ثلاث عضلات تقرب وتنثني السلاميات القاصية لليد ويغذيها العصب الزندي.
- muscoli interossei plantaris (= plantar interosseous muscles) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ للأخمص**. ثلاث عضلات تقرب وتنثني أصابع القدم ويغذيها العصب الخامس الوحشي.
- muscoli interossei volaris (= muscoli interossei palmaris) **العَضَلَاتُ بَيْنَ العَظْمِيَّةِ لِلرَّاحَةِ**.
- muscoli interspinales (= interspinal muscles) **العَضَلَاتُ بَيْنَ السِّنَّاسِ**. شرائط قصيرة من الألياف العضلية تمتد بين النواتئ الشوكية للفقرات المتجاورة.

- **musculi interspinales cervicis**  
(= interspinal muscles of neck)  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ السَّنَاسِينِ الرَّقَبِيَّةِ. شرائط مزدوجة من الألياف العضلية تمدد الفقرات الرقبية وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- **musculi interspinalis lumborum**  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ السَّنَاسِينِ الْقَطَنِيَّةِ. شرائط مزدوجة من الألياف العضلية التي تمدد الفقرات القطنية وتغذيها الأعصاب الشوكية القطنية.
- **musculi interspinalis thoracis**  
(= interspinal muscles of thorax)  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ السَّنَاسِينِ الصَّدْرِيَّةِ. شرائط مزدوجة من الألياف العضلية التي تمدد الفقرات الصدرية وتغذيها الأعصاب الشوكية الصدرية.
- **musculi intertransversarii (= intertransverse muscles)**  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ. عضلات تمتد بين النواتئ المستعرضة للفقرات المتجاورة.
- **musculi intertransversarii anteriores**  
(= musculi intertransversarii thoracis)  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْأَمَامِيَّةِ.
- **musculi intertransversarii anteriores cervicis (= anterior intertransverse muscles of neck)**  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْأَمَامِيَّةِ الرَّقَبِيَّةِ. عضلات صغيرة بين المستعرضات الشوكية الأمامية الرقبية المتجاورة تعمل على ثني العمود الفقري للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- **musculi intertransversarii lateralis**  
(= musculi intertransversarii lateralis lumborum)  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْقَطَنِيَّةِ الْوُخْشِيَّةِ. عضلات صغيرة تعمل على ثني العمود الفقري في المنطقة القطنية للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية القطنية.
- **musculi intertransversarii medialis lumborum**  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الْقَطَنِيَّةِ الْإِنْسِيَّةِ. عضلات صغيرة تعمل على ثني العمود الفقري للجانب في المنطقة القطنية وتغذيها الأعصاب الشوكية القطنية.
- **musculi intertransversarii posteriores cervicis (=posterior intertransverse muscles of neck)**  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الرَّقَبِيَّةِ الْخَلْفِيَّةِ. عضلات صغيرة بين المستعرضات الرقبية وتثني العمود الفقري الرقبى للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- **musculi intertransversarii thoracis**  
الْعَضَلَاتُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِضَاتِ الصَّدْرِيَّةِ. عضلات صغيرة تثني العمود الفقري الصدري للجانب وتغذيها الأعصاب الشوكية الصدرية.
- **m. ischiocavernosus**  
(= ischiocavernous muscle)  
الْعِضْلَةُ الْوُرْكِيَّةُ الْكَهْفِيَّةُ. عضلة تحافظ على انتصاب القضيب ويغذيها العصب العجاني.
- **musculi laryngis**  
الْعَضَلَاتُ الْحَنَجْرَةِ. عضلات الحنجرة الداخلية والخارجية.
- **m. latissimus dorsi**  
الْعِضْلَةُ الْعَرِيضَةُ الظَّهْرِيَّةُ. عضلة واسعة تقرب العضد وتبسطة وتدوره للجهة الإنسية ويغذيها العصب الصدري الظهري.
- **m. levator anguli oris (= levator muscle of angle of mouth)**  
لِزَاوِيَةِ الْفَمِ. عضلة ترفع زاوية الفم ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. levator ani (= levator ani muscle)**  
الْعِضْلَةُ الرَّافِعَةُ لِلشَّرْجِ. اسم يطلق على المكونات العضلية المهمة لحجاب الحوض ويشمل العضلة العانية العصبية (العضلتين الرافعة للبروستاتة والعانية المهبلية) والعضلة العانية المستقيمة والحرقفية العصبية.
- **musculi levatores costarum (= levator muscles of ribs)**  
الْعَضَلَاتُ الرَّافِعَةُ لِلأَضْلَاعِ. مجموعة عضلات (اثنتا عشرة عضلة على كل جانب) ترفع الأضلاع خلال عملية التنفس وتغذيها الأعصاب الوربية.
- **musculi levatores costarum breves**  
(= short levator muscles of ribs)  
الْعَضَلَاتُ الْقَصِيرَةُ الرَّافِعَةُ لِلأَضْلَاعِ. عضلات قصيرة ترفع الأضلاع تنغرز بالجهة الإنسية من زوايا الأضلاع بالقرب من الفقرات التي تتصل بها.

- **musculi levatores costarum longi**  
(= long levator muscles of ribs)  
الْعَضَلَاتُ الطَوِيلَةُ الرَّافِعَةُ لِلْأَضْلَاجِ. العضلات الطويلة السفلية التي يمتد كل منها إلى الضلع أسفل الفقرة التي تتأصل منها العضلة.
- **m. levator glandulae thyroideae**  
(= levator muscle of thyroid gland)  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلْغَدَةِ الدَّرَقِيَّةِ. عضلة لا توجد دائماً وعندما توجد غالباً ما تقع على الجهة اليسرى.
- **m. levator labii superioris** (= levator muscle of upper lip)  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلشَّفَةِ الْعُلْيَا. عضلة يغذيها العصب الوجهي.
- **m. levator labii superioris alaeque nasi** (= levator muscle of upper lips and ala of nose)  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلشَّفَةِ الْعُلْيَا وَجَنَاحِ الْأَنْفِ. عضلة يغذيها الفرع تحت الحجابي من العصب الوجهي.
- **m. levator palpebrae superioris**  
(= levator muscle of upper lid)  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلْجَفَنِ الْعُلَوِيِّ. عضلة يغذيها العصب محرك العين.
- **m. levator prostatae** (= levator muscle of prostate)  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلْبُرُوسَتَاتَةِ. اسم يطلق على القسم الأمامي من العضلة العانية العصبية ويغذيها العصبان العجاني والفرجي وهي عضلة تتحكم في عملية التبول.
- **m. levator scapulae** (= levator muscle of scapula)  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلْكَتِفِ. عضلة ترفع الكتف ويغذيها العصبان الرقبيا الثالث والرابع.
- **m. levator veli palatini**  
الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِشَرَاكِ الْحَنَكِ. عضلة الحنك الرخو وتغذيها الصغيرة البلعومية للمبهم.
- **musculi linguae** (= muscles of tongue)  
عَضَلَاتُ اللِّسَانِ. العضلات الداخلية والخارجية للسان.
- **m. longissimus** (= longissimus muscle)  
الْعَضَلَةُ الطَّوِيلَى. أطول قسم من العضلة الناصبة للفقار وهي تحوي العضلات الطولى الرأسية والطولى العنقية والطولى الصدرية.

- **m. longissimus capitis** (= longissimus muscle of head)  
الْعَضَلَةُ الطَّوِيلَى الرَّأْسِيَّةُ. عضلة تمتد من النواتئ المستعرضة لل فقرات العنقية السفلية حتى الناتئ الخشائي للعظم الصدغي وهي تسحب الرأس للخلف وتدوره وتغذيها فروع من الأعصاب الرقبية.
- **m. longissimus cervicis**  
الْعَضَلَةُ الطَّوِيلَى الرَّقَبِيَّةُ. عضلة تمتد بين الفقرات الصدرية العلوية الأربع والفقرات الرقبية وتقوم ببسط العمود الفقري الرقبى وتغذيها الأعصاب الفقرية الرقبية والصدرية.
- **m. longissimus dorsi** (= m. longissimus thoracis)  
الْعَضَلَةُ الطَّوِيلَى الصَّدْرِيَّةُ.
- **m. longissimus thoracis** (= longissimus muscle of thorax)  
الْعَضَلَةُ الطَّوِيلَى الصَّدْرِيَّةُ. عضلة تمتد من النواتئ المستعرضة لل فقرات القطنية وتنفرز في النواتئ المستعرضة لل فقرات الصدرية والأضلاع العشرة أو التسعة السفلية وهي تبسط العمود الفقري الصدري وتغذيها الأعصاب النخاعية القطنية والصدرية.
- **m. longitudinalis inferior linguae**  
(= inferior longitudinal muscle of tongue)  
الْعَضَلَةُ الطَّوَلَانِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلُّسَانِ. عضلة تغير شكل اللسان أثناء المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.
- **m. longitudinalis superior linguae**  
(= superior longitudinal muscle of tongue)  
الْعَضَلَةُ الطَّوَلَانِيَّةُ الْعُلَوِيَّةُ لِلُّسَانِ. عضلة تغير شكل اللسان أثناء المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.
- **m. longus capitis** (= long muscle of head)  
الْعَضَلَةُ الرَّأْسِيَّةُ الطَّوِيلَةُ. عضلة تتأصل في الفقرات الرقبية (3-6) وتنفرز في القسم القاعدي من العظم القذالي وهي تثني الرأس وتغذيها فروع من الأعصاب النخاعية الرقبية الأولى والثاني والثالث.
- **m. longus coli** (= long muscle of neck)  
الْعَضَلَةُ الرَّقَبِيَّةُ الطَّوِيلَةُ. عضلة تتكون من ثلاثة أقسام: القسم العلوي المائل والقسم السفلي المائل والقسم العمودي وهي تعمل على ثني الرأس وإسناد الفقرات الرقبية وتثبيتها وتغذيها الأعصاب العنقية الأمامية.

- **musculi lumbricales manus**

(= lumbrical muscles of hand) عَضَلَاتُ  
الْيَدِ الْخَرَّاطِيَّةِ. عضلات تثني المفاصل السنعية  
السلامية وتبسط السلاميين الوسطى والقصى  
ويغذيها العصبان الناصف والزندي.

- **musculi lumbricales pedis**

(= lumbrical muscles of foot) عَضَلَاتُ  
الْقَدَمِ الْخَرَّاطِيَّةِ. عضلات تثني السلاميات الدانية  
ويغذيها العصبان الاخمصيان الإنسي والوحشي.

- **m. masseter (= masseter muscle)**

الْعَضَلَةُ الْمَاضِغَةُ. عضلة ترفع الفك السفلي وتغلق  
الفك ويغذيها الفرع الفكي للعصب ثلاثي التوائم.

- **musculi membri inferioris**

عَضَلَاتُ الطَّرَفِ السُّفْلِيِّ. العضلات التي تعمل في الفخذ والساق  
والقدم.

- **musculi membri superioris**

عَضَلَاتُ الطَّرَفِ الْعُلْوِيِّ. العضلات التي تعمل في الذراع  
والساعد واليد.

- **m. mentalis**

الْعَضَلَةُ الذَّقْنِيَّةُ. عضلة تعمل على  
تجميع جلد الذقن ويغذيها العصب الوجهي.

- **musculi multifidi**

الْعَضَلَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ الْفُلُوحِ. عضلات تتأصل من العجز والرباط العجزي الحرقفي  
والنواثئ القطنية والمستعرضة الصدرية والمفصالية  
العنقية وتنفذ في الشوكات الفقرية وهي تبسط  
العمود الفقري وتدوره وتغذيها الفروع الظهرية  
للعصاب الخاعية.

- **m. multipennatus (= multipennate**

muscle) الْعَضَلَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ التَّرِيشِ. عضلة  
تتقارب حزم أليافها على عدة أوتار.

- **m. mylohyoideus (= mylohyoid**

muscle) الْعَضَلَةُ الْفَكِّيَّةُ الْأَمِيَّةُ. عضلة ترفع  
العظم اللامي وتسد قاع الفم ويغذيها الفرع الفكي  
اللامى للعصب ثلاثي التوائم.

- **m. mylopharyngeus**

الْعَضَلَةُ الْفَكِّيَّةُ الْبَلْعُومِيَّةُ. الجزء الفكي البلعومي للعضلة مضيق البلعوم العلوية.

- **m. nasalis (= nasal muscle)**

الْعَضَلَةُ الْأَنْفِيَّةُ. عضلة تتكون من قسمين القسم الجناحي الذي يساعد  
في توسيع المنخر والقسم المستعرض الذي يخسف  
غضروف الأنف ويغذيها العصب الوجهي.

- **m. obliquus auriculae (= oblique**

muscle of auricle) الْعَضَلَةُ الْأُذُنِيَّةُ الْمَائِلَةُ. عضلة تساعد في تغيير شكل وموضع الأذن ويغذيها  
العصبان الأذني الخلفي والصدغي.

- **m. obliquus capitis inferior (= inferior**

oblique muscle of head) الْعَضَلَةُ الرَّأْسِيَّةُ  
الْمَائِلَةُ السُّفْلِيَّةُ. عضلة تدور الرأس والفهق وتغذيها  
الفروع الظهرية للأعصاب الشوكية الرقبية.

- **m. obliquus capitis superior (= superior**

oblique muscle of head) الْعَضَلَةُ  
الرَّأْسِيَّةُ الْمَائِلَةُ الْعُلْوِيَّةُ. عضلة تبسط الرأس  
وتحركه للجهة الوحشية وتغذيها الفروع الظهرية  
للعصاب الشوكية الرقبية.

- **m. obliquus externus abdominis**

(= external oblique muscle of abdomen)  
الْعَضَلَةُ الْبَطْنِيَّةُ الْمَائِلَةُ الظَّاهِرَةُ. عضلة تثني العمود الفقري وتدوره وتضغط الأحشاء  
البطنية ويغذيها العصب الوربي السفلي.

- **m. obliquus inferior bulbi (= inferior**

oblique muscle of eyeball) الْعَضَلَةُ  
الْمَائِلَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَيْنِ. عضلة تدور المقلة إلى الأعلى  
والخارج ويغذيها العصب محرك العين.

- **m. obliquus inferior oculi (= m. oblique**

inferior bulbi) الْعَضَلَةُ الْمَائِلَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَيْنِ.

- **m. obliquus internus abdominis**

(= internal oblique muscle of abdomen)  
الْعَضَلَةُ الْبَطْنِيَّةُ الْمَائِلَةُ الْبَاطِنَةُ. عضلة تثني العمود الفقري وتدوره وتضغط على  
الأحشاء البطنية ويغذيها العصب الوربي السفلي.

- **m. obliquus superior bulbi (= superior**

oblique muscle of eyeball) الْعَضَلَةُ  
الْمَائِلَةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَيْنِ. عضلة تدور العين للأسفل وللخارج  
ويغذيها العصب البكري.

- **m. obliquus superior oculi (= m.**

oblique superior bulbi) الْعَضَلَةُ  
الْمَائِلَةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَيْنِ.

- **m. obturatorius externus (= external**

obturator muscle) الْعَضَلَةُ الْمُسَدَّةُ الظَّاهِرَةُ. عضلة تدور الفخذ للجهة الخارجية ويغذيها العصب  
المسد.

- **m. obturatorius internus (= internal obturator muscle)** **الْعَضَلَةُ الْمُسَدَّةُ الْبَاطِنَةُ.** عضلة تدور الفخذ للجهة الخارجية وتغذيها الأعصاب العجزية الأولى والثانية والثالثة.
- **m. occipitalis (= venter occipitalis musculi occipitofrontalis)** **الْعَضَلَةُ الْقَذَالِيَّةُ.** البطن القذالي للعضلة القذالية الجبهية.
- **m. occipitofrontalis (= occipitofrontal muscle)** **الْعَضَلَةُ الْقَذَالِيَّةُ الْجَبْهِيَّةُ.** عضلة لها بطنان، البطن الجبهي يرفع الحاجب ويغذي الفرع الصدغي للعصب الوجهي والبطن القذالي يسحب فروة الرأس للخلف ويغذي الفرع الأذني الخلفي للعصب الوجهي.
- **musculi oculi (= musculi bulbi)** **عَضَلَاتُ الْمُقَلَّةِ.**
- **m. omohyoideus (= omohyoid muscle)** **الْعَضَلَةُ الْكَتِفِيَّةُ الْأَمْيَةُ.** عضلة تتكون من بطنين (العلوي والسفلي) يربطهما وتر وسطي بينهما يرتبط بالترقوة بامتداد ليفي وهي عضلة تخسف العظم اللامي ويغذيها العصب الرقبي العلوي خلال العروة الرقبية.
- **m. opponens digitis minimi (= opposing muscle of little finger)** **الْعَضَلَةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْخَنْصَرِ.** عضلة تدور وتبعد العظم السنعي الخامس ويغذيها العصب الرقبي الثامن خلال العصب الزندي.
- **m. opponens digiti quinti manus (= m. opponens digiti minimi)** **الْعَضَلَةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْخَنْصَرِ.**
- **m. opponens pollicis (= opposing muscle of thumb)** **الْعَضَلَةُ الْمُقَابِلَةُ لِإِبْهَامِ** اليَدِ. عضلة تثني وتقابل إبهام اليد ويغذيها العصبان الرقبانيان السادس والسابع خلال العصب الناصف.
- **m. orbicularis (= orbicular muscle)** **عَضَلَةُ دَوَائِرِيَّةُ.** عضلة تحيط بفتحة كالفم أو العين.
- **m. orbicularis oculi (= orbicular muscle of eye)** **عَضَلَةُ الْعَيْنِ الدَوَائِرِيَّةُ.** عضلة لها ثلاثة أقسام الحجاجي والجفني والدمعي وهي عضلة تغلق الأجفان وتجعد الجبهة وتضغط الكيس الدمعي ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. orbicularis oris (= orbicularis muscle of mouth)** **عَضَلَةُ الْفَمِ الدَوَائِرِيَّةُ.** عضلة تغلق الشفتين وتبرزهما ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. orbitalis (= orbital muscle)** **الْعَضَلَةُ الْحَاجَاجِيَّةُ.** عضلة تبرز العين للامام وتغذيها ألياف عصبية ودية.
- **musculi ossiculorum auditus (= muscles of auditory ossicles)** **عَضَلَاتُ الْعُظْمَاتِ السَّمْعِيَّةِ.** العضلتان الموترة للطبل والركابية.
- **musculi ossis hyoides (= muscles of hyoid bone)** **عَضَلَاتُ الْعَظْمِ اللَّامِي.** وهي العضلات فوق اللامي وتحت اللامي.
- **musculi palati (= palatine muscles)** **الْعَضَلَاتُ الْحَنَكِيَّةُ.** العضلات الداخلية والخارجية التي تحرك الحفاف (شراع الحنك).
- **musculi palati et faucium (= muscle of palate and fauces)** **عَضَلَاتُ الْحَنَكِ وَالْحَلَقِ.** العضلات الداخلية والخارجية التي تحرك الحفاف (شراع الحنك) وجدار البلعوم المجاور له.
- **m. palatoglossus (= palatoglossus muscles)** **الْعَضَلَةُ الْحَنَكِيَّةُ اللَّسَانِيَّةُ.** عضلة ترفع اللسان وتضيق الحلق وتغذيها الصغيرة البلعومية للعصب المبهم.
- **m. palatopharyngeus (= palatopharyngeal muscle)** **الْعَضَلَةُ الْحَنَكِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ.** عضلة تساعد في عملية البلع وتغذيها الصغيرة البلعومية للعصب المبهم.
- **m. palmaris brevis (= short palmar muscle)** **الْعَضَلَةُ الرَّاحِيَّةُ الْقَصِيرَةُ.** عضلة توتر راحة اليد ويغذيها العصب الرثوي.
- **m. palmaris longus (= long palmar muscle)** **الْعَضَلَةُ الرَّاحِيَّةُ الطَوِيلَةُ.** عضلة تثني مفصل المعصم ويغذيها العصب الناصف.
- **muscle papillares (= papillary muscles)** **الْعَضَلَاتُ الْحَلِيمِيَّةُ.** بروزات عضلية مخروطية الشكل تبرز من السطح الداخلي البطيني للقلب.
- **musculi pectinati (= pectinate muscles)** **الْعَضَلَاتُ الْمِشْطِيَّةُ.** حروف من ألياف عضلية تبرز من السطح الداخلي لاذيني القلب.

- **m. pectineus (= pectineal muscle)** العَضَلَةُ العَاقِنِيَّةُ. عضلة تثني وتقرب الفخذ ويغذيها العصبان المسد والفخذي.
- **m. pectoralis major (=greater pectoral muscle)** العَضَلَةُ الصَّدْرِيَّةُ الكَبِيرَةُ. العضلة الكبيرة التي تثني الذراع وتقربه وتدوره للجهة الإنسية ويغذيها العصب الصدري الامامي.
- **m. pectoralis minor (= smaller pectoral muscle)** العَضَلَةُ الصَّدْرِيَّةُ الصَّغِيرَةُ. عضلة تسحب المنكب إلى الامام والاسفل ويغذيها العصب الصدري الامامي.
- **musculi perineales (= musculi perinei)** العَضَلَاتُ العِجَانِيَّةُ.
- **musculi perinei** العَضَلَاتُ العِجَانِيَّةُ. العضلات التي تشارك في تكوين العجان
- **m. peroneus brevis (= short peroneal muscle)** العَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ القَصِيرَةُ. عضلة تقرب القدم وتثنيه نحو الاخمص ويغذيها العصب الشظوي السطحي.
- **m. peroneus longus, (= long peroneal muscle)** العَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الطَوِيلَةُ. عضلة تبعد وتقلب القدم وتثنيه نحو الاخمص ويغذيها العصب الشظوي السطحي.
- **m. peroneus tertius** العَضَلَةُ الشَّظْوِيَّةُ الثَّالِثَةُ. عضلة تقلب القدم وتثنيه نحو ظهره يغذيها العصب الشظوي العميق.
- **m. pharyngopalatinus (= m. palatopharyngeus)** العضلة الحنكية البلعومية.
- **m. piriformis (= piriform muscle)** العَضَلَةُ الكُفْرِيَّةُ. عضلة تدور الفخذ للخارج ويغذيها العصبان العجزيان الاول والثاني.
- **m. plantaris (= planter muscle)** العَضَلَةُ الْأَخْمَصِيَّةُ. عضلة تثني القدم نحو الاخمص ويغذيها العصب الظنبوبي
- **m. pleuroes ophageus (= pleuroesophageal muscle)** العَضَلَةُ الجَنْبَوِيَّةُ المَرِيثِيَّةُ. حزمة من الالياف العضلية الملساء تربط المريء بالجنبه المنصفية اليسرى.
- **m. popliteus (= popliteal muscle)** العَضَلَةُ
- المَأْبُضِيَّةُ. عضلة تثني الساق وتدوره نحو الحزمة الإنسية وتغذيها الاعصاب القطنية الرابع والخامس والعجزي الاول.
- **m. procerus (= procerus muscle)** العَضَلَةُ النَّاشِلَةُ. عضلة تسحب الحاجب للأسفل ويغذيها العصب الوجهي.
- **m. pronator quadratus** العَضَلَةُ الكَائِبَةُ المُرْبِيعَةُ. عضلة تكب اليد ويغذيها العصب بين العظمين الامامي.
- **m. pronator teres** العَضَلَةُ الكَائِبَةُ المَدْوَرَةُ. عضلة لها رأسان وهي تكب اليد ويغذيها العصب الناصف.
- **m. prostaticus (= substantia muscularis prostatae)** العَضَلَةُ المَادَّةُ العَضَلِيَّةُ لِلْبُرُوسَتَاتَةِ. العضلة البروستاتية.
- **m. psoas major (= greater psoas muscle)** العَضَلَةُ القَطَنِيَّةُ الكبيرة. عضلة تثني الجذع وتثني الفخذ وتدوره للجهة الإنسية ويغذيها العصبان القطنيان الثاني والثالث.
- **m. psoas minor (= smaller psoas muscle)** العَضَلَةُ القَطَنِيَّةُ الصَّغِيرَةُ. عضلة تثني الجذع على الحوض ويغذيها العصب القطني الاول.
- **m. pterygoideus externus (=m. pterygoideus lateralis)** العَضَلَةُ الجَنَاجِيَّةُ الوُخْشِيَّةُ
- **m. pterygoideus internus (= m. pterygoideus medialis)** العَضَلَةُ الجَنَاجِيَّةُ الإنْسِيَّةُ.
- **m. pterygoideus lateralis** العَضَلَةُ الجَنَاجِيَّةُ الوُخْشِيَّةُ. عضلة لها رأسين علوي وسفلي وهي تبرز الفك السفلي وتفتح الفكين وتحرك الفك السفلي إلى الجهتين ويغذيها القسم الفكي السفلي من العصب ثلاثي التوائم.
- **m. pterygoideus medialis (=medial pterygoid muscle)** العَضَلَةُ الجَنَاجِيَّةُ الإنْسِيَّةُ. عضلة تغلق الفكين ويغذيها القسم الفكي السفلي من العصب ثلاثي التوائم.
- **m. pterygopharyngeus (= paris pterygopharyngea)** العَضَلَةُ الجَنَاجِيَّةُ

البُلْعُومِيَّة. الجزء الجناحي البلعومي لعضلة البلعوم العلوية.

- m. pubococcygeus (= pubococcygeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَانِيَّةُ الْعُضْعُصِيَّةُ.** اسم يطلق على القسم الامامي من العضلة الرافعة للشرج وهي تساعد في إسناد أحشاء الحوض وتقاوم ارتفاعات الضغط داخل البطن وتغذيها الاعصاب العجزية الثالث والرابع.
- m. puboprostaticus (= puboprostatic muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَانِيَّةُ الْبُرُوسْتَاتِيَّةُ.** الياف عضلية ملساء توجد ضمن الرباط العاني البروستاتي الإنسي وتمر من البروستاتة إلى الامام نحو العانة.
- m. puborectalis (= puborectal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَانِيَّةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ.** اسم يطلق على جزء من العضلة رافعة الشرج وهي عضلة تساعد في إسناد أحشاء الحوض وتقاوم ارتفاع الضغط داخل البطن ويغذيها العصبان العجزيان الثالث والرابع.
- m. pubovaginalis (= pubovaginal muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَانِيَّةُ الْمَهْلِيَّةُ.** اسم يطلق على القسم الامامي من العضلة العانية العصصية وهي عضلة تساهم في التحكم بعملية التبول ويغذيها العصبان العجزوي والفرجي.
- m. pubovesicalis (= pubovesical muscle) **الْعَضَلَةُ الْعَانِيَّةُ الْمَثَانِيَّةُ.** اسم يطلق على الياف عضلية ملساء تمتد من عنق المثانة حتى العانة.
- m. pyramidalis (= pyramidal muscle) **الْعَضَلَةُ الْهَرَمِيَّةُ.** عضلة توتر جدار البطن ويغذيها العصب الصدري الأخير.
- m. pyramidalis auriculae (= pyramidal muscle of auricle) **الْعَضَلَةُ الْهَرَمِيَّةُ الْأَذْنِيَّةُ.** استطالة الالياف من الغفيرة حتى شوكة الحثار.
- m. quadratus femoris (= quadrate muscle of thigh) **الْعَضَلَةُ الْمُرَبَّعَةُ الْفَخْذِيَّةُ.** عضلة تقرب الفخذ وتدوره للجهة الوحشية ويغذيها العصبان القطني الاخير والعجزوي الاول.
- m. quadratus labii inferioris (= m. depressor labii inferioris) **الْعَضَلَةُ الْخَافِضَةُ لِلشَّفَةِ السُّفْلَى.**

- m. quadratus labii superioris (= m. levator labii superioris) **الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِلشَّفَةِ الْعُلْيَا.**
- m. quadratus lumborum **الْعَضَلَةُ الْمُرَبَّعَةُ الْقَطْنِيَّةُ.** عضلة تثني العمود الفقري القطني جانبياً وتغذيها الاعصاب القطنية الاول والثاني والصدري الاخير.
- m. quadratus plantae (= quadratus muscle of sole) **الْعَضَلَةُ الْمُرَبَّعَةُ لِلْأَحْمَصِ.** عضلة تساعد في ثني اصابع القدم ويغذيها العصب الاخمصي الوحشي.
- m. quadriceps femoris (= quadriceps muscle of thigh) **الْعَضَلَةُ الرَّبَاعِيَّةُ الرَّؤُوسُ الْفَخْذِيَّةُ.** اسم يطلق على مجموعة العضلات المستقيمة الفخذية والمتسعة المتوسطة والمتسعة الوحشية والمتسعة الإنسية وكلها تعمل على بسط الساق على الفخذ.
- m. rectococcygeus (= rectococcygeal muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْعُضْعُصِيَّةُ.** الياف عضلية ملساء تتأصل من السطح الامامي للفقرتين العصصيتين الثانية والثالثة وتنغرز في السطح الخلفي للمستقيم وتعمل على سحبه ورفعها وتغذيها اعصاب مستقلة.
- m. rectourethralis (= rectourethral muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْإِحْلِيَّةُ.** شريط من الياف عضلية ملساء تمتد من الانثناء العجاني للمستقيم إلى الإحليل الغشائي في الذكور.
- m. rectouterinus (= rectouterine muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الرَّجْمِيَّةُ.** شريط من الياف عضلية ملساء تمتد بين عنق الرحم والمستقيم في الثنية المستقيمة الرحمية.
- m. rectovesicalis (= rectovesical muscle) **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْمَثَانِيَّةُ.** شريط من الياف عضلية ملساء تربط العضلات الطولانية للمستقيم مع الطبقة العضلية الظاهرة للمثانة.
- m. rectus abdominis **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ الْبَطْنِيَّةُ.** عضلة تسند جدار البطن وتثني العمود الفقري القطني وتغذيها فروع من الاعصاب الصدرية

- **m. rectus capitis anterior** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**  
الأمامية للرأس. عضلة تثني الرأس وتسندة ويغذيها  
العصبان الرقبيا الأول والثاني.
- **m. rectus capitis lateralis** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**  
الوَحْشِيَّةُ للرأس. عضلة تثني الرأس وتسندة ويغذيها  
العصبان الرقبيا الأول والثاني.
- **m. rectus capitis posterior major**  
**الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** الخَلْفِيَّةُ الكبيرة للرأس. عضلة  
تمدد الرأس ويغذيها العصبان القذالي الكبير وتحت  
القذالي
- **m. rectus capitis posterior minor**  
**الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** الخَلْفِيَّةُ الصَّغِيرَةُ للرأس. عضلة  
تمدد الرأس ويغذيها العصبان القذالي الكبير وتحت  
القذالي
- **m. rectus femoris** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** الْفَخْذِيَّةُ.  
عضلة تمدد الساق وتثني الفخذ ويغذيها العصب  
الفخذي
- **rectus inferior bulbi** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**  
السُّفْلِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة العين المستقيمة السفلية التي  
تدور مقلة العين للأسفل وللجهة الإنسية ويغذيها  
العصب المحرك للعين.
- **m. rectus inferior oculi (= m. rectus**  
**inferior bulbi)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** السُّفْلِيَّةُ  
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rectus lateralis bulbi** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**  
الوَحْشِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة تبعد مقلة العين ويغذيها  
العصب المبعد.
- **m. rectus lateralis oculi (= m. rectus**  
**lateralis oculi)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** الْوَحْشِيَّةُ  
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rectus medialis bulbi** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ**  
الْإِنْسِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة تقرب مقلة العين ويغذيها  
العصب المحرك للعين.
- **m. rectus medialis oculi (= m. rectus**  
**medialis bulbi)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** الْإِنْسِيَّةُ  
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rectus superior bulbi** **الْعَضَلَةُ**  
الْمُسْتَقِيمَةُ الْغُلْوِيَّةُ الْمُقْلِيَّةُ. عضلة تقرب مقلة العين  
وتدورها إلى الأعلى وإلى الجهة الإنسية ويغذيها  
العصب المحرك للعين.
- **m. rectus superior oculi (= m. rectus**  
**superior bulbi)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ** الْغُلْوِيَّةُ  
الْمُقْلِيَّةُ.
- **m. rhomboideus major (= greater**  
**rhomboideus muscle)** **الْعَضَلَةُ الْمَعْيِنَةُ** الْكَبِيرَةُ.  
عضلة تبعد عظم الكتف وترفعه ويغذيها العصب الكتفي  
الظهري.
- **m. rhomboideus minor (= lesser**  
**rhomboideus muscle)** **الْعَضَلَةُ الْمَعْيِنَةُ** الصَّغِيرُ.  
عضلة تقرب عظم الكتف وترفعه ويغذيها العصب  
الكتفي الظهري.
- **m. risorius (= risorius muscle)** **الْعَضَلَةُ**  
الضُّحِكِيَّةُ. عضلة تسحب زاوية الفم للجهة الوحشية  
ويغذيها الفرع الشدقي للعصب الوجهي.
- **musculi rotatores breves (= short**  
**rotator muscles)** **الْعَضَلَاتُ الْمُدِيرَةُ**  
الصَّغِيرَةُ. اسم يطلق على العضلات المديرة التي  
تنفرز في صفاحة الفقرة فوق الفقرة التي تتأصل  
منها.
- **musculi rotatores cervicis (= rotator**  
**muscles of neck)** **الْعَضَلَاتُ الْمُدِيرَةُ** الرَقَبِيَّةُ.  
عضلات تمدد العمود الفقري الرقبوي وتديره للجهة  
المعاكسة وتغذية الاعصاب النخاعية الرقبية  
rotat or
- **musculi rotatores longi (= long**  
**muscles)** **الْعَضَلَاتُ الْمُدِيرَةُ** الطَوِيلَةُ. العضلات  
التي تعبر فقرتين أو ثلاث لتنفرس في شوكة الفقرة  
الفوقية.
- **musculi rotatores lumborum** **الْعَضَلَاتُ**  
الْمُدِيرَةُ الْقَطْنِيَّةُ. عضلات تمدد العمود الفقري القطني  
وتديره للجهة المعاكسة وتغذيها الاعصاب النخاعية  
القطنية.
- **musculi rotatores thoracis** **الْعَضَلَاتُ**  
الْمُدِيرَةُ الصَّدْرِيَّةُ. عضلات تمدد العمود الفقري  
الصدري وتديره للجهة المعاكسة وتغذيها الاعصاب  
الشوكية الصدرية.
- **m. sacrococcygeus dorsalis (= dorsal**  
**sacrocooccygeal muscle)** **الْعَضَلَةُ الْعَجْزِيَّةُ**  
الْعَصْعَصِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ. شريط عضلي يمتد من الناحية  
الظهرية للعجز إلى العصعص.



- m. sacrococcygeus ventralis (= ventral sacrococcygeal muscle) **العضلة العجزية**  
العضلة العجزية السفلية. شريط عضلي وتري يمتد من  
الفتحة العجزية السفلية إلى العنق.
- m. sacrospinalis (= m. erector spinae) **العضلة العجزية الفقارية**.
- m. salpingopharyngeus (= salpingopharyngeal muscle) **العضلة البلعومية**  
العضلة البلعومية. عضلة ترفع البلعوم الأنفي (الخيضوم)  
وتغذيها الضفيرة البلعومية للعصب المبهم.
- m. sartorius (= sartorius muscle) **العضلة الخياطية**  
عضلة تشي الفخذ والساق ويغذيها العصب  
الفخذي.
- m. scalenus anterior (= anterior scalene muscle) **العضلة الأمامية**  
عضلة ترفع الضلع الأول وتغذيها الأعصاب الرقبية (7-2).
- m. scalenus medius (= middle scalene muscle) **العضلة الأمامية الوسطى**  
عضلة ترفع الضلع الأول وتغذيها الأعصاب الرقبية (7-2).
- m. scalenus minimus (= smallest scalene muscle) **العضلة الأمامية الصغرى**  
شريط عضلي يوجد أحياناً بين العضلتين الأماميتين  
الأمامية والوسطى.
- m. scalenus posterior (= posterior scalene muscle) **العضلة الخلفية**  
عضلة ترفع الضلع الأول والثاني وتغذيها الأعصاب  
الرقبية (7-2).
- m. semimembranosus (= semimermb-  
ranous muscle) **العضلة الغشائية النصف**  
عضلة تشي الساق وتمتد الفخذ ويغذيها العصب  
الظنبوبي.
- m. semispinalis **العضلة الشوكية النصفية**  
عضلة تتكون من ألياف تمتد بصورة مائلة من  
النواة المستعرضة للفتحات لشوكاتها ما عدا  
العضلة الشوكية النصف الراسية.
- m. semispinalis capitis **العضلة الشوكية**  
العضلة الراسية. عضلة تمتد الرأس ويغذيها
- العصبان القذالي الكبير وتحت القذالي وفروع من  
الأعصاب الرقبية.
- x- m. semispinalis cervicis **العضلة الشوكية**  
العضلة الرقبية. عضلة تمتد العمود الفقري الرقبى  
وتدوره وتغذيها فروع من الأعصاب الرقبية.
- m. semispinalis dorsi (= m. semispi-  
nalis thoracis) **العضلة الشوكية النصفية**  
العضلة الصدرية. عضلة تمتد العمود الفقري الصدري  
وتدوره وتغذيها الأعصاب الشوكية الصدرية.
- m. semitendinosus (= semitendinous  
muscle) **العضلة الوترية النصف**  
عضلة تشي الساق وتمتد الفخذ ويغذيها العصب الظنبوبي.
- m. serratus, anterior **العضلة المنشارية**  
العضلة المنشارية. عضلة تسحب عظم الكتف إلى الأمام  
وتدوره عند رفع الكتف في حالة إبعاد الذراع ويغذيها  
العصب الصدري الطويل.
- m. serratus posterior inferior **العضلة**  
المنشارية الخلفية السفلية. عضلة تخفف الأضلاع  
عند الزفير وتغذيها الأعصاب الصدرية (9-12).
- m. serratus posterior superior **العضلة**  
المنشارية الخلفية العلوية. عضلات ترفع الأضلاع  
عند الشهيق وتغذيها الأعصاب الوربية العلوية الأربعة.
- musculi skeleti (= skeletal muscles) **العضلات الهيكلية**  
انظر (muscle).
- m. soleus (= soleus muscle) **العضلة**  
التغلفية. العضلة التي تشي مفصل الكاحل نحو  
الأخمص ويغذيها العصب الظنبوبي.
- m. sphincter (= sphincter, muscle) **عضلة**  
مصرة. عضلة حلزونية الشكل تغلق إحدى الفتحات  
الطبيعية.
- m. sphincter ani externus (=external  
sphincter of anus) **العضلة مصرة الشرج**  
الظاهرة. عضلة تغلق الشرج ويغذيها العصبان  
الشرجي السفلي والعجز الرابع.
- m. sphincter ani internus (=internal  
sphincter of anus) **العضلة مصرة**  
الشرج الباطنة.

- العَضَلَةُ m. sphincter ductus choledochi** مَصْرُةُ الْقَنَاةِ الصَّفْرَاوِيَّةِ. غلالة عضلية حلقية تحيط بالقناة الصفراوية ضمن جدار الإثناعشري.
- m. sphincter pupillae (= sphincter muscle of pupil)** العَضَلَةُ مَصْرُةُ الْحَدَقَةِ. عضلة تعمل على تضيق الحدقة ويغذيها العصب محرك العين بأعصاب لا ودية.
- m. sphincter pyloric (= pyloric sphincter muscle)** العَضَلَةُ مَصْرُةُ الْبَوَابِ. عضلة ذات الألياف عضلية حلقية حول ممرها إلى الإثناعشري وتغذيها أعصاب مستقلة.
- m. sphincter urethrae (= sphincter muscle of urethra)** العَضَلَةُ مَصْرُةُ الْإِخْلِيلِ. عضلة تضغط على الإحليل الغشائي ويغذيها العصب العجاني.
- m. sphincter vesicae urinae (= sphincter muscle of urinary bladder)** العَضَلَةُ مَصْرُةُ الْمَثَانَةِ. عضلة تعمل على غلق الفتحة الداخلية للإحليل وتغذيها الأعصاب المثانية.
- m. spinalis** العَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ. القسم الإنسي من العضلة الناصبة للفقار وتشمل العضلات الشوكية الراسية والرقبية والصدرية.
- m. spinalis capitis** العَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ الرَّأْسِيَّةُ. عضلة تنصب الرأس وتمده وتغذيها الأعصاب الشوكية الرقبية.
- m. spinalis cervicis** العَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ الرَّقْبِيَّةُ. عضلة تمدد العمود الفقري والرقبة وتغذيها فروع من الأعصاب الشوكية الرقبية.
- m. spinalis thoracis** العَضَلَةُ الشُّوكِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ. عضلة تنصب العمود الفقري في المنطقة الصدرية وتغذيها فروع من الأعصاب الشوكية الصدرية.
- m. splenius capitis** العَضَلَةُ الطاحلة الرَّأْسِيَّةُ. عضلة تعدد الرأس وتدوره ويغذيها العصبان الرقبيان الأوسط والسفلي وتتأصل من القسم السفلي للرباط العنقي ونواتي الفقرات الرقبية السابعة والصدرية العلوية الثلاث وتغرز في الناتئ الخشائي والعظم القذالي.
- m. splenius cervicis** العَضَلَةُ الطاحلة الرَّقْبِيَّةُ. عضلة تدور الرأس والرقبة وتغذيها الفروع الخلفية للعصب الرقبى السفلي وتتأصل من نواتي الفقرات الصدرية الثالثة حتى السادسة وتغرز في الناتئ الثالث.
- m. stapedius (= stapedius muscle)** العَضَلَةُ الرَّكَابِيَّةُ. عضلة تكبت حركة العظم الركابي ويغذيها الفرع الركابي من العصب الوجهي.
- m. sternalis (= sternal muscle)** العَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ. شريط عضلي يشاهد أحياناً موازياً لعظم القص على الأصل القصي الضلعي للعضلة الصدرية الكبيرة.
- m. sternocleidomastoideus (= sternocleidomastoid muscle)** العَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ. عضلة تنثني العمود الفقري الرقبى وتدور الرأس ويغذيها العصب الإضافي والصفيرة العنقية.
- m. sternohyoideus (= sternohyoid muscle)** العَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ اللَّامِيَّةُ. عضلة تهبط العظم اللامي والحنجرة ويغذيها العصب الرقبى العلوي.
- m. sternothyroideus (= sternothyroid muscle)** العَضَلَةُ الْقَصِيَّةُ الدَّرَقِيَّةُ. عضلة تهبط الغضروف الدرقي ويغذيها العصب العنقي العلوي.
- m. styloglossus (= styloglossus muscle)** العَضَلَةُ الْإِبْرِيَّةُ اللِّسَانِيَّةُ. عضلة ترفع اللسان وتسحبها ويغذيها العصب تحت اللساني.
- m. stylohyoideus (= stylohyoid muscle)** العَضَلَةُ الْإِبْرِيَّةُ اللَّامِيَّةُ. عضلة تسحب العظم اللامي واللسان للأعلى ويغذيها العصب الوجهي.
- m. stylopharyngeus (= stylopharyngeal muscle)** الْإِبْرِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّةُ. عضلة ترفع البلعوم وتوسعه ويغذيها العصب اللساني البلعومي والصفيرة البلعومية.
- m. subclavius (= subclavius muscle)** العَضَلَةُ تَحْتَ التَّرْقُوزَةِ. عضلة تخسف النهاية الوحشية للترقوة ويغذيها العصبان الرقبيان الخامس والسادس.

- **musculi subcostales (= subcostal muscles)** العضلات تحت الضلعية. عضلات ترفع الأضلاع عند الشهيق وتغذيها الأعصاب الوربية
- **musculi suboccipitales (= suboccipital muscles)** العضلات تحت القذالية. مجموع العضلات التي تقع تحت العظم القذالي وتشمل العضلتين المستقيمتين الخلفيتين الكبيرة والصغيرة والعضلتين المائلتين الراسيتين العلوية والسفلية والعضلتين المستقيمتين الراسيتين الأمامية والوحشية والعضلة الطاحلة الراسية والعضلة الراسية الطويلة.
- **m. subscapularis (= subscapular muscle)** العضلة تحت الكتفية. عضلة تدير العضد للجهة الإنسية ويغذيها العصب تحت الكتفي.
- **m. supinator (= supinator muscle)** العضلة الباسطة. عضلة تبسط اليد ويغذيها العصب الكعبري العميق.
- **musculi suprahyoidei (= suprahyoid muscles)** العضلات فوق اللامي. مجموع العضلات التي توصل العظم اللامي بالجمجمة وتشمل العضلات ذات البطنين والإبرية اللامية والفكية اللامية والذقنية اللامية.
- **m. supraspinatus (= supraspinous muscle)** العضلة فوق الشوكة. عضلة تبعد العضد ويغذيها العصب فوق الكتف.
- **m. suspensorius duodeni (= suspensory muscle of duodenum)** العضلة المعلقة للإثنا عشر. شريط مسطح من الألياف العضلية الملساء التي تتأصل في الحجاب الحاجز والمتواصلة مع الغلاف العضلي للإثنا عشر عند اتصاله بالصائم.
- **m. tarsalis inferior (= inferior tarsal muscle)** العضلة الجفنية السفلية. عضلة توسع الشق الجفني وتغذيها أعصاب ودية.
- **m. tarsalis superior (= superior tarsal muscle)** العضلة الجفنية العلوية. عضلة توسع الشق الجفني وتغذيها أعصاب ودية.
- **m. temporalis (= temporal muscle)** العضلة الصدغية. عضلة تعمل على غلق الفكين

- ويغذيها القسم الفكي السفلي للعصب ثلاثي التوائم.
- **m. temporoparietalis (= temporoparietal muscle)** العضلة الصدغية الجدارية. عضلة توتر فروة الرأس وتغذيها الفروع الصدغية للعصب الوجهي.
- **m. tensor fasciae latae (= tensor muscle of fasciae lata)** العضلة المؤثرة للثأفة. عضلة تثني الفخذ وتديره للجهة الإنسية ويغذيها العصب الألوي العلوي.
- **m. tensor veli palatini** العضلة المؤثرة لشراع الحنك. عضلة توتر شراع الحنك (الحفاف) وتفتح الأنبوب السمعي ويغذيها الفرع الفكي السفلي من العصب ثلاثي التوائم.
- **m. teres major (= teres major muscle)** العضلة المدورة الكبيرة. عضلة تقرب وتبسط وتدير الذراع نحو الجهة الإنسية ويغذيها العصب تحت الكتف.
- **m. teres minor (= teres minor muscle)** العضلة المدورة الصغيرة. عضلة تدير الذراع للجهة الوحشية ويغذيها العصب الإبطي.
- **musculi thoracis (= muscles of thorax)** عضلات الصدر.
- **m. thyreopharyngeus (= pars thyreopharyngea constrictor pharyngis inferioris)** العضلة الدرقية البلعومية. القسم الدرقي البلعومي للعضلة مضيق البلعوم السفلية.
- **m. thyroarytenoideus (= thyroarytenoid muscle)** العضلة الدرقية الطرجهالية. عضلة ترخي وتقصر الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. thyroepiglotticus (= thyroepiglottic muscle)** العضلة الدرقية اللسان مزمارية. عضلة تخلق مدخل الحنجرة ويغذيها العصب الحنجري الراجع.
- **m. thyrohyoideus (= thyrohyoid muscle)** العضلة الدرقية اللامية. عضلة ترفع الحنجرة وتغير شكلها ويغذيها العصب الرقي العلوي.
- **m. tibialis anterior (= anterior tibial muscle)** العضلة الظنبوبية الأمامية. عضلة تثني

- القدم نحو ظهرها وتقلبها ويغذيها العصب الشظوي العميق.
- **m. tibialis posterior (= posterior tibial muscle)** **الْعَضَلَةُ الظَّنْبُوبِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ.** عضلة تثني القدم نحو الأخمص وتقلبها ويغذيها العصب الظنبوبي الخلفي.
- **m. trachealis (= tracheal muscle)** **الْعَضَلَةُ الرُّغَامِيَّةُ.** عضلة تضيق الرغامى وتقلل من قطرها وتغذيها أعصاب ذاتية.
- **m. tragicus (= muscle of tragus)** **عَضَلَةُ الرَّغْمَةِ.** شريط عضلي مسطح عمودي قصير على السطح الوحشي للرغمة يغذيها العصبان الأذني الصدغي والأذني الخلفي.
- **m. transversospinalis** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الشُّوكِيَّةُ.** مصطلح عام يشمل العضلات الشوكية النصفية والمتعددة الريش والمديرات.
- **m. transversus abdominis (= transverse muscle of abdomen)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْبَطْنِيَّةُ.** عضلة تضغط الأحشاء البطنية وتغذيها الأعصاب الوربية السفلى والحرقي المعدي والحرقي الأربي.
- **m. transversus auriculae (= transverse muscle of auricle)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْأُذُنِيَّةُ.** عضلة تسحب حنار الأذن ويغذيها العصبان الأذني الكبير والأذني الخلفي.
- **m. transversus linguae (= transverse muscle of tongue)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ اللِّسَانِيَّةُ.** عضلة تغير شكل اللسان عند المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.
- **m. transversus menti (= transverse muscle of chin)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الدَّقْنِيَّةُ.** ألياف عضلية سطحية للعضلة الخافضة لزاوية الفم التي تدور من جهتها وتعتبر للجهة المعاكسة.
- **m. transversus nuchae (= transverse muscle of nape)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْقَفَوِيَّةُ.** عضلة صغيرة توجد غالباً وهي تعبر من الناسرة القذالية إلى العضلة الأذنية الخلفية ويمكن أن تكون سطحية أو تحت العضلة شبه المنحرفة.
- **m. transversus perinei profundus (= deep transverse muscle of perineum)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الْعِجَانِيَّةُ الْغَمِيَّةُ.** عضلة تسحب النقطة المركزية للعجان نحو الخلف ويغذيها العصب الفرجي.
- **m. transversus thoracis (= transverse muscle of thorax)** **الْعَضَلَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ الصَّدْرِيَّةُ.** عضلة تضيق الصدر ويغذيها العصب الوربي.
- **m. trapezius (= trapezius muscle)** **الْعَضَلَةُ شِبْهُ الْمُنْحَرَفَةِ.** عضلة تدبر الكتف ليرفع المئب عند تبعيد الذراع ويغذيها العصب الإضافي والصفيرة الرقبية.
- **m. triangularis (= triangular muscle)** **عَضَلَةُ مُثَلَّثَةٌ.** عضلة مثلثة الشكل.
- **m. triceps brachii (= triceps muscle of arm)** **الْعَضَلَةُ الثَّلَاثِيَّةُ الرَّوْؤُوسِ الْعَضْدِيَّةُ.** عضلة تبسط الساعد وتقرب الذراع وتمده ويغذيها العصب الكعبري.
- **m. triceps surae** **الْعَضَلَةُ الثَّلَاثِيَّةُ الرَّوْؤُوسِ الْوَيْلِيَّةُ.** عضلة الساق والعضلة النعلية معاً.
- **m. unipennatus (= unipennate muscle)** **الْعَضَلَةُ أَحَادِيَّةُ الرِّيشَةِ.** عضلة تقرب حزم اليافها نحو وتر المغرز من جهة واحدة فقط.
- **m. uvulae (= muscle of uvula)** **عَضَلَةُ اللَّهَاءِ.** عضلة ترفع اللهاة وتغذيها الصفيرة البلعومية للعصب المبهم.
- **m. vastus intermedius** **الْعَضَلَةُ الْمُتَسِّعَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ.** عضلة تبسط الساق ويغذيها العصب الفخذي.
- **m. vastus lateralis** **الْعَضَلَةُ الْمُتَسِّعَةُ الْوُحْشِيَّةُ.** عضلة تبسط الساق ويغذيها العصب الفخذي.
- **m. ventricularis** **الْعَضَلَةُ الْبَطْنِيَّةُ.** اسم يطلق على ألياف من العضلة الدرقية الطرجهالية التي تسيير نحو الثنيات الدهليزية.
- **m. verticalis linguae (= vertical muscle of tongue)** **عَضَلَةُ اللِّسَانِ الْعَمُودِيَّةُ.** عضلة تغير شكل اللسان عند المضغ والبلع ويغذيها العصب تحت اللساني.

- m. viscerum عَضَلَةُ حَشَوِيَّة. اسم يطلق على عضلة أحد الأعضاء الحشوية.

- m. vocalis (= vocal muscle) العَضَلَةُ الصَّوْتِيَّة. عضلة تقصر الطيات الصوتية ويغذيها العصب الحنجري الراجع.

- m. zygomaticus major (= greater zygomatic muscle) العَضَلَةُ الْوُجْنِيَّة الْكَبِيرَة. عضلة تسحب زاوية الفم إلى الخلف والأعلى ويغذيها العصب الوجهي.

- m. zygomatic minor (= lesser zygomatic muscle) العَضَلَةُ الْوُجْنِيَّة الصَّغِيرَة. عضلة تسحب الشفة العليا للأعلى وللجهة الوحشية ويغذيها العصب الوجهي.

musicotherapy مُعَالَجَة بِالْمُوسِيقَى. معالجة الأمراض بالموسيقى.

mussitation مُعْتَمَة. تحريك الشفاه من دون إحداث أصوات كلامية.

mute أُخْرَس. لا يتمكن من النطق.

- deaf m. أَبْكَم. شخص لا يتمكن من السمع أو الكلام.

mutism 1. صُمَات 2. خُرْس. 1. الامتناع عن الكلام أو رفضه 2. عدم المقدرة على الكلام.

- akinetic m. صُمَات لا حركي. صمات لا يتمكن فيه المريض من توليد أية حركات صوتية.

- deaf m. بَكَامَة؛ صُمَات صَمْعِي. صمات يتولد نتيجة الصمم وعدم سماع العصاب أية أصوات لكي يقلدها.

- elective m. صُمَات انتخابي. صمات يتولد بسبب اختلال عقلي لدى الطفل الذي يرفض التحدث في المجتمعات لكنه يستطيع التحدث إلى بعض الأشخاص الذين يختارهم بنفسه.

myalgia أَلَمُ الْعَضَل. ألم عضلي.

- m. abdominis أَلَمُ عَضَلِي بَطْنِي. ألم في جدار البطن.

- m. capitis أَلَمُ عَضَلِي رَأْسِي. ألم في عضلات فروة الرأس مما يولد الصداع.

- m. cervicalis (= torticollis) صَعْر. ألم القطن؛ قُطَان.

- lumbar m. (= lumbago) أَلَمُ الْقَطْن؛ قُطَان.

myasthenia وَهْنُ عَضَلِي. أي شذوذ بنيوي عضلي يولد الضعف العضلي.

- angiosclerotic m. (= intermittent claudication) وَهْنُ عَضَلِي بِتَصَلُّبِ الشَّرَائِي. عرج متقطع.

- m. gastrica (= atony of stomach) وَهْنُ عَضَلِي مَعْدِي. ونى معدي بسبب ضعف وفقدان توتر عضلات جدار المعدة.

- m. gravis (= m. gravis pseudoparalytica) وَهْنُ عَضَلِي وَبِيل.

- m. gravis pseudoparalytica وَهْنُ عَضَلِي شَلَلِي كَاذِب. اضطراب وظيفي عضلي عصبي بسبب وجود أضرار لمستقبلات الأسيتيل كولين. وهو يتصف بتعب وإجهاد الجهاز العضلي مع تذبذب شدتهما ومن دون أي اضطراب حسي. ويمكن أن يتوضع هذا الاضطراب في إحدى المجموعات العضلية أو يكون عاماً مع الضعف الشديد، وفي بعض الحالات، عند قلة التهوية. وقد يصيب أية عضلة في الجسم وخاصة عضلات العين والوجه والشفيتين واللسان والبلعوم والرقبة.

- m. laryngis وَهْنُ عَضَلِي حَنْجَرِي. ومن عضلات الحنجرة بسبب كثرة الاستعمال أو الشخوخة أو حالات الضعف العام.

- neonatal m. وَهْنُ عَضَلِي وَلِيدِي. ومن عضلي عابر (لمدة أسبوع أو شهر) وعادة ما يصيب أولاد الأم المصابة بالوهن العضلي ويتصف بصعوبة الرضاعة والبلع.

myatonia (= amyotonia) وَنَاءُ عَضَلِي. حالة ونى عضلات الجسم.

- m. congenita (= amyotonia congenita) وَنَاءُ عَضَلِي خَلْقِي.

myatony (= myatonia) وَنَاءُ عَضَلِي.

myatrophie ضُمُورُ عَضَلِي. ضمور إحدى العضلات أو أكثر.

myautonomy الْحَالَةُ الْعَضَلِيَّة الْذَاتِيَّة. حالة يتأخر فيها التقلص بعد تنبيه العضلة لفترة طويلة نسبياً كما يظهر وكأنه يتم بمعزل عن التنبيه.

mydriasis تَوْسَعُ الْحَدَقَة. توسع الحدقة الوظيفي أو المرضي أو بفعل الأدوية.

- **alternating m.** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الْمُتَنَاقِبِ. عدم تساوي الحدقتين أو أن إحدهما تتوسع لفترة ثم تعود لتتسع الحدقة المعاكسة.

- **bounding m. (= alternating m.)** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الْمُتَنَاقِبِ.

- **paralytic m.** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الشَّلَلِيّ. توسع الحدقة الذي يتولد عن شلل العصب محرك العين.

- **spasmodic m. (= spastic m.)** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ التَّشَنُّجِيّ. توسع الحدقة بسبب تشنج العضلة موسعة الحدقة أو بسبب فرط فعالية الودي.

- **spinal m.** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ النُّخَاعِيّ. توسع الحدقة بسبب شلل المركز الهدايوي النخاعي في النخاع الشوكي.

- **springing m. (= alternating m.)** تَوَسُّعُ الْحَدَقَةِ الْمُتَنَاقِبِ.

**myectomy** قَطْعُ الْعَضَلَةِ. قطع قسم من العضلة.

**myectopia** انْزِيَاخُ الْعَضَلَةِ: ابتداء عضلي. انحراف العضلة.

**myectomy (= myectopia)** انْزِيَاخُ الْعَضَلَةِ.

**myelalgia** أَلَمُ النُّخَاعِ. ألم في النخاع الشوكي.

**myelapoplexy (= hematomyelia)** سَكْتَةُ نَخَاعِيَّة: تَدَمِّي النُّخَاعِ.

**myelasthenia** وَهْنُ النُّخَاعِ. وهن عصبي بسبب علة تصيب النخاع الشوكي.

**myelatalia** خَلَلُ تَنَامِي النُّخَاعِ. التنامي المعيب للنخاع الشوكي.

**myelatrophy** ضَمُورُ النُّخَاعِ. ضمور النخاع الشوكي.

**myelauze** ضَخَامَةُ النُّخَاعِ. زيادة حجم النخاع الشوكي الشاذة.

**myelemla (= myelocytosis)** كَثْرَةُ النُّقُويَات.

**myelencephalitis** الْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْذِمَاقِ. التهاب الدماغ والنخاع الشوكي.

**myelencephalon** الذِمَاقُ البَصَلِيّ.

1. النخاع المستطيل (البصلة) 2. القسم الخلفي من الحويصلتين المتكونتين من تطور الدماغ المؤخر في الجنين.

**myelencephalospinal** دِمَاقِيّ بَصَلِيّ. نسبة للدماغ البصلي والنخاع الشوكي.

**myeleterosis** تَنَكُّسُ النُّخَاعِ. تغير النخاع المرضي.

**myelin** نُخَاعِيْن: مِيَالِيْن. 1. مادة غشاء خلية شوان التي تلتف لتكون الغمد النخاعي الذي يحوي نسبة عالية من الشحميات بالنسبة للبروتين، ولذلك فهو يعمل كعازل كهربائي 2. مادة أحادية الامين أحادية الفسفوتيد توجد في الدماغ.

**myelinated** مِيَالِيْنِي: نُخَاعِيْنِي. ذو غمد نخاعي.

**myelination (= myelinization)** تَكْوُنُ النُّخَاعِيْن: تَكْوُنُ المِيَالِيْن.

**myelinic** نُخَاعِيْنِي: مِيَالِيْنِي. منسوب للنخاعين أو ذو طبيعة نخاعية.

**myelinization** تَشَكُّلُ المِيَالِيْن. عملية إضافة النخاعين أو اكتسابه.

**myelinoclasia (= myelinolysis)** تَحْلُلُ المِيَالِيْن. زوال النخاعين أو تخريبه.

- **acute perivascular m. (= acute disseminated encephalomyelitis)** الْتِهَابُ الذِمَاقِ والنُّخَاعِ المنتشر الحاد.

- **central pontine m. (= central pontine myelinolysis)** انْجِلَالُ المِيَالِيْن الجِسْرِيّ المَرْكَزِيّ.

- **postinfection perivenous m. (= postinfection encephalomyelopathy)** اغْتِلَالُ دِمَاقِيّ نُخَاعِيّ تَالٍ لِلْعَدْوَى.

**myelinogenesis (= myelinization)** تَكْوُنُ المِيَالِيْن: تَنْخَع.

**myelinogenetic** مَكْوُنُ المِيَالِيْن: مُنْخَع. مولد النخاعين أو مولد التنخع أو التخليع.

**myellnogeny** تَكْوُنُ المِيَالِيْن العَصَبِيّ. تنخع الالياف العصبية أو تنامي النخاعين.

**myelinolysis** تحلل الميالين: انجذاب الخُاعين. تخريب الخُاعين أو زواله.

**central pontine m.** تحلل الميالين الجسري المركزي. نوع نادر من زوال نخاعين الجسر الكتلي يحصل لدى مدمني الكحول.

**myelinopathy** إعتلال مياليني. تنكس المادة البيضاء للدماغ أو أي مرض يصيب الميالين (النخاعين).

**myelinosis** نخز مياليني. نوع من النخر الشحمي يتكون فيه الميالين.

**myelinotoxic** سام للميالين. مادة سامة مزيلة للنخاعين.

**myelinotoxicity** سمية ميالينية؛ سام للميالين. ما له صفة تسميم النخاعين.

**myelitis** التهاب النخاع. التهاب النخاع الشوكي وتختلف أعراضه حسب موقع الإصابة التي تشمل ألم الظهر وحس حزامي وفرط الحساسية والتنمل والخدر مع اضطرابات حركية والشلل وفرط الانعكاسية وشلل المصبرات والقرحة الناقبة وفي الأدوار المتقدمة التقلصات التشنجية للعضلات المشلولة.

**acute m.** التهاب النخاع الحاد. التهاب النخاع الشوكي الحاد.

**apoplectiform m.** التهاب النخاع السكتي الشكل. التهاب النخاع الذي يظهر فيه الشلل بصورة مفاجئة.

**ascending m.** التهاب النخاع المتسلق. التهاب النخاع الشوكي الذي يتسلق تدريجياً نحو الدماغ.

**bulbar m.** التهاب النخاع المستطيل. التهاب الذي يصيب النخاع المستطيل (البصلة).

**cavitary m. (= syringomyelitis)** التهاب النخاع الكهفي.

**central m.** التهاب النخاع المركزي. التهاب يصيب المادة السنجابية للنخاع الشوكي بصورة خاصة.

**chronic m.** التهاب النخاع المزمن. التهاب النخاع الشوكي الذي يتطور بصورة تدريجية.

**compression m.** التهاب النخاع الإنضغاطي.

اعتلال النخاع الشوكي الناتج عن انضغاطه بسبب آفة مثل الورم.

**concussion m.** التهاب النخاع الارتجاجي. اعتلال النخاع الشوكي بسبب ارتجاجه.

**cornual m.** التهاب النخاع القرني. التهاب يصيب قرون المادة السنجابية للنخاع الشوكي.

**descending m.** التهاب النخاع الهابط. التهاب النخاع الشوكي الذي ينزل متجهاً نحو ذنبه.

**diffuse m.** التهاب النخاع المنتشر. التهاب يصيب مناطق واسعة ومتفرقة من النخاع الشوكي.

**disseminated m.** التهاب النخاع المنتثر. التهاب تظهر فيه بؤر التهابية محددة في النخاع الشوكي.

**focal m.** التهاب النخاع البؤري. اعتلال نخاعي يصيب منطقة صغيرة من النخاع الشوكي أو عدة مناطق صغيرة فيه.

**foudroyant m. (= acute m.)** التهاب النخاع الحاد.

**funicular m.** التهاب النخاع الحبلي. اعتلال نخاعي يصيب المادة البيضاء للنخاع الشوكي وخاصة الحبل الظهري ويحدث ذلك خصوصاً في فقر الدم الوبيل.

**hemorrhagic m.** التهاب النخاع النزفي. اعتلال نخاعي يترافق مع النزف فيه.

**interstitial m. (= sclerosing myelopathy)** إعتلال نخاعي مصلب.

**neuro-optic m. (= neuromyelitis optica)** التهاب النخاع والعصب البصري.

**parenchymatous m.** التهاب النخاع المتي. اعتلال نخاعي يصيب بصورة خاصة مادة الألياف العصبية للنخاع الشوكي.

**periependymal m.** التهاب النخاع حول البطانة العصبية. التهاب النخاع في المنطقة المحيطة بقناته المركزية.

**sclerosing m.** التهاب النخاع المصلب. اعتلال نخاعي يتصف بتصلب النخاع الشوكي وفرط نمو الدبق.

**systemic m.** التهاب النخاع الجهازى. اعتلال نخاعي يصيب سبلاً معينة وأجهزة خاصة في النخاع الشوكي.

- traumatic m. التهاب النخاع الرضحي. اعتلال النخاع الشوكي الذي يتلو إصابته بالرضح.

- m. vaccinia التهاب النخاع التلقيحي. التهاب النخاع الذي يتلو التلقيح أحياناً.

myeloarchitecture معمارية السبل العيالية. 1. ترتيب الألياف العصبية في قشري المخ والمخيخ. 2. ترتيب وتنظيم السبل العصبية في النخاع الشوكي وساق الدماغ.

myeloblast أرومة النقيوة. خلايا غير ناضجة توجد في نقي العظام ولا توجد في الدم في الحالة السوية وهي الخلية البدائية وسليفة الخلايا المحبة التي تتطور بمراحل إلى كرية الدم البيضاء.

myeloblastemia وجود الأرومات النقيوة بالدم.

myeloblastoma ورم أرومة النقيوة. ورم بؤري خبيث يشاهد في ابيضاض الدم النقوي الحاد ويتكون من أرومات نقوية فيها القليل من اللون الأخضر.

myeloblastomatosis ورم أرومة النقيوة. وجود العديد من أورام الأرومة النقيوة.

myeloblastosis كثرة الأرومات النقيوة بالدم. كثرة وجود الأرومات النقيوة بالدم.

myelocoele قيلة نخاعية. انفتاق مادة النخاع الشوكي خلال عيب في القناة الفقرية العظمية.

myeloclast ناقضة الميالين. خلية تشطر الأغمد الميالينية.

myelocone شحم مياليني. مادة شحمية في الدماغ.

myelocyst كيسة ميالينية. كيسة حميدة تتولد من أقتية نخاعية بدائية.

myelocystomeningocele (= myelomeningocele) قيلة ميالينية سحائية.

myelocyte النقيوة. 2. خلية طليعية في سلسلة تطور الخلايا المحبة يبدأ فيها تمايز تكوين الحبيبات. 2. أية خلية من خلايا المادة السنجابية للجهاز العصبي.

myelocythemia كثرة النقيويات بالدم. وجود الخلايا النقيوية بالدم.

myelocytoma ورم النقيويات. 1. ابيضاض الدم النقوي المزمن. 2. ورم نقوي.

myelocytomatosis ورم النقيويات. مرض يصيب الطيور يتصف بوجود عدة أورام نقوية.

myelocytosis (= myelosis) كثرة النقيويات بالدم.

myelodysplasia خلل التنسج النخاعي. سوء تنسج قسم من النخاع الشوكي خاصة من قسمه السفلي.

myeloencephalitis التهاب الدماغ والنخاع الميوزيني؛ التهاب الدماغ والنخاع. التهاب يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

- eosinophilic m. التهاب الدماغ والنخاع الحمضي. معقد أعراض عصبية يتولد عن الإصابة بالديدان المسودة الفمويات الفكية والذي يتصف بالمجنون الشديد يتلوه شلل الأطراف وفقدان الحواس المفاجيء مع كثرة الحمضات بالدم واصفرار السائل النخاعي الشوكي.

- epidemic m. (= epidemic polioencephalitis) التهاب سنجابية الدماغ الوبائي.

myelofugal نابذ النخاع. مبتعد عن النخاع الشوكي.

1. تنامي الجهاز العصبي myelogenesis. 2. تكون الميالين. 1. تنامي وتطور الجهاز العصبي وخاصة الدماغ والنخاع الشوكي. 2. ترسب الميالين حول المحاور.

تناضج myelogeny (= myelinogeny) الميالين. نضوج الأغمد النخاعية حول الألياف العصبية عند تنامي الجهاز العصبي المركزي وتطوره.

myelogram صورة النخاع. الصورة الشعاعية للنخاع الشوكي.

myelography تصوير النخاع. تصوير النخاع الشوكي بعد حقن مادة مبيئة في الحيز تحت العنكبوتية.



**- oxygen m.** التَصَوِيرُ الأَكْسِجِينِي لِلنُّخَاع. تصوير النخاع باستعمال الأكسجين كوسط مباين.

**myeloid** 1. نُخَاعِي 2. نَقْيَانِي. 1. منسوب إلى النخاع الشوكي 2. منسوب إلى النقي أو مشتق منه أو شبيه به.

**myelolysis** إِنْجِلَالُ النُّخَاع.

**myeloma** وَرَمٌ نَقْوِي. ورم نقوي مكون من خلايا مستمدة من نقي العظام.

**myelomalacia** تَلَيُّنُ النُّخَاع. تلين النخاع الشوكي المميت.

**myelomenia** حَيْضٌ نُخَاعِي. نزف حيضي مع انتباز بطاني رحمي في القناة الشوكية.

**myelomeningitis** إِنْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالسَّحَايَا. التهاب النخاع الشوكي وسحاياه.

**myelomeningocele** قَيْلَةُ نُخَاعِيَّةٌ سَحَائِيَّةٌ. انفتاق النخاع الشوكي وسحاياه خلال عيب في القناة الفقرية العظمية.

**myelomere** قُسَمٌ نُخَاعِيَّةٌ. قسيم من أقسام الدماغ أو النخاع الشوكي المتمامين.

**myeloneuritis** إِنْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْأَعْصَابِ. التهاب النخاع الشوكي والأعصاب المحيطية.

**myelo-optic neuropathy** إِنْغِتَالُ النُّخَاعِ وَالْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ. اضطراب يصيب النخاع الشوكي والعصب البصري.

**myelopathy** 1. مِصْطَلَحٌ إِنْغِتَالُ نُخَاعِي. عام يدل على اضطرابات وظيفية مع تغيرات مرضية أو بدونها تصيب النخاع الشوكي ويستعمل للدلالة على آفات غير معينة 2. تغيرات مرضية في نقي العظام.

**- apoplectic form m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي سَكْنِي الشَّكْلِ. اعتلال يتصف بالشلل الذي يظهر بصورة مفاجئة.

**- ascending m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي مُتَسَلِّقٌ. اعتلال نخاعي يتقدم نحو جهة الدماغ.

**- compression m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي إِنْضِغَاطِي. اعتلال نخاعي يتولد عن انضغاط النخاع الشوكي بورم مثلاً.

**- concussion m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي إِنْجَاجِي. اعتلال نخاعي يتولد عن ارتجاج النخاع الشوكي.

**- descending m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي نَازِل. اعتلال نخاعي يتقدم نحو ذنب النخاع الشوكي.

**- focal m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي بُؤْرِي. اعتلال نخاعي يصيب منطقة صغيرة أو عدة مناطق صغيرة في النخاع الشوكي.

**- funicular m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي حَبْلِي. اعتلال نخاعي يصيب المادة البيضاء للنخاع الشوكي وخصوصاً الحبل الظهري وهو صفة مميزة لفقر الدم الوبيل.

**- hemorrhagic m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي نَزْفِي. اعتلال نخاعي يترافق مع النزف.

**- interstitial (= sclerosing m.)** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي خِلَالِي. اعتلال نخاعي خلالي؛ إِنْغِتَالُ نُخَاعِي مُصَلَّب.

**- parenchymatous m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي مُتَبَي. اعتلال نخاعي يصيب المادة العصبية الأساسية للنخاع الشوكي.

**- sclerosing m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي مُصَلَّب. اعتلال نخاعي يتصف بتصلب النخاع الشوكي وفطر نمو الدبق فيه.

**- spondylotic cervical m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي فَقَارِي رَقَبِي. اعتلال نخاعي ثانوي يتولد عن إصابة القناة الشوكية الصغيرة خلقياً بالفقرار الرقبي.

**- systemic m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي جَهَازِي. اعتلال نخاعي يصيب سبلاً عصبية معينة في النخاع الشوكي أو أحد أجهزته.

**- transverse m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي مُسْتَعْرِض. اعتلال نخاعي يمتد عرضياً في النخاع الشوكي.

**- traumatic m.** إِنْغِتَالُ نُخَاعِي رَضَجِي. اعتلال نخاعي يتلو إصابة النخاع الشوكي بإصابة رضحية.

**myelopetal** مُتَجُّهُ لِلنُّخَاعِ؛ إِنْتِحَاءٌ نُخَاعِي. متجه أو متحرك نحو النخاع الشوكي.

**myelophage** بَلْعَمٌ نُخَاعِي؛ غَائِيَّةٌ مِيَالِيْنِيَّةٌ. بَلْعَمٌ يَهْضُمُ أَوْ يَحْطُمُ المِيَالِينَ.

**myelophthisis** سَحَافُ النُّخَاعِ. ضَمُورُ النخاع الشوكي.

**myeloplegia** شَلْلٌ نُخَاعِي. شلل بسبب مرض النخاع الشوكي.

**myelopore** مَسَمٌ نُخَاعِي. قناة أو فتحة في النخاع الشوكي.

**myeloradiculitis** التهاب النخاع والجذور. التهاب النخاع الشوكي والجذور الشوكية الخلفية.

**myeloradiculodysplasia** خلل تنسج النخاع والجذور. عيب خلقي تنموي شاذ في النخاع الشوكي والجذور.

**myeloradiculopathy** إعتلال النخاع والجذور. مرض النخاع الشوكي وجذور الاعصاب الشوكية.

**myelorrhagia (= hematomyelia)** تدمي النخاع.

**myeloschisis** انشقاق النخاع. عيب تنموي يتصف بفلح النخاع الشوكي بسبب فشل الصفيحة العصبية في تكوين أنبوب كامل أو بسبب انفجار هذا الأنبوب العصبي بعد تكوينه.

**myeloscintigram** مخطط ومضائي نخاعي. تخطيط الجزيئات التي يعدها العداد الومضاني بعد زرق محلول يحوي نظيراً مشعاً في الحيز تحت العنكبوتية.

**myelosclerosis** تصلب النخاع. تصلب النخاع الشوكي.

**myelosis** كثرة النقويات بالدم.

**myelospasm** تشنج نخاعي. تشنج ينتج عن مرض النخاع الشوكي.

**myelospongium** الإسفنج النخاعي. الشبكة التي يتطور منها النسيج الدبقى والموجودة في الأنبوب العصبي والمكونة من الأرومات الاسفنجية وتوابعها المتفرعة.

**myelosyphilis** الزهري النخاعي؛ الإفرنجي النخاعي. داء الزهري النخاعي.

**myelotomy** بضع النخاع. عملية قطع بعض السبل العصبية للنخاع الشوكي.

**- commissural m.** بضع الصوار النخاعي. بضع النخاع طويلاً لقطع الألياف العصبية الحسية العابرة ولتوليد تسكين موضعي.

**myesthesia** الجس العَصَلِي. الحس الذي يتولد عن التنبيه العضلي.

**myitis (= myositis)** التهاب العضل. التهاب إحدى العضلات.

**myoarchitectonic** معماري عَصَلِي. متعلق بالمعمارية العضلية.

**myoasthenia (= amyosthenia)** وهن عَصَلِي.

**myoatrophy (= myatrophy)** ضمور عَصَلِي.

**myoblast** أرومة العَصَلِيّة. خلية جنينية تتطور لتكون الليف العضلي.

**myoblastoma** ورم أرومة العَصَلِيّة. آفة حميدة محددة شبيهة بالورم تتولد في الأنسجة الرخوة للعضلة.

**myoblastomyoma (= myeloblastoma)** ورم أرومة العَصَلِيّة.

**myobradia** بطء الاستجابة العَصَلِيّة. استجابة العضلة للمنبهات بطء شديد.

**myocardiac (= myocardial)** عَصَلِي قَلْبِي. متعلق بالنسيج العضلي للقلب.

**myocardiogram** مخطط عَصَلَة القلب. مخطط لحركات عضلة القلب.

**myocardiograph** مخطط عَصَلَة القلب. جهاز يستعمل لتخطيط حركات عضلة القلب.

**myocardiolysis** انحلال عَصَلَة القلب. نخر موضعي للألياف العضلية للقلب ينتج عن انسداد أحد شرايينها فيؤدي ذلك إلى تعويضها بنسيج ندبي كما يؤدي أيضاً إلى احتشاء كبير خصوصاً عندما يضاعفه الخثار.

**myocardiopathy** إعتلال عَصَلِي قَلْبِي. أي مرض لا التهابي يصيب عضلة القلب.

**- alcoholic** إعتلال عَصَلِي قَلْبِي كُحُولِي. اعتلال عضلة القلب بسبب تعاطي الكحول المزمن وبكميات كبيرة ويتصف بتضخم القلب وتغيرات تنكسية عضلية قلبية تشاهد عند فحصها خاصة بالمجهر الإلكتروني.

**myocardiorrhaphy** رفو عَصَلَة القلب. رفو جروح عضلة القلب.

**myocarditis** التهاب عَصَلَة القلب. التهاب الجدار العضلي للقلب.

**myocele** قيلة عَصَلِيّة. انفتاق العضلة خلال غلاتها المنشقة.

**myocelialgia** ألم عَضَلِ الْبَطْنِ. ألم في عضلات البطن.

**myocelitis** التهاب عَضَلِ الْبَطْنِ. التهاب في عضلات البطن.

**myocellulitis** التهابُ العَضَلِ والهَلَلِ. التهاب العضلات المترافق مع التهاب الهلل.

**myoeceptor (= end plate)** مُسْتَقْبَلَةٌ عَضَلِيَّةٌ؛ لَوْحٌ انْتِهَائِيٌّ؛ صَفِيحَةٌ انْتِهَائِيَّةٌ.

**myocerosis** تَنَكُّسٌ عَضَلِيٌّ شَمْعِيٌّ. تنكس شمعي يصيب العضل.

**myochorditis** التهابُ عَضَلَاتِ الْحَبَالِ. التهاب عضلات الحبال الصوتية.

**myoclonia** رَمَعٌ عَضَلِيٌّ. اضطراب يتصف بتقلصات عضلية ارتجاجية في جزء من عضلة أو في عضلة كاملة أو في مجموعة عضلات في منطقة محددة من الجسم أو في مناطق متعددة منه تحدث متزامنة أو غير متزامنة.

- m. epileptica (= myoclonus epilepsy) صَرْعٌ رَمْعِيٌّ عَضَلِيٌّ.

- m. fibrillaris multiplex (= myokymia) تَمَوُّجٌ عَضَلِيٌّ.

- fibrillary m. رَجْفَانٌ عَضَلِيٌّ. نفضان اللييفات العضلية أو رجفانها.

- pseudoglottic m. (= hiccup) فَوَاقٌ. رَمَعٌ عَضَلِيٌّ.

**myoclonus (= myoclonia)** رَمَعٌ عَضَلِيٌّ.

- m. multiplex (= paramyoclonus multiplex) رَمَعٌ عَضَلِيٌّ مُتَعَدِّدٌ.

- palatal m. رَمَعٌ عَضَلِيٌّ حَنَكِيٌّ. حالة تنصف بحركة نظمية ارتجاجية لإحدى جهتي الحنك أو جهتيه للأعلى والأسفل وعادة ما ترافقها حركات رمعية متزامنة في عضلات نفس الجهة من الوجه واللسان والبلعوم والحجاب الحاجز.

**myocrismus** صَوْتُ العَضَلَةِ. الصوت الذي يسمع عند التسمع للعضلة المتقلصة.

**myocyte** خَلِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ. خلية النسيج العضلي.

**myocytolysis** انْحِلَالُ الْخَلَايَا العَضَلِيَّةِ. تلاشي الألياف العضلية.

**myocytoma** وَرَمُ الْخَلَايَا العَضَلِيَّةِ. ورم يتكون من الخلايا العضلية.

**myodegeneration** تَنَكُّسٌ عَضَلِيٌّ. تنكس العضلة.

**myodemia** تَنَكُّسٌ شَحْمِيٌّ عَضَلِيٌّ. تنكس شحمي في العضلة.

**myodiastasis** انْفِصَالُ العَضَلَةِ. انفصال إحدى العضلات.

**myodynamics** دِيْنَامِيكَا العَضَلَاتِ. فيزيولوجيا الفعاليات العضلية.

**myodynamometer** مَقْيَاسُ قُوَّةِ العَضَلَاتِ. آلة لقياس قوة العضلات وشدة تقلصها.

**myodynia (= myalgia)** وَجَعٌ عَضَلِيٌّ. وجع في إحدى العضلات أو في مجموعة منها.

**myodystonia (= myodystony)** خَلَلٌ التَوَثُّرِ العَضَلِيِّ. اضطراب توتر العضلة.

**myodystrophia (= myotonia atrophica)** خَلَلٌ عَضَلِيٌّ.

- m. fetalis (= amyoplasia congenita) خَلَلٌ عَضَلِيٌّ جَنِينِيٌّ.

**myodystrophy (= myodystrophia)** خَلَلٌ عَضَلِيٌّ.

**myoedema** وَذَمَةٌ عَضَلِيَّةٌ. وذمة العضلة.

**myofascitis** التهابُ العَضَلَةِ واللِّفَافَةِ. التهاب العضلة ولفافتها.

**myofibril** لَبِنِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ. أحد الخيوط الرقيقة الموجودة في الليف العضلي والتي تسير بموازاة طول الليف وتتكون من العديد من الخيوط العضلية.

**myofibroblast** أرومة الليفة العَضَلِيَّةِ. ليفة عضلية لا نمطية لها صفات تشبه خلية العضلات الملساء فلها نواة غير منتظمة الشكل وكمية كبيرة من شبكة الهيولي الباطنة ومجموعة كثيفة من الخيوط العضلية.

**myofibroma** وَرَمٌ لِيْفِيٌّ عَضَلِيٌّ. ورم يحوي عناصر عضلية وليفية.

**myofibrosis** تَلَبُّفٌ عَضَلِيٌّ. تعويض النسيج العضلي بنسيج ليفي.

تَلَيَّفَ عَضَلِيَّ قَلْبِي. تليف عضلة القلب. - m. cordis  
إِلْتِهَابُ myofibrositis (= perimyositis) غمد العضل.

خَيْطُ عَضَلِيَّ. بنية دون المجهرية myofilament  
خيطة الشكل توجد بحزم في اللييفة العضلية في  
العضلات المخططة والنوع السميك منها مكون من  
الميوزين والرقائق مكون من الأكتين وهما مسؤولان  
عن الخواص التقلصية للعضلات.

تَقَسُّ عَضَلِيَّ. منطقة صلبة myogelosis  
محدودة في إحدى العضلات خصوصاً في العضلة  
الأولية.

تَوَلَّدَ عَضَلِيَّ. تولد العضل myogenesis  
وتكونه في المراحل الجنينية.

دَبَّقَ عَضَلِيَّ. مادة خيطية تولدها myoglia  
الخلايا العضلية توجد في المراحل الجنينية الأولية  
فقط.

مِيَوِغْلُوْبِيْن. المادة الصباغية myoglobin  
الناقلة للأكسجين في العضل وهي بروتين مرتبط  
شبيه بالوحدات الثانوية من الهيموغلوبين وتقوم  
بنقل الأكسجين من الدم إلى العضلات.

مِيَوِغْلُوْبُلِيْن. غلوبلين يوجد myoglobulin  
في مصل العضلات.

مُخَطَّطُ العَضَل. مخطط يحصل myogram  
عليه بالتخطيط العضلي.

مِخْطَاطُ العَضَل. جهاز يسجل myograph  
تأثيرات التقلصات العضلية.

تَخْطِيطُ العَضَل. 1. تسجيل myography  
التقلصات العضلية 2. وصف مفصل للعضلات  
3. تصوير شعاعي للعضلات بعد حقن مادة معتمة  
فيها.

هِيَمَاتِيْن عَضَلِيَّ. سيتوكروم myohematin  
يوجد في العضلات يساعد في عملية الأكسدة فيها.

myohemoglobin (= myoglobin) مِيَوِغْلُوْبِيْن.

ضَخَامَةُ عَضَلِيَّة. ضخامة myohypertrophia  
العضلات.

ضَخَامَةُ عضلية شللية - m. kymoparalytica

تموجية. حثل العضلة مع شللها.

عَضَلَانِيّ؛ شَبِيهُ العَضَل. مادة شبيهة myoid  
بالعضل.

وَدَمَةٌ عَضَلِيَّة. myoidema (= myoedema)

العَضَلِيَّة. تقلص عضلي ذاتي. myoidism

إِقْفَارٌ عَضَلِيَّ. نقص تجهيز myoischemia  
الدم إلى منطقة محددة من العضلة.

تَنَكُّسٌ شَمْعِيٌّ عَضَلِيَّ. تنكس العضلة الشمعي. myokerosis (= myocerosis)

مَقْيَاسُ التَّقَلُّصِ العَضَلِيَّ. myokinesimeter  
آلة تقيس شدة التقلص العضلي المولد عن تنبيهها  
كهربائياً.

تَحَرُّكٌ عَضَلِيَّ. حركة العضلات myokinesis  
وخصوصاً حركة الألياف عند تقلصها.

تَمَوُّجٌ عَضَلِيَّ. حالة حميدة تتصف myokymia  
بتقلصات ذاتية كزازية قصيرة في وحدات حركية  
منفصلة في مجموعة من الألياف العضلية وعادة ما  
تتقلص المجموعات المتجاورة بصورة تناوبية.

غَمْدُ اللَّيْفِ myolemma (= sarcolemma)  
العَضَلِيَّ.

مِيُولِيْن. مادة اللييفات العضلية. myolin

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورم عضلي myolipoma  
يحتوي عناصر شحمية.

مَبْحَثُ العَضَل. مبحث تسمية myologia  
العضلات والأجربة والأغمار الزلالية.

عِلْمُ العَضَل. العلم الذي يدرس myology  
العضلات ووظائفها وكل ما يتعلق بها.

إِنْجِلَالُ العَضَل. تلاشي النسيج myolysis  
العضلي أو تنكسه.

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ. ورم يتكون من عناصر myoma  
عضلية.

ورم عضلي كُرَوِيّ. ورم عضلي كروي - ball m.  
الشكل.

ورم عضلي أَمْلَس. - m. levicellularis (= leiomyoma)

ورم عضلي أَمْلَس رَجْمِيّ. - m. previum (= leiomyoma uteri)

- m. sarcomatodes (= myosarcoma)  
ورم ساركومي عَضَلِيّ أَمْلَس.

- m. striocellulare (= rhabdomyoma) ورم  
عضلي مَخْطَط الخلايا.

- m. telangiectodes ورم عضلي متوسّع الأوعية؛  
ورم عضلي أَمْلَس وَغَائِيّ. ورم يتكون من لفات من  
الأوعية الدموية تحيط بها شبكات من الألياف العضلية.

myomagenesis تكوّن الورم العضلي.  
تكون الورم العضلي أو تسببه.

myomalacia تَلَيُّنُ العَضَل. تلين العضل  
المرضي.

myomatosis وُزَامُ عَضَلِيّ. وجود عدة أورام  
عضلية.

myomectomy 1. استئصال الورم العضلي  
2. قَطْعُ العَضَل. 1. استئصال الورم العضلي  
جراحياً 2. قطع جزء من العضلة.

myomelanosis كثرة الميلانين العَضَلِيّ.  
ملان أو انصبغ أسود في جزء من النسيج  
العضلي.

myomere قُسَيْمٌ عَضَلِيّ. لوحة عضلية  
أو جسيم جنيني يتطور ليولد عضلة إرادية.

myometer مِقْيَاسٌ عَضَلِيّ. مقياس يقيس  
التقلص العضلي.

myometritis إِتِهَابُ عَضَلِ الرَّحِم. التهاب  
المادة العضلية للرحم.

myometrium عَضَلُ الرَّحِم. الجدار العضلي  
الأملس للرحم الذي يكون معظم كتلته.

myomotomy بَضْعُ الورم العضلي.

myonecrosis نَحْرٌ عَضَلِيّ. نخر أو موت  
الألياف العضلية.

- clostridial m. (= gas gangrene) ورم  
عضلي بالمطثيات؛ مُوَاتٌ غَازِيّ.

myoneural عَضَلِيّ عَصَبِيّ. نسبة للعضل  
والعصب ويطلق على النهاية العصبية في العضلة.

myoneuralgia (= muscular  
neuralgia) أَلَمٌ عَصَبِيٌّ عَضَلِيّ.

myoneurasthenia وَهْنٌ عَضَلِيّ. الوهن  
العضلي الذي يرافق الوهن العصبي.

myoneure عَصَبُونٌ عَضَلِيّ. عصبون يغذي إحدى  
العضلات.

myonosis (= myopathy) إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ.  
تَسْمِيَةُ العَضَلَات. التسمية  
التشريحية للعضلات.

myopachynsis ضَخَامَةُ عضلية. ضخامة  
إحدى العضلات.

myopalmus (= muscle twitching)  
نَفْضَانٌ عَضَلِيّ. تقلص عضلي مفرد أو متكرر  
قصير الأمد.

myoparalysis شَلْلٌ عَضَلِيّ. شلل العضلة  
أو العضلات.

myoparesis خَرَلٌ عَضَلِيّ. ضعف العضلات.

myopathia (= myopathy) إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ.

- m. cordis (= myocardosis) إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ  
قَلْبِيّ. اعتلال عضلة القلب الالتهابي الذي قد ينتج  
عن ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشريان التاجي أو  
فرط الدرقية.

- m. infraspinata إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ تَحْتَ الشُّوكِيّ.  
حالة تتصف بتولد ألم مفاجئ في المنكب مع إيلام في  
العضلة تحت الشوكية.

myopathy إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ. أي مرض  
يصيب العضل.

- alcoholic m. إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ كُحُولِيّ. اعتلال  
عضلي يصيب المدمنين على الكحول يتصف ببيلة  
الميوغلوبين وضعف الأطراف الداني.

- centronuclear m. (= myotubular m.)  
إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ نَوَوِيٌّ مَرْكَزِيّ.

- distal m. إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ قَاصٍ. اعتلال عضلي  
يبدأ في العضلات القاصية للأطراف خصوصاً في  
العضلات الصغيرة لليدين والقدمين.

- granulomatous m. إِغْتِلَالٌ عَضَلِيّ وَرْمِي  
حُبَبِيّ. اعتلال عضلي التهابي دون الحاد يتصف  
بتجمعات خلوية التهابية تشبه الأورام الحبيبية  
المتعددة وفي الغالب مع خلايا عملاقة.

- **metabolic m.** اعتلال عضلي ينتج عن خلل استقلابي في العضلات.
- **myotubular m.** اعتلال عضلي أنبوبوي. اعتلال عضلي يتصف بوجود الياف عضلية تشبه الألياف الجنينية البدائية التي تحوي نوى مركزية التوضع محاطة بهالة تبدو خالية وتكسبها منظرًا أنبوبياً.
- **nemaline m.** اعتلال عضلي خيطي. شذوذ لبيفي عضلي خلقي يتصف بوجود جسيمات خيطية أو عصوية الشكل منتشرة خلال الألياف العضلية ويؤدي إلى الوهن العضلي وضعف العضلات الدائية.
- **nutritional m.** اعتلال عضلي تغذوي. اعتلال عضلي لا التهابي في العضلات الهيكلية والقلبية بسبب نقص مادة السيلينيوم والفيتامين E في الطعام ويحدث غالباً في الحيوانات.
- **ocular m. (= progressive ocular ophthalmoplegia)** شلل عيني متروك. اعتلال عضلي متروك يبدأ في العضلات الشظوية والظنبوبية الأمامية في الأطراف السفلية ثم في العضلة المنشارية والعضلات الأخرى المحيطة بالكف.
- **senile m.** اعتلال عضلي شيخوخي. ضعف متروك في عضلات الساق يحدث في الشيخوخة وينتج عن عوامل متعددة.
- myophage** بلعم العضل؛ خلية غائية عضلية. بلعمة تخرب مادة العضلة التقلصية.
- myophagism** بلعمة عضلية؛ ضمور عضلي. ضمور النسيج العضلي.
- myophone** مسماع عضلي. آلة تستعمل لتسمع أصوات التقلص العضلي.
- myoplasm** الهَيُولَى العَضَلِيَّة. الجزء القلوص من الخلية العضلية أو اللييف العضلي.
- myoplasty** رأب عضلي. جراحة رأبية للعضلة.
- myoplegia** شلل عضلي. شلل إحدى العضلات أو أكثر.
- **familial m. (= periodic paralysis)** شلل عضلي عائلي. شلل دوري.

- myoreceptor** مُسْتَقْبِلَةٌ عَضَلِيَّة. مستقبلة حسية عميقة توجد في العضلة الهيكلية.
- myorrhaphy** رَفْوُ العَضَل. درز العضلة المقطوعة.
- myorrhexis** تَمَرُّقُ العَضَل. تمزق العضلة وتشققها.
- myosalgia (= myalgia)** ألم عضلي.
- myosarcoma** ساركومة عضلية. ورم خبيث يتولد من الخلايا العضلية.
- myschwannoma (= schwannoma)** ورم عضلي شفاني.
- mysclerosis** تَصَلُّبُ عَضَلِي. تصلب النسيج العضلي.
- myscope** منظار عضلي. آلة لتنظير التقلص العضلي.
- myoseism** تَقَلُّصُ عَضَلِيّ نَفْضِي. تقلصات عضلية نفضية غير منتظمة.
- myosin** ميوزين. غلوبين، وهو أكثر البروتينات وجوداً في العضل ومسؤول بالاشتراك مع الأكتين عن تقلص العضلات وارتخائها.
- myosis (= miosis)** تَقَبُّضُ الحَدَقَة.
- myositis** إَلْتِهَابُ العَضَل. التهاب العضلات الإرادية.
- **acute disseminated m. (= primary multiple m.)** التهاب العضل الحاد المنتشر؛ التهاب العضل الإبتدائي المتعدد.
- **acute progressive m.** إَلْتِهَابُ العَضَل المُتَرَقِّي. مرض نادر يصيب التهابه تدريجياً كل الجهاز العضلي وينتهي بالموت بالاختناق والتهاب الرئة.
- **m. fibrosa** إَلْتِهَابُ العَضَل التَلَيُّفِي. التهاب عضلي يؤدي إلى تليف داخل العضل.
- **m. a frigore** إَلْتِهَابُ العَضَل التَبْرِيدِي. التهاب عضلي روماتزمي يتولد عن التعرض للبرد أو للانجماد.
- **infectious m. (= interstitial m.)** إَلْتِهَابُ العَضَل العدواني.
- **interstitial m.** إَلْتِهَابُ العَضَل الخِلَالِي. التهاب النسيج الرابط والحاجزي في العضل.

- **multiple m. (= polymyositis)** التهاب العضلات المتعدد.
- **m. ossificans** التهاب العضل المَعْظَم. التهاب عضلي يتصف بترسب عظمي أو بتعظيم العضل.
- **m. ossificans circumscripta** التهاب العضل المَعْظَم المُتَحَدَّد. التهاب عضلي يتصف بتوليد ورم عظمي مثل عظم الفرسان الذي يتولد في العضلات مقربة الفخذ.
- **m. ossificans progressiva** التهاب العضل المَعْظَم المُتَرْقِي. مرض مترقي يبدأ في أوائل العمر تتحول عنده العضلات تدريجياً إلى نسيج عظمي مع تقدم العمر.
- **m. ossificans traumatica** التهاب العضل المَعْظَم الرَضْجِي. التهاب عضلي تعظمي ينتج عن رضح العضلة.
- **parenchymatous m.** التهاب العضل المَعْنِي. التهاب عضلي يصيب النسيج الاساسي للعضل.
- **primary multiple m.** التهاب العضل الابتدائي المتعدد. مرض حمي حاد يتصف بالتهاب الجلد والعضلات والتهابهما في مختلف أنحاء الجسم.
- **progressive ossifying m. (= m. ossificans progressiva)** التهاب العضل المَعْظَم المُتَرْقِي.
- **m. purulenta** التهاب العضل القَيْحِي. التهاب العضل بسبب تجرثم الدم وبترافق مع التقيح والموات.
- **rheumatoid m. (= fibrositis)** التهاب العضل الرُّوماتويدي. التهاب ليفي.
- **m. serosa** التهاب العضل المصلي.
- **trichinous m.** التهاب العضل بالشُعْرِيَّات. التهاب العضل المولد عن وجود الشعيرينات في العضلات.
- myospasia (= paramyoclonus)** رَمْعٌ عَضَلِيٌّ مُتَعَدَّد. رمع عضلي يصيب عدة عضلات.
- myospasm** تَشْنُجٌ عَضَلِيٌّ. تشنج العضلة.
- myospasmia** شَنْجٌ عَضَلِيٌّ. مرض يتصف بتشنج عضلي لا يمكن التحكم فيه.
- myosthenometer (= dynamometer)** مَقْيَاسُ قُوَّةِ العَضَل. جهاز يقيس قوة المجموعات العضلية.

- myostroma** سَدَى العَضَل. النسيج الهيكلي للعضل.
- myosuture (= myorrhaphy)** رَفْوُ العَضَل.
- mysynizesis** التَصَاقُ العَضَل. التصاق العضلات.
- myotactic** حِسِّيٌّ عَضَلِيٌّ عَمِيق. منسوب للحس العضلي العميق.
- myotasis** تَمَدُّدُ العَضَل. تمدد أو تمديد العضل.
- myotatic** مَمْدُدُ العَضَل. ما يمدد العضل أو ما يقوم بتمديده.
- myotenontoplasty (= tenomyoplasty)** رَأْبُ عَضَلِيٍّ وَتَرِي.
- myotenositis** التهاب عضلي وتري. التهاب العضل الوتر.
- myotenotomy** بَضْعُ وتر العضلة: قَطْعُ وَتَرٍ العَضَلَة. قطع وتر إحدى العضلات وبضعه.
- myothermic** حَرَارِيٌّ عَضَلِيٌّ. منسوب إلى التغيير الحراري للعضلة أثناء فعاليتها.
- myotic (= miotic)** مَقْبِضُ الحَدَقَة.
- myotility (= muscular contractility)** قَلْوَصِيَّةُ العَضَل.
- myotome** 1. مِبْضَعُ العَضَل 2. بَضْعَة عضلية.
1. آلة لقطع العضلات 2. الصفحة العضلية الجنينية التي تتطور إلى عضلة إرادية 3. مجموعة من العضلات تغذيها أعصاب شوكية من قسيمة شوكية واحدة.
- myotomy** قَطْعُ العَضَل. قطع العضل أو تشريحه.
- myotone (= myotonus)** تَوْتَرٌ عَضَلِيٌّ.
- myotonia** تَأَثُّرُ العَضَل؛ تشنج العضل التوتري. فرط ميوجية العضل وقلوصيته مع نقصان قدرته على الارتخاء مما يؤدي إلى تشنج العضلة التوتري.
- m. acquisita** تَأَثُّرُ العَضَل المُكْتَسَب. تأثر العضل الذي يتولد عن الرضخ أو نتيجة إصابته بمرض ما.
- **m. atrophica (= myotonic dystrophy)** تَأَثُّرُ العَضَل الضُّمُورِي.

- **m. congenita** تَأَثَّرُ الْعَضَلُ الْخَلْقِي. تَأَثَّرَ عضلي خلقي ويمكن أن يكون وراثياً أيضاً يتصف بتنشج العضل التوتري مع صمل بعض العضلات عند محاولة تحريكها بعد فترة من استراحتها أو عند تنبيهها آلياً ويزول الصمل عند استمرار تحريك العضلة.

- **m. dystrophica (= myotonic dystrophy)** تَأَثَّرُ الْعَضَلُ الضُّمُورِي.

- **m. hereditaria (= m. congenita)** تَأَثَّرُ الْعَضَلُ الْوَرِاثِي.

- **m. neonatorum (= tetanism)** تَأَثَّرُ الْعَضَلُ الْوَلِيدِي؛ تَكَرَّرَ؛ حَالَةٌ تَكَرُّزِيَّة.

- **percussion m.** تَأَثَّرَ عَضَلِي قَرْعِي. توتر العضلات عند قرعها.

**myotonic** تَأَثَّرِي عَضَلِي. منسوب للتأثر العضلي أو مصاب به.

**myotonoid** شَبِيهِ التَأَثَّرِ الْعَضَلِي. استجابات عضلية تتصف ببطء التقلص والارتخاء.

**myotonometer** مَقْيَاسُ التَّوَثُّرِ الْعَضَلِي. آلة لقياس التوتر العضلي.

**myotonus** تَشَنُّجٌ عَضَلِي تَوَثُّرِي. تشنج توترى لإحدى العضلات أو لمجموعة من العضلات.

**myotrophic** 1. مُنَمِّي الْعَضَل 2. تَغْذَوِي عَضَلِي. 1. ما ينمي العضل ويزيد من وزنه 2. نسبة إلى تغذية العضل.

**myotrophy** تَغْذِي الْعَضَل. تغذي العضل وتنميه.

**myotropic** مُوجِّهٌ عَضَلِي. ذو توجيه للعضلات.

**myotubule** نَبْيَبٌ عَضَلِي. ليف عضلي متنام ذو نواة مركزية بدلاً من النواة المحيطة.

**myovascular** عَضَلِيٌّ وَعَاقِي. متعلق بالعضلة وأوعيتها الدموية.

**myringa (= tympanic membrane)** غِشَاءُ طَبْلَةِ الْأُذُن.

**myringectomy** اسْتِنْصَالُ غِشَاءِ الطَّبْلِ. استئصال غشاء الطبل جراحياً.

**myringitis** الْتِهَابُ غِشَاءِ الطَّبْلِ.

- **m. bullosa, bullous m.** الْتِهَابُ غِشَاءِ الطَّبْلِ الْفُقَاعِي. نوع من التهاب الأذن الوسطى الفيروسي يولد فقاعات مصلية أو دموية على غشاء الطبلة وجدار الصماخ المجاور.

**myringoplasty** رَأْبُ غِشَاءِ الطَّبْلِ. رأب غشاء الطبل المثقوب بالطعم.

**mysophilia** وَلَعُ الْقَذَارَةِ. نوع من الشذوذ يتصف بالولع بالقذارة والغانط والمفرغات.

**mysophobia** رُهَابُ الْقَذَارَةِ. الخوف المفرط الشاذ من القذارة والمفرغات.

**mythomania** هَوَسُ الْكَذِبِ؛ هَوَسُ التَّهْوِيلِ. التهويل والكذب المفرط الشاذ.

**mythophobia** رُهَابُ الْكَذِبِ؛ رُهَابُ التَّهْوِيلِ. الخوف من التهويل والكذب أو من سماعهما.

**myxedema** وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ. حالة تتولد عن قصور الغدة الدرقية تتصف باورام شمعية جافة مع تكدس المخاطين (موسين) الشاذ في الجلد والأنسجة الأخرى.

**myxomyoma** وَرَمٌ عَضَلِيٌّ مُخَاطِيٌّ. ورم عضلي مع تنكس مخاطي.



# N

**nalorphine** نَالُورْفِين. دواء يستعمل كعلاج مضاد للمورفين والمخدرات الأخرى.

**naloxone hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد الفلوكسون. دواء يستعمل كدرياق لعلاج فرط جرعات الأدوية المخدرة.

**naltrexone** نالْتْرِكْسُون. دواء مضاد للمخدرات.  
**1. صِفَرُ الرَّأْس.** صغر الرأس **nanocephaly** الشاذ.

**1. صِفَرُ الْجِسْم** 2. صِفَرُ الْجَذَع؛ **nanocormia** قَزَامَةُ الْجَذَع. صغر الجسم أو الجذع الشاذ بالنسبة للرأس والأطراف.

**nanomelia** صِفَرُ الْأَطْرَاف؛ قَزَامَةُ الْأَطْرَاف. صغر الأطراف الشاذ.

**nanosoma (= nanism = dwarfism)** قَزَامَةٌ.

**nanosomia** قَزَامَةٌ.

**naranol hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد الفارانول. دواء مهدئ.

**narcism (= narcissism)** النُرْجِسِيَّة. حب الذات، ففي النرجسية الأولية عند الأطفال لا يفرق الطفل بين ذاته وبين العالم الخارجي ويعتقد أن كل مصادر اللذة كائنة في ذاته، أما في النرجسية الثانوية عندما ينضج المرء فإنه يوجه كل رغباته وحبه نحو ذاته حتى أنه قد يستمني أمام المرأة.

**narcissistic** نَرْجِسِي. منسوب للنرجسية أو مصاب بها.

**narcoanalysis** تَحْلِيلُ تَخْدِيرِي. تحليل نفسي بحقن المخدر إلى المريض بغرض تشجيعه على الإفصاح عن رغباته وأفكاره المكبوتة.

**narcohypnia** تَنْهَلُ الاستيقاظ. تنمل يشعر به الشخص عند الاستيقاظ من النوم.

**narcohypnosis** تَنْوِيمٌ تَخْدِيرِي. إحياء تنويمي للشخص عندما يكون تحت تأثير أحد المخدرات.

**narcolepsy** سَبَحٌ؛ تَغْفِيقٌ؛ نَوْمٌ إِنْتِيَابِي. نوبات نومية قصيرة ومعاودة لا يمكن مقاومتها وعادة ما تترافق مع هلوسات منومة أو مع الجمدة أو الشلل النومي.

**1. نَوْمِي إِنْتِيَابِي؛ مُتَغَفِّق**  
**2. مُنَوْمٌ إِنْتِيَابِي.** 3. مَسْبُوح. 1. منسوب للنوم الانتيابي 2. عامل أو دواء يولد نوما انتيابيا 3. مصاب بالنوم الانتيابي.

**narcoma** سُبَات تَخْدِيرِي. حالة زهول تولدها المخدرات.

**narcose** ذَاهِل. شخص في حالة زهول.

**narcosis** تَخْدُرٌ؛ تَخْدِير. حالة خمود لا نوعي وعكوس لوظائف الجهاز العصبي المركزي تتصف بالذهول أو عدم الحساسية وتولدها العقاقير المخدرة.

**- basal n. (= basis n.)** تَخْدِيرٌ قَاعِدِي. تخدير يتصف بفقدان الوعي التام والنسابة والتسكين.

**- insufflation n. (= insufflation anesthesia)** تَنْبِيحٌ نَفْجِي.

**- intravenous n. (= phlebonarcosis)** تَخْدِيرٌ وَرِيدِي.

**- medullary n.** تَخْدِيرٌ نَخَاعِي. تخدير يولد بحقن المخدر الموضعي إلى الحيز النخاعي تحت العنكبوتي.

**- Nussbaum's n.** تَخْدِيرٌ نُوسْبَاوَم. تخدير يولد

باستعمال الإيثر أو الكلوروفورم بعد حقن المورفين.  
**narcostimulant** مُخَدِّرٌ مُنَبِّهٌ. مادة لها تأثير تخديري وآخر تنبیهي.

1. مُخَدِّرٌ 2. تَخْدِيرِي. 1. مادة تولد التخدير 2. مادة تولد انعدام الحس أو الذهول.

1. تَخَدَّر 2. إِذْمَانُ الْمُخَدَّرَاتِ. **narcotism** خَدْرٌ. وضع الشخص تحت تأثير أحد المخدرات.

مختران. فتحتا الأنف **nares (= nostrils)** الخارجيتان.

مَنْخَرٌ. إحدى فتحتي الأنف الخارجيتين. **naris** المَنْخَرُ الأمامي. - anterior n. (= external n.) أحد المنخرين الخارجيين.

المَنْخَرُ الغائر؛ **- internal n. (= cavum nasi)** جوف الأنف. فتحة تجويف الأنف نحو البلعوم.

المَنْخَرُ الخَلْفِي. **- posterior n. (= choana)** الفتحة بين تجويف الأنف والبلعوم الأنفي (الخيشوم).

أَنْفِيٌّ. متعلق بالأنف. **nasal**

فَرْطُ **natremia (= hypernatremia)** صُودِيُومُ الدَّمِ. ارتفاع نسبة الصوديوم بالدم.

طَبِيعِيٌّ. ما هو ليس بالصنعي ولا بالمرضي. **natural**

غَثَيَانٌ. إحساس مزعج غير مريح يحس **nausea** في الشرسوف أو البطن وغالباً ما يؤدي إلى التقيؤ. غَثَيَانُ الحَمَلِ. الغثيان الصباحي **- n. gravidarum** أثناء فترة الحمل.

غَثَيَانِيٌّ. عامل يولد الغثيان. **nauseant**

السُّرَّةُ. **navel (= umbilicus)**

رُؤُوفِيٌّ. ما يشبه الزورق في شكله. **navicular**

رَقَبَةٌ؛ عُقُقٌ. جزء ضيق من الجسم أو العضو مثل الرقبة التي توصل الرأس بالجزع أو عنق الرحم وهو قسمه الضيق السفلي.

**necrencephalus (= encephalomalacia)** نَحْرُ الدِّمَاغِ؛ تَلَكُّنُ الدِّمَاغِ. تلين الدماغ المرضي.

هَوَسُ الأَمْوَاتِ. الانشغال **necromania** المرضي بأجسام الاموات.

تَوَهُمُ المَوْتِ. توهم المصاب **necromimesis** بأنه ميت أو يتصنع الموت.

مُجَامَعَةُ المَيِّتِ. الانجذاب **necrophilia** الجنسي الشاذ أو الاتصال الجنسي بالميت.

مُجَامَعَةُ **necrophilism (= necrophilia)** المَيِّتِ.

مُجَامَعَةُ **necrophily (= necrophilia)** المَيِّتِ.

رُهَابُ المَيِّتِ؛ رُهَابُ المَوْتِ. **necrophobia** الخوف المرضي من الميت أو من الموت.

سَادِيَةُ المَوْتِ. جِدْعٌ وتمزيق **necrosadism** جسم الميت إشباعاً للرغبة الجنسية.

نَحْرٌ. التغيرات المورفولوجية التي تحدث للأجسام أو الأنسجة الميتة. **necrosis**

انعدام الأوعية. النخر الذي يتولد **- avascular n.** عن نقص في تجهيز الدم للعضو أو لبعض أنسجته.

النَّخَرُ القَشْرِيُّ المَخِّي. **- cerebrocortical n.** نخر قشرة المخ في الأبقار والأغنام بسبب عوز الأكسجين أو استهلاك الثيامين الشاذ ويتصف بالاختلاج والهياج والرنح وهو مرض مميت.

بالاختلاج والهياج والرنح وهو مرض مميت.

**neencephalon (= neoencephalon)** الدِّمَاغُ الحَدِيثُ.

المُعَانَدَةُ. مقاومة المريض ورفضه **negativism** لاية إرشادات أو اقتراحات أو أوامر تقدم له كما يحدث في الفصام الجامودي.

المُخَيِّخُ الحَدِيثُ. اسم **neocerebellum** أطلق أصلاً للدلالة على نصفي كرة المخيخ أما الآن فإنه يطلق على الأقسام التي تستلم اليافا بصورة رئيسية من السبيل القشري الجسري المخيخي وتشمل الفص الذنبي بدون الهرم واللاهة وهي الأقسام التي تسيطر على تنسيق الحركات الحذقة التي تبدأ إشاراتهما من قشرة المخ.

القَشْرَةُ الحَدِيثَةُ. القسم الجديد **neocortex** ذو الطبقات المنظمة الست من قشرة المخ التي تمثل أحدث أقسامه في كل مراحل تطوره.

**neencephalon (= neoencephalon)** الدِّمَاغُ الحَدِيثُ. قشرة المخ وأقسامه الأخرى المرتبطة بها وهي أحدث أقسام الدماغ في مراحل تطوره.

**neokinetic** الحَرَكيَّةُ الحَدِيثَةُ. اسم يطلق على الآلية الحركية العصبية التي تسيطر على الحركات الإرادية في الجسم وهي مرتبطة بالباحات الحركية للمخ وتسمى بالحركية الحديثة لأنها تطورت عند تطور الباحات الحركية الحديثة.

**neoplasm** وَرَمٌ. نمو جديد شاذ وخاصة ورم الأنسجة المتترقي الذي لا يمكن السيطرة عليه، وتتميز الأورام الخبيثة عن الحميدة بكونها أسرع نمواً وأكثر انتشاراً وتظهر درجة أكبر من الكشم.

**neostigmine** نِيُوسْتِكْمِين. عامل مضاد للكولينستيراز يستعمل لعلاج أعراض الوهن العضلي الوبيل ولمعالجة الركود والوحي العضلي في الجهازين الهضمي والبولي بعد العمليات والوقاية منهما.

**neostriatum** الجِسْمُ الْمُخَطَّطُ الحَدِيثُ. القسم الأحدث تطوراً في الجسم المخطط الذي يشمل النواة المذنبة وقشرة النواة العنسية.

**neothalamus** المِهَادُ الحَدِيثُ. القسم

الأحدث تطوراً في المهاد وهو القسم المرتبط مع القشرة الجديدة للمخ.

**nephralgia** أَلَمُ الكُلْوَةِ. ألم في الكلية.

**nerval (= neural)** عَصَبِي.

**nerve** عَصَب. (ج: أعصاب). بنية حبلية الشكل مكونة من مجموعة من الألياف العصبية تنقل الدفعات العصبية بين أقسام الجهاز العصبي المركزي والأقسام الأخرى من الجسم.


- **accelerator n's.** أعصاب مُسرَّعة. الأعصاب القلبية الودية التي تسرع القلب.

- **afferent n.** عَصَبٌ وَّارِد. عصب ينقل الدفعات العصبية من أطراف الجسم نحو الجهاز العصبي المركزي مثل الأعصاب الحسية.

- **centrifugal n. (efferent n.)** عَصَبٌ صَّائِر.

- **centripetal n. (= afferent n.)** عَصَبٌ وَّارِد.


- **cerebral n's. (= cranial n's.)** الأعصاب الدماغية؛ الأعصاب القحفية.



nerve

مقطع عرضي للعصب وهو يحوي اليفافاً عصبية مغمدة وغير مغمدة.

- نقل النبضات العصبية من أعضاء الحس نحو النخاع الشوكي والدماغ.
- الأغصَابُ الجَسَوِيَّةُ. الأعصاب - somatic n's.** الحسية والحركية التي تغذي العضلات الهيكلية والأنسجة الجسدية.
- الأغصَابُ النُّخَاعِيَّةُ. الأعصاب التي - spinal n's.** تنبع من النخاع الشوكي وهي واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب.
- الأغصَابُ الحَشَوِيَّةُ. الأعصاب - splanchnic n's.** التي تغذي الأوعية الدموية والأحشاء خصوصاً الأعصاب الصدرية والبطنية والحوضية للجهاز العصبي الودي.
- الأغصَابُ العَرَقِيَّةُ. الأعصاب - sudomotor n's.** التي تغذي الغدد العرقية.
- العَصَبُ الوُدِّي. 1. الجذع الودي - sympathetic n.** 2. أحد أعصاب الجهاز العصبي الودي.
- عَصَبٌ لا مِيَالِينِي. عصب غير - unmyelinated n.** محاط بغمد مِيَالِينِي.
- أَغصَابٌ وَعَائِيَّةُ. الأعصاب التي - vascular n's.** تغذي الفللة البرانية للأوعية الدموية.
- عَصَبٌ مُضَيِّقُ الأَوْعِيَّةِ. - vasoconstrictor n.** عصب يؤدي تنبيهه إلى تضيق الأوعية الدموية.
- عَصَبٌ مُوسِّعُ الأَوْعِيَّةِ. عصب - vasodilator n.** يؤدي تنبيهه إلى توسيع الأوعية الدموية.
- عَصَبٌ مُحَرِّكُ الأَوْعِيَّةِ. أحد - vasomotor n.** الأعصاب التي تنظم سعة الوعاء سواء أكان عصباً موسعاً أو مضيقاً له.
- عَصَبٌ جِسْمِي وَعَائِي. عصب - vasosensory n.** يغذي الأوعية بالياف حسية.
- أَغصَابُ. جمع عصب. nervi**
- حَرَكَةٌ عَصَبِيَّةُ التَّنْبِيهِ. حركة - nervimotion** تتم بتأثير تنبيه عصبي.
- عَصَبِيٌّ عَضَلِي. نسبة إلى - nervimuscular** العصب المغذي للعضلة.
- عَصَبِي. 1. نسبة إلى العصب - nervous** 2. شديد الاستثارة أو مستثار.
- إِنْهَارٌ عَصَبِي. أي نوع - nervous breakdown** من الاضطرابات النفسية التي تؤثر على الفعاليات
- الأغصَابُ الرَقَبِيَّةُ. الأزواج الشامية - cervical n's.** من الأعصاب الشوكية التي تنبع من القسيمات الرقبية للنخاع الشوكي الرقبي.
- الأغصَابُ القَحْفِيَّةُ. الأزواج العصبية - cranial n's.** الإثنا عشر المرتبطة بالدماغ.
- عَصَبٌ جِلْدِي. عصب محيطي - cutaneous n.** مختلط يغذي منطقة جلدية معينة.
- عَصَبٌ صَادِر. عصب ينقل - efferent n.** دفعات عصبية من الجهاز العصبي المركزي نحو الأقسام المحيطية من الجسم كالأعصاب الحركية للعضلات.
- عَصَبٌ مُسْتَثِير؛ عَصَبٌ (= excitator n.) - exciter n.** مُثَبِّه. عصب ينقل دفعات إلى أحد أقسام الجسم تحفز فعاليته.
- عَصَبٌ تَنْبِيهِي مُنْعَكَسِي. عصب - exitoreflex n.** حشوي يولد فعلاً منعكساً.
- عَصَبٌ صَادِر. (= efferent n.) - exodic n.**
- عَصَبٌ مُثَبِّط. عصب ينقل دفعات - inhibitory n.** تثبط فعالية العضو الذي يتصل به.
- عَصَبٌ (= myelinated n.) - medullated n.** مِيَالِينِي.
- عَصَبٌ مُخْتَلَط. عصب يحوي اليافاً - mixed n.** حركية (صادرة) واليافاً حسية (واردة).
- عَصَبٌ حَرَكِي. عصب محيطي صادر - motor n.** ينقل دفعات حركية للعضلة.
- عَصَبٌ مِيَالِينِي. عصب (خاصة - myelinated n.** أحد الأعصاب المحيطية) يحوي اليافاً (محاور) مغطاة بغلاف نخاعيني يلف بدوره بغمد الليف العصبي.
- (= unmyelinated n.) - nonmedullated n.** عَصَبٌ لا مِيَالِينِي.
- عَصَبٌ لا وُدِّي. أحد - parasympathetic n.** أعصاب الجهاز العصبي اللاودي.
- عَصَبٌ مُحِيطِي. أي من الأعصاب - peripheral n.** خارج الجهاز العصبي المركزي.
- (= nervus ischiadicus) - sciatic n.** العَصَبُ الْوَرَكِي.
- عَصَبٌ جِسْمِي. عصب محيطي وارد - sensory n.**



nerve, sciatic

منظر جانبي وخلفي للعصب الوركي وبعض فروع.

الطبيعية الاعتيادية للشخص والتي تظهر عادة بصورة مفاجئة.

**nervousness** عَصَبِيَّة. استثارة مفرطة مع عدم الاستقرار الفكري أو الجسدي.

**nervus (= nerve)** عَصَب. (ج. أعصاب).

- **n. abducens (= abducens nerve)**

العَصَبُ المُبْعِد. وهو العصب القحفي السادس ينبع من نواة في الجسر تحت قاع البطين الرابع ويخرج من الجهة الامامية لجذع الدماغ بين الجسر والبصلة ويغذي العضلة المستقيمة الوحشية للعين بالياف حركية.

- **n. accessorius (= accessory nerve)**

العَصَبُ الإِضَافِي. العصب القحفي الحادي عشر ينبع بجذور قحفية من جانب النخاع المستطيل (البصلة) وجذور نخاعية من جانب النخاع (من القسيمات العنقية العلوية الثلاث أو أكثر) ثم تتحد الجذور لتولد جذع العصب الذي ينقسم إلى فرعين داخلي وخارجي، ويتوزع فرعه الداخلي مع المبهم إلى الحنك والبلعوم والحنجرة والأحشاء الصدرية ويتوزع فرعه الخارجي إلى العضلتين القصية الترقوية الحشائية وشبه المنحرفة وبذا فهو عصب لا ودي وحركي.

- **n. acusticus (= n. vestibulochlearis)** العَصَبُ السَّمْعِي. العصب الدهليزي القوقعي.

- **n. alveolaris inferior (= inferior alveolar nerve)** العَصَبُ السِّنْجِي السُّفْلِي. فرع من العَصَبِ الفكي السفلي ويتفرع إلى الأعصاب الفكي اللامي والسني السفلي والذقني واللثوي السفلي وهو عصب حركي وحسي عام.

- **nervi alveolares superiores (= superior alveolar nerves)** الأَعْصَابُ السِّنْجِيَّةُ العُلْوِيَّة. اسم عام للفروع السنية التي تتفرع من العصبين الفكي العلوي وتحت الحجاجي.

- **n. ampullaris anterior (= anterior ampullar nerve)** العَصَبُ الأَمْبُولِي الأَمَامِي. فرع من العصب الدهليزي الذي يغذي أمبولة القناة الهلالية الامامية وينتهي عند الخلايا الشعرية لعرف الأمبولة.

- **n. ampullaris inferior (= n. ampullaris posterior)** العَصَبُ الأَمْبُولِي السُّفْلِي.

- **n. ampullaris lateralis (= lateral ampullar nerve)** العَصَبُ الأَمْبُولِي الوَحْشِي. فرع العصب الدهليزي الذي يغذي أمبولة القناة الهلالية الوحشية وينتهي عند الخلايا الشعرية لعرف الأمبولة.

- **n. ampullaris posterior (= posterior ampullar nerve)** العَصَبُ الأَمْبُولِي الخَلْفِي. فرع العصب الدهليزي الذي يغذي أمبولة القناة الهلالية الخلفية وينتهي عند الخلايا الشعرية لعرف الأمبولة.

- **n. ampullaris superior (= n. ampullaris anterior)** العَصَبُ الأَمْبُولِي العُلْوِي.

- **nervi analis inferiores (= nervi rectalis inferiores)** الأَعْصَابُ الشَّرْجِيَّةُ السُّفْلِيَّة.

- **nervi anococcygei (= anococcygeal nerves)** الأَعْصَابُ الشَّرْجِيَّةُ العُضْصِيَّة. أعصاب تنبع من الضفيرة العصبية وتتوزع إلى المفصل العجزي العصعصي والعصعص والجلد الذي يغطيه وهو عصب حسي.

- **n. articularis (= articular nerve)** عَصَبُ مَفْصَلِي. عصب محيطي مختلط يغذي المفصل والبنيات والأنسجة المتعلقة به.

- **nervi auriculares anteriores (= anterior auricular nerves)** الأَعْصَابُ الأُذْنِيَّةُ الأَمَامِيَّة. أعصاب تنبع من العصب الأذني الصدغي وتتوزع إلى القسم الامامي العلوي للأذن وهي أعصاب حسية عامة.

- **n. auricularis magnus (= great auricular nerve)** العَصَبُ الأُذْنِي الكَبِير. عصب ينبع من الضفيرة الرقبية (الرقبيتين 2 و 3) ويتفرع إلى الفرعين الامامي والخلفي ويتوزع إلى الجلد الذي يغطي الغدة التلفية والناثئ الخشائي وسطح الأذن وهو عصب حسي.

- **n. auricularis posterior (= posterior auricular nerve)** العَصَبُ الأُذْنِي الخَلْفِي. عصب يتفرع من العصب الوجهي ويتفرع إلى الفرع

القذالي الذي يغذي العضلتين الأذنية الخلفية والقذالية الجبهية والجلد الذي يغطي الصماخ السمعي الظاهر وهو عصب حركي حسي.

#### - n. auriculotemporalis

(= auriculotemporal nerve) **العَصَبُ الأذني**  
الصُدْغِيّ. عصب ينبع بجذرين من العصب الفكي السفلي يتفرع إلى العصب الأذني الأمامي وعصب الصماخ السمعي الظاهر والفروع النكفية وفرع غشاء الطبل والفروع المتواصلة مع العصب الوجهي، وتنتهي فروعه الانتهازية بالفروع الصغدية السطحية لفروة الرأس ويتوزع العصب حسب توزيع فروعه وهو عصب حسي.

#### - n. axillaris (= axillary nerve) **العَصَبُ الإِبطِيّ.**

ينبع من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية ويتفرع إلى العصب العضدي الجلدي العلوي الوحشي والفروع العضلية ويتوزع إلى العضلتين الدالية والمدورة الصغيرة والجلد فوق ظهر الذراع وهو عصب حسي عام.

#### - n. buccalis (= buccal nerve) **عصب المبوقة:**

**العَصَبُ الشَّدَقِيّ.** عصب يتأصل من العصب الفكي السفلي ويتوزع إلى جلد الخد وغشائه المخاطي وإلى اللثة ولربما إلى السنين الرحويين الأول والثاني والأسنان الضواحك وهو عصب حسي عام.

#### - n. buccinatorius (= n. buccalis) **العَصَبُ الشَّدَقِيّ.**

- n. canalis pterygoidei (= nerve of pterygoid canal) **عَصَبُ القَنَاةِ الجَنَاحِيَّةِ.**  
عصب يتأصل من اتحاد العصبين الصخريين العميق والكبير ويتوزع إلى العقدة الجناحية الحنكية وفروعها وهو عصب ودي ولا ودي.

#### - n. cardiacus cervicalis inferior (= inferior cervical cardiac nerve)

**العَصَبُ الرِّقَبِيّ القَلْبِيّ السُّفْلِيّ.** عصب يتأصل من العقدة الرقبية الصدرية ويتوزع خلال الضفيرة القلبية إلى القلب وهو عصب ودي مسرع للقلب وعصبي حسي حشوي وارد (لحس الالم بصورة خاصة).

- n. cardiacus cervicalis medius (= middle cervical cardiac nerve) **العَصَبُ الرِّقَبِيّ القَلْبِيّ الوُسْطَى.** عصب يتأصل من العقدة الرقبية الوسطى ويتوزع إلى القلب وهو عصب ودي

ومسرع للقلب وحسي حشوي وارد (خصوصاً لحس الالم).

#### - n. cardiacus cervicalis superior (= superior cervical cardiac nerve)

**العَصَبُ الرِّقَبِيّ القَلْبِيّ العُلْوِيّ.** عصب ينبع من العقدة الرقبية العلوية ويتوزع إلى القلب وهو عصب ودي مسرع للقلب.

- n. nervi cardiaci thoracici (= thoracic cardiac nerves) **الأعصاب القَلْبِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ.**  
أعصاب تتأصل من العقد 2-4 أو 5 الصدرية للجذع الودي وتتوزع إلى القلب وهي أعصاب ودية مسرعة للقلب وحسية حشوية (خصوصاً لحس الالم).

- n. nervi caroticotympanici (= caroticotympanic nerves) **الأعصاب السَّبَاتِيَّةُ الطَّبَلِيَّةُ.**  
أعصاب تتأصل من الضفيرة السباتية الباطنة وتكون مع العصب الطبلي الضفيرة الطبلية وتتوزع إلى منطقتي الطبل والغدة النكفية وهي أعصاب ودية.

- n. nervi carotici externi (= external carotid nerves) **الأعصاب السَّبَاتِيَّةُ الظَّاهِرَةُ.**  
أعصاب تتأصل من العقدة الرقبية العلوية وتتوزع إلى الأوعية الدموية والغدد القحفية خلال الضفيرة السباتية الظاهرة وهي أعصاب ودية.

- n. nervi carotici interni (= internal carotid nerve) **العَصَبُ السَّبَاتِيّ البَاطِن.** عصب يتأصل من العقدة الرقبية العلوية ويتوزع إلى الأوعية الدموية والغدد القحفية خلال الضفيرة السباتية الباطنة وهو عصب ودي.

- n. nervi cavernosi clitoridis (= cavernous nerves of clitoris) **الأعصاب الكَهْفِيَّةُ البَطْرِيَّةُ.** أعصاب تتأصل من الضفيرة الرحمية المهبلية وتتوزع إلى الأنسجة الناعطة للبظر وهي أعصاب ودية ولا ودية وحشوية واردة.

- n. nervi cavernosi penis (= cavernous nerves of penis) **الأعصاب الكَهْفِيَّةُ القَضِيَّةُ.** أعصاب تتأصل من الضفيرة البروستاتية وتتوزع إلى الأنسجة الناعطة للخصيب وهي أعصاب ودية ولا ودية وحشوية واردة.

- **nervi cerebrales (= nervi cranialis)**  
الأعصاب الدماغية: الأعصاب القحفية.
- **nervi cervicales (= cervical nerves)**  
الأعصاب الرقبية. الأزواج الثمانية التي تتبع من قسيمات النخاع الشوكي الرقبية وتترك العمود الفقري (ما عدا الزوج الأخير) فوق مستوى الفقرة المناسبة له وتتحد الفروع الأمامية للأعصاب الأربعة العلوية لتكون الضفيرة الرقبية كما تتحد الفروع الأمامية للأعصاب الأربعة السفلية مع الفرع البطني للصدرية الأولى لتكون معظم الضفيرة العنقية.
- **nervi ciliares breves (= short ciliary nerves)**  
الأعصاب الهدبية القصيرة. أعصاب تتصل من العقدة الهدبية وتتوزع إلى العضلات الملصقة للعين وإلى غلاتها وهي أعصاب ودية ولا ودية وحسية عامة.
- **nervi ciliares longi (= long ciliary nerves)**  
الأعصاب الهدبية الطويلة. أعصاب تتصل من العصبين الأنفي الهدبي والعيني وتتوزع إلى العصب موسع الحدقة والقرنية والعينية وهو عصب ودي وحسي عام.
- **nervi clunium inferiores (= inferior clunial nerves)**  
الأعصاب الألوية السفلية. أعصاب تتصل من العصب الجلدي الفخذي الخلفي وتتوزع إلى المنطقة السفلية للألية وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi clunium medii (= middle clunial nerves)**  
الأعصاب الألوية الوسطية. أعصاب تتصل من الضفيرة المكونة من الفروع الوحشية للفروع الظهرية للأعصاب العجزية الأربعة الأولى خلف العجز والعصعص وتتوزع إلى الأوتار العجزية والجلد فوق القسم الخلفي للألية وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi clunium superiores (= superior clunial nerves)**  
الأعصاب الألوية العلوية. أعصاب تتصل من الفروع الوحشية للفروع الظهرية للأعصاب القطنية العلوية وتتوزع إلى جلد المنطقة العلوية للألية وهي أعصاب حسية عامة.
- **n. coccygeus (= coccygeal nerve)**  
العصب العُصْفَصِي. أحد العصبين اللذين ينبعان من القسم العصعصي للحبل الشوكي.
- **n. cochleae (= pars cochlearis nervi vestibulocochlearis)**  
العصب القَوَقَعِي. الجزء القوقعي من العصب الدهليزي القوقعي.
- **n. cochlearis (= cochlear nerve)**  
العصب القَوَقَعِي. قسم العصب الدهليزي القوقعي المختص بالسمع ويتكون من ألياف تتبع من الخلايا شائبة القطبين في العقدة الحلزونية والتي توجد مستقبلاتها في العضو الحلزوني.
- **nervi craniales (= cranial nerves)**  
الأعصاب القحفية. الأعصاب الإثنا عشر المرتبطة بالدماغ مباشرة.
- **n. cutaneus antebrachii lateralis (= lateral cutaneous nerve of forearm)**  
العصب الجلدي الوُخْشِيِّ لِلسَّاعِد. هو امتداد للعصب العضلي الجذبي ويتوزع للجلد على الجهة الكعبرية للساعد وأحياناً لمنطقة في جلد ظهر اليد وهو عصب حسي عام.
- **n. cutaneus antebrachii medialis (= medial cutaneous nerve of forearm)**  
العصب الجلدي الْإِنْسِيِّ لِلسَّاعِد. وهو الحبل الإنسي للضفيرة العنقية (الرقبي 8 والصدرى 1) ويتفرع إلى الفرعين الأمامي والزندى ويتوزع إلى النواحي الأمامية والإنسية والظهرية الإنسية للساعد وهو عصب حسي عام.
- **n. cutaneus antebrachii posterior (= posterior cutaneous nerve of forearm)**  
العصب الجلدي الْخَلْفِيِّ لِلسَّاعِد. عصب يتصل من العصب الكعبري ويتوزع إلى المناطق الجلدية الظهرية للساعد وهو عصب حسي عام.
- **n. cutaneus antibrachii dorsalis (= n. cutaneus antebrachii posterior)**  
العصب الجلدي الْخَلْفِيِّ لِلسَّاعِد.
- **n. cutaneus brachii lateralis inferior (= inferior lateral cutaneous nerve of arm)**  
العصب الجلدي السُّفْلِي الْوُخْشِيِّ لِلْعَضِد. عصب يتصل من العصب الكعبري ويتوزع إلى جلد المنطقة السفلية من العضد وهو عصب حسي عام.



- **n. cutaneus brachii lateralis superior**  
(= superior lateral cutaneous nerve of arm)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْغُلَوِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلْعَضُدِ. عصب يتأصل من العصب الإبطي ويتوزع إلى جلد ظهر العضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus brachii medialis**  
(= medial cutaneous nerve of arm)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْإِنْسِيُّ لِلْعَضُدِ. عصب ينبع من الحبل الإنسي للضفيرة العضدية (العضدية 1) ويتوزع إلى جلد المنطقتين الوحشية والظهرية للعضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus brachii posterior**  
(= posterior cutaneous nerve of arm)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْخَلْفِيُّ لِلْعَضُدِ. عصب ينبع من العصب الكعبري في الإبط ويتوزع إلى جلد ظهر العضد وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus colli (= n. transversus colli)**  
العَصَبُ الْمُسْتَقْرِضُ لِلرَّقَبَةِ.

- **n. cutaneus dorsalis intermedius**  
(= intermediate dorsal cutaneous nerve)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الظَّهْرِيُّ الْمُتَوَسِّطُ. عصب ينبع من العصب الشظوي السطحي ويتفرع إلى الأعصاب الإصبعية الظهرية للقدم ويتوزع إلى جلد المنطقة الأمامية للثلث السفلي من الساق وظهر القدم ومفاصل المناطق المتجاورة بين أصابع القدم الثالث والرابع وبين الرابع والخامس وهي أعصاب حسية عامة.

- **n. cutaneus dorsalis lateralis**  
(= lateral dorsal cutaneous nerve)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الظَّهْرِيُّ الْوَحْشِيُّ. وهو امتداد للعصب الربلي ويتوزع إلى جلد ومفاصل الجهة الوحشية من القدم وإصبع القدم الخامس وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus dorsalis medialis**  
(= medial dorsal cutaneous nerve)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الظَّهْرِيُّ الْإِنْسِيُّ. عصب يتأصل من العصب الشظوي السطحي ويتوزع إلى جلد ومفاصل الجهة الإنسية من القدم وإبهامه وللجوانب المتجاورة من الإصبعين الثاني والثالث وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus femoris lateralis (= lateral cutaneous nerve of thigh)**  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْفَخْذِيُّ الْوَحْشِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة القطنية

(القطنيين 2 و 3) ويتوزع إلى جلد المنطقتين الوحشية والأمامية للفخذ وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus femoris posterior**  
(= posterior cutaneous nerve of thigh)  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْفَخْذِيُّ الْخَلْفِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (العجزى 1-3) ويتفرع إلى العصب الأولي السفلي والفروع العجانية ويتوزع إلى جلد الألية والأعضاء التناسلية الخارجية وظهر الفخذ والربلة وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus surae lateralis (= lateral cutaneous nerve of calf)**  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْوَحْشِيُّ لِلرَّبْلَةِ. عصب يتأصل من العصب الشظوي الأصيل ويتوزع إلى جلد المنطقة الوحشية لظهر الساق وتادراً ما يستمر مكوناً العصب الربلي وهو عصب حسي عام.

- **n. cutaneus surae medialis (= medial cutaneous nerve of calf)**  
العَصَبُ الْجُلْدِيُّ الْإِنْسِيُّ لِلرَّبْلَةِ. عصب يتأصل من العصب الظنبوبي وعادة ما يتصل بالفرع الشظوي الموصل للعصب الشظوي الأصيل ليكونا العصب الربلي أو قد يستمر كالعصب الربلي وهو عصب حسي عام.

- **nervi digitales dorsales hallucis lateralis et digiti secundi medialis (= dorsal digital nerves of lateral surface of great toe and medial surface of second toe)**  
الأعصابُ الظَّهْرِيَّةُ الْأَبْخَسِيَّةُ لِلْسَّطْحِ الْوَحْشِيِّ لِإِبْهَامِ الْقَدَمِ وَالسَّطْحِ الْإِنْسِيِّ لِإَصْبَعِ الْقَدَمِ. أعصاب تتأصل من القسم الانتهائي الإنسي من العصب الشظوي العميق وتتوزع إلى جلد ومفاصل الجهات المتجاورة من الأبخسين الكبير والثاني وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi digitales dorsales nervi radialis (= dorsal digital nerves of radial nerve)**  
الأعصابُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِصْبَعِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْكُعْبَرِيِّ. أعصاب تتأصل من الأعصاب السطحية للعصب الكعبري وتتوزع لمفاصل وجلد ظهر الإبهام والسبابة وجزء من الوسطى حتى السلامة القصوية وهي أعصاب حسية.

- **nervi digitales dorsales nervi ulnaris (= dorsal digital nerves of ulnar nerve)**  
الأعصابُ الظَّهْرِيَّةُ الْعَصَبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّنْدِيِّ. أعصاب

تتأصل من الفرع الظهري للعصب الزندي وتتوزع إلى مفاصل وجلد الجهة الإنسية للخنصر والمناطق الظهريّة للجهات المتجاورة للخنصر والبنصر وهي أعصاب حسية.

**- nervi digitales dorsales pedis**

الأغصَابُ (= dorsal digital nerves of foot) الظَّهْرِيَّةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ. أعصاب تتأصل من العصب الجليدي الظهري المتوسط وتتوزع إلى مفاصل وجلد المناطق المتجاورة بين أصابع القدم الثالث والرابع وبين الرابع والخامس وهي أعصاب حسية عامة.

**- nervi digitales palmares communes**

nervi mediani (= common palmar digital nerves of median nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. وهي أربعة أعصاب تتأصل من الفرعين الإنسي والوحشي للعصب الناصف وتتفرع إلى الأعصاب الراحية الاصبعية وتتوزع إلى الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر وللعضلتين الخراطيتيتين الأوليتين وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

**- nervi digitales palmares communes**

nervi ulnaris (= common palmar digital nerves of ulnar nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. وهما عصبان يتأصلان من الفرع السطحي للعصب الزندي ويتفرعان إلى الأعصاب الراحية الاصبعية ويتوزعان إلى الخنصر والبنصر وهما عصبان حسيان.

**- nervi digitales palmares proprii nervi**

mediani (= proper palmar digital nerves of median nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ المَخْصُوصَةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. أعصاب تتأصل من الأعصاب الراحية الاصبعية الأصلية وتتوزع إلى العضلتين الخراطيتيتين الأوليتين ومفاصل وجلد الوجوه الراحية وجهتي الإبهام والسبابة والوسطى والجهة الكعبرية للبنصر وظهر النواحي القاصية لهذه الأصابع وهي أعصاب حسية عامة وحركية.

**- nervi digitales palmares proprii nervi**

ulnaris (= proper palmar digital nerves of ulnar nerve) الأغصَابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ المَخْصُوصَةُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. أعصاب تتأصل من العصبين الوحشين من الأعصاب الراحية الاصبعية

الأصلية من الفرع السطحي للعصب الزندي وتتوزع إلى مفاصل وجلد الجهتين المتجاورتين للخنصر والبنصر وهي أعصاب حسية عامة.

**- nervi digitales plantares communes**

nervi plantaris lateralis (= common plantar digital nerves of lateral plantar nerve) الأغصَابُ الأَخْمَصِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الْوَحْشِيِّ. وهما عصبان يتأصلان من الفرع السطحي للعصب الأخمصي الوحشي ويتفرعان إلى عصبين أخمصيين لأصابع القدم خاصين ويتوزع العصب الوحشي منهما إلى العضلة القصيرة المثنية لأصابع القدم وإلى مفاصل وجلد الأخمص والأبخرس الصغير ويتوزع العصب الإنسي منهما إلى الجهتين المتجاورتين بين إصبعي القدم الرابع والخامس وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

**- nervi digitales plantares communes**

nervi plantaris medialis (= common plantar digital nerves of medial plantar nerve) الأغصَابُ الأَخْمَصِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الْإِنْسِيِّ. وهي أربعة أعصاب تتأصل من العصب الأخمصي الإنسي وتتفرع إلى العصبين العضلي والعصب الأخمصي لأصابع القدم الخاص وتتوزع إلى العضلتين المثنية لإبهام القدم القصيرة والخراطينية الأولى وإلى مفاصل وجلد الجهة الإنسية للقدم وإبهام القدم والمناطق المتجاورة بين أصابع القدم الأول والثاني وبين الثاني والثالث وبين الثالث والرابع وهي أعصاب حركية وحسية.

**- nervi digitales plantares proprii nervi**

plantaris lateralis (= proper plantar digital nerves of lateral plantar nerve) الأغصَابُ الأَخْمَصِيَّةُ المَخْصُوصَةُ لأَصَابِعِ الْقَدَمِ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الْوَحْشِيِّ. أعصاب تتأصل من الأعصاب الأخمصية لأصابع القدم الأصلية وتتوزع إلى العضلة المثنية لإصبع القدم الصغير وإلى مفاصل وجلد الأخمص وإصبع القدم الصغير والجهتين المتجاورتين بين إصبعي القدم الرابع والخامس وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

**- nervi digitales plantares proprii nervi**

plantaris medialis (= proper plantar digital nerves of medial plantar nerve)

الأغصابُ الأُخفَصِيَّةُ المخصوصة لأصابع القدم  
للغَصَبِ الأُخفَصِيِّ الإنسِي. أعصاب تتأصل من  
الأعصاب الأُخفَصِيَّة لأصابع القدم الأصلية وتتوزع  
إلى مفاصل وجلد الجهة الإنسية لإصبع القدم الصغير  
والجهات المتجاورة بين أصابع القدم الأول والثاني  
وبين الثاني والثالث وبين الثالث والرابع كما تمتد  
الأعصاب إلى ظهر القدم لتغذي فراش الأظافر وذرى  
أصابع القدم وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi digitales volares communes  
nervi mediani (= nervi digitales  
palmares communes nervi mediani)**  
الأغصابُ الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ للغَصَبِ  
النَّاصِفِ.

- **nervi digitales volares communes nervi  
ulnaris (= nervi digitales palmares  
communes nervi ulnaris)** الأغصابُ  
الرَّاحِيَّةُ الإِصْبَعِيَّةُ الأَصْلِيَّةُ للغَصَبِ الرَّنْدِي.

- **nervi digitales volares proprii nervi  
mediani (= nervi digitales palmares  
proprii nervi mediani)** الأغصابُ الرَّاحِيَّةُ  
الإِصْبَعِيَّةُ الخَاصَّةُ للغَصَبِ النَّاصِفِ.

- **nervi digitales volares proprii nervi  
ulnaris (= nervi digitales palmares  
proprii nervi ulnaris)** الأغصابُ الرَّاحِيَّةُ  
الإِصْبَعِيَّةُ الخَاصَّةُ للغَصَبِ الرَّنْدِي.

- **n. dorsalis clitoridis (= dorsal nerve  
of clitoris)** غَصَبُ ظَهْرِ البُظُر. عصب يتأصل من  
العصب الفرجي ويتوزع إلى العضلتين المستعرضة  
العجانبة العميقة ومصرة الإحليل وإلى الجسم الكهفي  
البظري وإلى جلد وقلقة وحشفة البظر وهو عصب  
حركي وحسي عام.

- **n. dorsalis penis (= dorsal nerve of  
penis)** غَصَبُ ظَهْرِ القَضِيْب. عصب يتأصل  
من العصب الفرجي ويتوزع إلى العضلتين  
المستعرضة العجانبة العميقة ومصرة الإحليل والجسم  
الكهفي القضيبى وإلى جلد وقلقة وحشفة القضيب  
وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. dorsalis scapulae (= dorsal nerve  
of scapula)** غَصَبُ ظَهْرِ الكَتِف. عصب يتأصل  
من الضفيرة العضدية (الفرع البطني للرقبي 5)

ويتوزع إلى العضلتين المعينيتين وأحياناً إلى العضلة  
الرافعة للكتف وهو عصب حركي.

- **nervi encephalici (= nervi craniales)**  
الأغصابُ القَحْصِيَّةُ.

- **nervi erigentes (= nervi splanchnici  
pelvini)** الأعصاب المُنعِظَةُ: الأغصابُ الحَشَوِيَّةُ  
الحَوَظِيَّةُ.


- **n. ethmoidalis anterior (= anterior  
ethmoidal nerve)** الغَصَبُ الغَرْبَالِيُّ الأَمَامِي. وهو  
استمرارية العصب الأنفي الهدبي من العصب  
العينى ويتفرع إلى الفروع الظاهر والباطن والإنسي  
والوحشي ويتوزع إلى المخاطية الأمامية والعلوية  
لحاجز الأنف والجدار الوحشي للتجويف الأنفي وجلد  
الجسر السفلي وذروة الأنف وهو عصب حسي عام.

- **n. ethmoidalis posterior (= posterior  
ethmoidal nerve)** الغَصَبُ الغَرْبَالِيُّ الخَلْفِي. يتأصل  
من العصب الأنفي الهدبي من العصب العينى  
ويتوزع إلى مخاطية الخلايا الغربالية الخلفية والجيب  
الوتدي وهو عصب حسي عام.

- **n. facialis (= facial nerve)** الغَصَبُ الوُجْهِي. العصب  
القحفي السابع ويتكون من جذرين حركي  
كبير يغذي عضلات الوجه التعبيرية وجذر أصغر هو  
العصب المتوسطي. يتأصل العصب الوجهي من  
الحافة السفلية للجسر بين الزيتونة والسويقة  
المخيخية السفلية ويتفرع جذره الحركي إلى العصبين  
الركابي والأذني الخلفي والصفيرة النكفية وعصب  
ذات البطنين والصدغي والوجني والشدقي واللساني  
والفكي السفلي الهامشي والفرع الرقبي كما أنه يجهز  
فروعاً موصلة للصفيرة الطبلية وتتوزع هذه الفروع  
لمختلف أقسام الرأس وهو عصب حركي وحسي عام  
وخاص.


- **n. femoralis (= femoral nerve)** الغَصَبُ  
الفَخْذِي. يتأصل من الضفيرة القطنية (القطنيات 2-4)  
ويهبط خلف الرباط الأربى إلى المثلث الفخذي ويتفرع  
إلى العصب الصافن والفروع العضلية والجلدية  
الأمامية ويتوزع إلى جلد الفخذ والساق والعضلات  
الأمامية للفخذ ومفصلي الورك والركبة وهو عصب  
حركي وحسي عام.

- **n. fibularis communis (= common  
fibular nerve)** الغَصَبُ الشَطْوِيُّ الأَصْلِي.



nerve, femoral

أعصاب وعضلات وأوعية الطرف السفلي: (1) الوريد الحرقفي (2) الشريان الحرقفي (3) العصب الفخذي (4) العضلة الحرقفية (5) الشريان الفخذي العميق (6) الشريان الفخذي المنعطف (7) الفرع الصاعد (8) الفرع النازل (9) الفروع العضلية للعصب الفخذي (10) العضلة المستقيمة الفخذية (11) الشريان الثاقب (12) العضلة المتسعة الوحشية (13) الفرع العضلي للعصب الفخذي (14) العضلة المستقيمة الفخذية (15) العضلة المتسعة الإنسية (16) العصب الصافن (17) فرع الشريان الركبي النازل (18) شبكة عروق مفصل الركبة (19) الشريان المابضي (20) الشريان الركبي السفلي (21) الشريان الركبي العلوي (22) العضلة الخياطية (23) فرجة المقربين (24) الشريان الفخذي (25) العضلة المقربة الكبيرة (26) العضلة الناحلة (27) الوريد الفخذي (28) العضلة المقربة الطويلة (29) الفرع الجلدي للعصب السداي (30) الشريان الثاقب (31) العضلة المقربة الطويلة (32) العضلة المقربة القصيرة (33) الوريد الفخذي العميق (34) الوريد الفخذي (35) الشريان السداي (36) العصب السداي (37) الشريان المنعطف الفخذي (38) الوريد الصافن الكبير (39) العصب السداي.



nerve, fibural

أعصاب وشرايين وعضلات الساق اليمنى: (1) الشريان الركبي العلوي الوحشي (2) الشريان الركبي السفلي (3) العصب الشظوي السفلي (4) العضلة الشظوية الطويلة (5) العضلة باسطة الأصابع الطويلة (6) الشريان الظنبوبي الراجع (7) العصب الشظوي العميق (8) العصب الشظوي السطحي (9) العضلة الشظوية الطويلة (10) العضلة باسطة الأصابع الطويلة (11) العصب الشظوي السطحي (12) العضلة الشظوية القصيرة (13) العضلة الباسطة للأصابع الطويلة (14) الفرع الناقب للشريان الشظوي (15) الشبكة الكعبية الوحشية (16) الشريان الكعبي الأمامي الوحشي (17) العضلة باسطة الأصابع القصيرة (18) وتر العضلة الشظوية (19) الشرايين المشطية الظاهرة (20) الأعصاب الإصبعية الظهرية (21) شريان ظهر القدم (22) العصب الشظوي العميق (23) قيد الباسطات السفلي (24) العضلة باسطة الإبهام الطويلة (25) العصب الشظوي العميق (26) العضلة الظنبوبية الأمامية (27) الشريان الظنبوبي الأمامي (28) الرباط الرضفي (29) الشبكة الشريانية الركبية (30) الشريان الركبي العلوي الإنسي.

يتأصل من العصب الوركي في القسم السفلي من الفخذ ويتفرع ويتوزع إلى الرأس القصير للعضلة ذات الرأسين الفخذية ويعطي العصب الربلي الجليدي الوحشي والفرع الشظوي الموصل عند هبوطه في الحفرة الأبخسية ويغذي المفصلين الركبي والظنبوبي الشظوي والعضلة الشظوية الامامية ثم ينقسم إلى العصبين الشظويين السطحي والعميق وهو عصب حركي وحسي عام.

**- n. fibularis profundus (= deep fibular nerve)**  
العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْعَمِيقُ. هو فرع انتهائي للعصب الشظوي الأصلي ويتفرع ويتوزع بالتفاف حول عنق الشظية ويهبط بين الغشاءين العظميين إلى أمام الكاحل ويعطي فروعاً سفلية إلى العضلات الظنبوبية الامامية وباسطة إبهام القدم الطويلة وباسطة الأباخس الطويلة والعضلة الشظوية الثالثة وفرع إلى مفصل الكاحل ويغذي فرعه الانتهائي الوحشي العضلة الباسطة للأباخس القصيرة والمفاصل الرضفية كما يغذي فرعه الانتهائي الإنسي أو الفرع الأبخسي، الذي ينقسم إلى الأعصاب الظهرية الأبخسية، مفاصل وجلد الجهات المتجاورة للأبخسين الكبير والثاني وهو عصبي حركي وحسي عام.

**- n. fibularis superficialis (= superficial fibular nerve)**  
العَصَبُ الشَّظْوِيُّ السُّطْحِي. هو فرع انتهائي للعصب الشظوي الأصلي يتفرع ويغذي ويهبط أمام الشظية ليغذي العضلتين الشظويتين الطويلة والقصيرة وينقسم في الجزء السفلي من الساق إلى الفروع العضلية والعصبين الجلديين الإنسي والمتوسط الظهرية وهو عصب حركي وحسي عام.

**- n. frontalis (= frontal nerve)**  
العَصَبُ الجَبْهِي. يتأصل من العصب العيني وهو فرع من العصب ثلاثي التوائم ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي العلوي ويتفرع إلى العصبين فوق الحجاجي وفوق البكري ويتوزع بصورة رئيسية إلى الجبهة وفروة الرأس وهو عصب حسي عام.

**- n. genitofemoralis (= genitofemoral nerve)**  
العَصَبُ التَّنَاسُلِيُّ الْفَخْذِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة القطنية (القطنيين 1-2) ويتفرع إلى الفرعين التناسلي والفخذي وهو عصب حركي وحسي عام.

**- n. glossopharyngeus (= glossopharyngeal nerve)**  
العَصَبُ اللِّسَانِيُّ الْبَلْعُومِي. العصب القحفي التاسع يتأصل بعدد من الجذيرات من الجانب الوحشي للقسم العلوي من النخاع المستطيل (البصلة) بين الزيتونة والسويق المخيخي السفلي ويتفرع إلى العصب الطبلي والفروع البلعومي والإبري البلعومي واللوزي واللساني وفرع للجيب السباتي وآخر موصل مع الفرع الأذني للعصب المبهم وتوجد فيه عقدتان العلوية والسفلية ويغذي اللسان والبلعوم والغدة النكفية وهو عصب حركي ولا ودي وحسي خاص وحسي حشوي.

**- n. gluteus inferior (= inferior gluteal nerve)**  
العَصَبُ الْأَلْوِي السُّفْلِي. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (القطني 5- العجزي 2) ويتوزع إلى العضلة الألوية الكبرى وهو عصب حركي.

**- n. gluteus superior (= superior gluteal nerve)**  
العَصَبُ الْأَلْوِي الْعُلْوِي. عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (القطني 5- العجزي 1) ويتوزع إلى العضلتين الألويتين الصغرى والوسطى وموترة اللقافة العريضة ومفصل الورك وهو عصب حركي وحسي عام.

**- nervi haemorrhoidales inferioris (= nervi rectales inferiores)**  
العَصَبُ الْمُسْتَقِيمِي السُّفْلِي.

**- nervi haemorrhoidales medii (= branches of middle rectal plexus)**  
فُرُوعُ الضْفِيرَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْوَسْطَى.

**- nervi haemorrhoidales superiores (= branches of the superior rectal plexus)**  
فُرُوعُ الضْفِيرَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْعُلْوَةِ.

**- n. hypogastricus (dexter/ sinister)**  
العَصَبُ الْخَنْثَلِيُّ (الْأَيْمَنُ وَالْأَيْسَرُ). جذع عصبي يقع على الجهتين (اليسرى واليمنى) ويربط الضفيرتين الخنثييتين العليا والسفلى.

**- n. hypoglossus (= hypoglossal nerve)**  
العَصَبُ تَحْتَ اللِّسَانِ. العصب القحفي الثاني عشر يتأصل بجذيرات من التلم الامامي الوحشي بين زيتونة وهمم النخاع المستطيل (البصلة) ويمر إلى اللسان خلال القناة تحت اللسانية ويتفرع

إلى الفروع اللسانية التي تغذي العضلات الإبرية اللسانية وتحت اللسانية والذقنية اللسانية والعضلات الداخلية للسان وهو عصب حركي.

- **n. iliohypogastricus (= Iliohypogastric nerve)** العَصَبُ الحَرْقَفِيُّ الخَلْفِيُّ. يتأصل من الضفيرة القطنية (القطني 1 وأحياناً الصدري 12) ويتفرع إلى الفرعين الجليدين الوحشي والامامي وتتوزع فروعه إلى الجلد فوق العانة وفوق الجبهة الوحشية من الألية وأحياناً إلى العضلة الهرمية وهو عصب حركي حسي عام.

- **n. ilio-inguinalis (= Ilioinguinal nerve)** العَصَبُ الحَرْقَفِيُّ الأُرْبِيُّ. عصب يتأصل من الضفيرة القطنية (القطنية 1 وأحياناً الصدرية 12) ويرافق الحبل المنوي في القناة الأربية ويتفرع إلى الفروع الصغرى الأمامية أو الشفرية ويتوزع إلى جلد الصفن أو الشفر الكبير ومناطق الفخذ المجاورة له وهو عصب حسي عام.

- **n. Infraorbitalis (= infraorbital nerve)** العَصَبُ تَحْتَ الحَجَاج. وهو امتداد للعصب الفكي العلوي ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي السفلي ويحتل الأخدود ثم القناة ثم الثقب تحت الحجاجيات على التوالي ويتفرع إلى الفروع السنخية السفلية والوسطية والعلوية والجفني السفلي والانفيين الظاهر والباطن والشفوي العلوي وهو عصب حسي عام.

- **n. Infratrochlearis (= infratrochlear nerve)** العَصَبُ تَحْتَ البَكْرَةِ. عصب يتأصل من العصب الأنفي الهدبي وهو فرع من العصب العيني ويتفرع إلى الفروع الجفنية ويغذي جلد جذر الأنف وجسره والجفن السفلي والملتحمة والقناة الدمعية وهو عصب حسي عام.

- **nervi intercostales (= rami ventrales nervorum thoracicorum)** الأعصاب الوربية: الفُرُوعُ البَطْنِيَّةُ للأعصاب الصدرية.

- **nervi Intercostobrachiales (= Intercostobrachial nerves)** الأعصاب الوربية العضدية. أعصاب تتأصل من العصبين الوربيين الثاني والثالث وتتوزع على جلد المنطقتين الخلفية والإنسية للعضد وهي أعصاب حسية عامة.

- **n. Intermediifacialis (= n. facialis and n. Intermedius)** العصب المتوسط الوجهي:

العَصَبَانِ الوَجْهِيَّ والمتوسط.

- **n. intermedius (= intermediate n.)**

العَصَبُ المتوسط. الجذر الأصغر للعصب الوجهي يقع بين جذعه الرئيسي وبين العصب الدهليزي القوقعي ويتصل بالجذر الرئيسي للعصب الوجهي أو يندمج في العقدة الركبية عند رُكْبِيَّة العصب الوجهي ويغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية وتحت الفك السفلية وتحت اللسانية والثلاثين الاماميين للسان وهو عصب لا ودي وحسي خاص.

- **n. Interosseus (antebrachii) anterior (= anterior interosseous nerve of forearm)**

العَصَبُ الأَمَامِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ. عصب يتأصل من العصب الناصف ويتوزع إلى العضلات مثنية الابهام الطويلة ومثنية الأصابع العميقة والكابة المربعة وإلى مفاصل المعصم وبين الرسغيات وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. Interosseus antebrachii posterior (= posterior interosseous of forearm)**

العَصَبُ الخَلْفِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ. هو امتداد للفرع العميق للعصب الكعبري ويتوزع إلى العضلات مبعدة الأصابع الطويلة وباسطات الابهام والسبابة والمعصم والمفاصل بين الرسغية وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. Interosseus (antebrachii) dorsalis (= n. Interosseus antebrachii posterior)**

العَصَبُ الخَلْفِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ.

- **n. Interosseus (antebrachii) volaris (= n. Interosseus antebrachii anterior)**

العَصَبُ الأَمَامِيُّ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاعِدِ.

- **n. Interosseus cruris (= interosseous n. of leg)**

العَصَبُ بَيْنَ عَظْمَيْ السَّاق. عصب يتأصل من العصب الظنبوبي ويتوزع إلى الغشاء بين العظمين وإلى المرتبط الظنبوبي الشظوي وهو عصب حسي عام.

- **n. Ischiadicus (= sciatic n.)** العَصَبُ الْوَرَكِيُّ. أكبر أعصاب الجسم ويتأصل من الضفيرة العجزية (القطني 4- العجزي 3) ويترك الحوض خلال الثقب الوركية ويتفرع إلى العصبين الظنبوبي والشظوي الأصلي في الثلث السفلي من الفخذ ليتوزع في الساق وهو عصب حركي وحسي عام.





- **n. jugularis (= jugular nerve)** **العَصَبُ الوَدَاجِيّ**. فرع من العقدة الرقبية العلوية يتصل بالعصبين المبهم واللساني البلعومي.

- **nervi labiales anteriores (= anterior labial nerve)** **الأغصَابُ الشَّفَرِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ**. أعصاب تتأصل من العصب الحرقفي الأربي وتتوزع إلى جلد منطقة الشفر الكبير ومناطق الفخذ المجاورة له وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi labiales posteriores (= posterior labial nerves)** **الأغصَابُ الشَّفَرِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ**. أعصاب تتأصل من العصب الفرجي وتتوزع إلى الشفر الكبير وهي أعصاب حسية عامة.

- **n. lacrimalis (= lacrimal nerve)** **العَصَبُ الدُمُعِيّ**. عصب يتأصل من العصب الدمعي فرع العصب ثلاثي التوائم ويدخل الحجاج من الشق الحجاجي العلوي ويتوزع إلى الغدة الدمعية والملتحمة وصوار العين الوحشي وجلد الجفن العلوي وهو عصب حسي عام.

- **n. laryngalis inferior (= inferior laryngeal nerve)** **العَصَبُ الحَنَجَرِيّ السُّفْلِيّ**. يتأصل من العصب الحنجري الراجع وخصوصاً من قسمه الانتهائي ويتوزع إلى العضلات الداخلية للحنجرة ما عدا العضلة الحلقية الدرقية ثم يتصل بالعصب الحنجري الباطن وهو عصب حسي عام.

- **n. laryngalis recurrens (= recurrent laryngeal nerve)** **العَصَبُ الحَنَجَرِيّ الرَّاجِع**. عصب يتأصل من العصب المبهم (وخصوصاً من القسم القحفي من العصب الإضافي) ويتفرع إلى الأعصاب الحنجري السفلي والرغامي والمرئي والفرع القلبي السفلي ويتوزع إلى الأعضاء التي تغذيها هذه الأعصاب وهو عصب لا ودي وحركي ووارد حشوي.

- **n. laryngalis superior (= superior laryngeal nerve)** **العَصَبُ الحَنَجَرِيّ العُلَوِيّ**. يتأصل من العقدة السفلية للعصب المبهم ويتفرع إلى الفروع الظاهرة والباطنة والموصلة ويتوزع إلى مصرة البلعوم والعضلة الحلقية الدرقية والغشاء المخاطي لظهر اللسان وللحنجرة وهو عصب حركي وحسي عام ووارد حشوي ولا ودي.

- **n. lingualis (= lingual nerve)** **العَصَبُ اللِّسَانِيّ**. عصب يتأصل من العصب الفكي السفلي ويهبط إلى اللسان أولاً على الجهة الإنسية للفك السفلي ومن ثم تحت الغشاء المخاطي للقم ويتفرع إلى العصب تحت اللساني والفرع اللساني وفرع إلى برزخ الحلق وفروع موصلة بالعصب تحت اللساني وبالحبل الطلي وهو عصب حسي عام.

- **nervi lumbales (= lumbar nerves)** **الأغصَابُ القُطَنِيَّةُ**. الأزواج الخمسة من الأعصاب التي تنبع من القسيمات القطنية للنخاع الشوكي ويترك كل زوج منها في نقاط دون مستوى الفقرات المناسبة لها وتشارك الفروع البطنية من هذه الأعصاب في تكوين الضفيرة القطنية العجزية.

- **nervi lumbares (= nervi lumbales)** **الأغصَابُ القُطَنِيَّةُ**.

- **n. lumboinguinalis (= ramus femoralis nervi genitofemoralis)** **العَصَبُ القُطَنِيّ الأُرْبِيّ**: الفرع الفخذي للعصب التناسلي الفخذي.

- **n. mandibularis (= mandibular nerve)** **العَصَبُ الفَكِّيّ السُّفْلِيّ**. أحد الفروع الانتهائية الثلاثة للعصب ثلاثي التوائم والذي يمر من الثقب البيضوي إلى الحفرة تحت الصدغية ويتأصل من عقدة ثلاثي التوائم ويتفرع إلى الفرع السحائي والأعصاب الماضغ والصدغي العميق والجناحين الوحشي والإنسي والأذني الصدغي واللساني والسنخي السفلي ويتوزع إلى عضلات المضغ وجلد الوجه والغشاء المخاطي للقم وللأسنان وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. massetericus (= masseteric nerve)** **العَصَبُ المَاضِغِيّ**. عصب ينبع من العصب الفكي السفلي فرع العصب ثلاثي التوائم ويتوزع إلى العضلة الماضغة والمفصل الصدغي الفكي السفلي وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. masticatoricus (= radix motoria nervi trigemini)** **عصب الماضغة؛ الجَذَرُ الحَرَكِيّ للعَصَبِ الثَّلَاثِيّ التَوَامِ**.

- **n. maxillaris (= maxillary nerve)** **العَصَبُ الفَكِّيّ العُلَوِيّ**. أحد الفروع الانتهائية الثلاثة للعصب ثلاثي التوائم يمر خلال الثقب المدورة ويدخل الحفرة الجناحية الحنكية ويتأصل من عقدة ثلاثي التوائم

ويتفرع إلى الفرع السحائي والعصب الوجني والفرع السنخي الخلفي العلوي والعصبين تحت الحجابي والجناحي الحنكي وإلى فروع العقدة الجناحية الحنكية ويتوزع إلى جلد الوجه والفروة والغشاء المخاطي لجيب الفك العلوي وتجويف الأنف والاسنان وهو عصب حسي عام.

- **n. meatus acusticil externi (= nerve of external acoustic meatus)** عصب الصماخ السمعي الظاهر. عصب يتصل من العصب الأذني الصدغي ويتوزع إلى الجلد المبطن للصماخ السمعي الظاهر وغشاء الطبل، وهو عصب حسي عام.

- **n. medianus (= median nerve)** العَصَبُ النَاصِفُ؛ العَصَبُ الْمُتَوَسِّطُ. عصب يتصل من الحبلين الوحشي والإنسي للضفيرة العصبية (الرقبي 6- الصدري 1) ويتفرع إلى العصب الأمامي بين عظمي الساعد وإلى الأعصاب الإصبعية الراحية الأصلية والفروع العصبية والراحية وفرع موصل مع العصب الزندي ويتوزع إلى جلد الجهة الوحشية الأمامية لليد ومعظم العضلات المثنية في الجزء الأمامي من الساعد ومعظم العضلات القصيرة للإبهام ولمفصل المرفق وللعدد من مفاصل اليد وهو عصب حسي عام.

- **n. meningeus medius (= ramus meningeus medius nervi maxillaris)** فَرْعُ السِّحَائِي الْمُتَوَسِّطُ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلَوِيِّ.

- **n. mentalis (= mental nerve)** العَصَبُ الذَّقْنِي. عصب يتصل من العصب السنخي السفلي ويتفرع إلى الفرعين الذقني والشفوي السفلي ويتوزع إلى جلد الذقن والشفة السفلى وهو عصب حسي عام.

- **n. mixtus (= mixed nerve)** عَصَبٌ مُخْتَلَطٌ. عصب مكون من أعصاب حسية واردة وحركية صادرة.

- **n. motorius (= motor nerve)** عَصَبٌ حَرَكِي. عصب محيطي صادر ينه تقلص العضلات.

- **n. muscull quadrati femoris (= nerve of quadrate muscle of thigh)** عَصَبُ الْعَضَلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ الرَّؤُوسِ الْفَخْذِيَّةِ. عصب يتصل من الفروع البطنية لفروع العصبين التخاعيين القطنيين الرابع والخامس ويتوزع إلى العضلتين التوأمية

السفلية والمربعة الفخذية الأمامية ومفصل الورك وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. musculi tensoris tympani (= nerve of tensor tympani muscle)** عَصَبُ الْمُؤْتَرَةِ لِلطَّبْلِ. عصب يتصل من العصب الفكي السفلي عن طريق عصب العضلة الجناحية الإنسية والعقدة الأذنية ويتوزع إلى العضلة المؤترة للطبل وهو عصب حركي.

- **n. musculi tensoris veli palatini (= nerve of tensor veli palatini muscle)** عَصَبُ الْعَضَلَةِ مُؤْتَرَةِ الْحَقَافِ. عصب يتصل من العصب الفكي السفلي عن طريق عصب العضلة الجناحية الإنسية والعقدة الأذنية ويغذي العضلة المؤترة للحقاف (شراع الحنك) وهو عصب حركي.


- **n. musculocutaneous (= musculo-cutaneous nerve)** العَصَبُ الْعَضَلِيُّ الْجُلْدِي. عصب يتصل من الحبل الوحشي للضفيرة العصبية (الرقبية 5-7) ويتفرع إلى العصب الجليدي الوحشي للساعد والفروع العصبية ويتوزع إلى العضلات الغرابوية العصبية وذات الراسين والعصبية ومفصل المرفق وجلد الجهة الكعبرية للساعد وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. mylohyoideus (= mylohyoid nerve)** العَصَبُ الْفَكِّيُّ اللَّامِي. عصب يتصل من العصب السنخي السفلي ويغذي العضلة الفككية اللامية والبطن الأمامية لذات البطنين وهو عصب حركي.

- **n. nasociliaris (= nasociliary nerve)** العَصَبُ الْأَنْفِيُّ الْهَدْبِي. عصب يتصل من الفرع العيني للعصب ثلاثي التوائم ويتفرع إلى الأعصاب الهدبي الطويل والغرباليين الخلفي والأمامي وتحت البكري وفرع موصل للعقدة الهدبية وهو عصب حسي عام.


- **n. nasopalatinus (= nasopalatine nerve)** العَصَبُ الْأَنْفِيُّ الْحَنَكِي. عصب يتصل من العقدة الجناحية الحنكية ويتوزع إلى مخاطية وغدد الحاجز الأنفي والقسم الأمامي من الحنك الصلب وهو عصب لا ودي وحسي عام.

- **n. obturatorius (= obturator nerve)** العَصَبُ السِّدَّادِي. عصب يتصل من الضفيرة القطنية (القطنيين 3-4) ويتفرع إلى الفروع الأمامية والخلفية



nerve, median

الأعصاب والشرايين العميقة الأمامية للمساعد الأيسر الذي قطعت منه العضلات المثنية والكابة: (1) الشريان الجانبي الزندي العلوي (2) العصب الزندي (3) الشريان الجانبي الزندي السفلي (4) اللقيمة الإنسية (5) العضلة العضدية (6) الشريان الزندي الراجع (7) العصب المتوسط (8) العضلات المثنية للمساعد (9) الشريان الناصف (10) الشريان بين العظام الأمامي (11) الشريان الزندي (12) العصب الزندي (13) العضلة العنقية الزندية للرسغ (14) أوتار العضلة مثنية الأصابع العميقة (15) الفرع الظهرى للعصب الزندي (16) أوتار العضلة مثنية الأصابع السطحية (17) وتر العضلة العنقية الزندية للرسغ (18) الفرع الراجي السطحي للشريان الكعبري (19) وتر العضلة الراجية الطويلة (20) وتر العضلة المثنية الكعبرية للرسغ (21) العضلة مثنية الإبهام الطويلة (22) العضلة الكابة المربعة (23) وتر العضلة العضدية الكعبرية (24) العصب الناصف (25) الشريان الكعبري (26) الفرع السطحي للعصب الكعبري (27) وتر العضلة العضدية الكعبرية (28) العصب بين العظام الأمامي (29) الشريان بين العظام الخلفي (30) العضلة الكابة المدورة (31) الشريان بين العظام الأصلي (32) وتر العضلة ذات الرأسين العضدية (33) الشريان الكعبري الراجع (34) الفرع العميق للعصب الكعبري (35) الفرع الأمامي للشريان الجانبي الكعبري (36) العصب الكعبري (37) العصب الناصف (38) الشريان العضدي.



nerve, median

الطبقة المتوسطة من راحة اليد يبين أعصابها وشرائنها: (1) الشريان الزندي (2) العضلة مثنية الرسغ الزندية (3) الفرع الراحي للعصب الزندي (4) العظم الحمصي (5) الفرع العميق للعصب الزندي (6) الفرع الراحي العميق (7) الفرع السطحي للعصب الزندي (8) العصب الإصبعي الراحي الخاص (9) الفرع الموصل بين العصبين الزندي والناصف (10) العصب الراحي الإصبعي الأصلي (11) الشرايين الإصبعية الراحية (12) العصبان الإصبعيان الراحيان الخاصان (13) الشرايين الإصبعية الراحية (14) العصب الإصبعي الراحي (من العصب الناصف) (15) العضلة مقربة الإبهام (16) القوس الراحية السطحية (17) رأس العضلة مثنية الإبهام (18) العصب الناصف (19) العضلة مبعدة الإبهام القصيرة (20) قيد المثنيات (21) الفرع الراحي للعصب الناصف (22) الفرع الراحي السطحي للشريان الكعبري (23) وتر مثنية الرسغ الكعبري (24) الشريان الكعبري (25) العصب الناصف.

والعضلية ويتوزع إلى العضلات المقربة والعضلة الناحلة وجلد القسم الإنسي من الفخذ ومفصلي الورك والركبة وهو عصب حسي وحركي عام.

**- n. obturatorius accessorius**

**العَصَبُ السِّدَائِي الإِضَافِي (= accessory obturator nerve)**  
السِّدَائِي الإِضَافِي. عصب يتأصل من الفروع الامامية للفروع البطنية للأعصاب الشوكية الظهرية (3-4) ويتوزع إلى العضلة العانية ومفصل الورك والعصب السدائي وهو عصب حركي وحسي عام.

**- n. obturatorius internus (= internal**

**obturator nerve)** **العَصَبُ السِّدَائِي الْبَاطِنُ.**  
عصب يتأصل من الفروع الامامية للفروع البطنية للأعصاب الشوكية (الظهري 5 والعجزيين 1-2) ويتوزع إلى العضلة التوامية العليا والسدادية الباطنة وهو عصب حسي عام وحركي.

**- n. occipitalis major (= greater**

**occipital nerve)** **العَصَبُ الْقَذَالِي الْكَبِيرُ.**  
عصب يتأصل من الفرع الإنسي للفرع الظهري للرقبي الثاني ويتوزع إلى العضلة الشوكية النصفية الراسية وجلد فروة الرأس حتى قمة الرأس أماماً وهو عصب حركي وحسي عام.

**- n. occipitalis minor (= lesser occipital**

**nerve)** **العَصَبُ الْقَذَالِي الصَّغِيرُ.** عصب يتأصل من الضفيرة الرقبية السطحية (الرقبيين 2-3) ويصعد خلف الأذن ويغذي بعض جلد جانب الرأس وعلى الجهة القحفية للأذن وهو عصب حسي عام.

**- n. occipitalis tertius (= third occipital**

**nerve)** **العَصَبُ الْقَذَالِي الثَّالِثُ.** عصب يتأصل من الفرع الإنسي للفرع الظاهري للعنقي 3 ويتوزع إلى جلد القسم العلوي من ظهر الرقبة والرأس وهو عصب حسي عام.

**- n. octavus (= eighth nerve) (= n. vesti-**

**bulocochlearis)** **العَصَبُ الثَّامِنُ: العَصَبُ الدِّهْلِيْزِيُّ الْفَوْقَعِي.**

**- n. oculomotorius (= oculomotor**

**nerve)** **العَصَبُ الْمُحَرِّكُ لِلْعَيْنِ.** العصب القحفي الثالث يتأصل من جذع الدماغ وينبع من الجهة الإنسية للسويقة المخية ويجري إلى الامام في الجيب الكهفي ويتفرع إلى الفرعين العلوي والسفلي ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي العلوي وتغذي فروعه رافعة

الجفن العلوية وكل عضلات العين الخارجية ما عدا المائلة العلوية والمستقيمة الوحشية كما ينقل أعصاباً لا ودية إلى العضلة الهدبية ومصرة الحدقة وهو عصب حركي ولا ودي.

**- nervi olfactorii (= olfactory nerves)**

**الْأَعْصَابُ الشَّمْعِيَّةُ.** العصب القحفي الأول وهو عصب الشم ويحوي حوالي عشرين حزمة تنبع من الظهارة الشمية وتسير خلال اللوح المصفوي للعظم الغربالي حتى البصلة الشمية.

**- n. ophthalmicus (= ophthalmic n.)**

**العَصَبُ الْعَيْنِي.** أحد الفروع الانتهازية للعصب ثلاثي التوائم ينبع من عقدة ثلاثي التوائم ويتفرع إلى الفروع الخيمية والأعصاب الجيبية والدمعي والأنفي الهدبي وينتشر إلى المقلة والملتحمة والغدة الدمعية والكيس الدمعي ومخاطية الأنف والجيب الجبهوي وخارج الأنف والجيبة وفروة الرأس وهو عصب حسي عام.

**- n. opticus (= optic n.)**

**العَصَبُ الْبَصَرِي.** وهو العصب القحفي الثاني ويتكون من المحاور والفروع المركزية لخلايا الطبقة العقدية للشبكية التي تترك الحجاج خلال القناة البصرية وتتصل بالتصالبة البصرية وتستمر حتى السبيل البصري.

**- n. palatinus anterior (= n. palatinus**

**major)** **العصب الحنكي الأمامي: العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْكَبِيرُ.**

**- n. palatinus major (= greater palatine**

**nerve)** **العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْكَبِيرُ.** عصب يتأصل من العقدة الجناحية الحنكية ويتفرع إلى الفروع الأنفية الخلفية السفلية (الوحشية) ويمر من خلال الثقبة الحنكية الكبيرة ليفذي الحنك وهو عصب لاودي وودي وحسي عام.

**- n. palatinus medius (= middle palatine**


**nerve)** **العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْمُتَوَسِّطُ.**

**- nervi palatini minores (= lesser**

**palatine nerves)** **الْأَعْصَابُ الْحَنَكِيَّةُ الصَّغِيرَةُ.** أعصاب تتأصل من العقدة الجناحية الحنكية وتمر خلال الثقبة الحنكية الصغيرة وتغذي الحنك الرخو واللوزة وهي أعصاب لاودية ودية وحسية عامة.


**- n. palatini posterior (= posterior**

**palatine nerve)** **العَصَبُ الْحَنَكِيُّ الْخَلْفِي.**




nerve, olfactory

مقطع جبهى لتجاويف الأنف يبين انتشار العصب الشمي فيها: (1) البصلة الشمية (2) الأعصاب الشمية (3) القرين العلوي (4) مخاطية الأنف.



nerve, olfactory

الغشاء المخاطي الشمي يبين المستقبلات والنهايات العصبية الشمية: (1) خلية سائدة (2) خلية شمعية (3) خلية قاعدية (4) خيوط عصبية (5) غدة شمعية.



nerve, optic

مقطع في العين يظهر الشرايين الطبيعية لشبكية العين والقرص البصري في الخلف ومقطع العدسة والرباط المعلق والقزحية والبؤبؤ والقرنية في الأمام والعصب البصري في الجانب العلوي.

- **n. pectoralis lateralis (= lateral pectoral nerve)** العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الْوُحْشِيُّ. عصب يتأصل من الحبل الوحشي للضفيرة العضدية أو من القسم الأمامي من الجذعين العلوي والوسطي (الرقبية 5-7) ويتوزع عادة إلى عدة أعصاب تغذي العضلة الصدرية الصغيرة والمفصلين الأحرزمي الترقوي والمنكبي وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. pectoralis medialis (= medial pectoral nerve)** العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الْإِنْسِي. عصب يتأصل من الحبل الإنسي للجذع السفلي للضفيرة العضدية (الرقبي 8 والصدرى 1) ويتوزع إلى عدة أعصاب تغذي العضلتين الصدريتين الكبيرة والصغيرة وهو عصب حركي.

- **nervi perineales (= perineal nerves)** الْأَعْصَابُ الْعِجَانِيَّةُ. أعصاب تتأصل من العصب الفرجي في القناة الفرجية وتتفرع إلى الأعصاب العضلية والصفنية أو الشفوية الخلفية وتغذي الفروع العضلية العضلات البصلية الإسفنجية والوركية الكهفية والعجانية المستعرضة السطحية وبصلة القضيب ومصرة الشرج الظاهرة ورافعة الشرج ويغذي العصب الصفني (الشفري) الصفن أو الشفر الكبير وهي أعصاب حركية وحسية عامة.

- **nervi perineales (= n. perineales)** الْأَعْصَابُ الْعِجَانِيَّةُ.

- **n. peroneus communis (= n. fibularis communis)** العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْأَصْلِيُّ

- **n. peroneus profundus (= n. fibularis profundus)** العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْعَمِيقُ

- **n. peroneus profundus accessorius (= the accessory deep peroneal nerve)** العَصَبُ الشَّظْوِيُّ الْعَمِيقُ الْإِضَافِي. فرع العصب الشظوي السطحي إلى العضلة الشظوية القصيرة وعادة ما يستمر حتى الكعب وينتهي بفروع صغيرة للعضلة القصيرة الباسطة لأصابع القدم والمفاصل المجاورة لها.

**n. peroneus superficialis (n. fibularis superficialis)** العَصَبُ الشَّظْوِيُّ السَّطْحِي.

- **n. petrosus major (= greater petrosal nerve)** العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الْكَبِير. عصب يتأصل من العصب الوسطاني عن طريق العقدة الركبية ويشير

منها إلى الأمام ليتصل بالعصب الصخري العميق في القناة الجناحية ويغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية والبلعوم الأنفي خلال العقدة الجناحية الحنكية وفروعها وهو عصب لاودي وحسي عام.

- **n. petrosus minor (= lesser petrosal nerve)** العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الصَّغِير. عصب ينبع من الضفيرة الطبلية ويتوزع إلى الغدة النكفية عن طريق العقدة الأذنية والعصب الأذني الصدغي وهو عصب لا ودي.

- **n. petrosus profundus (= deep petrosal nerve)** العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الْعَمِيق. عصب يتأصل من الضفيرة السباتية الباطنة ويتصل بالعصب الصخري الكبير ليكونا عصب القناة الجناحية ويغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية عن طريق العقدة الجناحية الحنكية وفروعها وهو عصب ودي.

- **n. petrosus superficialis major (= n. petrosus major)** العَصَبُ الصَّخْرِيُّ السَّطْحِي الْكَبِير؛ العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الْكَبِير.

- **n. petrosus superficialis minor (= n. petrosus minor)** العَصَبُ الصَّخْرِيُّ السَّطْحِي الصَّغِير؛ العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الصَّغِير.

- **nervi phrenici accessorii (= accessory phrenic nerves)** الْأَعْصَابُ الْحَبَابِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ. مساهمة إضافية غير دائمة من العصب الرقبي الخامس إلى العصب الحجابي وتسير عند وجودها في مسلك مستقل إلى جذر الرقبة أو إلى الصدر قبل اتصالها بالعصب الحجابي.

- **n. phrenicus (= phrenic n.)** العَصَبُ الْحَبَابِي. عصب يتأصل من الضفيرة الرقبية (الرقبيين 4-5) ويتفرع إلى الفرعين التاموري والحجابي البطني ويتوزع إلى الجنبية والتامور والحجاب الحاجز والصفاق والضفيرة الودية وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. piriformis (= piriform nerve)** العَصَبُ الْكُثْرِيُّ الشَّكْل. عصب يتأصل من الفروع الظهرية للفروع البطنية للأعصاب نخاعية العجزية 1-2 ويتوزع إلى العضلة الكثرية الأمامية وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. plantaris lateralis (= lateral plantar nerve)** العَصَبُ الْأَخْمَصِيُّ الْوُحْشِيُّ. عصب مكون




من الفروع الانتهازية الصغيرة للعصب الظنبوبي ويتفرع إلى الفروع السطحي والعضلي والعميق ويقع بين الطبقتين الأولى والثانية للأخمص ويغذي العضلات المربعة الأخمصية ومبعدة إصبع القدم الصغير ومثنية إصبع القدم الصغير القصيرة ومقربة إبهام القدم وبين العظمية والخراطينيات الثانية والثالثة والرابعة كما يعطي فروعاً جلدية ومفصلية للجهة الوحشية للأخمص وإصبعي القدم الرابع والخامس وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. plantaris medialis (= medial plantar nerve)** العَصَبُ الْأَخْمَصِيُّ الْإِنْسِي. عصب مكون من الفروع الانتهازية الكبيرة للعصب الظنبوبي ويتفرع إلى الأعصاب الأخمصية لأصابع القدم الأصلية والفروع العضلية ويتوزع إلى العضلات مقربة إبهام القدم ومثنية أصابع القدم القصيرة ومثنية إبهام القدم القصيرة والخراطينية الأولى وفروع جلدية ومفصلية للجهة الإنسية من الأخمص وإلى أصابع القدم الأول حتى الرابع وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. presacralis (= plexus hypogastricus superior)** العَصَبُ أَمَامُ الْعَجَزِ: الضفيرة الحثلية السفلية.
- **n. pterygoideus externus (= n. pterygoideus lateralis)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْوُخْشِيُّ.
- **n. pterygoideus internus (n. pterygoideus medialis)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْإِنْسِيُّ.
- **n. pterygoideus lateralis (= lateral pterygoid nerve)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْوُخْشِيُّ. عصب يتأصل من العصب الفكي السفلي ويغذي العضلة الجناحية الوحشية وهو حركي.
- **n. pterygoideus medialis (= medial pterygoid nerves)** العَصَبُ الْجَنَاحِيُّ الْإِنْسِيُّ. عصب يتأصل من العصب الفكي السفلي ويغذي العضلات الجناحية الإنسية وموترة الطبل وموترة شراع الحنك (الحفاف) وهو عصب حركي.
- **nervi pterygopalatini (= pterygopalatine nerves)** العَصَبَانِ الْجَنَاحِيَانِ الْحَنَكِيَانِ. العصبان اللذان يوصلان العصب الفكي العلوي بالعقدة الجناحية الحنكية وهما الجذران الحسيان لهذه العقدة.



**العَصَبُ الْفَرْجِيُّ. n. pudendus (= pudendal nerve)** عصب يتأصل من الضفيرة العجزية (العجزية 2-4) ويدخل القناة الفرجية ويعطي العصب المستقيمي السفلي ثم ينقسم إلى العصب العجاني وعصب ظهر القضيب (أو البظر) ويتوزع إلى عضلات وجلد العجان وأنسجة الناعطة وهو عصب حركي وحسي عام ولا ودي.

- **n. quadratus femoris (= n. musculi quadrati femoris)** عَصَبُ الْفُضْلَةِ الرَّبَاعِيَّةِ الرَّؤُوسِ الْفُخْذِيَّةِ.
- **n. radialis (= radial nerve)** العَصَبُ الْكُعْبُرِيُّ. عصب يتأصل من الحبل الظهرى للضفيرة العجزية (الرقبية 6-8) وأحياناً (الرقبي 5- والصدري 1) ويتفرع إلى الأعصاب الجلدي الخلفي والجلدي الوحشي السفلي للعضد والجلدي الخلفي للساعد وإلى الفروع العضلية والعميقة والسطحية وينزل إلى ظهر العضد والساعد ويتوزع إلى جلد ظهر العضد والساعد واليد وإلى العضلات الباسطة على ظهر العضد والساعد ومفصل المرفق والعديد من مفاصل اليد وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. et ramus articularis** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْمُفَصِّلِيُّ. أي عصب محيطي مختلط (وارد أو صادر) أو أي من فروع التي تغذي أحد المفاصل والأنسجة المرتبطة به.
- **n. et ramus autonomici** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْمُسْتَقْلِيُّ. أي من الأعصاب الودية أو اللاودية وفروع الجهاز العصبي المستقل.
- **n. et ramus cutanei** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْجِلْدِيُّ. أي عصب محيطي مختلط (وارد أو صادر) أو أي من فروع التي تغذي منطقة جلدية معينة.
- **n. et ramus musculares** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْغَضَلِيُّ. أي عصب محيطي مختلط (وارد أو صادر) أو أي من فروع التي تغذي عضلة والأنسجة المرتبطة بها.
- **n. et ramus viscerales (= n. et ramus autonomici)** العَصَبُ وَالْفَرْعُ الْحَشَوِيُّ: العَصَبُ الْمُسْتَقْلِيُّ.
- **nervi rectales inferiores (= inferior rectal nerves)** الْأَعْصَابُ الْمُسْتَقِيمَةُ السُّفْلِيَّةُ. أعصاب تتأصل من العصب الفرجي أو بصورة مستقلة



nerve, pudendal


عجان الأنثى مبيناً أعصابه وأوعيته وعضلاته: (1) الفروع الشفوية الخلفية للشريان الفرجي (2) العضلة البصلية الإسفنجية (3) فتحة الإحليل (4) الشفر الصغير (5) بصلة الدهليز (6) وريد بصلة الدهليز (7) عصب ظهر البظر (8) الشريان الفرجي الباطن (9) الفروع العجانية للعصب الفخذي الجذبي (10) الأعصاب الألوية السفلية (11) العصب الفرجي (12) الشريان الفرجي الباطن (13) الأعصاب العجانية (14) العضلة رافعة الشرج (15) العضلة مصرة الشرج الخارجية (16) الرباط الشرجي العصعصي (17) الشرايين والأعصاب الشرجية العصعصية (18) الأعصاب الألوية السفلية (19) الأعصاب العجانية (20) الشريان المستقيمي السفلي (21) الشريان والوريد الفرجيان الباطنان (22) العضلة الألوية العظمى (23) العضلة العجانية السطحية المستعرضة (24) الحجاب البولي التناسلي (25) الأعصاب الشفوية الخلفية (26) العضلة الوركية الكهفية.



ب

nerve, radial

- ١ - أعصاب وشرابين إصبع السبابة: (١) الشريان الإصبعي الخلفي (٢) العصب الإصبعي الخلفي (٣) العصب الراجي الخاص (٤) الشريان الإصبعي الراجي الخلفي (٥) الشريان الإصبعي الراجي الأصلي.
- ب - الأعصاب والشرابين السطحية في الوجه الكعبري لليد اليمنى: (١) غدة مثنية الرسغ الكعبرية (٢) العصب الجلدي الساعدي الخلفي (٣) الشبكة الرسغية الخلفية (٤) الفرع الرسغي الخلفي للشریان الكعبري (٥) وتر باسطة الرسغ الكعبرية (٦) الشريان الكعبري (٧) أوتار باسطة الأصابع (٨) العظم السنعي الثاني (٩) الشرايين السنعية الخلفية (١٠) العصب الإصبعي الراجي والشریان الكعبري للسبابة (١١) العصب الإصبعي الخلفي (١٢) العضلة الخراطينية الأولى (١٣) العضلة بين العظام الظهرية الأولى (١٤) مقربة الإبهام (١٥) الأعصاب والشرابين الإصبعية الخلفية (١٦) وتر باسطة الإبهام الطويلة (١٧) مبعدة الإبهام القصيرة (١٨) العضلة مقابلة الإبهام (١٩) وتر باسطة الإبهام القصيرة (٢٠) وتر باسطة الرسغ الكعبرية (٢١) وتر مبعدة الإبهام (٢٢) الشريان الكعبري (٢٣) الفرع الراجي السطحي للشریان الكعبري (٢٤) قيد الباسطات (٢٥) الشريان الكعبري (٢٦) الفروع السطحية للعصب الكعبري.



nerve, radial

أعصاب وعضلات الوجه الأمامي للذراع الأيسر بعد سحب العضلة ذات الرأسين إلى الجيب الإنسي ونزع الأوردة من الذراع: (1) الشريان الإبطي (2) العصب الإبطي (3) العضلة المدورة الكبيرة (4) العصب الكعبري (5) العصب الناصف (6) الشريان العضدي العميق (7) الرأس الطويل للعضلة الثلاثية الرؤوس العضدية (8) العصب الزندي (9) الشريان الزندي الجانبي العلوي (10) العضلة الثلاثية الرؤوس العضدية (11) الشريان الزندي الجانبي السفلي (12) اللقمة الإنسية (13) العضلات المثنية للساعد (14) العضلة العضدية الكعبرية (15) العصب الناصف (16) الشريان العضدي (17) العصب الساعدي الجلدي الوحشي (18) العضلة العضدية (19) العضلة ذات الرأسين العضدية (20) العصب الجلدي (21) العضلة الغرابية العضدية (22) العضلة الصدرية الكبيرة (23) العضلة الدالية (24) العضلة الغرابية العضدية.

من الضفيرة العجزية وتتوزع إلى مصرة الشرج الظاهرة والجلد حول الشرج وبطانة القناة الشرجية حتى الخط المشطوي وهي اعصاب حركية وحسية عامة.

- **n. recurrens (= n. laryngeus recurrens)** العَصَبُ الحَنْجَرِيُّ الرَّاجِع

- **n. saccularis (= saccular nerve)** العَصَبُ الكَيْسِي. فرع الجزء الدهليزي من العصب الثامن الذي يغذي بقعة الكيس.

- **nervi sacrales (= sacral nerves)** الأَعْصَابُ العَجْزِيَّة. الأزواج الخمسة من الاعصاب التي تنبع من القسيمات العجزية للنخاع الشوكي وتشارك الفروع البطنية للاعصاب الأربعة الأولى في تكوين الضفيرة العجزية.

- **n. saphenus (= saphenous nerve)** العَصَبُ الصَّافِن. عصب يتصل من نهاية العصب الفخذي وينزل أولاً مع الاوعية الفخذية ثم على الجهة الإنسية للساق والقدم ويتفرع إلى الفرعين تحت الرضفي والجلدي الساقين الإنسي ويتوزع إلى مفصل الركبة وإلى الضفيرتين الرضفية وتحت الخياطية والجلد على الجهة الإنسية للساق والقدم وهو عصب حسي عام.

- **nervi scrotales anteriores (= anterior scrotal nerves)** الأَعْصَابُ الصَّفِيَّةُ الأَمَامِيَّة. أعصاب تتصل من العصب الحرقفي الأربي وتتوزع إلى جلد المنطقة الأمامية للصفن وهي اعصاب حسية عامة.

- **nervi scrotales posteriores (= posterior scrotal nerves)** الأَعْصَابُ الصَّفِيَّةُ الخَلْفِيَّة. أعصاب تتصل من الاعصاب العجانية وتتوزع إلى جلد الصفن وهي اعصاب حسية عامة.

- **n. sensorius (= sensory nerve)** عَصَبٌ حِسِّي. عصب محيطي وارد ينقل النبضات العصبية من أعضاء الحس إلى النخاع الشوكي والدماغ.

- **n. spermaticus externus (= ramus genitalis nervi genitofemorales)** العَصَبُ المَنَوِيُّ الظَّاهِر. الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي.

- **nervi sphenopalatini (= nervi pterygopalatini)** الأَعْصَابُ الوَتْدِيَّةُ الحَنَكِيَّة

- **nervi spinalis (= spinal nerves)** الأَعْصَابُ الشَّخَاعِيَّة. الواحد والثلاثون زوجاً من الاعصاب التي تنبع من النخاع الشوكي والتي تمر بين الفقرات وتشمل ثمانية أزواج من الاعصاب الرقبية وإثني عشر صدرية وخمسة قطنية وخمسة عجزية وزوجاً عصبياً عصبياً واحداً.

- **n. spinosus (= ramus meningeus nervi mandibularis)** العَصَبُ الشُّوكِي.

- **n. splanchnicus imus (= n. splanchnicus thoracicus imus)** العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصدري الأدنى.


- **nervi splanchnici lumbales (= lumbar splanchnic nerves)** الأَعْصَابُ الحَشَوِيَُّّة الأَعْصَابُ تتصل من العقد القطنية أو من جذع الودي وتتصل أعصابها العليا بالضفيرة البطنية والصفائر المجاورة لها وتهبط أعصابها الوسطية إلى الضفيرة بين المساريقية والصفائر المجاورة لها وتهبط أعصابها السفلية إلى الضفيرة الخلفية العلوية وهي اعصاب لا ودية واردة حشوية.

- **n. splanchnicus major (= n. splanchnicus thoracicus major)** العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصدري الكبير.

- **n. splanchnicus minor (= n. splanchnicus thoracicus minor)** العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّغِير.


- **nervi splanchnici pelvini (= pelvic splanchnic nerves)** الأَعْصَابُ الحَشَوِيَُّّة الحَوَاضِيَّة. أعصاب تتصل من الضفيرة العجزية (العجزيين 3-4) وتترك الضفيرة العجزية لتدخل الضفيرة الخلفية السفلية وتغذي أعضاء الحوض وهي اعصاب قبل عقدية لا ودية وحشوية واردة.

- **nervi splanchnici sacrales (= sacral splanchnic nerves)** الأَعْصَابُ الحَشَوِيَُّّة العَجْزِيَّة. أعصاب تتصل من القسم العجزى للجذع الودي وتتوزع إلى أعضاء الحوض والاعوية الدموية عن طريق الضفيرة الخلفية السفلية وهي اعصاب قبل عقدية ودية وحشوية واردة.



nerve, spinal

جذور وفروع العصب النخاعي: (1) المادة السنجابية للنخاع (2) العقدة الودية (3) فرع موصل (4) عصب نخاعي (5) عقدة نخاعية (6) قسم أولي خلفي (7) قسم أولي أمامي (8) فرع إنسي (9) ضلع (10) فرع وحشي.



nerve, spinal

الأعصاب الشوكية ومناطق خروجها من النخاع والعمود الفقري. الأحمر: الفقرات والأعصاب الرقبية. الأصفر: الفقرات والأعصاب الصدرية. الأزرق: الفقرات والأعصاب القطنية. الأسود: الفقرات والأعصاب العجزية والعصمية.

- **n. splanchnicus thoracicus imus**  
(= lowest thoracic splanchnic nerve)  
العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الأَدْنَى. عصب يتأصل من العقدة الصدرية الأخيرة لجذع الودي أو العصب الحشوي الصغير ويتوزع إلى العقدة الأبهريّة الكلوية والصفيرة المجاورة لها وهو عصب ودي وحشوي وارد.
- **n. splanchnicus thoracicus major**  
(= greater thoracic splanchnic nerve)  
العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الكَبِير. عصب يتأصل من الجذع الودي والعقد الصدرية الثالثة حتى العاشرة وينزل خلال الحجاب الحاجز أو فتحته الأبهريّة لينتهي عند العقد والصفائر البطنية وعند عقدة حشوية توجد بالقرب من الحجاب وهو عصب قبل عقدي وحشوي وارد.
- **n. splanchnicus thoracicus minor** (= lesser thoracic splanchnic nerve)  
العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الصَّغِير. عصب يتأصل من العقدتين التاسعة والعاشرة الصدريتين للجذع الودي ويعطي الفرع الكلوي ثم يثقب الحجاب ليرافق العقدة الأبهريّة الكلوية والصفيرة البطنية ويتصل مع الصفائر الكلوية والمسايقية العلوية وهو عصب قبل عقدي وحشوي وارد.
- **n. stapedius** (= stapedius nerve)  
الرَّكَابِيُّ. عصب يتأصل من العصب الوجهي ويغذي العضلة الركابية وهو عصب حركي.
- **n. subclavius** (= subclavian nerve)  
العَصَبُ تَحْتَ التَّرْقُوءَةِ. عصب يتأصل من الجذع العلوي أو من الصفيرة العضدية (الرقبي 5) ويغذي العضلة تحت الترقوة والمفصل القصي الترقوي وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. subcostalis** (= subcostal nerve)  
العَصَبُ تَحْتَ الصُّلْع. عصب يتأصل من الفرع البطني للعصب الصدري الثاني عشر ويتوزع إلى جلد البطن السفلي والجهة الوحشية للآلية وجزء من العضلات المستعرضة والمائلة والمستقيمة والهرمية والصفاق المجاور وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. sublingualis** (= sublingual nerve)  
عَصَبُ تَحْتَ اللُّسَان. عصب يتأصل من العصب اللساني وينتشر إلى الغدة تحت اللسانية والغشاء المخاطي الذي يغطيها وهو عصب لا ودي وحسي عام.
- **n. suboccipitalis** (= suboccipital nerve)  
العَصَبُ تَحْتَ القَذَال. عصب يتأصل من الفرع الظهري للعصب الرقبى الأول ويظهر فوق القوس الخلفي للفتحة ويغذي عضلات المثث تحت القذالي والعضلة الشوكية النصفية الراسية وهو عصب حركي.
- **n. subscapularis** (= subscapular nerve)  
العَصَبُ تَحْتَ الكَتِف. يتأصل من الحبل الخلفي للصفيرة العضدية (الرقبي 5) وينقسم إلى عصبين أو أكثر علوي وسفلي ويغذي العضلتين تحت الكتفية والمودرة الكبيرة وهو عصب حركي.
- **nervi supraclaviculares** (= supra-clavicular nerves)  
الأعصابُ فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. اسم عام يطلق على جذع مشترك وهو فرع من الصفيرة الرقبية (الرقبيين 3-4) والذي يظهر تحت غطاء الحافة الخلفية للعضلة القصية الترقوية الخشائية وينقسم إلى الأعصاب فوق الترقوية الوحشي والإنسي والمتوسط.
- **nervi supraclaviculares anteriores**  
(= nervi supraclaviculares mediales)  
الأعصابُ الأماميّة فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ.
- **nervi supraclaviculares intermedii**  
(= intermediate supraclavicular nerves)  
الأعصابُ المتوسّطة فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. أعصاب تتأصل من الصفيرة الرقبية (الرقبيين 3-4) وتنزل إلى المثث الخلفي وتعبّر الترقوة وتغذي الجلد الذي يغطي المنطقتين الصدرية والذالية وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi supraclaviculares laterales (posteriores)** (= lateral supraclavicular nerves)  
الأعصابُ الوحشيّة (الخلفيّة) فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. أعصاب تتأصل من الصفيره الرقبية (الرقبيين 3-4) وتنزل إلى المثث الخلفي وتعبّر الترقوة وتغذي جلد القسمين العلوي والخلفي للمنكب وهي أعصاب حسية عامة.
- **nervi supraclaviculares mediales**  
(= medial supraclavicular nerves)  
الأعصابُ الإنسيّة فَوْقَ التَّرْقُوءَةِ. أعصاب تتأصل من



الضفيرة الرقبية (الرقبيين 3-4) وتهبط الى المثلث الخلفي وتعتبر الترقوة وتغذي جلد المنطقة الإنسية تحت الترقوة وهي أعصاب حسية عامة.

- **nervi supraclaviculares medii (= nervi supraclaviculares intermedii)**  
الأغصابُ المُتَوَسِّطَةُ تَحْتَ التَّرْقُوتِ.

- **nervi supraclaviculares posteriores (= nervi supraclaviculares laterales)**  
الأغصابُ الخَلْفِيَّةُ تَحْتَ التَّرْقُوتِ.

- **n. supraorbitalis (= supraorbital nerve)**  
العَصَبُ فَوْقَ الحَجَّاجِ. هو استمرار للعصب الجبهي من العصب العيني ويتفرع إلى الفرعين الإنسي والوحشي ويترك الحجاج خلال التلمة أو الثقب فوق الحجاج ويغذي جلد الجفن العلوي والجهة وفروة الرأس الامامية حتى قمة الرأس ومخاطية الجيب الجبهي وهو عصب حسي عام.

- **n. suprascapularis (= suprascapular nerve)**  
العَصَبُ فَوْقَ الكَتِفِ. عصب يتأصل من الضفيرة العنقية (الرقبيين 5-6) ويهبط خلال التلمتين فوق الكتف والشوكة الحقة ليغذي العضلة الاخرمية الترقوية ومفاصل المنكب والعضلتين فوق وتحت الشوكة وهو عصب حركي وحسي عام.

- **n. supratrochlearis (= supratrochlear nerve)**  
العَصَبُ فَوْقَ البُكَرَةِ. عصب يتأصل من العصب الجبهي من العصب العيني ويترك الحجاج عند النهاية الإنسية للحافة فوق الجهة ويغذي الجهة والجفن العلوي وهو عصب حسي عام.

- **n. suralis (= sural nerve)**  
العَصَبُ الرُّبْلِي. عصب يتأصل من العصب الربلي الجلدي الإنسي والفرع الشظوي الموصل من العصب الشظوي الاصلي ويتفرع إلى العصب الظهري الوحشي الجلدي والفروع العقبية الوحشية ويتوزع إلى جلد ظهر الساق (الربلة) والمفاصل على الجهة الوحشية للكاحل والقدم وهو عصب حسي عام.

- **nervi temporales profundi (= deep temporal nerves)**  
الأغصابُ الصُّدْغِيَّةُ العميقة. هما عادة عصبان أمامي وخلفي يتأصلان من العصب الفكي السفلي ويغذيان العضلة الصدغية وهما عصبان حركيان.

- **n. tensor tympani (= n. musculus tensoris tympani)**  
عَصَبُ العَضَلَةِ مُوتَرَةِ الطَّبَلِ

- **n. tensor veli palatini (= n. musculus tensoris veli palatini)**  
عَصَبُ عَضَلَةِ شِزَاعِ الحَنَكِ

- **m. tentorii (= ramus tentorii nervi ophthalmici)**  
عَصَبُ الخَيْمَةِ: الفرع الخيمي للعصب العيني.


- **nervi terminales (= terminal nerves)**  
الأغصابُ الإِنْتِهَائِيَّةُ. خيوط عصبية تسمى كمجموعة بالأعصاب الانتهازية توجد في الام الحنون بين البصلة الشمية وعرف الديك وتمر خلال الصفيحة المصفوية إلى المخاطية الأنفية وتوجد فيها عادة خلايا عقدية على طول مسارها.

- **nervi thoracici (= thoracic nerves)**  
الأغصابُ الصَّدْرِيَّةُ. الاثنا عشر زوجاً من الأعصاب النخاعية التي تتبع من القسيمات الصدرية للنخاع الشوكي ويترك كل زوج العمود الفقري تحت مستوى الفقرة المناسبة له وهي تغذي الجدارين الصدري والبطني للجسم.

- **n. thoracicus longus (= long thoracic nerve)**  
العَصَبُ الصَّدْرِي الطَّوِيل. عصب يتأصل من الضفيرة العنقية من الفروع البطنية (الرقبية 5-7) ويهبط خلف الضفيرة العنقية إلى العضلة المنشارية الامامية وهو عصب حركي.


- **n. thoracodorsalis (= thoracodorsal nerve)**  
العَصَبُ الصَّدْرِي الظَّهْرِي. عصب يتأصل من الحبل الخلفي للضفيرة العنقية (الرقبيين 7-8) ويغذي العضلة العريضة الظهرية وهو عصب حركي.

- **n. tibialis (= tibial nerve)**  
العَصَبُ الظَّنْبُوبِي. عصب يتأصل من العصب الوركي (الاسكي) في القسم السفلي من الفخذ ويتفرع إلى العصب بين عظمي الساق والعصب الجلدي الإنسي للربلة والأعصاب الربلي والأخمصيين الوحشي والإنسي والفرعين العضلي والعقبى ويتوزع وهو لا يزال مع العصب الوركي ليغذي العضلتين الغشائية النصف والوترية النصف والرأس الطويل لذات الراسين الفخذية والعضلة المقربة الكبيرة كما أنه يغذي مفصل الركبة ثم ينزل إلى الحفرة المابضية ويستمر إلى الساق



nerve, tibial


أعصاب وأوعية وعضلات الساق: (1) الشريان المابضي (2) الشريان الركبي السفلي (3) العضلة المابضية (4) الشريان الظنبوبي الأمامي (5) وهو يعرف سريرياً بالجزع الظنبوبي الشظوي (6) العضلة النعلية (7) الشريان الظنبوبي الخلفي (8) العضلة الظنبوبية الخلفية (9) العضلة مثنية الأصابع الطويلة (10) الشريان الظنبوبي الخلفي (11) وتر العضلة الظنبوبية الخلفية (12) الفروع الكعبية الإنسية (13) وتر العضلة مثنية الإبهام الطويلة (14) الفروع العقبية للشريان الظنبوبي الخلفي (15) الشبكة العقبية (16) وتر العقب (العرقوب) (17) الشرايين الكعبية الوحشية (18) العضلة الشظوية القصيرة (19) العضلة مثنية الإبهام الطويلة (20) العضلة الشظوية الطويلة (21) العصب الظنبوبي (22) الشريان الشظوي (23) العضلة النعلية (24) العضلة الأخمصية (25) العصب الظنبوبي.



nerve, trigeminal


العصب الثلاثي التوائم وقروعه مرسوم على اقسام من الجمجمة والفك مع علاقاته بالأعصاب المجاورة: (1) العصب الثلاثي التوائم (2) العصب الصخري الكبير (3) العقدة الركبية (4) العصب الوجهي (5) العصب الطيلي (6) العقدة السفلية للعصب اللساني البلعومي (7) العصب اللساني البلعومي (8) العصب الفكي السفلي (9) العصب الوجهي (10) الناتئ الأبري (11) العصب الأذني الصدغي (12) العصب الأذني الصدغي (13) العقدة الأذنية (14) العصب السنخي السفلي (15) العصب الحنكي الكبير (16) العصب اللساني (17) العقدة تحت الفك السفلي (18) العصب الفركسي اللامي (19) العقدة الجناسية الحنكية (20) العصب الذقني (21) العصب تحت اللساني (22) العصب الحنكي الكبير (23) الفروع السنخية العلوية المتوسطة (24) الفروع السنخية العلوية الأمامية (25) الفروع السنخية العلوية الخلفية (26) الفروع الأنفية السفلية والعلوية (27) العصب تحت الحجاج (28) العصب الوجني (29) الفروع الأنفية للعصب الغربالي (30) العصب الغربالي (31) العصب فوق البكرة (32) العصب فوق الحجاج (33) الفرع الإنسي للعصب فوق الحجاج (34) العصب الوحشي فوق الحجاج (35) العصب الدمعي (36) العصب الأنفي الهبي (37) عصب نفق الجناحية (الجزر الوجهي) (38) الفروع العضلية (39) العصب العيني (40) العصب الصخري العميق (41) العصب الفكي العلوي (42) العصب الصخري الصغير.

- ليغذي عضلات وجلد الريلة وأخصص القدم وأصابه وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. transversus colli (= transverse nerve of neck)** **العَصَبُ الْمُسْتَقْرِضُ لِلرَّقَبَةِ.** عصب يتأصل من الضفيرة الرقبية (الرقبيين 2-3) ويتفرع إلى فرعين علوي وسفلي ويغذي جلد جانب الرقبة ووجهها وهو عصب حسي عام.
- **n. trigeminus (= trigeminal nerve)** **العَصَبُ ثَلَاثِي التَّوَاتِم.** هو العصب القحفي الخامس الذي ينبع من السطح الجانبي للجسر كجذرين حركي وحسي مع بعض الالياف الوسطية بينهما وينتشر الجذر الحسي إلى عقدة ثلاثي التوائم التي تحوي خلايا معظم الالياف العصبية الحسية وتتفرع منها الاقسام الثلاثة لهذا العصب وهي الفكي العلوي والفكي السفلي والعيني. وهو عصب حسي يغذي الوجه والاسنان والفم والتجويف الأنفي كما انه يغذي عضلات المضغ بأعصاب حركية.
- **n. trochlearis (= trochlear nerve)** **العَصَبُ الْبَكَرِي.** هو العصب القحفي الرابع، حيث تتصلب الياف العصبين البكريين عبر المستوى الناصف ويظهر العصب من خلف جذع الدماغ تحت مستوى السويقة السفلية ويجري إلى الامام في جدار الجيب الوحشي ويعبر الشق الحجاجي العلوي ويغذي العضلة المائلة العلوية للمقلة بالياف حركية.
- **n. tympanicus (= tympanic nerve)** **العَصَبُ الطَّبْلِي.** عصب يتأصل من العقدة السفلية للعصب اللساني البلعومي ويشارك في تكوين الضفيرة الطبلية ويغذي الغشاء المخاطي للتجويف الطبلي وللخلايا الخشائية الهوائية وللأنبوب السمعي كما يغذي الغدة النكفية خلال العصب الصخري الصغير والعقدة الأذنية وهو عصب حسي عام ولا ودي.
- **n. ulnaris (= ulnar nerve)** **العَصَبُ الزُّنْدِي.** عصب يتأصل من الحبلين الوحشي والإنسي للضفيرة العضدية (الرقبي 1- الصدرى 1) ويتفرع إلى الفروع العضلية والظهرية والراحية والسطحية والعميقة ويتوزع إلى جلد ظهر وجه المنطقة الإنسية لليد وإلى بعض العضلات المثنية في المنطقة الامامية من الساعد وإلى العديد من العضلات القصيرة لليد ومفصل المرفق والعديد من مفاصل اليد وهو عصب حركي وحسي عام.
- **n. utricularis (= utricular nerve)** **العَصَبُ الْقُرْبِي.** هو فرع من العصب الدهليزي الذي يغذي بقعة القريبة.
- **n. utriculoampullaris** **العَصَبُ الْقُرْبِيَّي** (= utriculoampullar nerve) **الْأُمْبُولِي.** عصب ينبع كقسم طرفي من العصب الدهليزي ليغذي القريبة وأمبولات الاقنية الهلالية.
- **nervi vaginales (= vaginal nerves)** **الْأَعْصَابُ الْمَهْلِيَّة.** أعصاب تتأصل من الضفيرة الرحمية المهبلية وتغذي المهبل بأعصاب ودية ولا ودية.
- **n. vagus (= vagus nerve)** **العَصَبُ الْمُتَبَهَم.** هو العصب القحفي العاشر ويتأصل بجذيرات عديدة من جانب النخاع المستطيل (البصلة) في الأخدود بين الزيتونة والسويقة المخيخية السفلية ويتفرع إلى العصبين الحنجريين العلوي والراجع وإلى الفروع السحائية والأذنية والبلعومية والقلبية والقصية والمعدية والكبدية والبطنية والكلبية والصفائير البلعومية والرئوية والمريئية وإلى الجذعين الامامي والخلفي وينزل خلال الثقبه الوداجية حيث يكون العقدتين العلوية والسفلية ثم يستمر خلال الرقبة والصدر إلى البطن وهو يغذي اليافاً حسية إلى الاذن واللسان والبلعوم والحنجرة واليافاً حركية إلى البلعوم والحنجرة والمريء واليافاً لا ودية وحشوية واردة إلى الاحشاء الصدرية والبطنية وهو عصب لا ودي وحشوي وارد وحركي وحسي عام.
- **nervi vasorum (= nerves of veins)** **الْأَعْصَابُ الْوَيْدِيَّة.** فروع عصبية تغذي الغلالة البرانية للأوعية الدموية.
- **n. vertebralis (= vertebral nerve)** **العَصَبُ الْفَقْرِي.** عصب يتأصل من العقد الرقبية الصدرية والفقارية ويتسلق مع الشريان الفقاري ليعطي اليافاً إلى السحايا النخاعية وللأعصاب الرقبية وللحفرة القحفية الخلفية وهو عصب ودي.
- **nervi vesicales inferiores plexus pudendi** **الْأَعْصَابُ الْمَثَانِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلضْفِيرَةِ الْفَرْجِيَّة.** مصطلح قديم لبعض الالياف العصبية التي تغذي المثانة كان يعتقد بانها تنبع من الضفيرة الفرجية.




nerve, ulnar

أعصاب وشرايين الساعد الأيسر الأمامية: (1) الشريان العضدي (2) العصب الناصف (3) اللقيمة الإنسية (4) العضلة العضدية (5) الرأس الزندي للعضلة الكتفية المدورة (6) الشريان الزندي الراجع (7) العضلة الكتفية المدورة (8) العصب الناصف (9) العضلة المثنية الكعبرية للرسغ (10) الرأس الكعبري للعضلة مثنية الأصابع السطحية (11) الشريان الزندي (12) العصب الزندي (13) وتر العضلة المثنية الزندية للرسغ (14) الفرع الظهري للعصب الزندي (15) الفرع الرسغي الظهري للشريان الزندي (16) الفرع الراجع السطحي للشريان الكعبري (17) وتر العضلة الراحية الطويلة (18) وتر العضلة المثنية الكعبرية (19) الشريان الكعبري (20) الفرع الراجحي للعصب الناصف (21) وتر العضلة العضدية الكعبرية (22) الفرع السطحي للعصب الكعبري (23) الشريان الكعبري (24) العضلة مثنية الإبهام الطويلة (25) الشريان بين العظمين الأصلي (26) العضلة الكتفية المدورة (27) العضلة العضدية الكعبرية (28) العضلة الباسطة (29) الفرع السطحي للعصب الكعبري (30) الشريان الكعبري الراجع (31) الشريان الكعبري (32) الشريان الزندي (33) الفرع العميق للعصب الكعبري (34) العصب الكعبري (35) العضلة ذات الرايين العضدية.



nerve, ulnar

الطبقة العميقة من أعصاب وشرايين راحة اليد: (1) الشريان الكعبري (2) العضلة الكأبة المربعة (3) الشريان الزندي (4) العضلة مثنية الرسغ الزندية (5) الفرع الرسغي الراجي للشريان الزندي (6) الفرع الراجي للعصب الزندي (7) الفرع السطحي للعصب الزندي (8) الفرع العميق للعصب الزندي (9) العضلة مبعدة الخنصر (10) الفرع الراجي العميق من الشريان الزندي (11) العضلات بين العظام الراجية (12) العضلة مقربة الإبهام (13) العضلات الخراطينية (14) أوتار العضلات المثنية (15) الشرايين السنعية الراجية (16) الأعصاب الإصبعية الراجية الخاصة (17) الشرايين الإصبعية الراجية الخاصة (18) العضلة الخراطينية الأولى (19) العضلة بين العظام الظهرية الأولى (20) الشرايين الإصبعية الراجية الخاصة (21) العضلة مبعدة الإبهام القصيرة (22) الشريان الرئيسي للإبهام (23) العضلة مقربة الإبهام (24) القوس الراجية العميقة (25) الرأس السطحي للعضلة مثنية الإبهام القصيرة (26) العضلة مقابلة الإبهام (27) وتر العضلة مثنية الإبهام الطويلة (28) قيد المثنيات (29) الفرع الراجي السطحي للشريان الكعبري (30) وتر العضلة مثنية الرسغ الكعبرية (31) الفرع الرسغي الراجي للشريان الكعبري.



الأعصاب والأوعية الدموية في الجدارين الخلفي والوحشي للبلعوم: (1) العصب المبهم (الحقفي العاشر) (2) العصب اللساني البلعومي (التاسع) (3) البصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن (4) الجيبان المستعرض والسيني (5) العقدة العلوية للمبهم (6) الشريان السباتي الباطن (7) الفرع الأذيني للمبهم (8) الناتئ الخشائي (9) الفرع الظاهر للعصب الإضافي (10) الناتئ الإبري (11) العقدة السفلية للمبهم (12) العصب اللساني (الثاني عشر) (13) العضلة الإبرية البلعومية (14) العصب اللساني البلعومي (التاسع) (15) الفرع البلعومي للمبهم (16) الشريان البلعومي الصاعد (17) البطن الخلفي لذات البطنين (18) العصب الحنجري العلوي (19) الشريان السباتي الظاهر (20) الفرع البلعومي للساني البلعومي (21) الشريان الوجهي (22) الشريان اللساني (23) الفرع الظاهر للحنجري البلعومي (24) العضلة مضيق البلعوم المتوسطة (25) الفرع الباطن للحنجري البلعومي (26) الشريان الدرقي العلوي (27) الضفيرة البلعومية (28) مضيق البلعوم السفلية (29) الفرع القلبي العلوي للمبهم (30) الغدة الدرقية (31) العصب المبهم (العاشر) (32) الشريان الدرقي السفلي (33) الفرع القلبي العلوي للمبهم (34) المريء (35) العصب القلبي المتوسط للجذع الودي (36) العقدة الرقبية السفلي (37) الشريان الدرقي السفلي (38) العقدة الرقبية المتوسطة (39) الفرع البلعومي للدرقي السفلي (40) البصلة السفلية للوريد الوداجي السفلي (41) الجذع الودي (42) الضفيرة السباتية الأصلية (43) السباتي الأصلي (44) العصب المبهم (45) الفرع البلعومي للدرقي العلوي (46) الوريد الوداجي الأصلي (47) العصب القلبي العلوي الودي (48) الشريان الدرقي العلوي (49) الفرع الظاهر للحنجري العلوي (50) الفرع الباطن للحنجري العلوي (51) الشريان اللساني (52) الشريان الوجهي (53) الشريان الحنكي الصاعد (54) الجذع الودي (55) العصب اللساني البلعومي (56) الشريان البلعومي الصاعد (57) العقدة الرقبية العلوية للجذع الودي (58) الراد (59) العصب الوداجي للجذع الودي (60) العقدة السفلية للسهم (61) العصب الإضافي (62) الشريان السباتي الباطن (63) العقدة السفلية للساني البلعومي (64) العصب اللساني الباطن (65) الشريان السحائي الخلفي (66) العظم الصدغي (67) الثقبة الوداجية والبصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن (68) الأوردة البلعومية (69) العضلة مضيق البلعوم العلوية (70) الفرع الباطن للعصب الإضافي.

- **nervi vesicales inferiores plexus vesicalis** الأَعْصَابُ المَثَانِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ  
المَثَانِيَّةُ. مصطلح قديم للألياف العصبية التي تصل  
الضفيرة المثانية عن طريق الشريان المثاني السفلي.
- **nervi vesicales superiores plexus vesicalis** الأَعْصَابُ المَثَانِيَّةُ العُلْوِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ  
المَثَانِيَّةُ. مصطلح قديم للألياف العصبية التي تصل  
الضفيرة المثانية عن طريق الشريان المثاني العلوي.
- **n. vestibularis (= vestibular nerve)** العَصَبُ الدِّهْلِيْزِيّ القَوَّعِيّ. القسم الخلفي من العصب  
الدهلزي القوقعي الذي يتحكم في وظيفة التوازن  
ويتكون من الياف تنبع من الخلايا ثنائية القطبين في  
العقدة الدهليزية وينقسم محيطياً إلى قسمين رأسي  
وذنب وله مستقبلات في أمبولات الأتية الهلالية  
والقريبة والكيس.
- **n. vestibulocochlearis (= vestibulo-cochlear nerve)** العَصَبُ الدِّهْلِيْزِيّ القَوَّعِيّ. وهو العصب القحفي الثامن الذي ينبع من ساق الدماغ  
بين الجسر والنخاع المستطيل (البصلة) عند الزاوية  
المخيخية الجسرية وخلف العصب الوجهي وينقسم  
بالقرب من النهاية الوحشية للصماخ السمعي الباطن  
إلى قسمين متميزين وظيفياً ومتحدتين جزئياً وهما  
العصب الدهليزي والعصب القوقعي وهما مرتبطان  
بالدماغ بجذور مختلفة - دهليزية وقوقعية.
- **n. zygomaticus (= zygomatic nerve)** العَصَبُ الزَّوْجَنِيّ. عصب يتأصل من العصب الفكي  
العلوي ويدخل الحجاج خلال الشق الحجاجي السفلي  
ويتفرع إلى الفرعين الوجني الوجهي والوجني  
الصدغي ويتصل مع العصب الدمعي ويغذي جلد  
الصدغ والمناطق المجاورة من الوجه وهو عصب  
حسيّ عام.
- net** شَبَكَةٌ. بنية من خيوط متشابكة ومتراصة.
- **nerve n.** شَبَكَةٌ عَصَبِيَّةٌ. شبكة جبلية لا تشابكية  
من الألياف العصبية وهي نوع من النهايات العصبية  
الحرّة التي توجد بصورة خاصة في النسيج الضام.
- network, neurofibrillar** الشَّبَكَةُ اللَّيْفِيَّةُ  
العَصَبِيَّةُ. شبكة تولد الليفيات العصبية للخلية  
العصبية.
- neu (= neurilemma)** غِطَاءُ اللَّيْفِ العَصَبِيّ.

- neurad** نَحْوُ العَصَبِ. متجه أو منجذب  
نحو العصب.
- neuragmia** تَمَرُّقُ الجَذْعِ العَصَبِيّ. تمزق أو  
تمزيق الجذع العصبي.
- neural** عَصَبِيّ؛ أَعْصَابِيّ. 1. متعلق بالعصب  
أو الأعصاب 2. واقع في منطقة المحور العصبي  
كالقوس العصبي مثلاً.
- neuralgia** أَلَمٌ عَصَبِيّ. ألم انتيابي يمتد  
على طول أحد الأعصاب أو أكثر وهناك عدة أنواع  
منه تصنف حسب المنطقة المولد فيها أو حسب  
الحالة المسببة له.
- **cardiac n. (= angina pectoris)** ألم عصبي  
قلبي؛ ذَبْحَةٌ صَدْرِيَّةٌ.
- **cervicobrachial n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ رَقَبِيّ عَضُدِيّ.  
الم في الرقبة ينتشر إلى الذراع بسبب انضغاط  
الجذور العصبية للأعصاب النخاعية الرقبية.
- **cervico-occipital n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ رَقَبِيّ قَذَالِيّ.  
الم عصبي في الأعصاب الرقبية العلوية خاصة في  
القسم الخلفي من العصب الرقبى الثاني.
- **cranial n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ قَحْفِيّ. ألم عصبي  
على طول أحد الأعصاب القحفية.
- **n. facialis vera** أَلَمٌ عَصَبِيّ وَجْهِيّ؛ الألم  
الحقيقي للعصب الوجهي. ألم عصبي يصيب الوجه  
والاذن ينتج عن الهربس المنطقي مع شلل وجهي  
نصفي عابر.
- **Fothergill's n. (= trigeminal n.)** أَلَمٌ الثَّلَاثِيّ  
التَّوَامِ.
- **geniculate n. (= geniculate ganglion n.)** أَلَمٌ العُقْدَةِ الرُّكْبِيَّةِ.  
ألم خلف العقدتين الحجاجية والفكية العلوية كان يعتقد  
سابقاً بأنه يتولد عن اضطراب العقدة الركبية.
- **glossopharyngeal n.** أَلَمٌ اللِّسَانِيّ البُلْعُومِيّ.  
الم عصبي يصيب العقد الصخرية والوداجية للعصب  
اللساني البلعومي ويتصف بالألم انتيابي شديد في  
جهتي البلعوم ويمتد إلى الأذن وعادة ما يترافق مع  
بطء القلب أو توقفه مع الغش.
- **hallucinatory n.** أَلَمٌ عَصَبِيّ هَلُوسِيّ. انطباع  
نفسي عن الشعور بالألم من دون وجود أي منه مؤلم  
في الجسم.



- herpetic n. (= postherpetic n.) **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ** تالٍ للهربس.
- Hunt's n. (= geniculate ganglion n.) **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ عُقْدِيٌّ رُكْبِيٌّ**.
- idiopathic n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ** مجهول السبب. ألم عصبي غير معروف السبب وغير مصحوب بأية تغيرات عضوية.
- intercostal n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ وَرْبِيٌّ**. ألم الأعصاب الوربية.
- mammary n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ ثَدِيٌّ**. ألم عصبي في منطقة الثدي.
- mandibular joint n. **أَلَمٌ مَفْصِلِ الْفَكِّ**. ألم في قمة الرأس وفي المنطقة القذالية مع ألم الأذن واللسان وحول الأنف والعينين مع اختلال وظيفة المفصل الصدغي الفكي السفلي.
- migrainous n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ شَقِيقِيٌّ**. نوع من داء الشقيقة يتصف بنوبات من الألم النصفي المبرح في إحدى العينين ونصف الجبهة مع ارتفاع درجة حرارتها والتدمع والثر الأنفي وقد تدمر النوبة لمدة 15-30 دقيقة وقد تأتي النوبات بمجموعات متقاربة.
- nasociliary n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ أَنْفِيٌّ هَدَبِيٌّ**. ألم في العينين والحاجبين وجسر الأنف.
- otic n. (= geniculate n., Ramsy Hunt syndrome) **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ أُذُنِيٌّ** متلازمة رمزي هنت.
- peripheral n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ مُحِيطِيٌّ**. ألم على مسرى أحد الأعصاب الحسية المحيطة.
- postherpetic n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ تالٍ للهربس**. ألم محرق مع مذل أو فرط الحساسية في مناطق انتشار الأعصاب الحسية الجلدية عقب إصابتها بالهربس النطقي والذي قد يدوم لبضعة أسابيع أو أشهر.
- red n. (= erythromelalgia) **إِحْمِرَارُ الْأَطْرَافِ** المؤلم. داء يصيب أطراف الجسم والأقدام أكثر من اليدين يتصف بتوسع الاوعية الانتيايبي بالجانبين وخاصة في الأطراف مع ألم محرق شديد وارتفاع درجة حرارة الجلد واحمراره.
- reminiscent n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ تَذَكُّرِيٌّ**. الشعور

- النفسي بألم عصبي يبقى بعد زوال الألم العصبي الأصلي.
- sciatic n. (= sciatica) **النَّسْأُ؛ عِزْقُ النَّسَا؛ ألم العصب الوركي**.
- Sluder's n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ سَلُودَرِيٌّ**. ألم عصبي في العقدة الودية الحنكية يسبب ألماً محرقاً وثاقباً في منطقة الفك العلوي مع انتشاره إلى الرقبة والمنكبين.
- sphenopalatine n. (= Sluder's n.) **أَلَمٌ الْوَتْدِيّ الْحَنَكِيّ**.
- stump n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ جَدْعِيٌّ**. ألم عصبي في موضع البتر.
- supraorbital n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ فَوْقَ الْحَاجِجِيّ**. ألم عصبي في العصب فوق الحاجج.
- trifacial n. (= trigeminal n.) **أَلَمُ الثَّلَاثِيّ التَّوَائِمِ**.
- trigeminal n. **أَلَمُ الثَّلَاثِيّ التَّوَائِمِ**. ألم عصبي مبرح في المنطقة التي يغذيها العصب ثلاثي التوائم وعادة ما يثيره تنبه بعض النقاط المهيجة له.
- vidian n. **أَلَمُ عَصَبِ فِيدْيوس؛ ألم عصب النفق الجناحي**. ألم عصب القناة الجناحية.
- visceral n. **أَلَمٌ عَصَبِيٌّ حَشَوِيٌّ**. ألم عصبي في منطقة الحوض.
- neuralgic** متعلق بالألم العصبي. منسوب الألم العصبي أو مصاب به.
- neuralgiform** شبيه الألم العصبي.
- neuragenesis** تَجَدُّدُ الْأَعْصَابِ. تجدد أو إعادة تكوين النسيج العصبي.
- neurapraxia** تَعَذُّرُ الْأَدَاءِ الْعَصَبِيّ. عدم توصيل العصب للنبضات مع عدم وجود أي تغيير بنيوي فيه بسبب إصابة كليلة أو انضغاطية أو إقفارية وعادة ما تعود له وظيفته بعد فترة.
- neurarchy** التَحَكُّمُ الْعَصَبِيّ. سيطرة الجهاز الدماغي النخاعي على الجسم.
- neurarthropathy (= neuroarthropathy)** **إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ مَفْصِلِيٍّ**.
- neurasthenia** وَهْنٌ عَصَبِيٌّ. مصطلح قديم للدلالة على متلازمة الضعف والتعب العقلي والجسمي المزمن والذي كان يعتقد بأنه يتسبب عن إرهاق الجهاز العصبي.

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِيٌّ. ومن عصبي - acoustic n. يترافق مع فقدان السمع لدرجات متفاوتة.

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ رَضَجِيٌّ. ومن عصبي - traumatic n. يتلو الإصابة بصدمة أو رضح.

موهون عصبي؛ وَاهِنُ الأعصاب. neurasthenic مصاب بالوهن العصبي أو ما ينسب إليه.

ضمور عصبي. خلل تغذية الجهاز العصبي. neuratrophia (= neuratrophy)

ضَامِرُ الأعصاب. شخص neuratrophic مصاب بالضمور العصبي.

ضمور عصبي. ضُمور إحدى العضلات أو الأنسجة بسبب مرض أو اختلال عصبي. neuratrophy (= neuratrophia)

1. المِخْوَرُ 2. المِخْوَرُ العَصَبِيٌّ. neuraxis 1. محوار العصبون 2. الجهاز العصبي المركزي.

المِخْوَرُ. neuraxon (= axon)

عَصَبُون. neurone (neuron)

تَفْدِيْدُ العَصَبِ: مَطُّ العَصَبِ. neurectasia (= neurotony) (= nerve stretching)

قَطْعُ العَصَبِ. قطع جزء من neurectomy العصب.

عَصَبِيٌّ مَعْوِيٌّ. متعلق بالقناة neurenteric العصبية والمعوي البدائي للجنين وخصوصاً بالنسبة للقناة التي تربطهما.

عَصَبِيٌّ ظَهَارِيٌّ. neurepithelial (= neuroepithelial)

ظَهَارَةُ العَصَبِيَّة. neurepithelium (= neuroepithelium)

عَصَبِيٌّ الْفَعْلُ. منسوب للفعل neurergic العصبي أو معتمد عليه في وظائفه.

قَلْعُ العَصَبِ. عملية تمزيق neurexeresis أو قلع العصب.

طَبُّ الأعصاب السريري. neuriatry (= clinical neurology)

غَمْدُ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ؛ غَمْدُ شَفَانٍ. الغشاء الرقيق neurilemma (= sheath of Schwann) الذي يغلف طبقات الميالين الرقيقة ويلتف حول محور الليف العصبي المحيطي للألياف المغمدة وبعض الألياف غير المغمدة.

إِثْبَابُ غَمْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ. neurilemmitis

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِيٌّ؛ وَرَمٌ شَفَانِي. neurilemmoma (= neurilemoma)

وَرَمٌ غَمْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ؛ وَرَمٌ شَفَانِي. neurilemoma ورم غمد الليف العصبي المحيطي، وهو عادة ما يكون معزولاً ومحمّلاً.

ورم عصبي سَمْعِيٌّ؛ ورم غمد ليف العصب السمعي. - acoustic n. (= acoustic neuroma)

المِخْوَرُ. neurite (= axon)

مُتَنَبِّهُ العَصَبِ. منسوب لالتهاب neuritic العصب أو مصاب به.

إِثْبَابُ العَصَبِ. التهاب أحد الأعصاب neuritis وهي حالة تتصف بالألم والإيلام فوق العصب والصدر والمعدة والشلل والضمور وانعدام المنعكسات ويستعمل أيضاً للدلالة على الإصابات الالتهابية للجهاز العصبي المحيطي.

التهاب غمد العصب. إِثْبَابُ adventitial n. الغِلَافَةِ البَرَانِيَّة للعصب.

إِثْبَابُ الأَعصاب الكُحُولِي. التهاب alcoholic n. بسبب عوز الثيامين في الكحولية المزمنة.

إِثْبَابُ عَصَبِيٍّ صَاعِدٍ. التهاب ascending n. العصب الذي يبدأ من القدم ويصعد إلى الساق ثم إلى الفخذ والورك والجذع.

إِثْبَابُ العَصَبِ العضدي: الضُمُورُ العَضَلِيّ brachial n. (= neuralgic amyotrophy) المُولِم.

التهاب عَصَبِيٌّ مَرَكَزِيٌّ؛ إِثْبَابُ الأعصاب المَتَنِيّ. central n. (= parenchymatous n.)

إِثْبَابُ عَصَبِيٍّ نَازِلٍ. التهاب descending n. العصب الذي يبدأ من المنكب أو الورك ثم ينتشر للأسفل حتى الأطراف ونهاياتها اليد والقدم.

إِثْبَابُ الأعصاب القَوْتِيّ: (beriberi) dietetic n. (= beriberi) بري بري. داء يتولد عن نقص الثيامين (فيتامين B) في الغذاء ويتصف بالتهاب الأعصاب والوذمة واعتلال القلب.

إِثْبَابُ الأعصاب المَتَنَتَر. disseminated n. (= polyneuritis)

إِثْبَابُ الأعصاب المَتَوَطَّن: بري بري. endemic n. (= beriberi)

إِثْبَابُ العَصَبِ الوَجْهِيّ. التهاب fallopian n. العصب الوجهي في منطقة قناته.

- **interstitial n.** التهاب النسيج الضام لجذع عصبي.
  - **interstitial hypertrophic n.** التهاب الأغصاب الخلالي الضخامي. اعتلال عصبي ضخامي متركب.
  - **intraocular n.** التهاب العصب داخل المقلة. تنكس الليف الأعصاب الذي يشمل القرص البصري.
  - **lead n. (= n. saturnina)** التسمم بالرصاص. التهاب الأعصاب الرصاصي.
  - **leprous n.** التهاب الأغصاب الجذامي. نوع من التهاب الأعصاب يظهر في الجذام.
  - **malarial n.** التهاب الأغصاب الملاري. التهاب الأعصاب الذي يترافق مع الملاريا.
  - **n. migrans (= migrating n.)** التهاب الأغصاب المهاجر. التهاب العصب الذي يصيب أولاً أحد الأعصاب ثم ينتشر إلى عصب آخر.
  - **multiple n. (= polyneuritis)** التهاب الأغصاب المتعدد. التهاب عصبي متعدد.
  - **n. multiplex endemica (= beriberi)** التهاب الأغصاب المتوطن المتعدد. بري بري.
  - **n. nodosa** التهاب الأغصاب العقدي. نوع من التهاب الأعصاب يولد عقداً على الأعصاب.
  - **optic n.** التهاب العصب العيني. التهاب العصب العيني الذي يمكن أن يصيب قسمه داخل العين (التهاب العصب داخل المقلة) أو قسمه خلف العين (التهاب العصب خلف المقلة).
  - **orbital optic n. (= retrobulbar optic n.)** التهاب العصب خلف المقلة.
  - **parenchymatous n.** التهاب الأغصاب الغنني. التهاب العصب الذي يصيب المحوار وغمده النخاعيني في الأعصاب المحيطية.
  - **periaxial n. (= segmental demyelination neuropathy)** التهاب حول محوار العصب. اعتلال الأعصاب المزيل للميالين القطعي.
  - **peripheral n.** التهاب العصب المحيطي. أحد الأعصاب المحيطية أو النهايات العصبية.
  - **porphyric n.** التهاب الأغصاب البرفيرية. التهاب الأعصاب الذي يظهر في البرفيرية المتقطعة الحادة.
  - **postfebrile n.** التهاب الأغصاب التالي للحُمى. التهاب الأعصاب الذي يعقب الإصابة بأحد الأمراض الطفحية.
  - **postocular n. (= retrobulbar n.)** التهاب العصب خلف المقلة.
  - **pressure n.** التهاب العصب الانضغاطي. التهاب العصب الذي يتولد عن انضغاطه.
  - **n. puerperalis traumatica** التهاب الأغصاب النفاسي الرضحي. التهاب الأعصاب الذي يحصل للمرأة نتيجة إصابتها أثناء الولادة.
  - **radiation n. (= radioneuritis)** التهاب الأغصاب الشعاعي.
  - **radicular n. (= radiculitis)** التهاب الجذور العصبية. التهاب الأعصاب الذي يشمل الجذور النخاعية للعصب.
  - **retrobulbar n.** التهاب العصب خلف المقلة. التهاب قسم العصب العيني خلف مقلة العين.
  - **rheumatic n.** التهاب الأغصاب الروماتزمي. التهاب الأعصاب الذي يترافق مع الأمراض الروماتزمية.
  - **n. saturnina** التهاب الأغصاب الرصاصي. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن التسمم بالرصاص.
  - **sciatic n. (= sciatica)** النسي؛ عرق النسا.
  - **segmental n.** التهاب العصب القطعي. اعتلال عصبي يتصف بفقدان النخاعين من قسيمات عصبية من العصب.
  - **senile n.** التهاب الأغصاب الشيخوخي. التهاب الأعصاب الذي يصيب الشيخوخ وغالباً ما يصيب أعصاب الأطراف.
  - **shoulder girdle n. (= neuralgic amyotrophy)** التهاب أعصاب الحزام الكتفي؛ الضمور العضلي المولم.
  - **syphilitic n.** التهاب الأغصاب الزهري. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن داء الزهري.
  - **tabetic n.** التهاب الأغصاب التابيسي. التهاب الأعصاب المرافق للتأيس الظهري.
  - **toxic n.** التهاب الأغصاب التسممي. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن التسمم بمادة سامة.
  - **traumatic n.** التهاب العصب الرضحي. التهاب العصب الذي يعقب الإصابة الرضحية ويتولد عنها.
- neuroallergy** أُرْجِيَّة عَصَبِيَّة. أرجية النسيج العصبي.

**neuroamebiasis** التهابُ الأعصابِ الأَمِيبِيّ. التهابُ الأعصابِ الذي يتولد عن داء الامبيات.

**neuroanastomosis** مُفَاغَرَةٌ عَصَبِيَّةٌ. إجراء مفاغرة بين الأعصاب جراحياً.

**neuroanatomy** التَشْرِيحُ العَصَبِيّ. علم تشريح الجهاز العصبي.

**neuroarthropathy** اِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ مَفْصَلِيٍّ. مرض بنيات المفاصل الذي يترافق مع أمراض الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي.

**neuroastrocytoma** وَرَمٌ نجمي عَصَبِيّ. وَرَمٌ دَبْقِيّ يكون بصورة رئيسية من الخلايا النجمية وهو شبيه بالورم النجمي وغالباً ما يوجد في قاع البطين الثالث والفصوص الصدغية ومن الممكن أن يتكون في أي قسم من أقسام الجهاز العصبي.

**neurobehavioral** سلوكي عَصَبِيّ. نسبة إلى الحالة العصبية للشخص الذي يتعرف عليها بملاحظة سلوكه.

**neurobiologist** اِختصاصي البيولوجيا العصبية. مختص البيولوجيا العصبية.

**neurobiology** البيُولُوجِيَا العَصَبِيَّةُ؛ عِلْمُ الحَيَاةِ العَصَبِيَّةِ. علم الجهاز العصبي الذي يشمل علومه التشريحية والفيزيولوجية والكيميائية الحيوية والباثولوجيا العصبية وعلم الأدوية العصبية.

**neurobiotaxis** اِتِّحَاءُ حَيَاتِيّ عَصَبِيّ. النظرية التي تنص على أن لأجسام الخلايا العصبية النزعة للهجرة أثناء تطورها بالاتجاه الذي تستلم منه عادة منبهاتها.

**neuroblast** أُرُومَةٌ عَصَبِيَّةٌ. أي من الخلايا الجنينية التي تتطور إلى خلية عصبية أثناء مراحل تناميها وعادة ما تكون خلية عصبية غير ناضجة.

**neuroblastoma** وَرَمٌ الأُرُومَةِ العَصَبِيَّةِ. ساركومة من مصدر عصبي يتكون غالباً من أرومات عصبية ويصيب عادة الرضع والأطفال حتى سن العاشرة وغالباً ما ينمو من الخلايا العصبية الودية أو من نخاع الغدة الكظرية.

**neurocanal (= canalis vertebralis)** القَنَاةُ الفَقْرِيَّةُ.

**neurocardiac** عَصَبِيّ قَلْبِيّ. نسبة للجهازين العصبي والقلبي.

**neuroceptor** مُتَقَبِّلُ عَصَبِيّ. أحد العناصر

الانتهازية للتخصّصات العصبية التي تستلم المنبهات من الناقلات العصبية للعصبونات المجاورة.

**neuroceratin (= neurokeratin)** قَرَاتِينُ عَصَبِيّ.

**neurochemistry** الكِيمِيَاءُ العَصَبِيَّةُ. فرع العلوم العصبية الذي يعنى بكيمياء الجهاز العصبي.

**neurochitin** كَيْتِينُ عَصَبِيّ. المادة التي تكون الهيكل الذي يسند الألياف العصبية.

**neurochondrite** الفُضْرُوفُ العَصَبِيّ. أحد العناصر الجنينية التي تتطور إلى القوس العصبي الفقرة.

**neurochorioretinitis** التهابُ العَصَبِ البَصَرِيّ والمَشِيمِيَّةِ والشَبَكِيَّةِ.

**neurochoroiditis** التهابُ العَصَبِ البَصَرِيّ والمَشِيمِيَّةِ.

**neurocladism** تَفَرُّعُ عَصَبِيّ. تكوين فروع جديدة من نواتئ العصبون وخصوصاً عند تجدد الأعصاب المقطوعة حيث تنجذب الفروع الجديدة المكونة من جدعة القسم الداني من العصب نحو جدعة القسم الطرفي لتكوّنا سوية جسراً بين النهايتين.

**neuroclonic** عَصَبِيّ رَمْعِيّ. يتميز بالتشنجات العصبية.

**neurocommunications** المُوَاصَلَاتُ العَصَبِيَّةُ. فرع العلوم العصبية الذي يعنى بانتقال المعلومات العصبية وتناسقها ضمن الجهاز العصبي المركزي.

**neurocranial** عَصَبِيّ قَحْفِيّ. متعلق بالقحف العصبي.

**neurocranium** القَحْفُ العَصَبِيّ. قسم الجمجمة الذي يحوي الدماغ.

**neurocrine** صَمَاوِيّ عَصَبِيّ. 1. تأثير صماوي على الأعصاب أو بواسطتها 2. إفراز عصبي.

**neurocristopathy** اِغْتِلَالُ عُرْفِيّ عَصَبِيّ. أي مرض ينتج عن سوء تنامي العرف العصبي.

**neurocutaneous** عَصَبِيّ جُلْدِيّ. نسبة للعصب والجلد أو للعصب الجلدي.

**neurocyte (= neuron)** خَلِيَّةُ عَصَبِيَّةٌ؛ عَصْبُون. خلية عصبية من أي نوع كان.

**neurocytology** عِلْمُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة. فرع العلوم العصبية الذي يعني بدراسة المكونات الخلوية للجهاز العصبي.

**neurocytolysin** حَالُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة. أحد مكونات سم بعض الأفاعي (كالكوبرا) الذي يحلل الخلايا العصبية.

**neurocytoma (= neuroepithelioma)**

وَرَمُ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّة؛ ورم ظهاري عصبي. ورم دماغي يتكون من خلايا عصبية غير متميزة أي أنها خلايا تشبه خلايا الورم الظهاري العصبي.

**neurodealgia** أَلَمُ الشَّبَكِيَّة. ألم شبكية العين.

**neurodeatrophia** ضَمُورُ الشَّبَكِيَّة. ضمور شبكية العين.

**neurodegenerative** تَنَكُّسِي عَصَبِي؛ مُتَنَكِّس عَصَبِيَّ. ينتسب أو يتصف بالتنكس العصبي.

**neurodendrite (= dendrite)** تَغْصُن.

**neurodendron (= dendrite)** تَغْصُن.

**neuroderm (= neural ectoderm)** الأديمُ العَصَبِي. قسم الأديم الظاهر الذي يتطور ليولد الأنبوب العصبي.

**neurodermatitis** جُلَادَةٌ عَصَبِيَّة؛ إِيْتِهَابُ الْجِلْدِ العَصَبِي. التهاب جلدي اكزيمي متباين يعتبر استجابة جلدية لحك الجلد أو لتدليك أو لقرصه المستمر للتفريغ عن الحكة الشديدة مما يولد آفات متعددة الأشكال في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة والتي تتباين كثيراً في شكلها وأدوارها وشدتها عند مختلف الأشخاص ويعتقد البعض أنها ناتجة عن اضطراب نفسي المنشأ.

**- exudative n. (= nummular eczema)** إِكْزِيْمَةٌ دَرَهْمِيَّة.

**- nummular n. (= nummular eczema)** إِكْزِيْمَةٌ دَرَهْمِيَّة؛ التهاب الجلد الدرهمي.

**neurodiagnosis** تَشْخِيصٌ عَصَبِي. تشخيص الأمراض العصبية.

**neurodynamic** دِيْنَامِيكِي عَصَبِي. متعلق بالطاقة العصبية.

**neurodynia (= neuralgia)** أَلَمُ عَصَبِي. ألم يمتد على مجرى أحد الأعصاب أو أكثر.

**neuroectoderm** الأديمُ العَصَبِي الظَّاهِر.

قسم الأديم الظاهر للجنين الذي يتطور ليكون الجهازين العصبي المركزي والمحيطي وبعض الخلايا الدبقية.

**neuroeffector** عَصَبِيٌّ مُسْتَفْعِلِي. متعلق بالاتصال بين العصبون والعضو المستفعل الذي يغذيه.

**neuroelectricity** الْكَهْرَبَائِيَّةُ الْعَصَبِيَّة. الإشارات أو التيارات أو الفولتية الكهربائية التي يولدها الجهاز العصبي.

**neuroencephalomyelopathy** اغْتِلَالٌ عَصَبِيٌّ دِمَاعِيٌّ نُخَاعِيٌّ. مرض يصيب الدماغ والنخاع والأعصاب.

**- optic n. (= neuromyelitis optica)** إِيْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ؛ الإلتهاب المياليني للعصب البصري.

**neuroendocrine** عَصَبِيٌّ صَمَاوِيٌّ. متعلق بالتأثيرين العصبي والصماوي وخصوصاً بالتفاعل بين الجهازين العصبي والصماوي والهرمونات التي تتكون في الجهاز العصبي ومن ثم تفرزها الغدد الصماوية مثل هرمون الفازوبريسين.

**neuroendocrinology** عِلْمُ الصَّمَاوِيَّاتِ العَصَبِيَّة. مبحث التفاعلات بين الجهازين العصبي والصماوي.

**neuroenteric (= neuterteric)** عَصَبِيٌّ مِعْوِيٌّ.

**neuroepidermal** عَصَبِيٌّ بَشْرَوِيٌّ. متعلق بالأنسجة العصبية والبشرية أو المولد لهما.

**neuroepithelial** ظَهَارِيٌّ عَصَبِيٌّ. متعلق بالظاهرة العصبية أو مكون منها.

**neuroepithelioma (= neurocytoma)** ورم ظهاري عصبي؛ ورم الخلايا العصبية.

**neuroepithelium** ظَهَارَةٌ عَصَبِيَّة. 1. خلايا أسطوانية بسيطة متخصصة تعمل كخلايا حسية لاستلام المنبهات الخارجية كخلايا القوقعة أو الدهليز أو الأنف أو اللسان. 2. ظاهرة البشرة التي يتطور منها الجهاز العصبي.

**- n. crista ampullaris (= n. of ampullary crest)** الظَهَارَةُ الْعَصَبِيَّةُ لِلْعُرْفِ الأَمْبُولِيِّ. الظهارة المتخصصة للعرف الأمبولي للتيه والتي تحوي الخلايا المستقبلية التي تبرز الشعيرات من بعضها لداخل القبية.

- n. macularum (= n. of maculae)

الظَهَارَةُ العَصَبِيَّةُ لِلْبَقْع. الظهارة المتخصصة لبقع التيه والتي تحوي الخلايا الحسية المستقبلية والتي تبرز الشعيرات من بعضها لداخل غشاء غبار الأذن.

neurofiber (= nerve fiber) لِنَفْ عَصَبِي.

neurofibra (= nerve fiber) لِنَفْ عَصَبِي.

neurofibrae (= nerve fibers) الِيفَ عَصَبِيَّة.

neurofibril لِنَيْف عَصَبِي. أي من الخيوط الدقيقة التي تمر خلال هيولي جسم العصبون وتمتد من أحد التغصنات للتغصنات الأخرى أو للمحوار وقد يظهر بالفحص المجهرى الإلكتروني بأنه مكون من تجمعات من الخيوط والنيبيات العصبية.

neurofibrilla (= neurofibril) لِنَيْف عَصَبِي.

neurofibrillae لِنَيْفَات عَصَبِيَّة.

neurofibroma وَرَم لِيَفِي عَصَبِي. ورم العصب المحيطي الذي يتكون من التكاثر الشاذ لخلايا شفان.

neurofibromatosis وَرَام لِيَفِي عَصَبِي. حالة تتصف بتغيرات تطورية في الجهاز العصبي والعضلات والعظام والجلد وتتصف سطحياً يتكون العديد من الأورام اللينة المسوكة (أورام ليفية عصبية) والمنتشرة في كل أنحاء الجسم والمترافقة مع مناطق انصبغية.

neurofilament خَيْط عَصَبِي. أحد العناصر الخيطية الدقيقة جداً التي تكون مع النيبيات العصبية الليف العصبي وهي تشابه الخيوطات الصغرية التي توجد في العديد من خلايا الجسم غير العصبية فهي تقوم بنقل بعض المستقبلات عند تكوين هيكل الليف العصبي داخل الخلية العصبية.

neuroganglitis الِتِهَابُ العُقْدَةُ العَصَبِيَّة. التهاب إحدى العقد العصبية.

neuroganglion عُقْدَةُ عَصَبِيَّة. عقدة أو كتلة من الخلايا أو المواد العصبية.

neurogastric عَصَبِي مَعْدِي. يتولد بأعصاب المعدة أو منسوب إليها.

neurogen مُوَلَّدُ العَصَب. المادة الكيميائية التي تساعد على تطور اللوح العصبي في الجنين.

neurogenesis تَكُونُ العَصَب. عملية تكون النسيج العصبي.

1. مُكَوَّنُ العَصَب 2. عَصَبِي neurogenic العُنْشَا. 1. ما يكون النسيج العصبي أو ينبه الطاقة العصبية 2. ما ينشأ من الجهاز العصبي.

neurogenous عَصَبِي العُنْشَا. ما يتولد من الجهاز العصبي أو من أفة فيه.

neuroglia دَبِقُ عَصَبِي. المادة الساندة للنسيج العصبي التي تتكون من شبكة نسيجية مكونة من عناصر أديمية ظاهرة محورة تضم خلايا متفرعة خاصة تسمى الخلايا الدبقية أو الدبقيات العصبية وهناك ثلاثة أنواع منها: الخلايا النجمية وقليلات التغصن، وهي نوعان الدبقيات الكبيرة والدبقيات الصغرية وهي من أصل أديمي متوسط وتقوم هذه الخلايا بدور في تكوين النخاعين ونقل المواد للعصبونات والحفاظ على محيطها الأيوني.

الدَبِقُ العَصَبِي بَيْنَ الحَزَم. - interfascicular n. الدبقيات قليلات التغصن التي توجد في المادة البيضاء على طول الغمد النخاعيني.

الدَبِقُ العَصَبِي المُحِيطِي. غمد - peripheral n. الليف العصبي وخلايا شفان والخلايا التابعة للجهاز العصبي المحيطي.

دَبِقِي عَصَبِي. neuroglial (= neuroglial) منسوب للدبق العصبي.

خَلِيَّة دَبِقِيَّة عَصَبِيَّة. خلية neurogliocyte الدبق العصبي.

وَرَم دَبِقِي neurogliocytoma (= glioma) عَصَبِي. ورم يتكون من خلايا الدبق العصبي.

neurogliomatosis (= neurogliosis) وَرَام دَبِقِي عَصَبِي.

وَرَام دَبِقِي عَصَبِي. حالة neurogliosis تتصف بتوليد عدة أورام دبقية منتشرة في أنحاء الجسم.

اعتلال عصبي بنقص neuroglycopenia السكر. نقص سكر الدم المزمن للحد الذي يضعف وظائف الدماغ ويؤدي إلى تغيير الشخصية وتردي التفكير.

رصيد الخبرة العصبية. بقيا وآثار neurogram الفعاليات الدماغية القديمة التي تؤثر على طراز الوظائف الدماغية للشخص وبهذا تشارك في تكوين شخصيته.

neurography بحث عصبي. رسالة أو وصف للأعصاب أو للجهاز العصبي.

neurohormonal عَصَبِيٌّ هُزْمُونِيٌّ. ذو تأثير عصبي وهرموني.

neurohormone هُزْمُونٌ عَصَبِيٌّ. هرمون ينبه وظيفة عصبية.

neurohumor خَلْطٌ عَصَبِيٌّ. مادة كيميائية تتكون في العصبون تتمكن من تنشيط أو تعديل وظيفة العصبون أو العضلة أو الغدة القريبة منها.

neurohumoralism الخَلْطِيَّةُ العَصَبِيَّةُ. النظرية التي تنص على أن فعالية الأعصاب الذاتية على الأعضاء المحيطة تتولد بواسطة مواد كيميائية (أخلاط عصبية) تفرز عند نهايات الأعصاب المنشطة.

neurohypophyseal (= neurohypophysial) نُخَامِيٌّ عَصَبِيٌّ.

neurohypophysectomy اسْتِنْصَالُ النُّخَامِيَّةِ العَصَبِيَّةِ. إزالة الفص العصبي للغدة النخامية جراحياً.

neurohypophysial نُخَامِيٌّ عَصَبِيٌّ. منسوب للنخامى العصبية.

neurohypophysis النُّخَامِيَّةُ العَصَبِيَّةُ. الفص الخلفي (العصبي) للغدة النخامية وهو مركز خزن الفازوبرسين والاوسيتوسين والنيورفيزين.

neuroid عَصَبِيَّانِيٌّ؛ شَبِيهُ العَصَبِ.

neuroimmunologic مَنَاعِيٌّ عَصَبِيٌّ. منسوب للمناعة العصبية.

neuroimmunology المَنَاعَةُ العَصَبِيَّةُ. فرع العلوم الذي يعنى بتفاعل الجهازين العصبي والمناعي أثناء الصحة والمرض مثل تأثيرات الجهاز العصبي الذاتي على الاستجابات المناعية أو دور الأضداد في الوهن العضلي الوبيل.

neuroinidia نَقْصُ التَغْذِيَّةِ العَصَبِيَّةِ. نقص تغذية الخلايا العصبية.

neurokeratin قَرَاتِينٌ عَصَبِيٌّ. نوع من القراتين يعتقد بأنه يولد الشبكة السائدة للغمد النخاعيني للألياف العصبية المغمدة.

neurokinet مَطْرَقَةُ العَصَبِ. آلة تستعمل لتنبيه العصب بالطرق.

neurokyme مَفْعُولٌ عَصَبِيٌّ؛ عَمَلِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.

أية عملية عصبية بصورة عامة.

neuro labyrinthitis الْتِهَابُ عَصَبِيٌّ تَلْهَبِيٌّ. التهاب البنيات العصبية للته.

neuroleptism (= lathyrism) التَّسَلُّمُ بِالْجُلْبَانِ.

neurolemma (= neurilemma) غَمْدُ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ.

neurolemmitis (= neurilemmitis) الْتِهَابُ غَمْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ.

neurolemmoma (= neurilemmoma) وَرَمٌ غَمْدِ اللَّيْفِ العَصَبِيِّ.

neuroleptanalgesia تَسْكِينٌ تَطْمِينِيٌّ. حالة همود وتغير الوعي مع التسكين يتولد عن تناول أي مركب يحوي مسكناً مخدراً وعاملاً مضاداً للذهان.

neuroleptanalgesic مُسَكِّنٌ تَطْمِينِيٌّ. مادة تولد تسكيناً مضاداً للذهان.

neuroleptanesthesia تَخْدِيرٌ تَسْكِينِيٌّ. حالة تسكين بمضاد للذهان مع فقدان الوعي تتولد عن تناول مركب يحوي مسكناً مخدراً وعاملاً مضاداً للذهان مع استنشاق أكسيد النتروجين والأكسجين.

neuroleptanesthetic مُخَدِّرٌ تَطْمِينِيٌّ. مادة تولد تخديراً مضاداً للذهان.

neuroleptic (= antipsychotic) مُضَادٌّ لِلذَّهَانِ. مصطلح يستعمل للدلالة على تأثير الأدوية المضادة للذهان على السلوك والاستعراف والتي تولد حالة من الخمول وضعف المبادرة والعاطفة ولكنها تقلل من حالة التخليط والهياج لدى المريض النفساني وتعديل الفعاليات النفسية الحركية لديه.

neurolipomatosis وُرَامٌ شَحْمِيٌّ عَصَبِيٌّ. حالة تنصّف بتكوّن ترسبات شحمية متعددة تحت الجلد مع الضغط على الأعصاب فتولد الألم والإيلام والمذل.

- n. dolorosa (= adiposis dolorosa) شَحَامَةٌ مُؤَلِمَةٌ؛ وُرَامٌ شَحْمِيٌّ عَصَبِيٌّ مُؤَلِمٌ.

neurologia (= neurology) طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيِّ.

neurologic طِبِّيٌّ عَصَبِيٌّ. متعلق بطب الجهاز العصبي أو بالجهاز العصبي نفسه.

neurologist طَبِيبُ الأعْصَابِ. اختصاصي في طبابة الجهاز العصبي.

**neurology** طبُّ الجهازِ العَصَبِيِّ. فرع العلوم الطبية الذي يعنى بدراسة الجهاز العصبي السوي والمرضي وأمراضه.

**- clinical n.** طبُّ الجهازِ العَصَبِيِّ السَّرِيرِيِّ. فرع الطب الذي يهتم بتشخيص أمراض الجهاز العصبي واضطراباته وبمعالجتها.

**neurolues (= neurosyphilis)** الزهري العَصَبِيِّ.

**neurolymph (= cerebrospinal fluid)** السائلُ الدِّمَاغِيُّ النِّخَاطِيُّ.

**neurolymphomatosis** وَرَامٌ لِمَفْي عَصَبِي. ارتشاح أرومي لمفاوي في العصب.

**neurolysin** حَالُ العَصَب. حال الخلية الذي له فعل تخريبي نوعي خاص على الخلايا العصبية.

**neurolysis** افتكاك العصب؛ حُلُّ العَصَب. 1. تحرير غمد العصب بقطعه طولياً 2. عملية قطع الالتصاقات حول العصبية 3. تفريغ الضغط عن العصب المضغوط 4. إزهاق الطاقة العصبية 5. تخريب أو حل النسيج العصبي.

**neurolytic** حَالُ العَصَب. مخرب للأنسجة العصبية.

**neuroma** وَرَمٌ عَصَبِي. ورم مكون بصورة رئيسية من خلايا والألياف عصبية أو ورم ينمو من أحد الأعصاب.

**- acoustic n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِي. ورم حميد يتضخم تدريجياً داخل القناة السمعية وينمو من العصب السمعي وتختلف أعراضه حسب حجمه وموقعه والتي يمكن أن تشمل فقدان السمع والصداع واضطرابات التوازن والمشي وتتمل الوجه والألم والطنين ويمكن أن تكون في إحدى الجهات أو في الجهتين.

**- amputation n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ تَالٍ لِلبَتَر. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ رضحي يعقب بتر أحد الأعضاء أو الأطراف.

**- amyelinic n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ لَا مِيَالِينِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ يحتوي على الألياف عصبية غير مغمدة فقط.

**- n. cutis** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ جِلْدِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ متوضع في الجلد.

**- cystic n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ كَيْسِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ كاذب أو وَرَمٌ عَصَبِيٌّ تحول إلى شكل كيسي.

**- false n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ كَاذِب. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ لا يحوي عناصر عصبية.

**- fascicular n. (= medullated n.)** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مِيَالِينِي.

**- ganglionar n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ عُقْدِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مكون من خلايا عصبية.

**- ganglionic n. (= ganglionar n.)** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ عُقْدِي.

**- malignant n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ خَبِيث. ساركومة البنيات العصبية وعادة ما تكون خلايا مغزلية.

**- medullated n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مِيَالِينِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مكون من الألياف عصبية نخاعية.

**- multiple n. (= neuromatosis)** وَرَامٌ عَصَبِيٌّ متعدد.

**- myelinic n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مِيَالِينِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ يحوي الألياف عصبية ميالينية.

**- nevoid n. (= telangiectodes n.)** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ وَخْمانِي.

**- plexiform n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ ضَفِيرِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مكون من جذوع عصبية ملتوية.

**- telangiectodes n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ مُتَوَسِّع الشعيرات. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ يحوي الكثير من الأوعية الدموية المتوسعة.

**- traumatic n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ رَضَحِي. كتلة من الألياف العصبية البصلية أو العقدية غير المنتظمة مع أنسجتها السائدة التي تتكون بعد رضح العصب العارضي أو القطع القصدي.

**- true n.** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ حَقِيقِي. وَرَمٌ عَصَبِيٌّ يكون من أنسجة عصبية.

**- Verneuil's n. (= plexiform n.)** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ ضَفِيرِي.

**neuromalacia** تَلَيُّنُ الأعْصَاب. تلين الأعصاب المرخي.

**neuromalakia (= neuromalacia)** تَلَيُّنُ الأعْصَاب.

**neuromatosis** وَرَامٌ عَصَبِيٌّ. مرض يتصف بوجود عدة أورام عصبية.

**neuromatous** متعلق بالورم العصبي. مصاب بالورم العصبي أو ما يتصف أو يتعلق به.

**neuromechanism** الآليَّةُ العَصَبِيَّةُ. بنية الجهاز العصبي وترتيبه وتنسيقه بالنسبة لوظائفه.

**neuromeningeal** عَصَبِيٌّ سِخَانِي. منسوب إلى الأنسجة العصبية والسحايا أو ما يصيبهما.



**neuromere** قَسَمٌ عَصَبِيٌّ. 1. أي من الشدقات المتتالية على طول الأنبوب العصبي للجنين المتطور وقد يستعمل الاصطلاح للدلالة على الشدقات المتتالية في الدماغ المؤخر الناضج. 2. شدة من النخاع الشوكي يتصل بها زوج من الجذور الظهرية وزوج من الجذور البطنية.

**neuromimesis** مُحَاكَاةٌ هِسْتِيرِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ. التقليد الهستيرى لأحد الأمراض العصبية.

**neuromimetic** مُحَاكِيُ الْفِعْلِ الْعَصَبِيِّ. 1. توليد استجابة في الأعضاء المستفلة تشابه تلك التي تولدها الدفقات العصبية. 2. عامل يولد مثل هذه الاستجابة. 3. نسبة إلى المحاكاة العصبية.

**neuromittor (= neurotransmitter)** نَاقِلٌ عَصَبِيٌّ. أحد العناصر الانتهازية في النهاية الطرفية للعصبون توصل المنبه إلى المتقبل العصبي للعصبون المجاور.

**neuromodulation** تَفْرِيجٌ عَصَبِيٌّ. التنبيه الكهربائي لأحد الأعصاب المحيطة أو للنخاع الشوكي أو للدماغ للتفريج عن الألم ومن الممكن أن يجري ذلك عبر الجلد أو خلال منبه مغروس.

**neuromotor** عَصَبِيٌّ حَرَكِيٌّ. يشمل العصب والعضل أو منسوب لكليهما.

**neuromuscular** عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ. منسوب للعصب والعضل.

**neuromyasthenia** وَهْنٌ عَضَلِيٌّ عَصَبِيٌّ. وهن عضلي يترافق مع تقلقل عاطفي.

**- epidemic n.** وَهْنٌ عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ وَبَائِيٌّ. داء يشبه التهاب سنجابية النخاع لحد ما ويحدث عادة كمرض وبائي ويتصف بالصداع والألم العضلي واعتلال الغدد اللمفية الرقبة والحمى والشلل أحياناً ولكنه من دون ضمور مع فرط المنعكسية.

**neuromyelitis** الْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْأَعْصَابِ. التهاب المادة العصبية والنخاعية، أي التهاب النخاع المترافق مع التهاب الأعصاب.

**- n. optica** الْتِهَابُ النُّخَاعِ وَالْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ. زوال الميالين من العصب البصري ومن النخاع الشوكي ويتصف بضعف البصر أو العمى مع الشلل الرخو في الأطراف وباضطراب الوظائف الحسية والتناسلية البولية.

**neuromyic (= neuromuscular)** عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ.

**neuromyon** الْعَصَبُ الْعَضَلِيُّ. العناصر العصبية في العضلات.

**neuromyopathic** مُعْتَلٌّ عَصَبِيٌّ عَضَلِيٌّ. ما يتصف بالاعتلال العصبي العضلي ويشمل العضلة القلبية أو منسوب إليه.

**neuromyositis** الْتِهَابُ الْأَعْصَابِ وَالْعَضَلِ. التهاب العصب المختلط مع التهاب العضل.

**neuromyotonia (= myokymia)** تَمَوُّجٌ عَضَلِيٌّ. تشنّج توتري عضلي تسببه فعالية كهربائية لعصب محيطي تنصف بالتيتيس ثم الارتخاء البطيء والارتجاف الحزمي والتقلص الموجي.

**neuron** عَصْبُونٌ. (ج: عَصْبُونَاتٌ). أي من الخلايا الموصلة في الجهاز العصبي المركزي وتتكون عادة من جسم الخلية الذي يحوي النواة والهياكل المحيطة بها مع عدة فروع قصيرة (التغصّنات) التي تنتهي بغصينات انتهائية (تغصّن انتهائي) مع فروع جانبية لها، كما أن لها محاوراً مغطى بغمد يكون عادة الليف العصبي.

**- afferent n.** عَصْبُونٌ وَارِدٌ. عصبون ينقل الدفقات من المستقبلات إلى المركز العصبي.

**- alpha motor n.** عَصْبُونٌ أَلْفَا الْحَرَكِيّ. عصبون مركزي يغذي محواره المحيطي أليافاً حركية عضلية وينقل النبضات بسرعة كبيرة.

**- autonomic n.** عَصْبُونٌ مُسْتَقْلِيٌّ. أي من العصبونات قبل أو بعد العقدة الذي يغذي عضلة ملساء أو قلبية أو إحدى الغدد.

**- bipolar n.** عَصْبُونٌ ذُو قُطْبَيْنِ: عصبون ثنائي القطب. عصبون ذو فرعين ينبع كل واحد منهما من إحدى جهتي جسم العصبون.


**- central n.** عَصْبُونٌ مَرْكَزِيٌّ. عصبون يوجد داخل الجهاز العصبي المركزي بصورة كاملة.

**- connector n. (= interneuron)** عَصْبُونٌ رَابِطٌ: عَصْبُونٌ بَيْنِيٌّ. عصبون تتشابك كل تغصناته ومحواره مع عصبونات أخرى.

**- correlation n.** عَصْبُونٌ تَرَابُطِيٌّ. عصبون يساهم في وظيفة تناسق وترباط مختلف المنبهات لتوليد استجابة مناسبة.


**- efferent n.** عَصْبُونٌ صَادِرٌ. عصبون ينقل الدفقات العصبية من أحد المراكز العصبية إلى أحد الأعضاء المحيطة.

**- exciter n. (= motor n.)** عَصْبُونٌ مُثِيرٌ. عصبون حركي.




neurone

رسم تخطيطي للعصبون يبين مختلف اقسامه




neurone

شكل تخطيطي يبين مختلف الأقسام الوظيفية للأنواع المختلفة من العصبونات.




عصبون حركي



عصبون حسي

neurone

عصبونان حسي وحركي: (1) ألياف عضلية (2) صفيحة انتهائية حركية (3) غمد الليف العصبي (4) المحوار (5) الغمد المياليني (6) فرع رادف (7) دبقيات مركزية (8) جسيمات نيسل (9) نواة العصبون (10) خلايا تابعة (سائلة) (11) عقدة رانقييه (12) الجلد (13) نهايات عصبية حرة (14) نهايات عصبية اشتباكية.



neurone

العصبون الحركي الذي يبدأ في داخل الجهاز العصبي المركزي ويمتد إلى خارجه إلى الجهاز العصبي المحيطي: (1) عقدة رانقييه (2) خلية قليلة التغصن (3) جسيمات نيسل (4) تغصنات (5) تشابك (6) حوالي النواة (7) نقلير المحوار (8) غمد الميالين (9) المحوار (10) خلية شوان (11) فرع جانبي (12) صفيحة حركية انتهائية.

- **first order n. (= primary n.)** عَصْبُونٌ أُولَى.

- **gamma n. (= gamma motor n.)** عَصْبُونٌ غَامَا حَرَكَيٌّ.

- **gamma motor n.** عَصْبُونٌ غَامَا حَرَكَيٌّ. عصبون مركزي يغذي محواره الألياف العضلية داخل المغزل العضلي وينقل الدفعات العصبية بمعدل سرعة توصيل ألياف غاما العصبية وهو معدّل عال.

- **Golgi type I n's** 1. عَصْبُونَاتٌ غُولْجِي نَمَط 1. عصبونات قشرية هرمية الشكل ذات محاور طويلة تترك المادة السنجابية للجهاز العصبي المركزي وتعتبر المادة البيضاء وتنتهي في الأقسام المحيطة.

- **Golgi type II n's** 2. عَصْبُونَاتٌ غُولْجِي نَمَط 2. عصبونات نجمية توجد في المادة السنجابية لقشرة المخ والمخيخ والشبكية وذات محاور قصيرة ولا تترك المادة السنجابية.

- **intercalary n. (= interneuron)** عَصْبُونٌ مُقَحَّم؛ عَصْبُونٌ بَيْنِيٌّ. عصبون متوسط.

- **internuncial n. (= interneuron)** عَصْبُونٌ مُقَحَّم؛ عَصْبُونٌ بَيْنِيٌّ. عصبون متوسط.

- **long n.** عَصْبُونٌ طَوِيل. عصبون ذو محوار طويل.

- **motor n. (= motoneuron)** عَصْبُونٌ حَرَكَيٌّ. عصبون له وظيفة حركية أو عصبون صادر ينقل الدفعات الحركية للعضلات.

- **multiform n. (= multipolar n.)** عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَشْكَال؛ عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَقْطَاب.

- **multipolar n.** عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَقْطَاب. عصبون ذو فروع متعددة تختلف في الشكل حسب ترتيب فروعها وتكثر بين الخلايا الهرمية والنجمية.

- **peripheral sensory n.** عَصْبُونٌ حِسِّيٌّ مُحِيطِيٌّ. عصبون يكون القسم الأول من القوس العصبي المحيطي وهو يقع خارج الجهاز العصبي المركزي ولكن له فرع يدخله وهو يكون مع العصبين البيني والحركي قوس المنعكس المحيطي.

- **polymorphic n. (= multipolar n.)** عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَشْكَال؛ عَصْبُونٌ مُتَعَدِّدُ الْأَقْطَاب.

- **postganglionic n's.** عَصْبُونَاتٌ بَعْدَ الْعُقْدَةِ. عصبونات توجد أجسام خلاياها في العقد المستقلة ووظيفتها ترحيل الدفعات العصبية إلى ما بعدها من بنيات.

- **preganglionic n's.** عَصْبُونَاتٌ قَبْلَ الْعُقْدَةِ. عصبونات توجد أجسام خلاياها في الجهاز العصبي المركزي وتنتهي فروعها الانتهازية في العقد المستقلة.

- **premotor n.** عَصْبُونٌ قَبْلَ الْحَرَكَيِّ. عصبون غير مرتبط مباشرة بالعضلة ولكنه يعمل كمركز ارتباط يتحكم في توصيل الدفعات الحركية إلى عصب حركي معين واحد أو أكثر.

- **primary n.** عَصْبُونٌ أُولَى. عصبون في السبيل العصبي يعمل كمستقبل حسي ويتشابك محواره مع عصبون ثانٍ (العصبون الثانوي) وينقل إليه الدفعات العصبية.

- **primary sensory n.** عَصْبُونٌ حِسِّيٌّ أُولَى. عصبون عقدة الجذر الظهري له فرع يمر إلى عضو الحس المحيطي وآخر يدخل الجهاز العصبي المركزي.

- **projection n.** عَصْبُونٌ إِسْقَاطِيٌّ. عصبون يعمل في نقل الدفعات العصبية سواء كانت حسية أو حركية بين القشرة الدماغية والمراكز دون القشرية أو بالعكس.

- **pseudounipolar n.** عَصْبُونٌ أَحَادِي الْقُطْب. عصبون أحادي القطب كان أصلاً ذا قطبين ولكنهما اندغما أثناء تطورها ليكونا فرعاً واحداً يتوزع بدوره إلى فرعين بعد مسافة من جسم الخلية.

- **pyramidal n. (= pyramidal cell)** خَلِيَّةٌ هَرَمِيَّةٌ.

- **sensory n.** عَصْبُونٌ حِسِّيٌّ. عصبون له وظيفة حسية وهو عصبون واحد ينقل النبضات العصبية من المحيط نحو الجهاز العصبي المركزي.

- **short n.** عَصْبُونٌ قَصِير. عصبون يتفرع محواره إلى فروع عديدة بالقرب من جسم خليةه ويصل إلى الخلايا الجاورة له في المادة السنجابية.

- **unipolar n.** عَصْبُونٌ أَحَادِي الْقُطْبِيَّة. عصبون ذو قطب واحد.

**neuronagenesis** قِلَّةُ عَصْبُونَاتٍ. عدم تكوّن العَصْبُونَات. قلة تكون العصبونات.

**neuronal** عَصْبُونِيٌّ. نسبة للعصبون.

**neuronatrophy** ضُمُورُ العَصْبُونَات. مصطلح يستخدم للدلالة على أي مرض يتسبب عن تصلب العصبونات وضمورها.

**neurone (= neuron)** عَصْبُونٌ.

**neuronephric** عَصْبِيٌّ كُلَوِيٌّ. نسبة للجهازين العصبي والكُلَوِي.

**neuronevus** وَحْمَةٌ عَصْبِيَّةٌ. وحة تتمايز خلاياها إلى ما يشبه البنيات العصبية وقد تسبب سريراً للليفوم العصبي أو قد تكون لها أوصاف سريرية تشبه الوحمة المشعرة العملاقة.

**neuronic** عَصْبُونِيّ. متعلق بالعصبون أو مؤثر فيه.

**neuronin** نِيُورُونِين. البروتين الرئيسي في محوار العصبون.

**neuronitis** إِتِهَابٌ عَصْبُونِيّ. مصطلح يستعمل للدلالة على اضطراب مجهول المنشأ.

**neuronophage** بلعم العصبونات. عاثية. تبتلع الخلايا العصبية.

**neuronophagia** بلعمة العَصْبُونَات. تخريب الخلايا العصبية بعملية ابتلاعها.

**neuronophagy (= neuronophagia)** بَلْعَمَةُ العَصْبُونَات.

**neuronosis** عُصَاب؛ اعتلال عصبي. أي مرض يتولد من أصل عصبي.

**neuronotropic** أَلِفٌ العَصْبُونَات. ماله ألفة للعصبونات.

**neuronymy** التَّسْمِيَةُ العَصْبِيَّة. التسمية النظامية لأقسام الجهاز العصبي.

**neuro-ophthalmology** طِبُّ الأَعْصَابِ العَيْنِيَّة. فرع الطب الذي يتخصص في أقسام الجهاز العصبي المتعلقة بالعين.

**neuro-otology** طِبُّ الأَعْصَابِ الأُذُنِيَّة. فرع الطب الذي يتخصص في أقسام الجهاز العصبي المتعلقة بالأذن.

**neuropacemaker** نَاطِقَةٌ عَصْبِيَّة. ناظمة غرسية تفرّج عن الألم الناتج عن إصابات الأعصاب.

**neuropapillitis (= papillitis)** إِتِهَابُ الخَلِيْمَةِ العَصْبِيَّة؛ إِتِهَابُ الخَلِيْمَةِ.

**neuroparalysis** شَلَلٌ عَصْبِيّ. شلل يتولد عن مرض العصب أو الأعصاب.

**neuropathic** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ. متعلق بالاعتلال العصبي أو متصف به.

**neuropathogenesis** إِفْرَاضٌ عَصْبِيّ. توليد مرض الجهاز العصبي.

**neuropathogenicity** إِفْرَاضِيَّةٌ عَصْبِيَّة. صفة توليد أو قابلية توليد تغييرات مرضية في الأنسجة العصبية.

**neuropathology** العَرَضِيَّاتُ العَصْبِيَّة؛ الباثولوجيا العَصْبِيَّة. فرع الطب الذي يعني بدراسة التغييرات الشكلية والعضوية والمرضية للجهاز العصبي.

**neuropathy** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ. مصطلح يدل على التغييرات الوظيفية أو المرضية أو كليهما التي تصيب الجهاز العصبي المحيطي ويستعمل غالباً للأمراض العصبية المحيطية الالتهابية.

**- alcoholic n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ كُحُولِيّ. اعتلال عصبي بسبب نقص الثيامين الذي يتولد عن الإدمان على الكحول.

**- ascending n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ صَاعِد. اعتلال عصبي يبدأ من الأسفل كالقدم ويتسلق إلى الساق والفخذ والورك والجذع حتى المنكبين والراس.

**- descending n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ نَازِل. اعتلال عصبي يبدأ من الأعلى كالمنكب أو الورك ويهبط للأسفل حتى اليد أو القدم.

**- diabetic n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ سُكَّرِيّ. اعتلال عصبي متعدد مزمن ومتناظر يصيب ابتداء أعصاب الأطراف السفلي وغالباً ما يصيب الأعصاب الودية ويتصف مرضياً بزوال الميلين القسيمي من الأعصاب ويتصف النوع الحاد منه بالم وخيم وضعف العضلات وضموها وفقدان المنعكسات الوترية وخلل الحس المحيطي أما اعتلال الأعصاب الذاتية فإنه يتصف بنقص الضغط القيامي والإسهال الليلي وانحباس البول والعانة وتضييق الحديقة.

**- entrapment n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ إِنْجَبَاسِيّ. أي من مجموع الاعتلالات العصبية التي تشمل متلازمة النفق الرسغي أو متلازمة النفق الرسغي أو ألم الفخذ المذلي حيث يصاب العصب المحيطي بانضغاطه في مرمره في نفق ليفي أو ليفي عظمي أو في نقطة يغير عندها اتجاهه بصورة مفاجئة خلال غلالة عميقة على شريط ليفي أو عضلي، ومن أمثلته متلازمة النفق الرسغي.

**- hereditary sensory radicular n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ وَرَثَائي حَسِّي جَذَرِيّ. اضطراب وراثي سائد يتصف بعلامات فقدان الحس الجذري في الأطراف العلوية والسفلية مع ألم برقي وتقرح الأقدام المزمن غير المؤلم وأحياناً الصمم. ويشاهد تنكس أولي لعقدة الجذر الظهري مع علامات تنكس النواة اللوزية والعصب البصري والمخيخ.

**- periaxial n. (= segmental n.)** اعتلال عصبي محيط بالمحوار؛ إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ قِطْعِيّ.

**- progressive hypertrophic interstitial n.** إِغْتِلَالٌ عَصْبِيّ صَحَامِيّ مَتَرَقٌّ خِلَالِيّ. حالة تتصف بفرط تنسج النسيج الضام الخلالي مسبباً تشنّ جذوع الأعصاب المحيطية والجذور الظهرية

وتصلب الاعمدة الظهرية للنخاع الشوكي وهو مرض عائلي متروك وبطيء يبدأ في مقتبل العمر ويتصف بضمور الاقسام السفلية للساقين وضعف المنعكسات الوترية والحس.

**إِغْتِلَالُ - segmental (demyelination) n.**  
عَصَبِيّ قَطْعِيّ (مُزِيلُ الميالين). اعتلال عصبي يتصف بزوال الميالين من قسيمات من العصب.

**- serum n.**  
إِغْتِلَالُ عَصَبِيّ مُصَلِّي. اعتلال عصبي يشمل الاعصاب الرقبية او الضفيرة العضدية يحدث بعد يومين إلى ثمانية أيام بعد حقن بروتين اجنبي مثل مصل ضدي او ترياق من اصل حيواني ويتصف بالم موضعى مع اضطرابات حسية او الشلل.

**neuropeptide** بَبْتِيدُ عَصَبِيّ. أحد الجزيئات الذي يتكون من سلسلة قصيرة من الحموض الامينية ويوجد في أنسجة الدماغ ويتوضع عادة في نهايات المحاور عند التشابكات ويصنف باعتباره ناقل عصبي بالرغم من أن بعض هذه السلاسل هي هرمونات.

**neurophage (= neuronophag)** غَائِيَّةُ عَصَبُونِيَّة (بلعم عصبي).

**neuropharmacology** عِلْمُ ادْوِيَةِ الجِهَازِ العَصَبِيّ. فرع علم الادوية الذي يعنى بدراسة تأثير الادوية على مختلف اقسام وامراض الجهاز العصبي.

**neurophilic (= neurotropic)** مُوجِّةٌ لِلْعَصَبِ؛ عصبي اللفة.

**neurophonia** عَصَابٌ صَوَاحِي. عصاب مصاحب بصراخ المريض وعويله وأحياناً إصدار أصوات تشابه أصوات الحيوانات.

**neurophthalmology (= neuro-ophthalmology)** طِبُّ الأَعْصَابِ العَيْنِيَّة.

**neurophthisis** ضُمُورٌ عَصَبِيّ. ضمور النسيج العصبي.

**neurophysiology** فِيزْيُولُوجِيَا الجِهَازِ العَصَبِيّ. فرع من علم الفيزيولوجيا يدرس وظائف الجهاز العصبي.

**neuropil** اللَّبْدُ العَصَبِيّ. فروع هبلية من الخلايا العصبية متشابكة تشابكاً كثيفاً مكوناً من تفصنات ومحاور مع خلايا دبقية في الجهاز العصبي المركزي وفي بعض اقسام الجهاز العصبي المحيطي.

**neuropile (= neuropil)** اللَّبْدُ العَصَبِيّ.

**neuropiasm** الجَبَلَةُ العَصَبِيَّة. الجبلية القعدة غير المتميزة الموجودة بالخلية العصبية.

**neuroplasty** رَأَبُ العَصَبِ. الجراحة الربابية للعصب.

**neuroplexus** ضَفِيرَةٌ عَصَبِيَّة. ضفيرة اعصاب.

**neuropodia** أَقْدَامٌ عَصَبِيَّة.

**neuropodien (= neuropodium)** قَدَمٌ عَصَبِيَّة.

**neuropodium** قَدَمٌ عَصَبِيَّة. نهاية بصلية لاحد المحاور في بعض أنواع التشابكات.

**neuropore** مَسَمٌ عَصَبِيّ. النهاية الامامية المفتوحة (الثقبية الامامية) او النهاية الخلفية المفتوحة (الثقبية الخلفية) للأنبوب العصبي للجنين الابتدائي وتغلق هذه الفتحات تدريجياً مع تنامي الأنبوب وفي حوالي الاسبوع الرابع من تطوره.

**- anterior n. (= nostral n.)** المَسَمُ العَصَبِيّ الأَمَامِيّ. الفتحة الجنينية في الجزء الامامي من الدماغ المقدم التي تغلق في مرحلة العشرين جُسَيْدَةً.

**- posterior n. (= caudal n.)** المَسَمُ العَصَبِيّ الخَلْفِيّ. الفتحة الجنينية في الجزء الخلفي من القناة العصبية التي تغلق في مرحلة الخمس وعشرين جسيده (حوالي 26 يوماً).

**neuropotential** الجُهْدُ العَصَبِيّ. الجهد او الطاقة العصبية.

**neuropsychiatry** الطِبُّ النَّفْسِيّ العَصَبِيّ. فرع الطب الذي يشمل الطب النفسي وطب الجهاز العصبي.

**neuropsychic** عَصَبِيّ نَفْسِيّ. متعلق بالمراكز العصبية المتخصصة بالعمليات النفسية.

**neuropsychopathy** إِغْتِلَالُ عَصَبِيّ نَفْسِيّ. اعتلال الاعصاب والنفس.

**neuropsychopharmacology (= psychopharmacology)** عِلْمُ الادْوِيَةِ النَّفْسِيَّة.

**neuropsychosis (= psychosis)** دُهَان.

**neuroradiology** عِلْمُ الأشعة العَصَبِيَّة. علم أشعة الجهاز العصبي.



neurorecidive نَاجِسٌ عَصَبِيٌّ.

neurorecurrence (= neurorelapse)

إِنْتِكَاسٌ عَصَبِيٌّ.

neurorelapse إِنْكَاسٌ عَصَبِيٌّ. هِجَانٌ مَفَاجِئٌ

للزهرى العصبي ينتج عن عدم كفاءة علاجه بالارسفينامين ويتصف بأعراض عصبية عديدة.

neuroretinitis إِنْهَابُ الْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ وَالشَّبَكِيَّةِ.

neuroretinopathy إِنْتِلَالُ الْقُرْصِ الْبَصَرِيِّ

وَالشَّبَكِيَّةِ. تَوَرُّمُ الْقُرْصِ الْبَصَرِيِّ وَتَكْوِينُ تَرْسَبَاتٍ فَبْرِينِيَّةٍ وَمَصْلِيَّةٍ فِي الشَّبَكِيَّةِ وَيَحْصُلُ فِي فَرْطِ ضَغْطِ الدَّمِ الْوَحْمِ.

neuroroentgenography (= neuroradiology) عِلْمُ الْأَشْعَةِ الْعَصَبِيَّةِ: التَّصَوُّيرُ الشَّعَاعِيُّ الْعَصَبِيُّ.

neurorrhaphy رَفْقُ الْعَصَبِ. خِيَاطَةُ الْعَصَبِ الْمَقْطُوعِ.

neurosarcocleisis تَشْمِيلُ الْعَصَبِ

بِالْعُضَلَاتِ: التَّضْمِينُ الْعَضَلِيُّ لِلْعَصَبِ. عَمَلِيَّةٌ تُجْرَى لِمُعَالَجَةِ الْأَلَمِ الْعَصَبِيِّ وَتُجْرَى بِإِزَالَةِ الضَّغْطِ عَنِ الْعَصَبِ الْمَصَابِ بِالْقَطْعِ الْجَزْئِيِّ لِلْقَنَاةِ الْعَظْمِيَّةِ الَّتِي يَمُرُّ مِنْهَا وَغَرَسَ الْعَصَبُ فِي النَسِيجِ الرَّخْوِ لِاحْدَى الْعُضَلَاتِ الْمَجَاوِرَةِ.

neurosarcoma سَارْكُومَةُ عَصَبِيَّةٌ. سَارْكُومَةُ تَحْوِي أَنْسَجَةً عَصَبِيَّةً.

neurosciences الْعُلُومُ الْعَصَبِيَّةُ. مَجْمُوعَةُ الْعُلُومِ الَّتِي تَعْنِي بِدِرَاسَةِ تَطَوُّرِ وَتَنَامِي الْجِهَازِ الْعَصَبِيِّ وَتَشْرِيحِهِ وَفِيزْيُولُوجِيَّتِهِ وَكِيمِيَاثِيَّتِهِ وَعِلْمِ أَدْوِيَّتِهِ وَمَرْضِيَّاتِهِ وَحَتَّى طَبِّهِ وَأَمْرَاضِهِ النَّفْسِيَّةِ وَعِلْمِ النَّفْسِ.

neurosclerosis تَصَلُّبٌ عَصَبِيٌّ. تَصَلُّبُ مَادَّةِ الْعَصَبِ أَوْ الْمَرْكَزِ الْعَصَبِيِّ.

neurosecretion إِفْرَازٌ عَصَبِيٌّ. 1. الْفَعَالِيَّاتُ الْإِفْرَازِيَّةُ لِلْخَلِيَّةِ الْعَصَبِيَّةِ كِإِفْرَازِ الْهَرْمُونَاتِ الْمَحْرُورَةِ وَالْفَازُوْبِرِيسِينِ وَالنَّاقِلَاتِ الْعَصَبِيَّةِ. 2. الْإِفْرَازَاتُ الَّتِي تُولِّدُهَا هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ.

neurosegmental شَدَفِيٌّ عَصَبِيٌّ. يَنْتَسِبُ إِلَى زَوْجٍ مِنَ الْجُذُورِ النَّخَاعِيَّةِ الشُّوكِيَّةِ الظَّهْرِيَّةِ وَالْبَطْنِيَّةِ أَوْ مِنْطَقَةِ الْجِسْمِ الَّتِي تُغْذِيهَا.

neurosensory عَصَبِيٌّ حِسِّيٌّ. مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَصَبِ الْحَسِيِّ.

neuroses عُصَابَاتٌ. جَمْعُ عَصَابٍ.

neurosis عُصَابٌ. 1. اضْطِرَابٌ نَفْسِيٌّ وَظَلْفِيٌّ يَتَصَفُّ بِأَعْرَاضٍ خَلَلَ تَوَثُّرِ الذَّاتِ (الْأَنَا) كَالْوَسْوَاسِ وَنَوْبَاتِ الْقَلْقِ وَالرَّهَابِ. 2. أَمَّا فِي نَظَرِيَّةِ التَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ فَهِيَ الْعَمَلِيَّةُ السَّبَبِيَّةُ الَّتِي لَا تُولِّدُ الْعَصَابَ فَقَطْ (الْمَوْصُوفُ أَعْلَاهُ) بَلْ تُؤَدِّي أَيْضاً إِلَى اضْطِرَابَاتِ الشَّخْصِيَّةِ وَاضْطِرَابَاتِ نَفْسِيَّةٍ. وَتُؤَدِّي الصَّرَاعَاتِ الْإِلَهَامِيَّةِ لِلرَّغَبَاتِ الْمُتَضَارِبَةِ أَوْ لِلرَّغَبَاتِ الطُّفُولِيَّةِ الْمَكْبُوتَةِ إِلَى تَوَقُّعِ الْإِخْطَارِ مِمَّا يَسَبِّبُ الْقَلْقَ وَإِلَى أَلْيَاتٍ دِفَاعِيَّةٍ لَا شَعُورِيَّةٍ يَحْسُ بِهَا الْمَرِيضُ وَالْأَشْخَاصُ الْآخَرُونَ بِشَكْلِ أَعْرَاضٍ عَصَبِيَّةٍ أَوْ نَزَعَاتٍ مَرَضِ الشَّخْصِيَّةِ.

- anxiety n. عُصَابُ الْقَلْقِ. عَصَابٌ يَتَصَفُّ بِقَلْقٍ شَدِيدٍ ظَاهِرٍ وَيَتَطَوَّرُ أحياناً إِلَى الْهَلْهِلِ وَغَالِباً مَا يَتَرَفَّقُ مَعَ أَعْرَاضٍ جَسَدِيَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَغَيْرِ مُرْتَبِطَةٍ مَعَ أَيْةٍ فَعَالِيَّةٍ أُخْرَى.

- association n. عُصَابُ التَّعَادُلِيِّ. حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ تَتَوَلَّدُ ثَانِيَةً لِحَالَةٍ قَدِيمَةٍ مَعَ كُلِّ خَوَاصِهَا الْجَسَدِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ عِنْدَمَا يَتَذَكَّرُ الشَّخْصُ أَيْةَ فِكْرَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِهَا تَمَرُّ بِهَا.

- cardiac n. عُصَابٌ قَلْبِيٌّ. وَهْنٌ دَوْرَانِيٌّ عَصَبِيٌّ.

- character n. عُصَابٌ أَخْلَاقِيٌّ. اضْطِرَابٌ سُلُوكٍ الشَّخْصِ أَوْ شَخْصِيَّتِهِ.

- combat n. عُصَابُ الْمَعْرَكَةِ. اضْطِرَابٌ كَرْبِي بَعْدَ الرِّضْحِ وَالْإِصَابَةِ نَتِيجَةً عَنِ الْعَرَاكِ الْفَعْلِيِّ.

- compensation n. عُصَابٌ تَعْوِيْضِيٌّ. اضْطِرَابٌ مُصْطَنَعٌ يُولِّدُ الْمَصَابِ بِهِ أَعْرَاضاً إِرَادِيَّةً كَيْ يَحْصَلَ عَلَى التَّعْوِيْضِ أَوْ التَّأْمِينِ أَوْ التَّقَاعِدِ.

- compulsion n. (= obsessive compulsive disorder) عُصَابٌ إِجْبَارِيٌّ. عَصَابٌ وَسْوَاسِيٌّ قَسْرِيٌّ.

- conversion n. (= conversion disorder) عُصَابٌ تَحْوِيلِيٌّ.

- depersonalization n. (= depersonalization disorder) عُصَابٌ بِتَبَدُّدِ الشَّخْصِيَّةِ: عُصَابٌ جَهْلُ الذَّاتِ.

- depressive n. (= dysthymia) عُصَابٌ إِكْتِنَابِيٌّ.

- experimental n. عُصَابٌ تَجْرِيْبِيٌّ. عَصَابٌ يُولِّدُ فِي الْحَيَوَانَاتِ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا إِلَى التَّنَاقُضَاتِ أَوْ الْخِيْبَةِ فَيَتَوَلَّدُ لَدَيْهَا عَصَابٌ شَبِيهِ مِمَّا يَصِيبُ الْإِنْسَانَ.

- **hypochondriacal n. (= hypochondriasis)** المُرَاق؛ عُصَابُ مُرَاقِي. عُصَابُ تَوْفَم المرض.
- **hysterical n. (= hysteria)** عُصَابُ هِسْتِيرِي؛ عُصَابُ هُرَاعِي. هِسْتِيرِيَا.
- **neurasthenic n. (= neurasthenia)** وَهَنٌ عَصَبِي.
- **obsessional n.** عُصَابٌ وَسْوَاسِي. اضطراب عصبي يتصف بالسواس.
- **obsessive compulsive n. (= obsessive compulsive disorder)** عُصَابٌ وَسْوَاسِي قَسْرِي.
- **occupational n.** عُصَابٌ مِهْنِي. عصاب نفسي يعيق المرء عن العمل.
- **pension n. (= compensation n.)** عُصَابٌ تَغْوِيضِي.
- **phobic n. (= phobia)** عُصَابٌ رَهَابِي.
- **transference n.** عُصَابُ التَحْوُل. ظاهرة تحدث أثناء التحليل النفسي حيث يقوم المريض بتكرار تناقضات طفولته والشعور بأحاسيسها تجاه والديه والتي ينقلها الآن للمحلل النفسي.
- **traumatic n.** عُصَابٌ رَضَجِي. عصاب يتلو الإصابة بوضع جسدي أو نفسي.
- **vegetative n. (= acrodynia)** عُصَابُ إنبَاتِي؛ وَجَعُ الْأَطْرَاف.
- **war n.** عُصَابُ الْحَرْب. الاضطرابات النفسانية التي تصيب بعض المحاربين أثناء المعارك.
- neuroskeletal** عَصَبِيٌّ هَيْكَلِي. نسبة للأنسجة العصبية وأنسجة العضلات الهيكلية.
- neuroskeleton (= endoskeleton)** الْهَيْكَلُ الدَّاخِلِي. الهيكل العظمي والغضروفي للجسم.
1. جِسْمُ الْعَصَبُون 2. الْجُسَيْمَاتُ العَصَبِيَّة. 1. جسم الخلية العصبية 2. أي من مجموعة الجسيمات الدقيقة الموجودة في المادة الأساسية لجبلية العصبون.
- neurospasm** تَشْنُجٌ عَصَبِي. التفضان العصبي للعضلة.

- neurosplanchnic** عَصَبِيٌّ حَشَوِي. نسبة إلى الجهازين العصبيين الدماغي والنخاعي والودي.
- neurospingioma (= glioma)** وَرَمٌ دِنَقِي.
- neurospingium** الْإِسْفَنْجُ الْعَصَبِي.
1. المكونات الخيطية للعصبونات 2. شبكة من الألياف العصبية خصوصاً الطبقة الشبكية الداخلية لشبكية العين.
- neurosthenia** النَشَاطُ الْعَصَبِي. الطاقة العصبية المفرطة الإثارة.
- neurosurgeon** جِرَّاحُ الْأَعْصَاب. الجراح الذي يجري العمليات على الجهاز العصبي.
- neurosurgery** جِرَّاحَةُ الْأَعْصَاب. جراحة الجهاز العصبي.
- **functional n.** الْجِرَّاحَةُ الْعَصَبِيَّةُ الْوُظَيْفِيَّة. الجراحة العصبية التي تستهدف إعادة الوظيفة السوية إلى الألياف العصبية أو تحسين جريان الدم إلى الأنسجة العصبية أو تخفيف المرض النفسي.
- neurosuture (= neurorrhaphy)** رَفْوُ الْعَصَب.
- neurosyphilis** الزهري الْعَصَبِي. الزهري الثالثي الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي وهناك نوعان منه المصحوب بالأعراض وديم الأعراض. ويشمل الأول الزهري العصبي السحائي الوعائي والزهري المتني العصبي.
- **asymptomatic n.** الزهري الْعَصَبِي عديم الأعراض. زهري يشخص عند وجود اختبار موجب للسائل الدماغي النخاعي مؤكداً من قبل مختبر بحوث الأمراض الزهرية وعند غياب أية أعراض أو علامات مرضية عصبية خاصة.
- **meningovascular n.** الزهري الْعَصَبِي السَّحَائِي الْوَعَائِي. زهري يتصف بأفة بؤرية أو سحائية وعائية منتشرة، وتولد الآفات البؤرية الشلل الجانبي أو الاعتلال العصبي الانتقائي أما الآفات المنتشرة فتولد الصداع الوخيم والاضطرابات العقلية والاختلاج.
- **parenchymatous n.** الزهري الْعَصَبِي الْمَتْنِي. الزهري يتصف بتخريب منتشر في الأنسجة العصبية المتنية.

- paretic n. (= general paresis) الزهري  
العصبي الخزلي؛ الخَزَلُ العام.

- tabetic n. (= tabes dorsalis) الزهري العصبي  
التابيقي؛ التَّابِسُ الظَّهْرِي.

neurotagma تَرْتِيبُ عَصَبِي. ترتيب خطي  
للعناصر المتنية للخلية العصبية.

neurotendinous عَصَبِي وَتَرِي. منسوب  
للعصب وللوتر.

neurotensin نُورُوتِنْسِين. مادة عزلت من  
وطاء البقر توسع الأوعية وتهبط ضغط الدم كما  
أنها توجد في معى الإنسان وفي دماغه ويعتقد  
بأنها مادة ناقلة عصبية.

neuroterminal نِهَائِيَّةُ عَصَبِيَّة. عضو عصبي  
انتهائي لعصب طرفي.

neurothele حُلَيْمَةٌ عَصَبِيَّة. حليلة عصبية  
حسية في الأدمة.

neurotic عُصَابِي. منسوب للعصاب أو مصاب  
به.

neuroticism (= neurosis) عُصَاب.

neurotogenic مُؤَلِّدُ الْعُصَاب. عامل يولد  
العصاب.

neurotization تَجَدُّدُ الْعَصَب. تجدد العصب  
بعد قطعه.

neurotmesis تَهْنَكُ الْعَصَب؛ تَمَرُّقُ الْعَصَب.  
تمزيق أو قطع العصب الكلي أو الجزئي مع تهنك  
المحاور وغمدته النخاعيني والأنسجة الضامة  
المحيطة به ولا يحصل أي تجدد فيه.

neurotology (= neuro-otology) طِبُّ  
الآذَنِ الْعَصَبِي. قسم طب الآذان الذي يعني  
بأعصابها.

neurotome مِبْضَعُ الْعَصَب. 1. سكين إبري  
الشكل لتشريح العصب 2. قسيم عصبي.

neurotomography تَصْوِيرٌ مَقْطَعِي عَصَبِي.  
التصوير المقطعي للجهاز العصبي المركزي.

neurotomy بَضْعُ الْعَصَب. 1. تشريح العصب  
2. القطع الجراحي للعصب.

- radiofrequency n. بَضْعُ الْعَصَبِ بِالتَّرَدُّدِ

الإشعاعي. قطع الجذور العصبية بالتخثير بالموجات  
الإشعاعية.

- retrogasserian n. (= retrogasserian  
rhizotomy) بَضْعُ الْجَذْرِ خَلْفَ عُقْدَةِ الثَّلَاثِي  
الْقَوَائِمِ.

neurotonia ضَعْفُ الْقُوَّةِ الْعَصَبِيَّة. عدم  
استقرار قوة الجهاز العصبي الذاتي.

neurotonic منشَطُ عَصَبِي. له تأثير منشط  
على الجهاز العصبي.

neurotony مَطُّ الْعَصَب؛ شَدُّ الْعَصَب. تمديد  
العصب بهدف تفريغ الألم.

neurotoxic سَامٌ لِلْعَصَب. مادة سامة أو  
مبيدة للنسيج العصبي.

neurotoxicity سُفِيَّةُ عَصَبِيَّة. صفة المادة  
في إبادة النسيج العصبي أو تسميمه.

neurotoxin ذَيْفَانٌ عَصَبِي. ذيفان سام  
أو مبيد للنسيج العصبي.

neurotransducer تَرْجَامُ عَصَبِي. عصبون  
يركب ويحرر هرمونات ارتباطية بين الجهاز  
العصبي والغدة النخامية.

neurotransmission إِنْتِقَالُ عَصَبِي.  
العملية التي بواسطتها تطلق الناقلة العصبية التي  
تعبر التشابك وتولد تأثيرها في الخلية المستهدفة.

neurotransmitter نَاقِلُ عَصَبِي. إحدى  
المواد التي تحرر من نهاية محوار العصبون قبل  
الاشتباك في الجهاز العصبي المركزي أو  
المحيطي عند إثارته وتعتبر هذه المادة الفلح  
التشابكي حتى تثير أو تثبط الخلية المستهدفة.  
ومن هذه الناقلات العصبية الأسيتيل كولين  
والنورابينفرين والايبنفرين والدوبامين والغليسين  
والغاما امينو بيوتيريت وحمض الغلوتاميك ومادة  
بي والإنكيفالين والإندورفين والسيروتونين.

- false n. نَاقِلُ عَصَبِي كَاذِب. أمين مثل الاوكتوبامين  
الذي يمكن أن يخزن ويحرر من الحويصلات قبل  
التشابكية ولكن له تأثير ضعيف على المستقبلات بعد  
التشابكية.

neurotrauma رَضْعُ عَصَبِي. إصابة آلية  
للعصب.

وَهُنَّ التَغْذِيَةُ الْعَصَبِيَّةُ. neurotrophasthenia  
التغذية المعيبة للجهاز العصبي.

تَغْذَوِيٌّ عَصَبِيٌّ. neurotrophic  
منسوب للتغذية العصبية.

التَغْذِيَةُ الْعَصَبِيَّةُ. تغذية الانسجة neurotrophы  
وادامتها التي ينظمها الجهاز العصبي ويتحكم فيها.

عَصَبِيٌّ الْأَلْفَةُ؛ مُوجَّةٌ لِلْعَصَبِ. neurotropic  
ذو الة انتقائية للنسيج العصبي أو ما يولد تأثيره  
الرئيسي على الانسجة العصبية.

التَّوَجُّهُ الْعَصَبِيٌّ. 1. صفة neurotropism  
الالة الانتقائية الخاصة للنسيج العصبي 2. ميل  
الالياف العصبية المتجددة للنمو نحو جزء محيطي  
معين.

التَّوَجُّهُ (= neurotropism) neurotropy  
العَصَبِيٌّ

رَضْحُ (= neurotrauma) neurotrosis  
عَصَبِيٌّ.

نُيْبٌ عَصَبِيٌّ. أي من النيبات neurotubule  
المستقيمة والطويلة والمتوازية في داخل العصبون  
والتي تكون مع الخيوط العصبية اللييفات العصبية  
وهي تشابه النيبات التي توجد في العديد من  
الخلايا خارج الجهاز العصبي.

لِقَاحٌ عَصَبِيٌّ. فيروس الجدري neurovaccine  
الذي يحضر بتنميته في دماغ الارنب.

دَوَالِيَةٌ عَصَبِيَّةٌ. حالة تدلي neurovaricose  
الياف العصب.

لِقَاحٌ (= neurovaccine) neurovariola  
عَصَبِيٌّ.

عَصَبِيٌّ وَعَائِيٌّ. منسوب neurovascular  
للأعصاب والأوعية أو منسوب للأعصاب التي  
تسيطر على أقطار الاوعية الدموية.

عَصَبِيٌّ مُسْتَقْلِيٌّ؛ عَصَبِيٌّ neurovegetative  
إنبائتي. نسبة إلى الجهاز العصبي المستقل.

فَوَعَةٌ عَصَبِيَّةٌ. قدرة العامل neurovirulence  
العدواني على توليد تأثير مرضي في الجهاز  
العصبي.

فَيْرُوسٌ عَصَبِيٌّ. فيروس الجدري neurovirus  
الذي يحور بإمراره خلال النسيج العصبي.

neurovisceral (= neurosplanchnic)  
عَصَبِيٌّ حَشَوِيٌّ.

neurula العَصَبِيَّةُ. المضغة المبكرة في دور  
تنامي الأنبوب العصبي من الصفيحة العصبية التي  
تؤشر أول ظهور للجهاز العصبي للجنين ويكون  
ذلك حوالي 19-26 يوماً بعد الاخصاب.

تَكُونُ الْعَصَبِيَّةُ. تكون الصفيحة neurulation  
العصبية وانغلاقها وتكون الأنبوب العصبي في  
المضغة.

نِيَالَامِيد. دواء يستعمل كمضاد nialamide  
للكتابة.

نِيكُوتِين. قلواني سام يستحصل nicotine  
من التبغ أو ينتج صناعياً ويستعمل في التجارب  
الفيزيولوجية والدوائية فهو يبنه الجهاز العصبي  
الذاتي والاتصالات العصبية العضلية مبدئياً ثم  
يشبطها.

نِيكُوتِينِيٌّ. متعلق بالنيكوتين أو nicotinic  
يقوم بعمل مشابه له.

إِنْسِمَامٌ نِيكُوتِينِيٌّ. الانسمام nicotinism  
بالنيكوتين ويتصف بتنبيه الجهاز العصبي المستقل  
مبدئياً ثم بتثبطه وينتهي بالموت بشلل التنفس.

حَالُ النِيكُوتِينِ. مادة تحل nicotinolytic  
النيكوتين أو تمنع تأثيره السمي.

رَمَشٌ؛ رَفُّ الْجَفْنِ. (= nictitation) nictation

رَمَشٌ؛ رَفُّ الْجَفْنِ. عملية رف الجفن. nictitation

بُورِيَّةٌ مَرَضِيَّةٌ. منسوب إلى البؤرة nidal  
المرضية.

1. بُورَةٌ مَرَضِيَّةٌ 2. نواة. 1. نقطة منشأ nidus  
أو بؤرة عملية مرضية 2. مجموعة من الخلايا  
العصبية في داخل الجهاز العصبي المركزي لها  
ارتباط مباشر مع الالياف العصبية لأحد الأعصاب  
المعينة.

البُورَةُ الْخُطَافِيَّةُ؛ عَشَّ السُّنُونُو. انخساف n. avis  
في المخيخ بين الشراع الخلفي ولهاة الدودة وهو  
موضع لوزة المخيخ.

البُورَةُ الْخُطَافِيَّةُ: (= n. avis) n. hirundinis  
عش السنونو.

**nightmare** كابُوس. حلم مفرع أو نوبة قلق أثناء الحلم ترافقها استجابة ذاتية معتدلة.

**nigra (= substantia nigra)** المَادَّةُ السُّودَاءُ

**nigrosin** نِيغْرُوسِين. صباغ أنيليني له الفة شديدة لخلايا العقد العصبية يستعمل كملون لانسجة الجهاز العصبي المركزي.

**nigrostriatal** سَوْدَاوِيٌّ مُخَطَّطِي. منسوب إلى الاليف التي تمر أو تسقط من المادة السوداء إلى الجسم المخطط.

**nihilism** الْعَدَمِيَّةُ؛ الْنَهْلِسْتِيَّةُ. 1. حالة التشكك بالقيم والمعتقدات التقليدية 2. توهم بعدم وجود الذات أو العالم كله.

**- therapeutic n.** الْنَهْلِسْتِيَّةُ الدَّوَائِيَّةُ. التشكك بالفائدة العلاجية للأدوية أو بالطرق العلاجية.

**nikethamide** نِيكِيتَامِيد. مادة منبهة مركزية وتنفسية تستعمل كدواء مضاد للخمود التنفسي أو العصبي المركزي أو فشل القلب.

**nociassociation** تَرايُطٌ ضروري؛ تَدَاعِي الإِصَابَةِ. إفراغ لا شعوري للطاقة العصبية استجابة للتنبيه بالإصابة كالذي يحصل في حالة الصدمة الجراحية.

**nociceptive** مُسْتَقْبِلُ الأَلَم. ما يستقبل التنبيه بالإصابة المؤذية ويولد حس الألم.

**nociceptor** مُسْتَقْبِلَةُ الأَلَم. مستقبلات تنبيه بالإصابة المؤذية فتولد حس الألم.

**- polymodal n.** مُسْتَقْبِلَةُ الأَلَمِ الْمُتَعَدِّدَةِ الخَوَاصِ. مستقبلات الألم الإحساسات الحرارية أو الكيميائية أو الميكانيكية أو تلك المولدة عن الالتهابات التي تسببها الإصابات المؤذية.

**nocifensor** دافع الأذى؛ مُقَاوِمُ الأَذَى. إحدى مجموعات الأعصاب التي توجد في الجلد والأغشية المخاطية، والتي تدافع عنه ضد الألم والإصابات المؤذية.

**nocifluence** تَأْثِيرٌ مُؤْذٍ. تأثير يولد المرض أو الإصابة المؤذية.

**nociperception** إدراك الأذى. إدراك الشخص للمنبهات التي تولدها الإصابات المؤذية.

**noctambulation (= somnambulism)**

سَيَرٌ نَوْمِي.

**noctambulic** سَيَرِيٌّ نَوْمِي. منسوب للسير النومي أو مصاب به.

**noctiphobia** رَهَابُ الظَّلَام. الخوف من الظلام أو من الليل.

**nocturia** بُوَالٌ لَيْلِي. كثرة التبول أثناء الليل.

**nodal** عُقْدِي. منسوب للعقدة.

**node** عُقْدَةٌ. (ج: عُقَد). كتلة صغيرة من الأنسجة على شكل ورم أو عقدة أو ناشزة وهي إما أن تكون طبيعية أو مرضية.

**- lymph n.** عُقْدَةٌ لِمَفْيَةٍ. كتلة أنسجة لمفاوية منظم للعمل كعضو لمفاوي ويتراوح قطره بين 1 و 25 ملمتراً ويوجد على طول مجرى الاوعية اللمفاوية.

**- n's. of Ranvier** عُقَدُ رَانْفِييه. تضيقات توجد في الاليف العصبية المقعدة وعلى مسافات منتظمة تبعد عن بعضها حوالي المليمتر الواحد وينعدم الميلين في هذه العقد وتغطيها فقط نتوءات من خلايا شفان.

**nodule** عُقْدَةٌ. (ج: عُقَدَات)؛ عقدة صغيرة.

**- n. of cerebellum (= nodulus cerebelli)** عُقْدَةُ الْمُخَيِّخ.

**- n. of vermis (= nodulus cerebelli)** عُقْدَةُ الْمُخَيِّخ.


**nodulus (= nodule)** عُقْدَةٌ.

**- n. cerebelli** عُقْدَةُ الْمُخَيِّخ. القسم البطني الأدنى من السطح الذنبي من الدودة والمتصل على جهته بالجناح النخاعي الذنبي ويكون القسم المركزي من الفص الندفي العقدي.

**- n. vermis (= n. cerebelli)** الْعُقْدَةُ الدَوْدِيَّةُ؛ عُقْدَةُ الْمُخَيِّخ.

**noematachograph** مخطاط العملية الفكرية؛ مُسَجِّلُ سُرْعَةِ التَّفَكُّير. آلة تسجل سرعة القيام بالعمليات الفكرية.

**noematachometer** مقياس العملية الفكرية؛ مَقْيَاسُ سُرْعَةِ التَّفَكُّير. آلة تقيس سرعة القيام بالعمليات الفكرية.



node of Ranvier

عقدة رانفيليه وتنخع الليف العصبي  
رسم تخطيطي يبين طبقات النخاعين التي تتولد حول محور الليف العصبي وتوليد عقدة رانفيليه.

**noematic** فِكْرِيّ. متعلق بالفكر أو بالعمليات النفسية.

**noesis (= cognition)** إِسْتِفْرَاف؛ تَفْكِير. عملية الإدراك والفكر.

**noetic** فِكْرِيّ؛ إِسْتِفْرَافِيّ. منسوب للفكر أو للاستعراف.

**non compos mentis** مُخْتَلُّ الْعَقْل. ذو عقل غير سليم أو غير مالك لقواه العقلية.

**nonmedullated (= unmyelinated)** عَدِيمُ الْمِيَالِين.

**nonmyelinated (= unmyelinated)** عَدِيمُ الْمِيَالِين.

**non-neuronal** عديم العصبونات؛ لا عَصَبُونِيّ. منسوب إلى، أو مكون من، خلايا غير ناقلة في الجهاز العصبي مثل الخلايا الدبقية.

**nonus (= hypoglossal nerve)** الْعَصَبُ تَحْتَ اللِّسَان.

**noradrenaline (= norepinephrine)** نُورَادِرِينَالِين.

**noradrenergic** نُورَادِرِينَالِينِيّ الْفِعْل. ينشط بالنورادرينالين أو يفرزه.

**norepinephrine** نُورَابِينَفَرِين. أحد الكاتاكول أمينات الطبيعية التي توجد في الجسم وهو هرمون عصبي تحرره الاعصاب الأدرينالينية الفعل بعد العقدية وهو المادة الأساسية للعصبونات

الأدرينالينية الفعل وله نشاط أدرينالي ألفا بصورة رئيسية مع قليل من النشاط الأدرينالي بيتا، كما يفرزه نخاع الغدة الكظرية استجابة للتنبيه الحشوي ويخزن في الحبيبات الأليفية الكروم ويحرر منها بصورة عامة عند هبوط ضغط الدم فهو موثر وعائي نشيط ويستعمل دوائياً بشكل ملح ثنائي الطرطرات.

1. سَوِيّ؛ طبيعي 2. عِيَارِيّ. 1. منسجم normal مع الأنماط النظامية الثابتة 2. في الكيمياء يعني محلولاً يحوي 1 غرام وزن مكافئ من المادة الفعالة في كل لتر من المحلول.

1. السَّوَاء 2. العِيَارِيَّة. 1. حالة normality الانسجام مع الأنماط السوية 2. عدد غرامات الوزن المكافئ في لتر من المحلول.

إِسْوَاء. عملية إعادة الحالة normalization السوية.

سَوِيّ العَمَل. يستجيب بطريقة normergic سوية.

الدُّمَاغُ nosebrain (= rhinencephalon) الشَّمْعِيّ.

nosomania (= hypochondriasis) هَوَسُ المَرَض. اعتقاد خاطئ للمريض بأنه مصاب بأحد الأمراض.

الرَّغْبَةُ بِالْمَرَض. الرغبة في المرض. nosophilia رُهَابُ المَرَض. الخوف من nosophobia المرض.

أُبَابَة. الرغبة للعودة للوطن أو nostalgia للمحيط المألوف.

هَوَسُ الأُبَابَة. الرغبة العارمة nostomania بالعودة إلى الوطن التي لا تقاوم.

مِنْخَر. إحدى فتحتي الأنف الخارجيتين. nostril ألم الظهر. notalgia (= dorsalgia).

إِنْعِدَامُ مُؤَخَّرِ الرُّأْس. الغياب notancephalia الخلقي لمؤخرة القحف.

إِنْعِدَامُ المَخِيخ. الغياب notanencephalia الخلقي للمخيخ.

ثُلْمَة. انخساف أو ثلم خاصة في إحدى notch حواف العظم أو أحد الأعضاء.

- cerebellar n., anterior (= incisura cerebelli anterior) الثُلْمَة المَخِيخِيَّة الأَمَامِيَّة.

- cerebellar n., posterior (= incisura cerebelli posterior) الثُلْمَة المَخِيخِيَّة الخَلْفِيَّة.

- frontal n. (= incisura frontalis) الثُلْمَة الجَبْهِيَّة.

- tentorial n. (= incisura tentorii) ثُلْمَة الخِيَمَة المَخِيخِيَّة.

قَبِيلَة دماغية قَفَوِيَّة؛ notencephalocele قَبِيلَة دِمَاعِيَّة خَلْفِيَّة. بروز الدماغ أو انفثاقه من القسم الخلفي من الرأس.

إِلْتِهَابُ النُّخَاع. التهاب النخاع notomyelitis الشوكي.

ضَارٌّ؛ مُؤَذِّ. مؤذ ومخرب للأنسجة. noxious

NREM (non rapid eye movements) غِيَاب الحَرَكَات العَيْنِيَّة السَّرِيعَة. أنظر sleep.

نَوَاة. (ج: نَوَى). 1. نواة الخلية، وهي nucleus جسم كروي في داخل الخلية يتكون من عدد من العضيات وله غشاء نووي رقيق وفيه نوية أو عدة نويات وحبيبات كروماتينية غير منتظمة وخويطات اللاينين والهيوولي النووية 2. مجموعة من الخلايا العصبية توجد في داخل الجهاز العصبي المركزي وتتعلق مباشرة بالياف أحد الأعصاب.

- n. alae cinereae (= n. dorsalis nervi vagi) النَوَاة الجَنَاحِيَّة الرَّمَادِيَّة؛ النَوَاة الظَّهْرِيَّة للغَصَبِ المَعْبُهم.

- n. ambiguus (= ambiguous n. = vagoglossopharyngeal n.) النَوَاة المُلتَبِسَة. النواة التي تتأصل منها الألياف الحركية للأعصاب المبهم واللساني البلعومي والإضافي التي تغذي العضلات المخططة للحنجرة والبلعوم وتتكون من عمود متقطع من الخلايا في وسط الحبل الوحشي للنخاع المستطيل (البصلة) بين نهايتها الذنبية ومستوى خروج العصب اللساني البلعومي.

- amygdaloid n. (= corpus amygdaloidum) الجِسْمُ اللُّوزِيّ.

- n. amygdaliformis of Stilling (= n. subthalamicus) النواة تحت المهادية.

- n. ansae lenticularis نواة العروة العدسية. مجموعة من العصبونات في العروة العدسية عند موضع استدارتها حول الحافة الإنسية للكرة الشاحبة.

- nuclei anteriores thalami (= anterior nuclei of thalamus) النوى الأمامية للمهاد. النوى الثلاث في القسم الأمامي من المهاد وهي النوى الأمامية البطنية والأمامية الظهرية والأمامية الإنسية وثلاثها تستلم ارتباطات من الجسم الحلمي وترسل أليافها إلى الجسم الحزامي.

- arcuate nuclei of medulla oblongata (= nuclei arcuati medullae oblongatae) النوى المقوسة للبلصلة.

- nuclei arcuati medullae oblongatae النوى المقوسة للبلصلة. كتل صغيرة غير منتظمة من المادة السنجابية توجد على طول الناحية البطنية الإنسية لهرم النخاع المستطيل (البلصلة) وتصلها ألياف واردة من قشرة الدماغ كما أنها ترسل أليافها الصادرة إلى المخيخ بشكل الألياف المقوسة المتصالبة الظاهرة.

- n. arcuatus hypothalami (= n. infundibularis hypothalami) النواة القمعية للوطاء.

- nuclei areae H, H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub> نوى باحات H, H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>. مجموعة من النوى في المهاد البطني تحوي نواة الساحة أمام الحمراء (باحة H لفوريل) وعصبونات منتشرة على طول الحزم المهادية والعدسية في باحات 1H و 2H لفوريل.

- auditory n., large cell (= n. vestibularis lateralis) النواة السمعية الكبيرة الخلايا؛ النواة الدهليزية الوحشية.

- autonomic n. (= n. oculomotoris accessorius) النواة المستقلية؛ نواة محرك العين الإضافية

- basal n. (= n. olivaris) النواة القاعدية؛ النواة الزيتونية. النواة القاعدية.

- basal nuclei النوى القاعدية. مجموعات من الكتل المترابطة من المادة السنجابية توجد في عمق

نصف كرة المخ وفي القسم العلوي من جذع الدماغ وبالرغم من النوى العديدة التي تعتبر من ضمن النوى القاعدية ولكن التسمية التشريحية الرسمية تضم الجسم المخطط (الذي يشمل النواتين المذنبية والعدسية الشكل) والعائق والجسم الزيتوني والمحفظتين الظاهرة والباطنة.

- Bekhterev's n. (= cranial (superior) vestibular n.) النواة الدهليزية القحفية.

- Blumenau's n. نواة بلومناو. الجزء الوحشي من النواة المذنبية.

- n. of Burdach's column (= n. cuneatus) النواة الإسفينية.

- n. caeruleus (= n. ceruleus) النواة الزرقاء. تجمع كثيف لعصبونات منصيفة توجد بجوار الموضع الأزرق

- n. caudalis centralis (= central caudate n.) النواة المذنبية المركزية. تجمع خلوي غير مزدوج في الثلث الذنب من المعقد النوري لمحرك العين ويقع في الرفاء الناصف وبالظهر من النوى الوحشية.

- n. caudatus (= caudate n.) النواة المذنبية. كتلة سنجابية مقوسة طولانية مرتبطة بالبطين الجانبي على كل طولها وتتكون من رأس وجسد وذنب وتكون النواتان المذنبية وقشرة النواة العدسية وحدة وظيفية واحدة (المخطط الجديد) للجسم المخطط.

- n. centralis lateralis thalami النواة الوحشية المركزية للمهاد. إحدى النوى الصغيرة داخل صفيحات المهاد تقع في الجهة الظهرية للصفيحة النخاعية الباطنة.

- n. centralis medialis thalami (= medial central n. of thalamus) النواة الإنسية المركزية للمهاد. إحدى النوى الصغيرة داخل صفيحات المهاد تقع في الجهة الإنسية للصفيحة النخاعية الباطنة.

- central n. of ventral column of spinal cord النواة المركزية للعمود البطني للنخاع. مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية بالمنطقة المركزية للعمود البطني للنخاع الشوكي.



## - n. centromedianus thalami

النَّوَاةُ (= centromedian n. of thalamus)  
المَرْكَزِيَّةُ النَّاصِفِيَّةُ لِلْمَهَاد. أكبر نوى داخل صفيحات  
المهاد وأقربها لجهته الظهرية الذنبية وترتبط بصورة  
رئيسية مع الجسم المخطط.

## - nuclei cerebelli (= nuclei of cerebellum)

نَوَى المَخْيِخ. أربعة تجمعات من المادة السنجابية في  
مادة المخيخ البيضاء تتكون من النوى المسننة  
والصمية الشكل والكروية والبرحاء.

## - n. of cerebellum, dentate (= dentate n.)

النَّوَاةُ المَخْيِخِيَّةُ المُسَنَّنَةُ.

## - n. of cerebellum, medullary (= corpus medullare cerebelli)

الجِسْمُ النُّخَاعِيّ لِلْمَخْيِخ.

## - cervical n. (= n. lateralis cervicalis)

النَّوَاةُ الرَّقَبِيَّةُ الوَحْشِيَّة.

## - n. cinereum (= substantia grisea

medullae spinalis) النَّوَاةُ السِّنْجَابِيَّة.

المادة السنجابية للنخاع الشوكي.

## - Clark's n. (= columna thoracica)

الْعَمُودُ الصَّدْرِيّ.

## - cleavage n. (= segmentation n.)

النَّوَاةُ التَّشْطُرِيَّة.

## - nuclei cochleares (= cochlear nuclei)

النَّوَاتَانِ القَوَقِعِيَّتَانِ. النواتان البطنية والظهرية  
اللذان تحيطان جزئياً بالسويقة المخيخية السفلية عند  
اتصال الجسر والنخاع المستطيل حيث تنتهي فيهما  
الياف الفرع القوقعي للعصب الدهليزي القوقعي.

## - n. cochlearis anterior (= n. cochlearis

ventralis) النَّوَاةُ القَوَقِعِيَّةُ البَطْنِيَّة.

## - n. cochlearis dorsalis (= dorsal

cochlear n.) النَّوَاةُ القَوَقِعِيَّةُ الظَّهْرِيَّة.

نواة من خلايا عصبية على الناحية الظهرية من السويقة  
المخيخية الذنبية والتي تكون بارزة تدعى الحديبة  
السمعية على الجهة الوحشية من الباحة الدهليزية على  
قاع البطين الرابع.

## - n. cochlearis posterior (= n. cochlea-

ris dorsalis) النَّوَاةُ القَوَقِعِيَّةُ الظَّهْرِيَّة.

## - n. cochlearis ventralis (= ventral

cochlear n.) النَّوَاةُ القَوَقِعِيَّةُ البَطْنِيَّة. نواة

من خلايا عصبية على الناحية البطنية الوحشية من  
السويقة المخيخية الذنبية والتي تستلم الفروع  
المتسلفة الكبيرة من العصب القوقعي.

## - nuclei of cochlear nerve (= nuclei

cochleares) النَّوَاتَانِ القَوَقِعِيَّتَانِ.

## - n. colliculi caudalis (= n. of caudal

colliculus) نَوَاةُ الأَكَيْمَةِ الذَّنْبِيَّة. المجموعة

الكبيرة البيضاء الشكل التي تكون معظم مادة الأكمة  
الذنبية.

## - n. colliculi inferioris (= n. colliculi

caudalis) نَوَاةُ الأَكَيْمَةِ الذَّنْبِيَّة.

## - n. commissuralis (= commissural n.)

النَّوَاةُ الصِّوَارِيَّة. مجموعة من العصبونات  
الأدرينالية الفعل التي تحيط بالناحية الظهرية  
الوحشية لنواة العصب تحت اللسان والتي تصل حتى  
القاع البطاني العصبي للبطين الرابع.

## - n. corporis geniculati lateralis (= n.

of lateral geniculate body) نَوَاةُ الجِسْمِ

الرُّكْبِيّ الوَحْشِيّ. نواة في داخل الجسم الركبي  
الوحشي تتكون من قسم بطني صغير وآخر ظهري  
كبير يتكون من ست طبقات متراكزة من الخلايا التي  
تستلم أليافاً عابرة وغير عابرة من السبيل البصري  
والمترتبة مع القشرة البصرية.

## - n. corporis geniculati medialis (= n. of

medial geniculate body) نَوَاةُ الجِسْمِ

الرُّكْبِيّ الْإِنْسِيّ. نواة في داخل الجسم الركبي الإنسي  
تتكون من قسمين ظهري وبطني يستلزمان الألياف  
السمعية الصاعدة ويسقطانها إلى القشرة السمعية  
للمخ.

## - nuclei corporis mamillaris mediales et

laterales (= lateral & medial nuclei of

mamillary body) نَوَاتَا الجِسْمِ الحَلِيمِيّ الْإِنْسِيّ

وَالوَحْشِيَّة. النواتان الرئيسيتان للجسم الحلمي  
واللذان تستلزمان أليافاً من الباحات الشمية القاعدية  
والقبر يسقطانها إلى المهاد والدماغ الوسطي بواسطة  
الحزمتين الحلمية المهادية والحلمية السقفية.

## - n. of corpus striatum, intraventricular

(= n. caudatus) النَّوَاةُ المُذَنَّبِيَّة.

## - n. cuneatus (= cuneate n.) النَّوَاةُ الْإِسْفِينِيَّة.

- نواة في النخاع المستطيل عند النهاية الرأسية للحزمة الإسفينية حيث تترحل منها الياف هذه الحزمة ثم تسقط الخلايا اليافها إلى المهاد بواسطة الفتيل الإنسي.
- **n. cuneatus accessorius (= accessory cuneate n.)** **النَّوَّةُ الإسْفِينِيَّةُ الإِضَافِيَّةُ.** مجموعة من الخلايا العصبية توجد على الجهة الوحشية للنواة الإسفينية تنقل الدفعات من الياف الأطراف العليا في الحزمة الإسفينية إلى المخيخ (السبيل النخاعي المخيخي الراسي) بواسطة الياف المقوسة الظاهرة والسويقة المخيخية السفلية.
- **Darkshevich's n.** **نَوَّاةُ داركشيفيتش.** نواة صغيرة على ظهر الحزمة الطولانية الإنسية للمادة السنجابية المركزية في النهاية الرأسية للمسار المخيخي ويعتقد بأنها تستلم اليافاً من الحزمة الطولانية الوحشية ومن الأكمة العلوية.
- **Deiter's n. (= n. vestibularis lateralis)** **نواة دايترس: النَّوَّةُ الدَّهْلِيْزِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ.**
- **n. dentatus (= dentate n.)** **النَّوَّةُ الْمُسَنَّنَةُ.** أكبر النوى المخيخية العميقة التي توجد في المادة البيضاء للمخيخ مباشرة على الجهة الوحشية للنواة الصماوية الشكل وتستلم الياف خلايا بركنجي من المخيخ الجديد وتكوّن محاورها معظم الياف السويقة المخيخية القحفية وتسقط بصورة رئيسية على النواة الحمراء بالجهة المقابلة وعلى المهاد.
- **n. dorsalis (= dorsal n. of Clark)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ.** (= columna thoracica) العمود الصدري.
- **n. dorsalis corporis trapezoidi (= dorsal n. of trapezoid body)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْجِسْمِ الْمُتَحَرِّفِي.** مجموعة من أجسام الخلايا العصبية توجد على الجهة الظهرية الوحشية للجسم المنحرفي وتستلم اليافاً قوقعية وتشارك في تكوين الجسم المنحرفي والفتيل الوحشي.
- **n. dorsalis nervi glossopharyngei (dorsal n. of glossopharyngeal nerve)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبُلْعُومِيِّ.** القطب القحفي للنواة الظهرية للعصب المبهم التي يعتقد بأنها تعطي بعض الالياف اللاودية إلى العصب اللساني البلعومي ويعتقد البعض بأنها هي النواة اللعابية الذنبية.
- **n. dorsalis nervi vagi (= dorsal nucleus of vagus nerve)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.** نواة تتأصل منها الالياف اللاودية للعصب المبهم وتوجد في مثلث العصب المبهم في قاع البطين الرابع وعلى الجهة الوحشية لنواة العصب تحت اللسان.
- **n. dorsolateralis (= dorsolateral n.)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ.** خلايا عصبية متوضعة بالجهة الظهرية وفي القسم الوحشي من معقد نوى العصب محرك العين وهي معزولة تماماً عن النوى البطنية في الثلث الوسطي من هذا المعقد وتعطي اليافاً حركية جسمية.
- **n. dorsolateralis columnae ventralis (= dorsolateral n. of ventral column of spinal cord)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ لِلْعَمُودِ الْبَطْنِيِّ لِلنَّخَاعِ.** مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية للمنطقة الظهرية الوحشية للعمود البطني للنخاع الشوكي.
- **n. dorsomedialis columnae ventralis (= columnae ventralis medullae spinalis = dorsomedial n. of ventral column of spinal cord)** **النَّوَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْعَمُودِ الْبَطْنِيِّ لِلنَّخَاعِ.** مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية للمنطقة الظهرية الإنسية للعمود البطني للنخاع الشوكي.
- **Duval's n.** **نَوَّاةُ دُوْفَال.** مجموعة من الخلايا العقدية عديدة الأقطاب توجد على الجهة البطنية الوحشية من نواة العصب تحت اللسان في النخاع المستطيل.
- **Edinger's n. (= Edinger-Westphal n. = n. oculomotorius accessorius)** **نواة إيدنغر: نَوَّاةُ مُحَرِّكِ الْعَيْنِ الإِضَافِيَّةُ.**
- **n. emboliformis cerebelli (= emboliform n.)** **النَّوَّةُ الصِّمَائِيَّةُ الشَّكْلُ.** كتلة صغيرة توجد بين النواتين المسنة والكروية وتشارك في تكوين السويقة المخيخية القحفية.
- **end nuclei (= terminal nuclei)** **النُّوَى الْإِنْتِهَائِيَّةُ.**
- **n. entopeduncularis (= entopeduncular n.)** **نَوَّاةُ بَاطِنِ السُّوَيْقَةِ.** مجموعة

- من العصبونات الموجودة في المحفظة الباطنة بجوار الحافة الإنسية للكرة الشاحبة وعلى الجهة الظهرية الوحشية للنواة الوطائية الوحشية.
- **n. fastigii (= fastigial n.)** **النواة الأوجية:** النواة الأكثر إنسية من باقي النوى المخيخية العميقة بالقرب من الخط الوسطي في سقف البطين الرابع وتبرز إلى الجسر والنخاع المستطيل وبصورة خاصة إلى النوى الدهليزية.
- **geniculate n., lateral (= n. corporis geniculati lateralis)** **نواة الجسم الركبي الوحشية.**
- **geniculate n., medial (= n. corporis geniculati medialis)** **نواة الجسم الركبي الإنسية.**
- **gingival n.** **النواة اللثوية.** جزء من المخيخ أثناء الشهرين الرابع والخامس في الجنين.
- **n. globosus cerebelli (= globose n.)** **النواة الكروية.** نواة مخيخية عميقة تقع بين النواتين الصماوية الشكل والبرحاء (الأوجية) وترسل اليافاها خلال السويقة المخيخية القذالية.
- **n. of Goll's column (= n. gracillis)** **النواة الناجلة.**
- **n. gracillis** **النواة الناجلة.** نواة في النخاع المستطيل في النهاية الراسية للحزمة الناجلة للنخاع الشوكي حيث تتشابك فيها ألياف هذه الحزمة ثم تسقط الخلايا اليافاها إلى المهاد بواسطة الفتيل الإنسي.
- **grav n. (= substantia grisea medullae spinalis)** **المادة السنجابية للنخاع.**
- **nuclei habenulae medialis et lateralis (= medial & lateral habenular nuclei)** **نوى العنان الإنسية والوحشية.** مجموعتان من الخلايا العصبية، إنسية ووحشية، تقعان عميقاً في المثلث العناني وتستلزمان أليافاً من السطور البصلية للمهاد.
- **n. hypothalamicus anterior (= anterior hypothalamic n.)** **نواة الوطاء الأمامية.** مجموعة من الخلايا العصبية في المنطقة الامامية للوطاء.
- **n. hypothalamicus dorsalis (= dorsal hypothalamic n.)** **نواة الوطاء الظهرية.** مجموعة من الخلايا العصبية في القسم الظهري من المنطقة الوسطية للوطاء.
- **n. hypothalamicus dorsomedialis (= dorsomedial hypothalamic n.)** **نواة الوطاء الظهرية الإنسية.** مجموعة من الخلايا العصبية توجد في القسم الظهري من المنطقة الوسطية للوطاء.
- **n. hypothalamicus posterior (= posterior hypothalamic n.)** **نواة الوطاء البطنية الإنسية.** مجموعة من اجسام الخلايا العصبية التي توجد في القسم البطني من المنطقة الوسطية للوطاء تشارك في العديد من الوظائف مثل تناول الطعام والسلوك الجنسي.
- **inferior nervi trigemini (= n. spinalis nervi trigemini)** **نواة العصب الثلاثي التوائم السفلية.**
- **n. Infundibularis hypothalami (= infundibular. n. of hypothalamus)** **نواة الوطاء القمعية.** نواة مكونة من خلايا عصبية في المنطقة الخلفية للوطاء تمتد إلى البارزة الناصفية وتحيط بقاعدة القمع بصورة كاملة تقريباً.
- **n. intercalatus** **النواة المقحمة:** النواة المُندسة. مجموعة من الخلايا العصبية بين النواة الظهرية للعصب المبهم ونواة العصب تحت اللسان وتكون جزءاً من المعقد النووي تحت اللساني.
- **n. Intermediolateralis (= intermediolateral n.)** **النواة المتوسطة الوحشية.** نواة تقع في المادة الوسطية الوحشية في المستويين الصدري والقطني العلوي للنخاع الشوكي وتكون قرونة الوحشية وتعطي خلاياها الألياف الودية قبل العقدية.
- **n. Intermediomedialis (= Intermediomedial n.)** **النواة المتوسطة الإنسية.** نواة مكونة من خلاياها منتشرة تقع في المادة الوسطية المركزية وبالجهة الإنسية من النواة الوسطية الوحشية، وهي أكثر بروزاً في النخاع الشوكي الرقبى ويعتقد بأن ارتباطاتها حسية عميقة شوكية.

- **n. interpeduncularis (= interpeduncular n.)** النواة بين السويقتين. نواة تقع بين السويقتين المخيتين وعلى الجهة الظهرية من الحفرة بين السويقتين مباشرة وتستلم الحزمة المنعطفة للخلف.

- **n. Interstitialis (= interstitial n.)** النواة الخلائية. نواة النهاية الراسية للحزمة الطولانية الإنسية في سقيفة الدماغ المتوسط وارتباطها الوحيد هو ارتباط متبادل مع النوى الدهليزية كما أنها تسقط أليافها على النخاع الشوكي.

- **nuclei intralaminares thalami (= intralaminar nuclei of thalamus)** نوى المهاد داخل الصفائح. نوى في داخل الصفائح النخاعية الداخلية للمهاد متوضعة بين النواة الظهرية لوحشية من فوق والنواة الوحشية الخلفية من تحت وتحوي النوى المركزية الناصفية وجنوب الحزمة والنواتين المركزيتين الوحشية والإنسية.

- **Kaiser's nuclei** نوى كيزر. نوى طولانية حركية في التضخمات الرقبية والقطنية للنخاع الشوكي بين العمودين الوسطي الوحشي والناصف.

- **n. lateralis cervicalis (= lateral cervical n.)** النواة الرقبية الوحشية. مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية توجد في الحبل الوحشي للشدفتين العنقيتين الأولى والثانية للنخاع الشوكي وتكون محطة ترحيل في السبيل النخاعي الرقبي المهادي.

- **n. lateralis medullae oblongatae (= lateral nucleus of medulla oblongata)** النواة الوحشية للبصلة. نواة في المادة الشبكية للنخاع المستطيل (البصلة) على الجهة الظهرية الوحشية للنواة اللوزية وهي ترخل الدفعات النخاعية المارة إلى المخيخ.

- **n. lemnisci lateralis (= n. of lateral lemniscus)** نواة الفتيل الوحشي. مجموعات خلوية عصبية متعددة ومنتشرة في طريق الفتيل الوحشي في الجسر.

- **n. lentiformis (= lenticular n.)** النواة العدسية. قسم الجسم المخطط الشبيه بالعدسة المحدة الوجهين وتنقسم إلى القسمين الظاهر الأكبر والوحشي وهو القشرة، وإلى الأصغر الباطن والإنسي

والافتح لوناً وهو الكرة الشاحبة التي تنقسم بدورها إلى قسم إنسي صغير وقسم وحشي كبير بواسطة الصفيحة النخاعية الإنسية.

- **n. of Luys (= n. subthalamicus)** نواة لويز: النواة تحت المهاد.

- **n. magnocellularis (= n. vestibularis lateralis)** النواة الدهليزية الوحشية.

- **n. medialis dorsalis thalami (= dorsal medial n. of thalamus)** النواة الظهرية الإنسية للمهاد. أكبر نوى المهاد الإنسية لها قسم رأسي ضخم الخلايا وقسم ذنب وحشي صغير الخلايا ويكون كلاهما ارتباطات واسعة مع معظم نوى المهاد الأخرى.

- **nuclei mediales thalami (= medial nuclei of thalamus)** النوى الإنسية للمهاد. مجموعة من الخلايا العصبية توجد بين الصفيحة النخاعية الباطنة على الجهة الوحشية وتسقط أليافها نحو البطانة العصبية للبطين الثالث على جهتها الإنسية وهي تشمل النواة الكبيرة الوحشية الظهرية والعديد من النوى الصغيرة المجهولة الأهمية والارتباطات.

- **nuclei of median raphe (= nuclei raphe medullae oblongatae)** نواة الرفاء الناصف: نوى رفاء البصلة.

- **nuclei mediani thalami (= median nuclei of thalamus)** النوى الناصفية للمهاد. مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية اللانوعية المنتشرة في المادة السنجابية حول البطين وتفصل القسم الإنسي من المهاد عن البطانة العصبية للبطين الثالث وتكون جزئياً الالتصاق بين المهادين وتشتمل هذه المجموعة على النوى المجاورة للبطين الأمامية والخلفية والنوى المعينية والارتباطية.

- **n. mesencephalicus nervi trigemini (= mesencephalic n. of trigeminal nerve)** نواة الدماغ المتوسط للعصب الثلاثي التوائم. عمود رفيع من الخلايا العصبية في القسم الوحشي من المادة السنجابية المركزية للجزء الراسي من البطين الرابع والسويقة المخية وهو الموقع الوحيد في الجهاز العصبي المركزي للعصبونات الحسية الأولية وتشبه خلاياه خلايا عقدة الجذر الظهري وتوصل فروعها المحيطية التي تكون السبيل الدماغي

- المتوسط دفعات الحس العميق أما فروعها المركزية فلها ارتباطات مخيخية وجذعية دماغية واسعة وتشمل النواة الحركية لثلاثي التوائم.
- **Monakow's n.** **نَوَاةُ مُونَاكُوف.** القسم الوحشي للنواة الإسفينية
- **motor n.** **نَوَاةُ حَرَكَية.** أي من التجمعات الخلوية العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تجهز اليافاً عصبية حركية للأعصاب.
- **n. motorius nervi trigemini (= motor n. of trigeminal nerve)** **النَوَاةُ الحَرَكَيةُ للعَصَبِ الثَلَاثِيّ التَوَائِم.** النواة التي تتصلب منها الألياف الحركية للعصب الثلاثي التوائم وتقع في القسم الظهري الوحشي من الجسر وعلى الجهة الإنسانية مباشرة للنواة الحسية الرئيسية وللجذر الحسي الداخل
- **n. nervi abducentis (= n. of abducent nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ المُبْعِد.** النواة التي يتصلب منها العصب المبعد وتقع في القسم السفلي من الجسر وتكون القسم الوحشي من الأكمة الوجهية في قاع البطين الرابع وتكون ألياف العصب الوجهي عروة معقدة حولها.
- **n. nervi accessorii (= n. of accessory nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ الإِضَافِيّ.** مجموعة غير منتظمة الشكل من الخلايا العصبية تتكون من دخول محاور الخلايا العصبية التي تدخل القسم النخاعي من العصب الإضافي وتوجد في الحافة البطنية من العمود البطني من النخاع الشوكي في موضع متوسط أو مركزي.
- **nuclei nervorum cranialium (= nuclei of cranial nerves)** **نَوَى الأَعْصَابِ القَحْفِيَّة.** مجموعات الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تجهز أو تنقل أو تستلم النبضات من المكونات الحركية أو الحسية للأعصاب القحفية.
- **n. nervi facialis (= n. of facial nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ الوَجْهِيّ.** النواة التي تتصلب منها الألياف الحركية للعصب الوجهي والتي تغذي عضلات الوجه التعبيرية وتقع هذه النواة في القسم البطني الوحشي للقسم السفلي من الجسر وتكون الألياف الصادرة منها عروة معقدة حول نواة العصب المبعد.
- **n. nervi glossopharyngeal (= n. of glossopharyngeal nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ اللِّسَانِيّ البَلْعُومِيّ.** نواة أصل وانتهاء العصب اللساني البلعومي تقع في النخاع المستطيل وتشمل النواة الإلغابية السفلية والنواة الملتبسة (قسمها الرأسي) ونواة السبيل المفرد.
- **n. nervi hypoglossal (= n. of hypoglossal nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَان.** نواة أصل العصب تحت اللسان التي تكون عموداً في المادة السنجابية المركزية للبارزة الإنسية من تحت مستوى الزيتونة السفلية حتى القسم العلوي للنخاع المستطيل (البصلة).
- **n. nervi oculomotorii (= n. of oculomotor nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ المُحَرِّك.** نواة أصل ألياف العصب المحرك للعين تقع في سقيفة الدماغ المتوسط على الجهة البطنية المباشرة للمادة السنجابية المركزية حيث تكون مجموعة خلاياها معقداً بين الحزم الطولانية الإنسانية. ويتكون المعقد من مجموعتين وحشيتين مزدوجتين ومجموعة مفردة ناصفية ومجموعتين ظهريتين مستقلتين (لا وديتين) مزدوجتين. وتغذي المجموعة الجسدية العضلة رافعة الجفن العلوي وكل عضلات العين الخارجية ما عدا العضلتين المستقيمة الوحشية والمائلة العلوية. وتغذي المجموعة المستقلة المستقلة الهدبية ومصرة الحدقة.
- **n. nervi phrenici (= n. of phrenic nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ الحِجَابِيّ.** مجموعة من الخلايا العصبية مركزية التوضع في المادة السنجابية للعمود البطني للنخاع الشوكي تمتد من الشدفة الرقبية الثالثة حتى السابعة وتغذي الحجاب الحاجز.
- **nuclei nervi trigemini (= nuclei of trigeminal nerve)** **نَوَى العَصَبِ الثَلَاثِيّ التَوَائِم.** نوى تتوضع بصورة رئيسية في الجسر والنخاع المستطيل وكذلك في الدماغ المتوسط والنخاع الرقبي العلوي.
- **n. nervi trochlearis (= n. of trochlear nerve)** **نَوَاةُ العَصَبِ البَرْكِيّ.** نواة أصل الألياف الحركية للعصب البركي تقع في المادة السنجابية المركزية على السطح الظهري للحزمة الطولانية الإنسانية في القسم السفلي من الدماغ المتوسط.

- **n. nerve vagi (= n. of vagus nerve)** **نَوَاةُ الْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.** نواة بداية ونهاية العصب المبهم تقع في النخاع المستطيل وتشمل النوى الظهرية والملتبسة ونواة السبيل المفرد.

- **nuclei nervi vestibulocochlearis** **نَوَى الْعَصَبِ الدَّهْلِيْزِيِّ الْقَوَقَعِيِّ.** نوى أصل الألياف الحسية للفرعين الدهليزي والقوقعي للعصب القحفي الثامن وتشمل النواتين القوقعيتين الظهرية والبطنية والنوى الدهليزية الإنسية والوحشية والسفلية والعلوية.

- **n. oculomotorius accessorius** **النَّوَاةُ الْإِضَافِيَّةُ (= accessory oculomotor n.)** **لِمُحَرِّكِ الْعَيْنِ.** مجموعة من الخلايا الصغيرة التي تقع بالجهة الظهرية من القسم العلوي من المجموعات الجسدية من معقد نوى المحرك للعين والتي تشمل الألياف اللاودية الصادرة خلال العقدة الهدبية للعضلة الهدبية ولمصرة الحدقة.

- **n. olivaris accessorius dorsalis** **النَّوَاةُ (= dorsal accessory olivary n.)** **الرَّيْتُوْنِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.** شريط الخلايا الذي يقع على ظهر النواة الزيتونية الذنبية وتسقط أليافاً إلى الجهة المعاكسة من المخيخ وخصوصاً لدودته.

- **n. olivaris accessorius medialis** **النَّوَاةُ (= medial accessory olivary n.)** **الرَّيْتُوْنِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.** شريط المادة السنجابية الذي يقع على الجهة الإنسية من النواة الزيتونية الذنبية والذي يسقط أليافاً إلى الجهة المعاكسة من المخيخ وخصوصاً لدودته.

- **n. olivaris accessorius posterior (= n. olivaris accessorius dorsalis)** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ.**

- **n. olivaris caudalis (= caudal olivary** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الذَّنْبِيَّةُ.** شريط مطوي من المادة السنجابية يضم لباً أبيض (نقيير النواة الزيتونية الذنبية) ويكون حدية على البصلة (النخاع المستطيل) يسمى «الزيتونة» وهو معقد نووي يستلم إسقاطات كثيفة من النخاع الشوكي والدماغ المتوسط وقشرة المخ ويرسل أليافاً عن طريق السويقة المخيخية الذنبية المعاكسة جزئياً إلى الدودة ولكن بصورة رئيسية إلى المخيخ الجديد.

- **n. olivaris rostralis (= rostral olivary** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الرُّأْسِيَّةُ.** شريط من المادة السنجابية يقع بالجهة الوحشية عند مستوى الاتصال الجسري النخاعي الشوكي وأعلى من النواة الزيتونية السفلية وتكوّن أليافه السبيل الزيتوني القوقعي.

- **olivary n. (1. = n. olivaris caudalis** **النَّوَاةُ الرَّيْتُوْنِيَّةُ الذَّنْبِيَّةُ 2. oliva)** **الزيتونة.**

- **nuclei originis (= nuclei of origin)** **نَوَى الْمُنْشَأِ.** مجموعات من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي تتبع منها الألياف العصبية الحركية أو الصادرة للأعصاب القحفية.

- **Pander's n. (= n. subthalamicus)** **نَوَاةُ باندنر: النَّوَاةُ تَحْتَ الْمِهَادِ.**

- **n. paracentralis thalami (= paracentral** **النَّوَاةُ الْمِهَادِيَّةُ المجاورة** **n. of thalamus)** **لِلْمُرَكَّزِ.** إحدى النوى الصغيرة من نوى داخل الصفائح المهادية للمهاد الظهري تقع على الجهة البطنية الوحشية للنواة الظهرية الإنسية وعلى الجهة الإنسية للنواة المركزية الوحشية.

- **n. parafascicularis thalami (= para** **النَّوَاةُ الْمِهَادِيَّةُ** **fascicular n. of thalamus)** **المجاورة لِلْحَزْمَةِ.** إحدى النوى الصغيرة من نوى داخل الصفائح المهادية للمهاد وتقع على الجهة الإنسية للنواة المركزية الناصفية وبالجهة البطنية للنواة الظهرية الإنسية.

- **n. paramedianus dorsalis (= dorsal** **النَّوَاةُ الظَّهْرِيَّةُ المجاورة** **paramedian n.)** **لِلنَّاصِفِ.** مجموعة من الخلايا العصبية تقع بالقرب من السطح الظهري للنخاع المستطيل مكونة جزء من المعقد النووي حول تحت الساني.

- **n. parasolitaris (= parasolitary n.)** **النَّوَاةُ المجاورة لِلْمُفْرَدَةِ.** تجمع خلايا عصبية يقع على الجهة البطنية الوحشية للنواة المفردة.

- **nuclei parasympathici sacrales** **النَّوَى (= parasympathetic sacral nuclei)** **الْعَجْزِيَّةُ الْأَوْدِيَّةُ.** مجموعة من الخلايا العصبية التي توجد في قسيمات النخاع الشوكي العجزية الثانية

حتى الرابعة وتقع على الجهة الوحشية من القناة المركزية والمادة الجلاتينية المركزية بين قاعدتي العمودين السنجابين البطني والظهري وهذه الخلايا هي مصدر الألياف اللاودية العجزية قبل العقدية.

#### - n. paraventricularis hypothalami

(= paraventricular n. of hypothalamus)

النواة الوطائية المُجاورة للبطين. شريط محدد من الخلايا العصبية في جدار البطين الثالث في القسم الأمامي من منطقة الوطاء ولمعظم خلاياها وظيفة إفرازية عصبية وتفرز الأوسيتوسين الذي ينقل إلى الفص الخلفي للغدة النخامية بواسطة الألياف السبيل المجاورة للبطيني - النخامي.

#### - n. periventricularis posterior

النواة (= posterior periventricular n.)

حول البطين الخلفية. نواة من الخلايا العصبية في المنطقة الوطائية المتوسطة تقع في القسم الخلفي من البطين الثالث.

#### - Perlia's n.

نواة بيرلييا. مجموعة من الخلايا العصبية في الخط الوسطي لنواة محرك العين يعتقد بأن لها علاقة بتقريب العينين

#### - nuclei pontis (= pontine nuclei)

النوى الجسرية. كتل من الخلايا العصبية منتشرة خلال القسم البطني من الجسر تنتهي فيها الألياف الطولانية للجسر وتعبّر محاورها بدورها إلى الجهة المعاكسة وتولد السويقة المخيخية الوسطية التي تنقل اليافاً إلى المخيخ الجديد.

#### - n. pontinus nervi trigemini (= pontine

النواة الجسرية للعصب الثلاثي التوائم. نواة انتهاء الألياف الواردة للعصب الثلاثي التوائم والتي تحمل نبضات حس للمس والضغط وتقع في القسم الظهري الوحشي من وسط الجسر مباشرة على الجهة الوحشية لمدخل جذور الألياف العصب الثلاثي التوائم.

#### - nuclei posteriores thalami

النوى (= posterior nuclei of thalamus)

الخلفية للمهاد. النوى التي تكوّن النهاية الخلفية لظهر المهاد والتي تحوي الوسادة والنوى الوحشية والإنسية للجسمين المركبين.

#### - nuclei preoptici medialis et lateralis

(= medial & lateral preoptic nuclei)

النوى الإنسية والوحشية أمام الغينية. تجمع من الخلايا العصبية في القسمين الإنسي والوحشي في المنطقة الوطائية الأمامية.

#### - n. of prerubral field

نواة الساحة أمام الحُمراء. مجموعات من العصبونات منتشرة على طول الحافة الذنبية الإنسية للمنطقة العائرة في ساحة فوريل H.

#### - n. pretectalis (= pretactal n.)

النواة أمام السقف. كتلة غير محددة من الخلايا العصبية في المنطقة أمام السقف تستلم الدفعات العصبية من السبيل البصري وتسقطها إلى النواة الإضافية لنواة العصب المحرك للعين وتكوّن مركز الدماغ المتوسط لنعكس الحدة الضوئي.

#### - n. proprius

النواة المخصوصة. عمود من العصبونات الكبيرة تمتد خلال القرن الظهري للنخاع الشوكي على الجهة البطنية من المادة الجلاتينية.

#### - n. pulposus disci intervertebralis

النواة اللينة للقرص بين الفقرتين. كتلة شبه سائلة من الألياف دقيقة بيضاء ومرنة تكوّن الجزء المركزي للقرص بين الفقار وتعتبر الجزء المتبقي من الحبل الظهري الجنيني.

#### - nuclei pulvinares thalami

النوى الوسادية. النوى التي تكون الجسم الوحشي البارز للمهاد. الوسادة للنهاية الخلفية للمهاد (الوسادة).

#### - pyramidal n. (= n. olivaris accessoris

medialis) النواة الريتونية الإنسية الإضافية.

#### - n. radialis descentis nervi trigemini

(= n. tractus mesencephalicus nervi trigemini) نواة السبيل الدماغية المتوسط للعصب الثلاثي التوائم.

#### - nuclei raphae medullae oblongatae

نوى رفاه البصلة. نوى شبكية متجمعة في صفائح عمودية ضيقة على طول المستوى الناصف للنخاع المستطيل (البصلة) وللجسر والدماغ المتوسط وتحوي البعض من خلاياها مادة السيروتونين.

#### - red n. (= n. ruber)

النواة الحُمراء.

#### - reticular n., lateral (= n. lateralis

medullae oblongatae) النواة الوحشية للبصلة.

**- n. reticularis tegmenti** **النَّوَةُ الشَّبَكِيَّةُ**  
السَّقْفِيَّةُ. نواة في سقيفة الجسر تستلم اليافاً من قشرة المخ والدماغ المتوسط وترسل اليافاً إلى المخيخ الجديد عن طريق السويقة المخيخية الوسطية.

**- n. reticularis thalami (= reticular n. of thalamus)** **النَّوَةُ الشَّبَكِيَّةُ المِهَادِيَّةُ**. طبقة خفيفة من الخلايا على السطح الوحشي للمهاد في داخل وخارج الصفيحة النخاعية الظاهرة.

**- n. retrodorsolateralis columnae ventralis medullae spinalis (= retrodorsolateral n. of ventral column of spinal cord)** **النَّوَةُ الخَلْفِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ الوَخْشِيَّةُ للعمود البطني للنَّخَاع**. مجموعة من الخلايا العصبية في المادة السنجابية للمنطقة الخلفية الظهرية الوحشية للعمود البطني للنَّخَاع الشوكي والتي تغذي عضلات الأصابع.

**- Roller's n.** 1. نواة تحت اللساني  
2. خلايا توجد بالقرب من نقيز النواة اللوزية.

**- roof nuclei** **النَّوَى السَّقْفِيَّةُ**. مصطلح يستعمل أحياناً للدلالة على نوى المخيخ لأن بعضها يقع بالقرب من سطح البطين الرابع للدماغ.

**- n. ruber (= red n.)** **النَّوَةُ الحُمْرَاءُ**. نواة بيضوية مميزة (وردية حمراء اللون في النماذج الحديثة من الدماغ بسبب وجود صبغ حاد للحديد في العديد من خلاياها) وهي متوضعة في منطقة مركزية في التكوين الشبكي في أعلى الدماغ المتوسط وتستلم اليافاً من النوى المخيخية العميقة وقشرة الدماغ وترسل اليافاً إلى المخيخ وجذع الدماغ والنَّخَاع الشوكي ولربما إلى المهاد أيضاً وهي تنقسم إلى قسمين أحدهما ضخم الخلايا والآخر صغير الخلايا.

**- n. salivatorius caudalis (= caudal salivatory n.)** **النَّوَةُ اللُّعَابِيَّةُ الذَّنْبِيَّةُ**. القسم الذنبى لعمود الخلايا المنتشرة في القسم الظهري الوحشي للتكوين الشبكي في أسفل الجسر وأعلى النَّخَاع المستطيل (البصلة) وتكون خلاياه مصدر الألياف اللاودية للعصب اللساني البلعومي التي تغذي الغدة النكفية.

**- n. salivatorius rostralis (= rostral salivatory n.)** **النَّوَةُ اللُّعَابِيَّةُ الرَّأْسِيَّةُ**. عمود غير محدد من الخلايا العصبية التي تنتشر في القسم

الظهري الوحشي للتكوين الشبكي لظهر الجسر والتي تصدر الألياف اللاودية للعصب الوجهي التي تغذي الغدد الدمعية والأنفية والحنكية وتحت اللسانية وتحت الفككية وتتواصل هذه النواة مع اللعابية الذنبية.

**- n. of Sappey (= n. ruber)** **نَّوَةُ سَآبِي: النَّوَةُ الحُمْرَاءُ**.

**- Schwalbe's n (= n. vestibularis medialis)** **نَّوَةُ شَفَالِبِيَّة: النَّوَةُ الدُّهْلِيْزِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ**.

**- sensory n.** **نَّوَةُ حَسِّيَّة**. نواة نهايات الألياف الواردة (الحسية) للأعصاب المحيطية.

**- n. solitarius (= solitary n.)** **النَّوَةُ الْمُفْرَدَةُ**. نواة نهايات الألياف الحشوية الواردة للأعصاب الوجهي واللساني البلعومي والمبهم والتي تدخل السبيل المفرد. وهي تحيط بالسبيل المفرد وتتصل النهاياتان الذنبيتان لنواتي الجانبين ببعضهما البعض.

**- spherical n. (= n. globosus)** **النَّوَةُ الكُرَوِيَّةُ**.

**- n. spinalis nervi accessorii (= spinal n. of accessory nerve)** **النَّوَةُ النُّخَاعِيَّةُ للعَصَبِ الإِضَافِي**. مجموعة الخلايا العصبية في المستويات الخمسة أو الستة الرقبية العلوية التي تكون الجذور النخاعية للعصب الإِضَافِي.

**- n. spinalis nervi trigemini (= spinal n. of trigeminal nerve)** **النَّوَةُ النُّخَاعِيَّةُ للعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَاتِمِ**. عمود من الخلايا التي تتوضع على طول الناحية الجانبية للسبيل النخاعي الشوكي ويمتد من مستوى دخول العصب الثلاثي التوائم إلى الجسر حتى القسيمة الرقبية الثانية حيث يتواصل مع العمود السنجابي الظهري وينقسم هذا العمود إلى مجموعات خلوية متعددة وتنتهي فيها الألياف السبيل النخاعي للعصب الثلاثي التوائم.

**- Spitzka's n. (= Perlia's n.)** **نَّوَةُ سَبِيْتْسْكَ! نَّوَةُ بِيرْلِيَا**.

**- Stilling's n. (= columna thoracica)** **نَّوَةُ سَتِيلِنْغ: العَمُودُ الصَّدْرِي**.

**- Stilling's sacral n. (= sacral n.)** **النَّوَةُ العَجَزِيَّةُ**.

**- n. subcaeruleus (= n. subceruleus)** **النَّوَةُ تَحْتَ الزَّرْقَاءُ**. مجموعة من العصبونات



المجاورة للنواة الزرقاء في العمود الشبكي الوحشي  
الصغري الخلايا في القسم الامامي من الجسر.

- subependymal n. (= dorsal cochlear n.)  
النواة تحت البطانة العصبية: النواة القوقعية  
الظهرية.

- sublingual n. نواة تحت اللساني.  
واضحة التحديد تقع إلى الجهة البطنية من نواة  
العصب تحت اللسان وتكون جزءاً من المعقد النووي  
حول تحت اللساني.

- n. subthalamicus (= subthalamie n.)  
النواة تحت المهاد. كتلة من مادة سنجابية محدبة  
الوجهين على الجهة الإنسية من موصل المحفظة  
الباطنة مع الساق المخية وترتبط ارتباطاً رئيسياً مع  
الكرة الشاحبة.

- n. supraopticus hypothalami (= supra-  
optic n. of hypothalamus) النواة الوطائية  
فوق البصرية. نواة محددة بوضوح مكونة من خلايا  
عصبية تقع في المنطقة الوطائية الامامية مباشرة فوق  
القسم الوحشي من التصالبة البصرية والعديد من  
خلاياها إفرازية عصبية تفرز الهرمون مضاد للإبالة  
الذي يحمل إلى الفص الخلفي للنخامية بواسطة الياف  
السييل فوق البصري - النخامي كما توجد فيها خلايا  
مستقبلات التناضح التي تستجيب لارتفاع الضغط  
التناضحي الامر الذي يحفز تحرير هرمون مضاد  
الإبالة من الفص الخلفي للنخامية.

- n. taeniaeformis (= corpus amyg-  
daloideum) الجسم اللوزي.

- n. tecti (= n. fastigi) النواة  
الأوجية.

- nuclei tegmenti (= tegmental nuclei)  
النوى السقيفية. عدة كتل نووية توجد في التكوين  
الشبكي للجسر والدماغ المتوسط خاصة في الاخير  
منهما حيث تتوضع بالقرب من السويقتين المخيخيتين  
القحفييتين.

- nuclei terminationis (= terminal  
nuclei) النوى المطرافية: النوى الإنتهاءية.  
مجموعات من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي  
المركزي تتشابه عليها محاور العصبونات الواردة  
الاولية للعديد من الاعصاب القحفية.

- thoracic n. (= columna thoracica)  
النواة الصدرية: العمود الصدري.

- nuclei of trigeminal nerve نوى العصب  
الثلاثي التوائم.

- nuclei tuberi lateralis (= lateral  
tuberal nuclei) النوى الحديبية الوحشية.  
نوى خلايا عصبية تقع على الجهة البطنية للمنطقة  
الوطائية المتوسطة وبصورة رئيسية في الباحة  
الوطائية الوحشية.

- n. vagalis dorsalis النواة المبهمية الظهرانية.

- n. ventralis corporis trapezoidei النواة  
البطنية للجسم المنحرفي. مجموعة من الخلايا  
العصبية متداخلة مع الياف الجسم المنحرفي على  
الجهتين البطنية والظهرية للنواة الزيتونية العليا وهي  
تشارك في تجهيز الياف للفتيل الوحشي.

- n. ventralis intermedius thalami (= n.  
ventralis lateralis thalami) النواة البطنية  
الوحشية للمهاد.

- nuclei ventrolaterales thalami  
(= ventrolateral nuclei of thalamus)  
النوى البطنية الوحشية للمهاد. مجموعة كبيرة من  
النوى المتوضعة بين الصفيحة النخاعية الباطنة  
والمحفظة الباطنة وتنقسم إلى قسم بطني كبير وآخر  
وحشي صغير. ويتكون القسم البطني من النوى  
البطنية الامامية والبطنية الوحشية والبطنية الإنسية  
والبطنية الخلفية والبطنية الخلفية الوحشية والبطنية  
الخلفية الإنسية وتختص هذه النوى بترحيل الدفعات  
العصبية إلى مناطق معينة في قشرة المخ أما القسم  
الوحشي فإنه يتكون من النويتين الوحشية الخلفية  
والظهرية الوحشية. ترتبط الاولى منهما مع التلفيف  
الحزامي أما الثانية فلها ارتباطات واسعة مع قشرة  
المخ.

- n. ventromedialis (= ventromedial n.)  
النواة البطنية الإنسية. خلايا عصبية متوضعة في  
القسم الوحشي البطني للمعقد النووي لمحرك العين  
وهي تختلف تماماً عن الخلايا المتوضعة في الثلث  
الوسطي من القسم العلوي من هذا المعقد والتي لها  
وظائف حركية.

- nuclei vestibulares (= vestibular  
nuclei) النوى الدهليزية. الكتل الخلوية الاربع

التي توجد في قاع البطين الرابع وهي النواة الراسية أو القحفية أو العلوية والنواة الإنسية والنواة الوحشية والنواة الذنبية أو السفلية حيث تنتهي عندها الفروع القصيرة الصاعدة والطويلة النازلة من الجزء الدهليزي من العصب الثامن وهي تستلم إسقاطات مخيخية، كما أنها تكون جهازاً عصبياً حسياً خاصاً واسع الانتشار عن طريق إسقاطاتها إلى النوى الحركية العديدة في جذع الدماغ والنخاع الشوكي الرقيبي بواسطة الحزم الطولانية الإنسية من كل النوى الدهليزية إلى المخيخ (وبصورة رئيسية من النواتين الذنبية والإنسية) وإلى الخلايا الحركية على طول النخاع الشوكي (من النواة الوحشية) كما تعطي اتصالات إضافية لعمليات الإدراك الواعي والاستجابات الذاتية للتنبيهات الدهليزية.

- **n. vestibularis caudalis (= caudal vestibular n.)** النواة الدهليزية الذنبية. نواة خلايا عصبية تتوضع على الجهة الوحشية من النواة الإنسية وتقع بينها وبين السويقة المخيخية الذنبية.
- **n. vestibularis lateralis (= lateral vestibular n.)** النواة الدهليزية الوحشية. نواة تتكون من خلايا عصبية كبيرة عديدة الفروع وتتوضع على الجهة الراسية من النواة الدهليزية الذنبية مباشرة وتتواصل نهايتها العلوية مع النواة الدهليزية القحفية وتسمى أيضاً نواة ديتز.
- **n. vestibularis medialis (= medial vestibular n.)** النواة الدهليزية الإنسية. نواة من الخلايا العصبية تتوضع في قاع البطين الرابع وتمتد إلى الأعلى من النخاع المستطيل والجسر.
- **n. vestibularis rostralis (= rostral vestibular n.)** النواة الدهليزية الرأسية. نواة من الخلايا العصبية تتوضع فوق النواة الدهليزية الوحشية وهي إما أن تكون بمستوى داخل القحف وتسمى عند ذاك النواة الدهليزية القحفية أو أن تكون دون مستوى القحف وتسمى عند ذاك النواة الدهليزية النخاعية.
- **vestibulocochlear nuclei (= nuclei nervi vestibulocochlearis)** النوى الدهليزية القوقعية.
- **Voit's n.** نواة فويت. نواة مخيخية إضافية للنواة العذبية.
- **Westphal's n. (= n. oculomotorius)**

- accessorius** نواة ويستفال: النواة الإضافية لمحرك العين.
- nudomania** هوس التعري. الرغبة الشاذة بالتعري.
- nudophobia** رهاب التعري. الخوف الشاذ من التعري.
- numbness** تنمل. فقدان أو قلة الحس في أحد أقسام الجسم.
- nunnation** نأناة. كثرة استعمال حرف النون في الكلام.
- nutation** إنغاض: إحناء الرأس. الاهتزاز المتكرر اللاإرادي للرأس.
- nutrient** مغذي. ما يغذي أو يوفر الغذاء أو المادة المغذية كالطعام.
- nyctalgalia** ألم نومي. ألم يشعر به المريض أثناء النوم فقط.
- nyctalopia** عشى: عشاوة. عى ليلي، عدم الرؤية الجيدة أثناء الليل أو في المحلات المظلمة أو قليلة الإضاءة.
- nyctaphonia** صمات ليلي. عدم القدرة على الكلام أثناء الليل.
- nyctophilia** الولع بالليل. تفضيل الليل على النهار.
- nyctophobia** رهاب الظلام. الخوف الشاذ من الظلام.
- nyctophonia** صمات نهاري. عدم القدرة على الكلام أثناء النهار ولكن المصاب يتمكن من النطق أثناء الليل.
- nycturia** بوال ليلي. كثرة التبول أثناء الليل وأكثر مما هو أثناء النهار.
- nymphomania** غلغلة. رغبة جنسية شديدة لا تشبع عند الإناث.
- nystagmic** زازاي. متعلق بالראة. أو يتصف بالראة أو مصاب بها.
- nystagmograph** مخطاط הראة. جهاز يسجل حركات العين أثناء הראة.

**nystagmoid** شَبِيهَةُ الرَّأْرَاءِ. حركات شبيهة بالرأْرَاءِ.

**nystagmus** رَأْرَاءٌ. حركات العين النظامية السريعة اللاإرادية والتي يمكن أن تكون أفقية أو عمودية أو دائرية أو مختلطة، أي من نوعين منها، وقد تكون على شكل حركة سريعة لإحدى الجهتين تتلوها حركة بطيئة للجهة المعاكسة لها.

- **amaurotic n.** رَأْرَاءٌ كُفَيْتَةٌ. رَأْرَاءُ الأعمى أو المصاب بغيب بصري مركزي.

- **amblyopic n.** رَأْرَاءٌ غَمَشِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ بسبب إصابة تؤثر على وظائف البصر المركزية.

- **ataxic n.** رَأْرَاءٌ رنحية. رَأْرَاءٌ في إحدى العينين تصاحب التصلب المتعدد وتتصف بضعف الحملقة المقترنة.

- **aural n.** رَأْرَاءٌ أُذُنِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تنتج عن إصابة التيه وتكون عادة نظامية وعلى شكل حركات سريعة لإحدى الجهات تتلوها حركة بطيئة للجهة المعاكسة لها.

- **caloric n.** رَأْرَاءٌ حَرَارِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تستحث بفصل الأذن بسائل أو هواء حار أو بارد.

- **central n.** رَأْرَاءٌ مَرْكَزِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ نفضية بسبب آفة في الجهاز الدهليزي.

- **congenital n. (= congenital hereditary n.)** رَأْرَاءٌ خَلْقِيَّةٌ.

- **congenital hereditary n.** رَأْرَاءٌ خَلْقِيَّةٌ وَرَثَائِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تظهر عادة عند الولادة وهي عادة ما تكون أفقية ونواسية وأحياناً نفضية ونواسية ويمكن أن تتسبب أو تترافق مع الضمور البصري أو الثلامة أو البرص أو الإصابات البقعية بالعينين أو الساد الخلقي أو اللابؤرية الشديدة أو الزرق.

- **convergence n.** رَأْرَاءٌ التَقَارُوبِ. نذبة العين النظامية التي تتصف بحركة تقاربية سريعة للعينين بالنسبة لكل منهما تتلوها حركة تباعدية بطيئة وعادة ما تنتج عن ورم في المسال المخي أو البطين الثالث أو الدماغ المتوسط وعادة ما تترافق مع رَأْرَاءٍ انكماشية.

- **disjunctive n.** رَأْرَاءٌ انفصاليَّةٌ. رَأْرَاءٌ تتحرك فيها العينان نحو بعضهما وثم تباعدان عن بعضهما.

- **dissociative n.** رَأْرَاءٌ متفارقة؛ رَأْرَاءٌ تَفَارُقِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تكون فيها حركة العينين مختلفة عن بعضهما.

- **downbeat n.** رَأْرَاءٌ سَفْلِيَّةُ الحَرَكَةِ. رَأْرَاءٌ عمودية تكون فيها الحركات السريعة نحو الأسفل وتحدث في إصابات الاتصال النخاعي البصلي.

- **end position n.** رَأْرَاءٌ انتهائية الموضع؛ رَأْرَاءٌ الوضع الأخير. رَأْرَاءٌ تحدث عند الحملقة الشديدة لأحدى الجهات.

- **fixation n.** رَأْرَاءٌ التَثْبِيثِ. رَأْرَاءٌ تظهر عند تثبيت البصر على أحد المواضع.

- **galvanic n.** رَأْرَاءٌ غَلْفَانِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تنتج عن التنبيه الكهربائي لتيه الأذن الداخلية.

- **gaze n.** رَأْرَاءُ الحَمْلَقَةِ. رَأْرَاءٌ تظهر عند النظر إلى إحدى الجهتين، اليمين أو اليسار.

- **jerk n. (= jerky n.)** رَأْرَاءٌ نَفْضِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تتكون من حركة بطيئة إلى إحدى الجهات تتلوها حركة سريعة إلى الجهة المعاكسة.

- **labyrinthine n. (= vestibular n.)** رَأْرَاءٌ تَيْهِيَّةٌ.

- **latent n.** رَأْرَاءٌ كَامِنَةٌ. رَأْرَاءٌ تظهر فقط عند تغطية إحدى العينين.

- **lateral n.** رَأْرَاءٌ جَانِبِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تكون فيها حركة العينين من جانب لآخر.

- **miner's n.** رَأْرَاءُ عَمَالِ المَنَاجِمِ. رَأْرَاءٌ مهنية تظهر عند عمال مناجم الفحم تتكون من حركات عينية شاذة مع أعراض أخرى يعتبرها البعض بسبب سوء الإنارة ويعتبرها آخرون اضطرابات وظيفية.

- **ocular n. (= amaurotic n.)** رَأْرَاءٌ كُفَيْتَةٌ.

- **optokinetic n. (= optokinetic n.)** رَأْرَاءٌ بَصَرِيَّةُ حَرَكَةٍ. الرَأْرَاءُ الطبيعية التي تحدث عند النظر إلى الأشياء التي تمر عبر الساحة البصرية كالنظر إلى الخارج من قطار أو سيارة متحركة.

- **oscillating n. (= pendular n.)** رَأْرَاءٌ نَوَاسِيَّةٌ.

- **paretic n.** رَأْرَاءٌ حَزَلِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ كاذبة تحدث عند وجود ضعف في عضلات العين.

- **pendular n.** رَأْرَاءٌ نَوَاسِيَّةٌ. رَأْرَاءٌ تكون فيها نذببات العين متساوية في سرعتها ومداهما واتجاهها ومنطها.

- **periodic alternating n.** رَأْرَاءٌ دَوْرِيَّةٌ



# O

**obex** العِزْلَاج. الموصل المبطن بالبطانة العصبية الذي يوصل شرائط البطين الرابع عند الزاوية السفلية.

1. أَجْبَرِي. 2. إجْبَارِي. ليس بالاختياري **obligate** ولا يتمكن من البقاء إلا تحت ظروف إجبارية معينة خاصة فقط.

**obligatory** إجْبَارِي.

**obliteration** طَفْسٌ؛ مَحْوٌ؛ إِزَالَةٌ. إزالة كاملة سواء بالمرض أو بالتنكس أو بالجراحة أو بالاشعاع أو بأية وسيلة أخرى.

مَحْوٌ قِشْرِيّ. اتصال قشري وهي **cortical o.** حالة تتصف بظهور بقع في القشرة المخية تزول منها الخلايا العقدية.

**oblongata** مُسْتَطِيل. تستعمل أحياناً للدلالة على البصلة أو النخاع المستطيل.

النَّخَاعُ الْمُسْتَطِيل؛ البِصْلَةُ. **medulla o.** انظر medulla.

**obnubilation** تَغْشِيْمٌ الوُعْي. فقدان الوعي الجزئي.

**obsession** وَسْوَاسٌ؛ وَسْوَسة. فكرة أو صورة أو منبه غير مرغوب ومزعج يعاود لا إرادياً وبصورة دائمة بالرغم من محاولة المصاب كبته وإبعاده عن فكره وتشمل الوسواس غالباً أفكار العنف والتلوث وفقدان الثقة بالنفس.

**obsessive** وَسْوَاسِيّ. متعلق بالوسواس أو مصاب به.

**obsessive-compulsive** وَسْوَاسِيّ قِسْرِيّ. متعلق بالوسواس والإجبار أو

بالاضطرابات الوسواسية القسرية أو بالاضطرابات الشخصية القسرية.

**obtusion** تَبْلُدُ الحَسِّن. كلاله الحس والإدراك وضعفهما.

**occipital** قَذَالِيّ. متعلق بالقذال أو متوضع بالقرب من العظم القذالي مثل الفص القذالي للمخ.

**occipitalis** الْقَذَالِيَّة. القسم الخلفي من العضلة القذالية الجبهية.

**occipitalization** تَقَذُّل. الالتحام العظمي بين الفهقة والعظم القذالي.

**occipitoatloid** قَذَالِيّ فَهْقِيّ. متعلق بالقذال والفهقة.

**occipitoaxoid** قَذَالِيّ مَحْوَرِيّ. متعلق بالقذال والمحور.

**occipitobasilar** قَذَالِيّ قَاعِيّ. متعلق بالقذال وقاعدة القحف.

**occipitobregmatic** قَذَالِيّ هَامِيّ. متعلق بالقذال والهامة.

**occipitocervical** قَذَالِيّ رَقَبِيّ. متعلق بالقذال والرقبة.

**occipitofacial** قَذَالِيّ وَجْهِيّ. متعلق بالقذال والوجه.

**occipitofrontal** قَذَالِيّ جَبْهِيّ. متعلق بالقذال والجبهة.

**occipitomastoid** قَذَالِيّ خُشَائِيّ. متعلق بالعظم القذالي والناثيء الخشائي.

**occipitomental** قَذَالِيّ ذَقْنِيّ. متعلق بالقذال والذقن.



obsession

مریضة مصابة بوسواس نتف الشعر من راسها فتنتف شعراتها الواحدة تلو الأخرى.

**occipitoparietal** قَذَالِيٌّ جِدَارِيٌّ. متعلق  
بالعظمين أو الفصين القذالي والجداري.

**occipitotemporal** قَذَالِيٌّ صُدْغِيٌّ. متعلق  
بالعظمين أو الفصين القذالي والصدغي.

**occipitothalamic** قَذَالِيٌّ مِهَادِيٌّ. متعلق  
بالفص القذالي وبالمهاد.

**occiput** الْقَذَالُ؛ مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ. القسم الخلفي  
من الرأس.

**ochlophobia** رَهَابُ الْإِزْدِيحَامِ. رهاب  
التجمعات المزدحمة.

**ocular** 1. عَيْنِيٌّ 2. الْعَيْنِيَّةُ. 1. متعلق  
بالعين 2. عدسة المجهر العينية.

**oculocephalogyric** حَرَكَى رَأْسِي بَصَرِي. منسوب لحركة الرأس المتعلقة بالبصر.

**oculogyration** حركة العين الالتفافية؛ دَوْرَانُ الْمُقَلَّة. حركة العين حول محورها الأمامي الخلفي.

**oculomotor** مُحَرِّكُ الْعَيْن. منسوب إلى حركة العين أو ما يولدها.

**oculomotorius (= oculomotor nerve)** الْعَصَبُ الْمُحَرِّكُ لِلْعَيْن.

**oculospinal** عَيْنِي نَخَاعِي. متعلق بالعين والنخاع الشوكي.

**oculus (= the eye)** الْعَيْن.

**odaxesmus** عَضُّ اللِّسَان. عض اللسان أو الحَدَّ أَثْنَاء نوبة الصرع.

**odaxetic** عَضُوض؛ مُثِيرُ الْحَك. ما يولد حس العض أو الحك.

**odogenesis (= neurocladism)** تَفَرُّغٌ عَصَبِي؛ تَغْصُنُ الْعَصَب.

**odontalgia (= toothache)** أَلَمُ السِّن.

**odontectomy** قَلْعُ السِّن. قلع السن أو استئصاله أو قطعه.

**odontophobia** رُهَابُ الْأَسْنَان. الخوف من رؤية الأسنان أو من قلعها أو معالجتها.

**odontoprisia (= bruxism)** صَرِيْفُ الْأَسْنَان.

**odynia** أَلَم؛ وَجَع. (لاحقة).

**odynometer** مِقْيَاسُ الْوَجَع. آلة لقياس الوجع.

**odynophagia** بَلْعٌ مُؤَلَم؛ وَجَعُ الْبَلْع. الألم الذي يترافق مع بلع الطعام أو السوائل.

**odynphagia (= odyndynophagia)** بَلْعٌ مُؤَلَم؛ وَجَعُ الْبَلْع.

**oedipal** أَوْدِيْبِي. متعلق بعقدة أوديب.

**oedipism (= edipism)** الْأَوْدِيْبِيَّة؛ إِضْرَارُ الْعَيْنِ الذَّاتِي. (أوديب ملك أسطوري لطيفة قتل أباه غلطاً وتزوج أمه فقلع عينيه حزناً) ويستعمل

المصطلح للدلالة على إصابة الشخص لعينه باضرار عمداً وعن قصد.

**oedipus complex** عَقْدَةُ أَوْدِيْب. في نظرية التحليل النفسي هي المشاعر والتناقضات التي تحدث للطفل أثناء المرحلة القضيبية من مراحل تطوره الجنسي النفسي التي تحدث من الانجذاب الجنسي للوالد المخالف جنسياً (الأم بالنسبة للولد أو الأب بالنسبة للبنات) والتي تشمل أيضاً مشاعر الحقد والحسد نحو الوالد المماثل جنسياً والتي يكتبها الشخص خوفاً من انتقام الوالد منه.

**olfaction** الشَّم. عملية الشم أو حس الشم.

**olfactism** شَمٌّ لَا شَمِي التَّنْبِيهِ؛ تَنْبِيْهُ شَمِّي؛ إِسْتِشْمَام. حس الشم الذي يتولد عن التنبيه بغير المنبهات الشمية.

**olfactometer** مِقْيَاسُ الشَّم. آلة لقياس حس الشم.

**olfactory** شَمِّي. منسوب لحس الشم.

**oligodendroblastoma (= oligodendroglioma)** وَرْمُ الدِّبَقِيَّاتِ قَلِيْلَاتِ التَّغْصُن.

**oligodendroglia** دِبَقِيَّاتٌ قَلِيْلَاتِ التَّغْصُن. الخلايا اللاعصبية التي تنشأ من الأديم الظاهر والتي تكون جزءاً من البنية البرانية (الدبق العصبي) للجهاز العصبي المركزي وتلتف التغصنات التي تبرز من أغشيتها وتلف حول محاور العديد من العصبونات لتكون أغمارها النخاعية في المادة البيضاء كما أنها تكون مع الدبقيات الصغيرة الخلايا التابعة حول عصبونات المادة السنجابية.

**oligodendroglioma** وَرْمُ الدِّبَقِيَّاتِ قَلِيْلَاتِ التَّغْصُن. ورم يتكون من الخلايا القليلة التغصن في مراحل تناميها المختلفة.

**oligodipsia** قَلَّةُ الْعَطْش. قلة العطش الشاذ.

**oligoencephalon (= micrencephalon)** الدِّمَاغُ الصَّغِير. الدماغ الصغير الشاذ.

**oligoglia (= oligodendroglia)** دِبَقِيَّاتٌ قَلِيْلَاتِ التَّغْصُن.

**oligophrenia** تَخَلُّفٌ عَقْلِي.

- moral o. (= moral insanity) جُنُونٌ أَخْلَاقِي.

oligoposia قَلَّةُ الشَّرْبِ. قلة تناول السوائل الشاذ.

oligosynaptic قَلِيلُ التَّشَابُكَاتِ. سبيل عصبي قليل التشابكات وبذلك يكون أيضاً قليل العصوبات.

oliva الزَيْتُونَةُ. حبة مدورة على الجهة الوحشية من كل من هرمي النخاع المستطيل (البصلة) بين الثلمين البطني الوحشي والظهري الوحشي وتولدها كتلة سنجابية غير منتظمة الشكل (النواة الزيتونية الذنبية) تقع تحت سطحها مباشرة.

- o. cerebellaris (= nucleus dentatus) النَوَاةُ المُسَنَّنَةُ.

olive الزَيْتُونَةُ. زيتونة النخاع المستطيل.

- inferior o. (= oliva) الزَيْتُونَةُ السُّفْلِيَّةُ.

- superior o. (= nucleus dorsalis corporis trapezoidei) الزَيْتُونَةُ العُلْوِيَّةُ؛ النواة الظهرية للجسم المنحرفي.

olivifugal مبتعد عن الزيتونة. أو ينقل الدفعات بعيداً عنها.

olivipetal متجه نحو الزيتونة. أو ينقل الدفعات نحوها.

olivopontocerebellar زَيْتُونِي جِسْرِي مُخِخِي. متعلق بالزيتونتين والسويقتين المتوسطتين وقشرة المخيخ.

omalgia أَلَمُ الكَتِفِ. ألم في منطقة الكتف.

omodynia أَلَمُ الكَتِفِ.

oncoma وَرَمٌ؛ تَوَرُّمٌ.

oncotomy بَضْعُ الْوَرَمِ. بضع الورم أو التورم.

oneirism وَغَيٌّ أَخْلَامِي؛ حالة أحلامية. حالة الوعي الشاذة الشبيهة بالحلم.

oneirodynia (= nightmare) كَابُوس. أحلام مزعجة.

oneirogenic مُخَلِّمٌ. ما يولد الأحلام.

oneirogmus إِخْتِلَامٌ. قذف المني الذي يرافق الأحلام.

oneirophrenia فَصَامٌ أَخْلَامِي. نوع من الفصام يتصف بتغيم الوعي.

oneiroscopy تَفْسِيرُ الْأَحْلَامِ. تفسير الأحلام لغرض تشخيص الحالة العقلية للمريض.

onomatomania هَوَسٌ تَرِيدُ الكَلِمَاتِ. هوس ترديد بعض الأسماء أو الكلمات.

onomatophobia زُهَابُ سَمَاعِ الكَلِمَاتِ. الخوف والآنزعاج من سماع بعض الأسماء أو الكلمات.

onomatopoesis هَذَرٌ. النطق بكلمات لا معنى لها.

onychophagia قَضْمُ الْأَظْفَارِ. عادة قضم الأظفار.

onychophagy (= onychophagia) قَضْمُ الْأَظْفَارِ.

oophoralgia (= ovarialgia) أَلَمُ المَبِيضِ.

opening فَتْحَةٌ. فوهة أو فتحة أو حيز مفتوح.

operant 1. إِشْرَاطٌ فَعَالٌ 2. إِسْتِجَابَةٌ ذَاتِيَّةٌ.

1. استجابة أو نمط رد فعل يتصف بتأثيره الفعال على المحيط وقدرته في الحصول على فائدة أو تعزيز 2. نوع من الإشراط يقوم الحيوان أو الشخص فيه بعمل معين عند تنبيهه بمنبه بسيط بأمل الحصول على جائزة أو فائدة 3. في علم النفس استجابة لا يثيرها منبه خارجي معين ولكنه يعاود بتناوب معين تحت ظروف خاصة.

operation عَمَلِيَّةٌ. أي عمل جراحي يقوم به الجراح بيديه أو بواسطة آلة جراحية.

operculum الوِصَادُ. غطاء يغطي أحد الفتحات أو الأعضاء لوقايتها.

- frontal o. (= o. frontale) الوِصَادُ الجَبْهِيّ

- o. frontale (= pars opercularis gyri

frontalis inferioris) الوِصَادُ الجَبْهِيّ. الجزء الوصادي للتلفيف الجبهي السفلي.

- frontoparietal o. الوِصَادُ الجَبْهِيّ الجِدَارِيّ.



- جزء التلفيف الجبهي السفلي خلف الفرع الصاعد من التلم الوحشي بالإضافة إلى النهايتين السفليتين الأماميتين للفصيص الجداري السفلي وهو يغطي جزء من فصيص الجزيرة.
- **opercula of insula** **أُوصِدَةُ الْجَزِيرَةِ**. باحات قشرة المخ التي تغطي جزيرة (فص الجزيرة) نصف كرة المخ والتي تكون حواف التلم الوحشي والتي تقسمها وتفصلها عن بعضها.
- **occipital o.** **الْوَصَادُ الْقَذَالِي**. جزء من الفص القذالي للدماغ يحده التلم الهلالي عند وجوده.
- **temporal o.** **الْوَصَادُ الصَّدْغِي**. أقسام من التلفيف الصدغي العلوي والتلفيف الصدغي المستعرض التي تغطي قسماً من فص الجزيرة.
- ophthalmagra** **أَلَمٌ عَيْنِيٌّ مُفَاجِئٌ**. ألم يصيب العين بصورة مفاجئة.
- ophthalmalgia** **أَلَمُ الْعَيْنِ**.
- ophthalmatrophia** **ضُمُورُ الْعَيْنِ**.
- ophthalmectomy** **اسْتِنْصَالُ الْعَيْنِ؛ قَلْعُ الْعَيْنِ**. إزالة العين جراحياً.
- ophthalmencephalon** **المادة العصبية الإبصارية؛ الدُمَاغُ الْعَيْنِيّ**. الشبكية والعصب البصري والجهاز البصري الدماغ.
- ophthalmocele (= exophthalmos)** **جُحُوظُ الْعَيْنِ**.
- ophthalmoplegia** **شَلْلُ الْعَيْنِ**. شلل عضلات العين.
- **basal o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْقَاعِيّ**. شلل العين بسبب آفة في قاعدة الدماغ.
- **exophthalmic o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْجُحُوظِيّ**. خزل العين الخارجي مع جحوظها الذي يحصل في مرض غريفز (فرط الدرقية).
- **external o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْخَارِجِيّ**. شلل عضلات العين الخارجية.
- **fascicular o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْحَزْمِيّ**. شلل عضلات العين بسبب آفة في الجسر.
- **internal o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الدَّاخِلِيّ**. شلل عضلات القزحية والجهاز الهدبي.
- **internuclear o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ بَيْنَ النَّوَى**. شلل
- العين الحركي المستعرض بسبب آفة في الحزمة الطولانية الإنسية.
- **nuclear o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ النَّوَوِيّ**. شلل العين بسبب إصابة نوى أعصاب العين.
- **orbital o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْحَاجَاجِيّ**. شلل العين بسبب إصابة أو آفة في الحاجاج.
- **partial o** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْجُزْئِيّ**. شلل يصيب إحدى عضلات العين أو اثنتين منها.
- **progressive external o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ الْخَارِجِيّ**. اعتلال عضلي متروك بطيء يصيب العينين وعادة ما يصيب عضلات العين الخارجية ولكنه قد يصيب عضلة العين الدويرية أحياناً كما أنه غالباً ما يصيب العضلة الراقعة للجفن مبكراً ويؤدي إلى جحوظ العين ويتطور تدريجياً إلى شلل كامل.
- **total o.** **شَلْلُ الْعَيْنِ التَّامّ**. شلل يصيب كل عضلات العين الخارجية والداخلية.
- ophthalmoptosis (= exophthalmos)** **جُحُوظُ الْعَيْنِ**.
- ophthalmoscope** **مِنْظَارُ الْعَيْنِ**. آلة لتنظير داخل العين.
- ophthalmoscopy** **تَنْظِيرُ الْعَيْنِ**. عملية فحص داخل العين بواسطة المنظار وتنظير القرص البصري وأوعية داخل العين وشبكيتها وقاعها.
- **medical o.** **تَنْظِيرُ الْعَيْنِ الطَّبِيّ**. تنظير داخل العين بهدف تشخيص بعض الأمراض الجهازية كالبول السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أورام الدماغ.
- opiate** **أَفْيُونِيّ**. 1. دواء يحوي الأفيون أو مستمد منه 2. دواء منوم.
- opiomania** **إِذْمَانُ الْأَفْيُونِ**.
- opipramol hydrochloride** **هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الْأُوبِيْپِرَامُول**. دواء مضاد الكآبة ومسكن معتدل.
- opisthencephalon (= the cerebellum)** **الْمُخَيِّخ**.
- opisthotonos** **التَشَنُّجُ الظَّهْرِيّ**. نوع من التشنج يتصف بانتواء الرأس والكاكل للخلف والجسم إلى الامام.
- opisthotonus (= opisthotonos)** **التَشَنُّجُ الظَّهْرِيّ**.

**opium** أفيون. عصير ثمار بعض أنواع نبات الخشخاش ويستخلص من العديد من قلوانياته كالمورفين والكودائين والبابايرين والثيبائين ويستعمل لخواصه التنويمية والتسكينية ولكنه يولد الإدمان.

**opiumism** إدمان الأفيون.

**opposition of thumb** تقابل الإبهام. مقابلة الإبهام لأصابع اليد الأخرى.

**opsialgia (= geniculate neuralgia)** ألم العقدة الركبية.

**opsomania** هوس طعامي؛ هوس الطعام. الرغبة في بعض أنواع الطعام المعينة.

**optesthesia** حس الإنبصار. القدرة على إدراك المنبهات البصرية.

**optic** عيني. متعلق بالعين.

**optical** بصري. متعلق بالبصر.

**opticocchiasmatic** بصري تصالبي. متعلق بالعصب البصري وبالتصالب البصري.

**opticociliary** بصري هديبي. متعلق بالعصبين البصري والهدبي.

**opticopupillary** بصري حدقي. متعلق بالعصب البصري وبحدة العين.

**optics** البصريّات. العلم الذي يعنى بدراسة الضوء والبصر.

**optimal** أمثل؛ مثلى. الأحسن أو الأكثر مناسبة.

**optimum** الأمثل؛ المثلى. 1. حالة المحيط الأكثر مناسبة للوظائف الطبيعية للكائن 2. أفضل كمية مناسبة من الطعام الكافية للفرد في أحوال معينة.

**optochlasmic (= opticochiasmatic)** بصري تصالبي.

**optokinetic** حركي بصري. متعلق بحركات العينين والأجسام في المجال البصري.

**optomeninx (= the retina)** الشبكية.

**orbit** الحجاج. التجويف العظمي الذي يحوي مقلة العين وعضلاتها وأوعيتها وأعصابها وتساهم عدة عظام قحفية في تكوينه.

**orbitotemporal** حجاجي صدغي. متعلق بالمنطقتين الحجاجية والصدغية.

**orchialgia** ألم الخصية. ألم في الخصية.

**orchidalgia (= orchialgia)** ألم الخصية.

**organ** عضو. قسم مستقل من الجسم يقوم بوظيفة معينة خاصة.

**- effector o.** عضو مستفعل. عضلة تنقلص أو غدة تفرز استجابة للنبضات العصبية.

**- end o. (= end-organ)** عضو إنتهائي.

**- essential o. of thalamus** العضو الأساسي للمهاد. أحد أجزاء المهاد ومن المحتمل أن تكون النواة الإنسانية التي تعمل كمركز تكامل في الحيوانات التي لا تملك قشرة مخية أو قليلاً منها وهي تعمل بنفس الأسلوب حتى في الكائنات العليا.

**- Golgi tendon o.** عضو غولجي الوترى. مستقبلات توجد في أوتار عضلات الحيوانات الثديية والحساسة للتغيير الميكانيكي للوتر الذي يتولد إما عن تمديده المنفعل أو عن تقلصها اللاتقصري مما يزيد في توتر الوتر الذي ينبه هذه المستقبلات. وهي المسؤولة عن استجابة التحويل واستجابة السكين المطواة.

**- gustatory o.** عضو الذوق. الأعضاء المسؤولة عن حس الذوق.

**- olfactory o.** عضو الشم. العضو المسؤول عن حس الشم.


**- sense o's.** أعضاء الحس. مختلف أعضاء الحس في الجسم.

**- special sense o's.** أعضاء الحس الخاصة. أعضاء حس البصر والسمع والذوق والشم والحس الدهليزي القوقعي.

**- terminal o.** عضو إنتهائي. عضو يوجد في نهايتي القوس المنعكسي.

**- vestibulocochlear o.** العضو الدهليزي القوقعي. البنات الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي والمسؤولة عن الوظائف الدهليزية والسمعية.

**- visual o.** العضو البصري. العين.



organ, special sense

الاسماء اذن الإنسان وملحقاتها: (1) العضلة الصدغية (2) غضروف الأذن (3) الزنمة (5) الصماخ السمعي الظاهر الغضروفي (6) الصماخ السمعي الظاهر العظمي (8) غشاء الطبل (9) عظيمات الأذن (11) الأقنية الهلالية (12) العصب الدهليزي (14) العصب الوجهي (15) العصب القوقعي (16) الشريان السباتي الباطن (19) النخير (22) الشريان السباتي الباطن (23) الوريد الوداجي الباطن (24) النائي الإبري (25) العصب الوجهي (26) النائي الخشائي.

- organism** كَائِنٌ حَيٌّ. أي مخلوق حي سواء كان حيواناً أو نباتاً.
- organization** 1. مُنَظَّمَةٌ. 2. تَنْظِيمٌ. 3. تَعْضِي. 1. المجموعة المنظمة والمرتببة والمتخصصة بالقيام بوظيفة منسقة. 2. عملية ترتيب وتنظيم. 3. عملية تحول خثرة الدم إلى نسيج ليفي.
- organon (= organ)** عُضْوٌ. عضو مستقل في وظائفه في الجسم منظم بشكل بنوي خاص ليقوم بوظيفة أو عدة وظائف معينة خاصة ويكون من أنسجة مختلفة يقوم أحدها بالوظيفة الرئيسية الخاصة.
- organum (= organ)** عُضْوٌ.
- orgasm** الإِنْغَافُ: الإِرْجَازُ: هَزَّةُ الجماع. ذروة التهيج الجنسي.
- orientation** تَوَجُّهُ: الإِهْتِدَاءُ. إدراك الشخص لمحيطه بالنسبة للموقع والوقت والناس المحيطين به.
- orphenadrine** أَوْرفِينَادْرِين. دواء مضاد للفعال الكوليني ولل هستامين وللتشنج مع تأثير شمقي.
- o. hydrochloride** هَيْدُرُوكْلُورِيد الأَوْرفِينَادْرِين. دواء يستعمل في معالجة الاستجابات خارج الهرمية والباركنسونية المولدة من استعمال بعض الأدوية المسببة له.
- orthochromatic** سَوِيُّ اللَّوْنِ. سوي الانصباع أو اللون.
- orthodromic** سَوِيُّ التَّوَصِيلِ. عصب يوصل الدفعات العصبية بالاتجاه السوي.
- orthophony** سَوَاءُ النُّطْقِ. التصويت الصحيح والنطق السوي للكلمات.
- orthopsychiatry** الطِبُّ النَّفْسِيُّ الإِسْوَاتِي. فرع الطب النفسي الذي يعني بدراسة وممارسة إدامة الحالة النفسية السوية أو إعادتها عند اختلالها وذلك باستعمال مناهج علم النفس أو كالا اجتماع أو الحقول العلمية الأخرى ويهتم بالصحة النفسية للمجتمع بصورة عامة.
- orthostatic** قِيَامِي: إِنْتِصَابِي. متعلق بالوضع القياسي للجسم أو مولد عنه.
- orthostatism** إِنْتِصَابُ الْجِسْمِ: قِيَامُ الْجِسْمِ: الانتصابية الجسم. الوضع القائم المنتصب للجسم.
- orthosympathetic** الْجَهَازُ الْوَدِّي. الجهاز المستقل الودي.
- orthotherapy** مُعَالَجَةٌ تَقْوِيْمِيَّةٌ. معالجة الاختلالات والاضطرابات الجسدية بتصحيح وضع الجسم.
- orthotonos** تَشْنِجٌ انْتِصَابِي: تَوَثُرٌ إِنْتِصَابِي. التثيت الكزازي للرأس والأطراف في خط مستقيم جاسيء.
- orthotonus (= orthotonos)** تَشْنِجٌ انْتِصَابِي: تَوَثُرٌ إِنْتِصَابِي.
- os** 1. الفَمُ. 2. عَظْمٌ. 1. أية فتحة في الجسم أو فتحة الفم. 2. عظم.
- oscillation** تَدْبِذٌ: دَبْذَبَةٌ. حركة اهتزازية أو حركة نواسية من الامام للخلف أو من جانب لآخر.
- bradykinetic o.** دَبْذَبَةٌ حَرَكِيَّةٌ بَطِيئَةٌ. حركات رقصية بطيئة معاودة تشاهد في التهاب الدماغ الوبائي.
- oscillator** مُوَلِّدُ الدَّبْذَبَاتِ. جهاز يولد الدبذبات بمختلف درجات التردد أو بتردد ثابت.
- oscillopsia** بَصَرٌ مُدْبَذِبٌ. حالة تظهر فيها الأجسام المتطورة تتحرك من الامام للخلف وبالعكس أو تقفز أو تتمتع ويحدث ذلك في التصلب المتعدد.
- oscilloscope** مِنْظَارُ الدَّبْذَبَةِ. آلة تعرض صورة بصرية للتغيرات الكهربائية على الشاشة التألقية لأنبوب الأشعة المهبطية.
- oscitation (= yawning)** تَنَاقُوبٌ.
- osmesthesia (= olfactory sensibility)** حِسُّ الشَّمِّ.
- osmoceptor (= osmoreceptor)** 1. مُسْتَقْبِلَةُ الرَّائِحَةِ. 2. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُجِ كَرَاهِيَةِ الرَّائِحَةِ. كراهية الشخص لإحدى الروائح.
- osmodysphoria** 1. مُسْتَقْبِلَةُ الرَّائِحَةِ

2. مُسْتَقْبَلَةُ التَّنَاضُح. 1. مستقبلية توجد في الانف حساسة للروائح 2. أحد العصبونات المتخصصة التي توجد في النوى فوق البصرية للوطاء والتي تتحسس لزيادة التناضحية (وبصورة خاصة لزيادة تركيز الصوديوم في السائل خارج الخلايا) ويؤدي تنبيهها إلى تحرير هرمون مضاد للإبالة من الفص الخلفي للنخامي.

**ostealgia** ألم عظمي. ألم في أحد العظام أو أكثر.

**osteoscope** وَجَعٌ عَظْمِيٌّ مَبْرَح. ألم في العظم أو العظام ينتج عن داء الزهري فيها.

**osteodynia** وَجَعٌ عَظْمِيٌّ. ألم في أحد العظام.

**osteoneuralgia** ألم عَصَبِيٌّ عَظْمِيٌّ. ألم عصبي في أحد العظام.

**otagra (= otalgia)** ألم أُذُنِيّ.

**otalgia** ألم أُذُنِيّ. ألم في الأذن.

**- geniculate o. (= geniculate neuralgia)** ألم الأذن الركيبي المنشأ؛ ألم العُقْدَةِ الرُكْبِيَّة. ألم الأذن المسبب بهربس الموجه الذي يصيب العصبين الوجهي والسمعي.

**- tabetic o.** ألم أُذُنِيٌّ تَابِيسِيٌّ. ألم أُذُنِيّ يظهر في التابس الظهرى بسبب تنكس الجذر المتوسط للعصب الوجهي.

**otic** أُذُنِيٌّ. متعلق بالأذن أو منسوب إليها.

**otocerebritis** إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الأُذُنِيّ المَنْشَأ. التهاب الدماغ الناتج عن أمراض الأذن.

**otocranium** القِحفُ الأُذُنِيّ. قسم العظم الصدغي للقحف الذي يحوي الأذن الداخلية ويسمى أيضاً الخشاء الصدغي.

**otoencephalitis** إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الأُذُنِيّ المَنْشَأ. التهاب الدماغ الذي يمتد إليه من الأذن الوسطى الملتهبة.

**otoneuralgia** ألم أُذُنِيٌّ عَصَبِيٌّ. ألم عصبي في الأذن.

**otoneurasthenia** وَهْنٌ عَصَبِيٌّ أُذُنِيٌّ المَنْشَأ. وهن عصبي ينتج عن مرض الأذن.

**otoneurology (= neuro-otology)** طِبُّ الأغصَابِ الأُذُنِيَّة.

**ovarialgia (= oophoralgia)** ألم المَبِيض. استمرار جريان السائل سَلَسٌ. كالبول أو الدمع.

**overstrain** فَرْطُ الإِزْهَاق. درجة عالية شاذة من التعب تتولد عن فرط الفعالية وهي درجة متوسطة بين التعب والانهك.

**overstress** فَرْطُ الإِجْهَاد. فرط الفعالية الشديدة الذي يؤدي إلى فرط الإرهاق.

**oxazepam** أوكسازيبام. دواء مهدئ يستعمل في معالجة القلق وخصوصاً عند الشيوخ أو لتهذئة المريض المدمن على الكحول عند انقطاعه عنه.

**oxyachresia** نقص غُلُوكُوزِ الدِّمَاغ. نقص في تجهيز الغلوكوز للدماغ الذي يؤدي إلى سبات نقص الغلوكوز.

**oxycephalia (= oxycephaly)** تَسَنُّمُ الرأس.

**oxycephalic (= oxycephalous)** مُسَنَّمُ الرأس. مصاب بتسнем الرأس.

**oxycephaly** تَسَنُّمُ الرأس. حالة تكون فيها قمة الرأس مدببة أو مخروطية بسبب الانسداد المبكر للدرزتين اللامي والإكليلاني.

**oxycinesia (= kinesialgia)** ألم الحَرَكَةِ. الألم الذي يتولد عند الحركة.

**oxyesthesia** احتداد الحس؛ فَرْطُ الإِحْسَاس. فرط حدة الإحساس الشاذ أو المرضي.

**oxylalia** هَزُولَةُ الكلام. سرعة الكلام.

**oxymorphone hydrochloride** هِيدُرُوكُلُورِيدُ الأُكْسِيْمُورْفُون. دواء صناعي يستعمل كمسكن مخدر.

**oxytocin** أوكسيتوسين. أحد الهرمونين اللذين تولدهما الخلايا العصبية للوطاء ويخزنان في الفص الخلفي للنخامية ويعمل على تنبيه تقلص الرحم وإدراج الحليب.

**ozostomia** نَقَاطَةُ النَفْس. سوء رائحة النفس أو الفم.

# P

**pacemaker** نَاضِطَةٌ. مادة أو شيء أو آلة تؤثر في سرعة إحدى الوظائف النظمية ويستعمل المصطلح بمفرده للدلالة على ناضطة القلب.

**pachycephalia (= pachycephaly)**

ثَخَنُ الرَّأْسِ.

**pachycephalic** ثَخِينُ الرَّأْسِ.

**pachycephaly** ثَخَنُ الرَّأْسِ. ثخن عظام القحف كما يحدث في داء ضخامة النهايات.

**pachygyria (= macrogyria)** ضَخَامَةُ التَّلَافُيفِ.

**pachyleptomeningitis** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ والحَنُون. التهاب السحايا السمكة والرقيقة.

**pachymeningitis** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ. التهاب الأم الجافية وتشابه أعراضها أعراض التهاب السحايا.

**- cerebral p.** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ الدُّمَاغِيَّةُ. التهاب جافية الدماغ.

**- circumscribed p.** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ المُتَحَدِّد. التهاب منطقة محددة من الجافية.

**- external p.** التَّهَابُ ظَاهِرُ الجَافِيَّةِ. التهاب الوجه الظاهر للجافية.

**- hemorrhagic internal p.** التَّهَابُ بَاطِنُ الجَافِيَّةِ النَّزْفِيَّةِ. التهاب باطن الجافية مع ورم دموي فيها.

**- internal p.** التَّهَابُ بَاطِنُ الجَافِيَّةِ. التهاب الوجه الباطن للجافية.

**- intralamellar p. (= Intradural abscess)** خُرَاجٌ دَاخِلُ الجَافِيَّةِ.

**- purulent p.** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ الفَنَحِي. خراج الجافية.

**- serous internal p. (= communicating hydrocephalus)** التَّهَابُ بَاطِنُ الجَافِيَّةِ المَصْلِي. مَوَه الرأس الخارجي.

**- spinal p.** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ. التهاب جافية النخاع الشوكي.

**- syphilitic p.** التَّهَابُ الجَافِيَّةُ الزَّهْرِي. التهاب الجافية الذي يسببه داء الزهري.

**pachymeningopathy** اغْتِلَالُ الجَافِيَّةِ. أي من الأمراض غير الالتهابية في الجافية.

**pachymeninx (= the dura mater)** السَّحَايَا الثَّخِينَةُ؛ الأُمُ الجَافِيَّةُ.

**pain** ألم. (ج: آلام). حس غير مريح ومزعج في منطقة محددة تقريباً مع ضائقة وكراب ويتولد عن تنبيه نهايات عصبية خاصة وينتج عن تخريب الأنسجة أو عن التهديد بتخريبها ويخدم كآلية وقائية تحمي الجسم وتنبيهه للابتعاد عن العامل المسبب والمؤذي للجسم.

**- affective p.** أَلَمٌ عَاطِفِيٌّ؛ أَلَمٌ إِنْفِعَالِيٌّ. ألم نفسي يؤثر على عواطف الشخص.

**- atypical facial p. (= atypical facial neuralgia)** أَلَمٌ عَصَبِيٌّ وَجْهِيٌّ لَا نَعْمَطِي.

**- bearing down p.** أَلَمُ الحَرَقِ؛ طَلَق. ألم يرافق وضع الجنين في المرحلة الثانية من الولادة وينتج عن تقلص عضلات الرحم.

**- boring p.** أَلَمٌ ثَاقِبٌ. حس مؤلم يشعر المصاب به كأن آلة حادة دقيقة وطويلة تنقب الجزء المؤلم من جسمه.

**- Brodie's p.** أَلَمٌ بَرُودِي. ألم يتولد عن طي الجلد بالقرب من مفصل مصاب بالآلم العصبي.

- burning p. أَلَمٌ مُخْرِقٌ؛ أَلَمٌ حَارِقٌ. ألم يصاحب الحرق أو يشابه الحس بالحرق.
- central p. أَلَمٌ مُرَكِّزِيٌّ. ألم يتولد عن آفة في الجهاز العصبي المركزي.
- Charcot's p's. أَلَامٌ شَارِكُوت. روماتزم إحدى الخصيتين.
- cord p. أَلَمٌ نَخَاعِيٌّ المَنَشَا. ألم تلقائي يتولد عن آفة في النخاع الشوكي وعادة ما يصيب مناطق دخول الجذور الخلفية والسبل النخاعية المهادية أو الألياف العصبية المتصالبة بالقرب من القناة المركزية كما يحصل في تكهف النخاع.
- dilating p. طَلَقٌ مُوسِعٌ. ألم المرحلة الأولى من الولادة.
- dull p. أَلَمٌ كَلِيلٌ. ألم غير حاد.
- evoked contralateral p. أَلَمٌ مُسْتَنَارٌّ بِالْجِهَةِ الْمُعَابِلَةِ. ألم عرق النسا (النسي) في الطرف السفلي يستثار عند ثني وتقريب ساق الجهة المقابلة أو ثني الطرف السفلي المعاكس عند مفصل الورك مع بسط الساق عند الكاحل.
- expulsive p. (= bearing down P.) طَلَقٌ طَارِدٌ.
- false p's. أَلَامٌ كَاذِبَةٌ. آلام غير مؤثرة تشبه آلام الطلق ولكنها لا تولد أي توسيع لعنق الرحم.
- fast p. أَلَامٌ السَّرِيع. الألم الذي يتولد مباشرة بعد التنبيه وبعد فترة كمون قصيرة جداً.
- fulgurant p. (= lightning p.) أَلَمٌ بَارِقٌ.
- gas p's. أَلَامٌ غَازِيَّةٌ. آلام تنتج عن تمدد المعدة أو الأمعاء بتجمع الهواء أو الغازات الأخرى فيها نتيجة تناول أغذية مولدة للغازات.
- girdle p. ألم حزامي؛ ألم يُطَاقِي. حس مؤلم شبيه بالنطاق حول الخصر.
- growing p's. أَلَامٌ مُتَمَامِيَّةٌ. آلام معارضة شبيهة بالآلام الروماتزمية في الأطراف وهي آلام عضلية هيكلية تحدث في الأحداث.
- heterotopic p. (= referred p.) أَلَمٌ مُحَوَّلٌ؛ أَلَمٌ رَجِيعٌ.
- homotopic p. أَلَمٌ مُوَضَّعٌ. ألم يحس به في منطقة الإصابة.
- hunger p. أَلَمٌ الْجُوع. ألم يظهر عند الشعور بالجوع وهو عرض لاضطرابات المعدة.
- Ideogenous p. (= psychogenic p.) أَلَمٌ نَفْسِيٌّ المَنَشَا.
- imperative p. (= psychogenic p.) أَلَمٌ نَفْسِيٌّ المَنَشَا.
- Intermenstrual p. (= mittelschmerz) أَلَمٌ الْقُرْء؛ أَلَمٌ بَيْنَ الْحِيضَيْنِ. ألم في الفترة بين الحيضين وعادة في منتصفها عند طرح البويضة.
- Internal p. أَلَمٌ دَاخِلِيٌّ. ألم داخل الجسم.
- Intractable p. أَلَمٌ غَيْرٌ مُخْتَمَلٌ. ألم يصعب تسكينه.
- ischemic p. أَلَمٌ إِقْفَارِيٌّ. ألم يتولد عن إقفار المنطقة وتوقف دورتها الدموية.
- jumping p. أَلَمٌ قَفَاز. ألم يتولد في امراض المفاصل عندما ينكشف العظم بسبب تقرح غضروفه.
- labor p's. أَلَامٌ المَخَاض. آلام نظمية تزداد شدتها وترددها تدريجياً أثناء الولادة بسبب تقلصات عضلات الرحم.
- lancinating p. أَلَمٌ رَامِح. ألم سهمي حاد.
- lightning p's. أَلَامٌ بَارَقَةٌ. آلام سهمية قاطعة وشديدة تظهر في التابس الظهري.
- low back p. أَلَمٌ أَسْفَلِ الظَّهْرِ. ألم في القسم السفلي من الظهر.
- malingering p. أَلَمٌ المَقَارِض. ألم الأشخاص المتمارضين.
- middle p. (= intermenstrual p.) أَلَمٌ بَيْنَ الْحِيضَيْنِ.
- nerve p. أَلَمٌ عَصَبِيٌّ. ألم يتولد عن إصابة العصب أو انضغاطه أو مرضه.
- osteocopic p. (= osteocope) الْوَجَعُ العَظْمِي. الألم الذي يصيب العظام بسبب إصابتها بداء الزهري.
- phantom limb p. أَلَمٌ الطَّرْفِ الشَّبَحِي. ألم يحس به المريض المبتور الطرف على أنه صادر من الجزء المقطوع من الطرف وكأنه لا زال في موضعه.
- postprandial p. أَلَمٌ تَالٍ لِلأَكْلِ. ألم في البطن يحدث بعد تناول الطعام.

- **premonitory p's.** آلامٌ إنذارية. آلام تقلصية خفيفة تظهر قبل بداية الولادة الحقيقية.
- **pricking p.** ألمٌ وأخز. ألم وخزي يشعر به الشخص وكأنه وخزات إبرية.
- **psychic p. (= psychalgia)** ألمٌ نفسي. ألم في الرأس يشعر به المريض وكأنه ألم عاطفي المنشأ ويمكن أن يترافق مع أفكار غير محتملة أو مع وسواس أو هلاس.
- **psychogenic p.** ألمٌ نفسي المنشأ. أعراض آلام جسمية ذات أسباب نفسية.
- **radiating p.** ألمٌ متشعع. ألم في منطقة معينة ولكنه ينتشر منها إلى المناطق المحيطة بها.
- **radicular p.** ألمٌ جذري. ألم ينتج عن انضغاط الجذور الخلفية للنخاع الشوكي أو عن إصابته أو مرضها ويحس به في المناطق الجلدية التي تغذيها.
- **referred p.** ألمٌ محوّل. ألمٌ رَجِيع. ألم يحس به في قسم من الجسم غير القسم المسبب فيه.
- **rest p.** ألمٌ الراحة. ألم محرق ومستمر في الأقسام السفلية من الأطراف السفلية وعادة في مقدمة القدم يبدأ أو يزداد شدة عند الاستلقاء ويخف أو يزول عند الوقوف ويتسبب عن إقفار الطرف.
- **root p. (= radicular p.)** ألمٌ جذري.
- **sharp p.** ألمٌ حاد. ألم شديد مفاجئ.
- **shooting p's. (= lightning p's)** آلامٌ بارقة.
- **slow p.** الألم البطيء. حس الألم الذي يتلو حس الألم السريع وله فترة كمون طويلة نسبياً.
- **somatic p.** ألمٌ جسدي. ألم في إحدى المناطق الجسدية.
- **spinal root p. (= root p.)** ألمٌ جذري.
- **spot p's.** آلامٌ بقعية. آلامٌ لطخية. آلام تتوضع في نقاط متفرقة من الجسم.
- **starting p.** ألمٌ الإغفاء. ألم مع تشنج عضلي يظهر مع بدء النوم.
- **startling p.** ألمٌ مذهل. ألم مروع وشديد.
- **superficial p.** ألمٌ سطحي. ألم في منطقة سطحية من الجسم.
- **terberant p. (= terberating p. = boring p.)** ألمٌ ثاقب.
- **thalamic p.** ألمٌ مهدي. ألم تلقائي يتولد عن آفة المهاد أو مرضه.
- **visceral p.** ألمٌ حشوي. ألم يصيب أحد الأحشاء.
- **wandering p.** ألمٌ متجول. ألم يغير موضعه باستمرار.
- pains** آلام. وعادة ما يطلق على آلام الوضع.
- paleocerebellum** المخيخ القديم. اسم يطلق على الأقسام التطورية القديمة للمخيخ ولكنه يطلق اليوم بصورة خاصة على أقسامه التي تستلم أليافاً واردة من السبل النخاعية المخيخية التي تشمل في الإنسان الفص القحفي باستثناء اللسين والهرم ولهواة دودة الجزء الذنبي من المخيخ.
- paleocortex** القشرة القديمة. قسم قشرة المخ التي تتطور مع القشرة البدائية وبالترافق مع الجهاز الشمي وهي أقدم وأقل تطبيقاً من القشرة الحديثة وتتكون بصورة رئيسية من القشرة الكثرية الشكل والتلفيف حول الحصيني.
- palatoplegia** شللُ الحَنَك. شلل شراع الحنك أو الحنك الرخو.
- paleoencephalon** الدِّماغُ القديم. الدماغ القديم طورياً ويشمل كل الدماغ ما عدا قشرة المخ وتوابعها.
- paleocerebellum (= palaeocerebellum)** المخيخ القديم.
- paleocortex (= palaeocortex)** القشرة القديمة.
- paleoencephalon (= paleoencephalon)** الدِّماغُ القديم.
- paleokinetic** حركي قديم. مصطلح يطلق على الآلية العصبية الحركية المختصة بالحركات التلقائية المرافقة وهي تحت سيطرة الجسم المخطط وتمثل نوعاً من التحكم العصبي القديم طورياً.
- paleoneurology** علمُ أعصابِ المُتَحَجِّرات. علم يدرس الأجهزة العصبية لافحورات الحيوانات المتحجرة.
- paleopallium (= paleocortex)** القشرة القديمة.



**paleosensation** الحِسُّ القَدِيم. حس الألم الشديد والاختلافات الحرارية الكبيرة واللمس الخشن بالمقارنة مع الحس الحديث الذي يشمل اللمس الرقيق والاختلافات البسيطة في درجات الحرارة والحواس الدقيقة.

**paleostriatum** المَخْطُطُ القَدِيم. القسم القديم تطورياً من الجسم المخطط وهو يشمل الكرة الشاحبة.

**paleothalamus** المِهَادُ القَدِيم. الجزء القديم تطورياً من المهاد ويتكون من قسمه الإنسي الذي لا توجد فيه ارتباطات متبادلة مع القشرة الجديدة.

**palikinesia (= palicinesia)** تَكَرُّرِيَّة الحَرَكَة. تكرار الحركات المرضي.

**palilalia** لَجَلَجَلَة. حالة التكرار المرضي للألفاظ أو الكلمات أو المقاطع بسرعة كبيرة.

**palingraphia** تَكَرُّرِيَّة الكِتَابَة. حالة مرضية يكرر المصاب بها كتابة الأحرف أو الكلمات أو المقاطع.

**palinmnesis** تَذَكُّرُ القَدِيم. ذكرى الحوادث أو التجارب القديمة.

**palinopsia (= visual perseveration)** وَظُوبُ الرُّؤْيَة. الحالة المرضية لبقاء أو لتكرر الحس البصري بعد زوال المنبه المولد له.

**palinphrasia** تَكَرُّرِيَّة الكلام. حالة التكرار المرضي للكلمات والمقاطع.

**paliphrasia (= palinphrasia)** تَكَرُّرِيَّة الكلام.

**pallanesthesia** فَقْدُ حِسِّ الاهْتِرَاز. فقدان حس الاهتزاز كاهتزاز الشوكة الرنانة.

**pallesthesia** حِسُّ الاهْتِرَاز. حس الاهتزاز الذي يشعر به الشخص عند وضع شوكة رنانة مهتزة على ناتئة عظمية تحت جلدية في الجسم.

**pallhypesthesia** نَقْصُ حِسِّ الاهْتِرَاز.

**pallial** قَشْرِيٌّ مُخَي. منسوب لقشرة المخ.

**palliate** مُلَطِّف. ينقص من شدة المرض أو الأعراض.

**palliative** مُلَطِّف. ما يفرج عن المرض أو الأعراض ولكنه لا يشفيها.

**pallidal** كَرْوِيٌّ شَاحِبِي. نسبة للكرة الشاحبة.

**pallidectomy** قَطْعُ الشَّاحِبَة. قطع الكرة الشاحبة أو استئصالها جراحياً أو كيميائياً.

**pallidoansection** قَطْعُ الشَّاحِبَة والغُرْوَة. بضع الكرة الشاحبة والعروة العدسية.

**pallidoansotomy** بَضْعُ الشَّاحِبَة والغُرْوَة. بضع الكرة الشاحبة والعروة العدسية وتوليد آفة فيهما.

**pallidofugal** مُبْتَعِدُ عَنِ الشَّاحِبَة. ينقل دفعات عصبية بعيداً عن الكرة الشاحبة.

**pallidotomy** بَضْعُ الشَّاحِبَة. بضع الكرة الشاحبة جراحياً وتوليد آفة فيها.

**pallidum (= globus pallidus)** الكُرَة الشَّاحِبَة.

**p. I** الكُرَة الشَّاحِبَة 1. الكرة الشاحبة الإنسية.

**p. II** الكُرَة الشَّاحِبَة 2. الكرة الشاحبة الوحشية.

**pallium (= cerebral cortex)** قَشْرَة المَخ. ما يشمل كل القشرة السنجابية التي تغطي نصفي كرة المخ كما أنه يعني قشرة المخ أثناء مرحلة تطورها.

**palmanesthesia (= pallesthesia)** فَقْدَانُ حِسِّ الاهْتِرَاز.

**palmesthesia (= pallesthesia)** حِسُّ الاهْتِرَاز.

**palmus (= 1. palpitation 2. saltatory spasm)** 1. خَفَقَان 2. تَشَنُّجٌ قَفْزِيٌّ

**palpable** مَحْسُوس. محسوس بالجلس.

**palpatometry** قِيَاسُ الجِس. قياس مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحملة الشخص من دون حدوث أي ألم له.

**palpebration (= winking)** رَفُّ الأَجْفَان، غَمَاز؛ غَمَاز. رف الأجفان المتكرر مثل الذي يحدث في العرة.

**palsy (= paralysis)** شَلْل.

**Bell's p.** شَلْلٌ بِل. شلل وجهي شقي ومفاجئ بسبب آفة العصب الوجهي ويولد تشوهاً وجهياً مميزاً.

- birth p. شَلْلٌ بِالْوِلَادَةِ. شلل يصيب الجنين أثناء ولادته.
- brachial p. شَلْلٌ عَضْدِيّ. انظر brachial paralysis.
- bulbar p. شَلْلٌ بَصَلِيّ. انظر bulbar paralysis.
- cerebral p. شَلْلٌ دِمَاعِيّ. اضطراب حركي دائم وشلل يظهر قبل سن الثالثة ينتج عن تلف دماغي غير مترقّ أو مرض دماغي للجنين في داخل الرحم.
- crossed leg p. شَلْلٌ تَصَالِبُ السَّاقِ. شلل العصب الشظوي الذي ينتج عن تصالب الساقين إحداهما فوق الأخرى عند الجلوس.
- Erb's p. (= Erb's paralysis) شَلْلٌ إِرْب. شَلْلٌ الْوَجْه. (= Bell's p.)
- facial p. (= Bell's p.) شَلْلٌ مِطْرَقِيّ. شلل يتولد عند استمرار العمل الشاق بالمطرقة.
- hammer p. شَلْلٌ مُتَصَالِب. (= Ischemic paralysis) شَلْلٌ إِقْفَارِيّ.
- ischemic p. (= Ischemic paralysis) شَلْلٌ كَلْمَبَكَة.
- Klumpke's p. (= Klumpke's paralysis) شَلْلٌ لَانْدَرِي؛ إِتِهَابُ الْأَعْصَابِ (polyneuritis) الْخُمُويّ الْخَادّ.
- Landry's p. (= acute febrile polyneuritis) الشَّلْلُ الْأُمُومِي الْوِلَادِيّ. شلل بعض أقسام الأطراف السفلية للام بسبب انضغاط أعصابها عند ولادة جنين كبير الحجم.
- maternal obstetric p. شَلْلُ الطَّبَاعِيْنَ. شلل يصيب عمال المطابع بسبب تسعّمهم المزمن بالانتيمون والذي يتصف بالتهاب الأعصاب والشلل والم العانة والطفح الحطاطي.
- printer's p. شَلْلٌ الْوَجْه. شلل يتولد عند استمرار العمل الشاق بالمطرقة.
- progressive supranuclear p. الشَّلْلُ الْبَصَلِيّ (= pseudobulbar paralysis) الْكَاذِب.
- pseudobulbar p. (= pseudobulbar paralysis) الشَّلْلُ الْبَصَلِيّ الْكَاذِب.
- radial p. (= radial paralysis) الشَّلْلُ الْكُفْبَرِيّ.
- saturday night p. (= musculospiral paralysis) شَلْلُ لَيْلَةِ السَّبْت؛ الشَّلْلُ الْعَضَلِيّ الْحَزُونِيّ. شلل العصب الكعبري.
- scrivener's p. (= writer's cramp) الشَّلْلُ الْكَاتِب؛ مَعْصُ الْكَاتِب.
- shaking p. (= paralysis agitans) شَلْلٌ رَغَشِيّ.
- spastic bulbar p. (= pseudobulbar paralysis) الشَّلْلُ الْبَصَلِيّ الْكَاذِب.
- tardy median p. (= carpal tunnel syndrome) شلل العصب المتوسط؛ مُتَلَازِمَةُ نَفَقِ الرُّسْغ.
- tardy ulnar p. (= cubital tunnel syndrome) شلل العصب الزندي، مُتَلَازِمَةُ النَفَقِ الْمَرْفَقِيّ.
- Todd's p. (= Todd's paralysis) شَلْلٌ تُود.
- transverse p. (= crossed paralysis) شَلْلٌ مُتَصَالِب.
- wasting p. (= spinal muscular atrophy) شَلْلٌ عَضَلِيّ نَحَاعِيّ الْمُنْشَا.
- pamphlegia شَلْلٌ شَامِل. شلل تام شامل.
- pananxiety قَلَقٌ شَامِل. قلق عام.
- analgesic p. (= Morvan's syndrome) قَلَقٌ شَامِل مُسَكَّن؛ مُتَلَازِمَةُ مُورْفَان.
- pancrealgia أَلَمُ الْبَنْكَرِيَّاس.
- pancreatalgia أَلَمُ الْبَنْكَرِيَّاس.
- panencephalitis إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِل. إِتِهَابُ الدِّمَاغِ النَّاتِج أَكْثَرُ احْتِمَالاً عَنِ الْفَيروسِ الَّذِي يُولَدُ أَجْسَاماً احْتَوَائِيَّةً (نمط 1) دَاخِلَ النُّوَى أَوْ دَاخِلَ الْهَيُولَى وَالَّذِي يُولَدُ آفَةً مَتْنِيَّةً تَصِيبُ الْمَادَتَيْنِ السَّنَجَابِيَّةَ وَالْبَيضَاءَ الدِّمَاغِيَّتَيْنِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ.
- Pette-Doring p. إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِلِ لَيْت - دُورِينْغ. نوع من التهاب الدماغ دون الحاد يصيب المادتين السنجابية والبيضاء الدماغيتين وبصورة خاصة العقد القاعدية.
- subacute sclerosing p. إِتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِلِ الْمُصْلَبِ دُونَ الْخَادّ. نوع من التهاب بيضاء الدماغ النادر والمدمر وعادة ما يصيب الأطفال

والأحداث ويبدأ بداية مخاتلة ويولد بصورة خاصة خللاً وظيفياً دماغياً مترقياً يستمر لعدة أسابيع أو لعدة أشهر وينتهي بالموت خلال عام واحد. ويتصف مرضياً بالإضافة للأفة التي يولدها للمادة البيضاء بنزع النخاعين ووجود الأجسام الاشتعالية في الخلايا العصبية وفي الدبقات قليلة التفرع مما يوحي بأن المرض فيروسي المنشأ.

**panesthesia** الحِسُّ الشَّامِل. مجموع الإحساسات التي يحس بها الشخص.

**panhypopituitarism** قُصُورُ النِّخَامِيَّة الشَّامِل. قصور نخامي عام بسبب غياب أو تخريب الغدة النخامية والذي يولد في حالة قصورها الكامل غياب وظائف الغدد التناسلية وقصور الوظائف الدرقية والقشرية الكظرية ويولد القزامة وتراجع الصفات الجنسية الثانوية وفقدان الوزن وسرعة الإرهاق وبطء القلب وهبوط ضغط الدم والاضطراب والكآبة والأعراض العديدة الأخرى.

**panic** هَلَج. قلق شديد حاد مع اضطراب الشخصية والوظائف.

**homosexual p.** هَلَجُ اشتِهَاء الجنس المماثل؛ هَلَجُ الجُنُوسِيَّة. حالة قلق شديد حادة تظهر في ظروف خاصة وتعرض الخوف اللاشعوري من أن يصبح الشخص جنوسياً أو أن يرضخ لمحضرات اللواط.

**panneurosis** عُصَابٌ شَامِل. الإصابة في وقت واحد بكل الأعراض العصبية التي تشمل القلق والأعراض التحولية والرهاب والوسواس.

**panniculalgia (= adiposalgia)** أَلَمُ الشَّحْمِ الجِلْدِيِّ. ألم السبلة الشحمية تحت الجلدية.

**panophobia (= panphobia)** رُهابٌ شَامِل.

**panphobia** رُهابٌ شَامِل. الخوف من كل شيء وهو خوف مرضي من شر مجهول.

**panplegia (= pamplegia)** شَلَلٌ شَامِل.

**pantalgia** أَلَمٌ شَامِل. ألم يشمل الجسم كله.

**pantanencephaly** انْعِدَامُ الدِّمَاغ. انعدام كل الدماغ في الجنين.

**pantophobia (= panphobia)** رُهابٌ شَامِل.

**papilla** الخَلْمَةُ؛ خُلَيْمَةٌ. بروز صغير حلمي الشكل أو بنية حلمية الشكل.

**- acoustic p. (= spiral organ)** العَضْوُ الحَلَزُونِيّ. العضو المستقر على الغشاء القاعدي للقوقعة والذي يحوي مستقبلات السمع.

**- arcuate papillae of tongue (= papillae filiformis)** الخُلَيْمَاتُ الخَيْطِيَّة.

**- caliciform papillae (= papillae vallatae)** الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة.

**- capitate papillae** الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة.

**- circumvallate papillae** الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة.

**- clavate papillae (= papillae fungiformis)** الخُلَيْمَاتُ الكَمْنِيَّة.

**- conical papillae** الخُلَيْمَاتُ المَعْرُوطِيَّة. حليمات كبيرة على سطح اللسان تعتبر نوعاً محوراً من الحليمات الخيطية.

**- papillae filiformis (= filiform papillae)** الخُلَيْمَاتُ الخَيْطِيَّة. حليمات خيطية الشكل تغطي معظم سطح اللسان.

**- papillae foliatae (= foliate papillae)** الخُلَيْمَاتُ الوَرَقِيَّة. طبقات مخاطية متوازية على حواف اللسان عند منطقة اتصال جسمه مع جذره.

**- fungiform papillae (papillae fungiformis)** الخُلَيْمَاتُ الكَمْنِيَّة. نتوءات عقدية تبرز من سطح اللسان بوحدات مفردة تنتشر بين الحليمات الخيطية.

**- gustatory papillae (= lingual papillae)** الخُلَيْمَاتُ الذوقِيَّة؛ الخُلَيْمَاتُ اللِّسَانِيَّة.

**- lingual papillae** الخُلَيْمَاتُ اللِّسَانِيَّة. الحليمات الخيطية والورقية والكاسية والمخروطية الموجودة على سطح اللسان.

**- p. nervi optici (= discus nervi optici)** خُلَيْمَةُ العَصَبِ البَصَرِيِّ.

**- papillae vallatae (= vallate papillae)** الخُلَيْمَاتُ الكاسِيَّة. أكبر حليمات اللسان وهي 8-12 حليلة مرتبة بشكل V أمام الثلم الانتهائي للسان.

**papilledema** وَذَمَّةُ الحُلَيْمَةِ البَصَرِيَّةِ.

قرص مختنق، وهي وذمة القرص البصري والتي غالباً ما تنتج عن ارتفاع الضغط داخل القحف أو ارتفاع ضغط الدم الوبيل أو خثار الوريد الشبكي المركزي.

**para-analgesia** تسكين أسفل الجسم؛ فَقْدَانُ حَسِّ أَلَمِ أَسْفَلَ الجِسْمِ. فقدان حس الألم في القسم السفلي من الجسم ويشمل الأطراف السفلية.

**para-anesthesia** خَدَرُ أَسْفَلَ الجِسْمِ. خدر القسم السفلي من الجسم والساقين.

**parablepsia** خَطَلُ البَصَرِ. اختلال البصر وخطأه أو شذوذه.

**parabulia** ضَلَالُ الإرَادَةِ. شذوذ يتصف بقيام المصاب به بعمل عكس الذي يبتغيه ولا علاقة له بما يريده.

**paracenesthesia** خَطَلُ حَسِّ الرَّاحَةِ. شذوذ يتصف بفقدان الحس العام بالراحة والاستقرار النفسي.

**paracerebellar** مُخَيِّخِي وَخَشِي. منسوب إلى القسم الوحشي من المخيخ.

**paracinesia (= parakinesia)** خَطَلُ الحَرَكَةِ.

**paracinesis (= parakinesia)** خَطَلُ الحَرَكَةِ.

**paracoxalgia** نَظِيرُ الوَرَاكِ. ألم يشابه الألم المرافق لالتهاب الورك.

**paracusia** خَطَلُ السَّمْعِ. أي اختلال في حس السمع.

شِدَّةُ السَّمْعِ. شدة حدة السمع المتواصلة. **p. acris**

تَضَاعَفُ السَّمْعِ؛ **p. duplicata (= diplacusis)** إِرْدِيَاوُجُ السَّمْعِ. سمع صوتين عند تنبيه الشخص بمنبه صوتي واحد.

خَطَلُ تَوْضِيعِ السَّمْعِ. عدم المقدرة على معرفة موضع مصدر الصوت. **p. loci**

نَظِيرُ الصَّرَعِ؛ صَرْعٌ بَوْرِيٌّ صَغِيرٌ. **paraepilepsy**

مَجَاوِرُ المَنْجَلِ. جنب منجل المخيخ أو المنخ.

**paraflocculus (= accessory flocculus)** النُّذْفَةُ الإِضَافِيَّةُ. فصيص

في نصف كرة المخيخ يقع بالجهة الخلفية من ندفته ويكون أحياناً جزءاً بارزاً منه.

**parafunction** اِخْتِلَالُ الوُظَيْفَةِ. اضطراب الوظيفة أو شذوذها.

**paraganglioma** ورم المُسْتَقْتِمَاتِ.

**- medullary p. (= pheochromocytoma)** وَرَمُ المُسْتَقْتِمَاتِ اللَّيْنَةِ.

**- nonchromaffin p. (= chemodectoma)** وَرَمُ المُسْتَقْتِمَاتِ غَيْرِ المُلَوَّنَةِ. ورم المستقبلات الكيميائية عديمة اللون كتلك التي توجد في الأجسام السباتي أو الأبهري أو الطبلي.

**paraganglion (= pheochrome body)** المُسْتَقْتِمُ. مجموعة من الخلايا الليفية للكروم التي تستمد من الأديم الظاهر العصبي والتي توجد خارج لب الغدة الكظرية وغالباً بالقرب من العقد الودية ومتعلقة بالأبهر وفروعه وتفرز معظمها الأدرينالين أو النورادرينالين.

1. خَطَلُ الذُّوقِ 2. ذُوقٌ كَرِيه. **parageusia** 1. شذوذ حس الذوق 2. حس ذوقي كريه في الفم.

خَطَلُ الكَلَامِ؛ خَطَلٌ نَحْوِيٌّ. **paragrammatism** اضطراب الكلام حيث يخلط المصاب في ترتيب الكلمات وفي تنظيم قواعدها النحوية.

خَطَلُ الكِتَابَةِ. اضطراب كتابة الكلمات بصورة صحيحة أو في ترتيبها ترتيباً أصولياً منتظماً.

خَطَلُ النُّوْمِ؛ تَنَوِيمٌ شَاذٌ. نوم **parahypnosis** أو تنويم شاذ كذلك الذي يولد بالتبنيج.

خَطَلُ الحَرَكَةِ. اضطراب الوظائف الحركية الذي يولد حركات غريبة شاذة.

خَطَلُ التَّلَفُّطِ. تلفظ شاذ يولد ألفاظاً شاذة مخالفة لما يقصده المتكلم كإبدال مواقع حروف الكلمات وتغيير مواضعها.

خَطَلُ التَّلَفُّظِ الحَرْفِيِّ. عدم المقدرة على تلفظ بعض الحروف. **- p. literalis**

بارالدهايد. دواء مركن **paraldehyde**

ومنوم يستعمل لمعالجة الأرق والإثارة والهباج والهذيان والاختلاج.

**paralepsy (= psycholepsy)** صرغ نفسي؛ نوبة نفسية.

**paralexia** خطل القراءة. اضطراب المقدرة على القراءة ويتصف بتحويل الكلمات من مواقعها بحيث لا تعبر عن كلام مفهوم.

**paralgesia (= painful paraesthesia)** مذل مؤلم. خطل أو شذوذ حسي مؤلم.

**paralgia (= paralgesia)** مذل مؤلم.

**paralogia** خطل المنطق. في الأمراض النفسية هو كبت فكرة معينة تتولد عن فكرة أولية منطقية وإبدالها بفكرة أخرى مغايرة ولكنها قريبة منها.

**- thematic p.** خطل المنطق الموضوعي. خطل منطقي حول موضوع واحد محدد يشغل فكر الشخص.

**paralogism** هذر؛ كلام خاطيء. كلام بدون معنى أو غير منطقي يتفوه به المصاب بداء نفسي.

**paralysis** شلل. (ج: شُلُول). فقدان أو اضطراب الوظائف الحركية لأحد الأعضاء أو الأقسام في الجسم بسبب آفة عصبية أو عضلية وبالمقارنة بذلك يمكن أن يكون الشلل حسياً بسبب آفة أحد الأعصاب أو الأعضاء الحسية.

**- abducens p.** شلل العُبقَد. شلل العضلة المستقيمة للعين بسبب آفة العصب البعيد والذي يولد الحول والشفع (ازدواج الرؤية).

**- p. of accommodation** شلل التكيف. شلل العضلات الهدبية مما يمنع تكيف البصر.

**- acute ascending spinal p. (= acute febrile polyneuritis)** الشلل النُخاعي. الصَّاعِد الحاد. التهاب الأعصاب الحُموي الحاد.

**- acute bulbar p.** الشلل البَصَلِي الحاد. شلل البصلة الذي يتولد عن آفات الدماغ النخاعية وغالباً ما تكون آفات نزفية أو خثارية.

**- acute infections p. (= epidemic poliomyelitis)** الشلل العدواني الحاد. التهاب سنجابية النخاع الوبائي.

**- p. agitans (= Parkinson's disease)**

الشلل الرُعشي. نوع من الباركنسونية مجهولة السببيات تحدث في أواخر العمر بالرغم من حدوث حالات قليلة في مقتبل الحياة. وهو مرض مترقي بطيء يتصف بسحنة قناعية الشكل ورعشة، خاصة في العضلات المستقرة، وبطء الحركات الإرادية ومشية مهرولة ووضع خاص مع ضعف العضلات، وقد يرافق ذلك فرط التعرق والشعور بالحرارة المفرطة.

**- p. agitans, juvenile** الشلل الرُعشي اليَفْعِي. حالة تظهر في مقتبل العمر وهي عادة ما تكون عائلية وقد تحدث بصورة منفردة وتتصف بفرط التوتر العضلي مع سحنة وجهية تشبه سحنة الشلل الرُعشي. وهي تنتج عن التنكس المترقي للكرة الشاحبة مع احتمال إصابة السبل خارج الهرمية والمادة السوداء.

**- alcoholic p.** شلل كُحُولِي. شلل يتولد عن إدمان الكحول.

**- alternate p. (= alternate hemiplegia)** فَالِج مُتَنَاقِب؛ شلل شَقِي مُتَنَاقِب.

**- anesthesia p.** شلل التَبْنِيج. شلل يتلو التبنيج.

**- anterior spinal p. (= anterior poliomyelitis)** شلل نُخَاعِي أَمَامِي. التهاب سنجابية النخاع الأمامية.

**- arsenical p.** شلل زُرْنِيخِي. شلل يتولد عن التسمم بالزرنيخ.

**- ascending p.** شلل صَّاعِد. شلل نخاعي يتقدم تدريجياً نحو الدماغ.

**- association p. (= bulbar p.)** شلل تَرَابِطِي؛ شلل بَصَلِي.

**- asthenic bulbar p. (= myasthenia gravis pseudoparalytica)** شلل بَصَلِي وَهَنِي. وهن عضلي شللي كاذب.

**- asthenobulbospinal p. (= myasthenia gravis)** وَهَن عَضَلِي وَبِيل.

**- Bell's p. (= Bell's palsy)** شلل بيل.

**- birth p.** شلل قَوْلِيدِي. شلل ينتج عن إصابة تحدث أثناء الولادة.

**- brachial p.** شلل عَضْدِي. شلل أحد الأذرع بسبب آفة الضفيرة العضدية.



**paralysis**

شلل القدم المولد من متلازمة النفق الرسغي.

- **brachiofacial p.** شَلْلٌ عَضْدِيّ وَجْهِيّ. شلل يصيب الذراع والوجه.
  - **Brown-Sequard's p. (= Brown sequard 's syndromes)** شَلْلٌ بِرَاوْن سِيْكَوَار. شلل يصلي. شلل يتولد عن اضطرابات في المراكز الحركية للبصلة (النخاع المستطيل) وهو مرض مزمن ومميت ويصيب الأشخاص بعد سن الخمسين عاماً ولكنه قد يحصل في التصلب الوحشي الضموري أو في تكهف البصلة أو التصلب المتعدد ويتصف بالشلل المترقي لعضلات الشفتين واللسان والفم والبلعوم والحنجرة وينتج عن تنكس النوى العصبية في قاعدة البطين الرابع.
  - **bulbospinal p. (= myasthenia gravis)** وَهْنٌ عَضَلِيّ وَخِيم. شللٌ مُرَكَّزِيّ. شلل يتولد عن إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي.
  - **central p.** شَلْلٌ مَحْفَظِيّ مُرَكَّزِيّ. شلل يتولد عن آفة في المحفظة الباطنة للدماغ.
  - **cerebral p.** شَلْلٌ دِمَاعِيّ. شلل يتولد عن آفة داخل القحف.
  - **circumflex p.** شَلْلٌ مُنْعَطِف. شلل العصب المنعطف.
  - **complete p.** شَلْلٌ كَامِل. شلل حركي وحسي ووظيفي كامل.
  - **compression p.** شَلْلٌ انْضِغَاطِيّ. شلل يتولد عن انضغاط أحد الأعصاب أثناء النوم مثلاً أو بالعكازات.
  - **conjugate p.** شَلْلٌ مُقْتَرِن. شلل يؤدي إلى عدم إمكان الشخص من إجراء حركات عينية متوازية ومقتربة.
  - **cortical p.** شَلْلٌ قَشْرِيّ. شلل ينتج عن آفة تصيب قشرة المخ.
  - **crossed p. (= cruciate p.)** شَلْلٌ مُتَصَالِب. شلل يصيب أحد نصفي الوجه ونصف الجسم المعاكس له.
  - **crural p.** شَلْلٌ فَخْذِيّ. شلل يصيب الفخذ أو الفخذين بصورة خاصة.
  - **crutch p.** شَلْلٌ عُكَّازِيّ. شلل في أحد الذراعين أو في كليهما ينتج عن انضغاط الأعصاب في الإبط بالعكازة.
  - **Cruvelhier's p. (= progressive muscular atrophy)** ضُمُورٌ عَضَلِيّ مُتَرَقُّ. شَلْلٌ الإِسْتِثْقَاء. شلل يتولد عن انضغاط أحد الأعصاب بسبب النوم بوضع واحد لفترة طويلة.
  - **diaphragmatic p.** شَلْلٌ جِجَاجِيّ. شلل أحد جانبي الحجاب.
  - **diphtheric p. (= diphtheritic p.)** شَلْلٌ خُنَاقِيّ. شللٌ خُنَاقِيّ. شلل جزئي يتلو أحياناً الإصابة بالخناق وغالباً ما يصيب عضلات البلعوم والحقاف (شراع البلعوم).
  - **diver's p.** شَلْلٌ الْعَوَاص. شلل يصيب الغطاسين في المياه العميقة بسبب هبوط الضغط السريع عند خروجهم من الماء.
  - **Duchenne's p. (= 1. progressive bulbar p. 2. Erb's-Duchenne p.)** 1. شَلْلٌ بَصَلِيّ 2. شَلْلٌ إِرْب دُوشِين. شللٌ إِرْب. 1. شلل إرب دوشين 2. شلل سفلي تشنجي 3. حثل عضلي ضخامي كاذب.
  - **Erb's p.** شَلْلٌ إِرْب. 1. شلل إرب دوشين 2. شلل سفلي تشنجي 3. حثل عضلي ضخامي كاذب.
  - **Erb- Duchenne p.** شَلْلٌ إِرْب - دُوشِين. شلل عضدي بالذراع العلوي ينتج عن شلل الجذور العلوية للضفيرة العضدية ينتج عن تخريب الجذور الرقبية الخامسة والسادسة ويتصف بشلل العضلات الصغيرة لليد.
  - **facial p.** شَلْلٌ العصبِ الْوَجْهِيّ. شلل أو ضعف العصب الوجهي كما يحدث في شلل بيل.
  - **familial periodic p. (= periodic p.)** شَلْلٌ دَوْرِيّ عَائِلِيّ. شلل رخو. شلل مع فقدان التوتر العضلي في القسم المشلول وفقدان المنعكسات الوترية فيه.
  - **flaccid p.** شَلْلٌ رَخْو. شلل مع فقدان التوتر العضلي في القسم المشلول وفقدان المنعكسات الوترية فيه.
  - **functional p.** شَلْلٌ وَظِيفِيّ. شلل وقتي لا يتولد عن آفة عصبية، ومن الممكن أن يكون نفسي المنشأ أحياناً.



paralysis, facial

شلل الجانب الأيمن نتيجة شلل العصب الثلاثي التوائم.

- **p. of gaze** شَلْلُ الحَمَلَّة. شلل يتولد عن آفات مرضية في المراكز فوق النوية للعصب محرك العين أو في سبله المركزية مما يولد شلل الحملقة الأفقية أو العمودية.
- **general p. (= general paresis)** الشَّلْلُ العام.
- **general p. of the insane (= general paresis of the insane)** الشَّلْلُ العام.
- **glossolabial p. (= bulbar p.)** الشَّلْلُ اللسانِي الشَّفَوِي
- **glossopharyngolabial (= labial p.)** الشَّلْلُ اللسانِي البَلْعَوِي الشَّفَوِي.
- **hereditary cerebrosplinal p.** الشَّلْلُ الدِّمَاغِي التَّخَايِي الوَراثِي. حالة وراثية تظهر عادة في بداية سن الشباب وتتطور تدريجياً ويمكن أن تتصف بشلل في الأطراف العليا أو السفلى أو في كليهما أو في جهة واحدة أو في كل الأطراف الأربعة.
- **histrionic p.** الشَّلْلُ التَّعْبِيرِي. شلل بعض عضلات الوجه مما يولد سحنة وجبهة عاطفية خاصة.
- **hypoglossal p.** شَلْلُ تَحْتَ اللِّسَانِي. شلل العصب تحت اللسان بسبب آفة تصيب نواته أو سبله العصبية المركزية.
- **hysterical p.** شَلْلُ هِسْتِيرِي. فقدان القدرة الحركية الظاهرة من دون وجود أي سبب عضوي عصبي.
- **incomplete p. (= paresis)** شَلْلٌ نَاقِصٌ؛ خَزَلٌ.
- **Infantile p. (= poliomyelitis)** شَلْلُ الأَطْفَال. التهاب سنجابية النخاع.
- **Infantile cerebral ataxic p.** شَلْلٌ طِفْلِي مُجَيِّ رَنَحِي. حالة تنتج عن سوء تطور المناطق الجبهية للمخ توجد عند الولادة وتؤثر على كل الأطراف ولكنها ليست مترقية.



**- infantile cerebrotocerebellar diplegic p.**

شَلْلٌ طِفْلِيٌّ مُخَيٍّ مُخَيَّيٍّ مُزْدَوِجٍ. حالة تظهر في الولدان وتؤثر على كل الأطراف وتنتج عن فشل تطور أو تخريب الأجزاء المتبادلة في المخ والمخيخ.

**- Infantile spastic p. (= cerebral p.)**

شَلْلٌ طِفْلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ.

**- infantile spinal p. (= acute anterior**

poliomyelitis) شَلْلٌ طِفْلِيٌّ نُخَاعِيٌّ. التهاب سنجابية النخاع الأمامي الحاد.

**- infectious bulbar p. (= pseudorabies)**

شَلْلٌ بَصْلِيٌّ عَدَوَاتِيٌّ؛ داء الكلب الكاذب.

**- ischemic p.**

شَلْلٌ إِقْفَارِيٌّ. شلل موضعي بسبب انسداد الدورة الدموية للموضع كما يحصل في الخثار أو الانصمام.

**- juvenile p.**

شَلْلٌ يَفْعِيٌّ. شلل عام يصيب الأحداث.

**- Klumpke's p. (= Klumpke-Dejerine p.)**

شَلْلٌ كُلُومِبَكَةٌ.

**- Klumpke- Dejerine p.**

شَلْلٌ كُلُومِبَكَةٌ -

ديجيرين. نمط الشلل العضدي السفلي للذراع الذي يتصف بشلل عضلات الذراع واليد وينتج عن آفة العصبين الرقبين الثامن والصدرى الأول. وغالباً ما يصيب الولدان الذين يولدون بالتوليد المقعدي.

**- Kussmaul-Landry p. (= acute febrile**

polyneuritis) شَلْلٌ كُوسْمَاوُل - لَانْدْرِي. التهاب الأعصاب الحُمُوي الحاد.

**- laryngeal p.**

شَلْلٌ حَنَجَرِيٌّ. شلل إحدى عضلات الحنجرة.

**- lead p.**

شَلْلٌ الرُّصَاصِ. شلل يتولد عن التسمم بالرصاص وينتج عن التهاب الأعصاب المحيطية ويتصف بتدلي الرسغ.

**- Lissauer's p.**

شَلْلٌ لِيْسَاوَر. نمط سكتي الشكل للخرف الشللي.

**- local p.**

شَلْلٌ مُوَضِعِيٌّ. شلل عضلة واحدة أو مجموعة عضلات موضعية.

**- masticatory p.**

شَلْلٌ مَضْغِيٌّ. شلل عضلات المضغ.

**- medullary tegmental p's.**

شُلُولٌ بَصْلِيَّةٌ

سَقِيفِيَّةٌ. شلل يتولد عن آفات سقيفة النخاع المستطيل وتشمل الفالج المتناوب وبعض المتلازمات العصبية كمتلازمة سيستان ومتلازمة تابيا.

**- mimetic p.**

شَلْلٌ مُخَاكِ. شلل عضلات الوجه.

**- mixed p.**

شَلْلٌ مُخْتَلَطٌ. شلل حركي وحسي مختلط.

**- motor p.**

شَلْلٌ حَرَكَيٌّ. شلل العضلات الإرادية.

**- musculospiral p. (= radial p. = saturday night palsy)**

الشلل العضلي الحزوني؛ شَلْلٌ الكُفْبِرِيَّ. شلل العضلات الباسطة للرسغ وللأصابع يتولد غالباً عن انضغاط العصب العضلي اللولبي (العصب الكعبري). ويختلف نوع الشلل حسب قسم العصب المصاب وقد يترافق مع ضعف انبساط المرفق أيضاً.

**- myopathic p.**

شَلْلٌ إِعْتِلَالِيٌّ عَضَلِيٌّ. شلل يتولد عن اعتلال العضلة نفسها.

**- narcosis p.**

شَلْلٌ التَّخْدِيرِ. الشلل الذي يتولد عند التبنج سواء بالضغط أو بالتبريد أو بالكوراري.

**- p. notarium (= writer's cramp)**

مَقْمُصُ الكَاتِبِ.

**- nuclear p.**

شَلْلٌ نَوَوِيٌّ. شلل يتولد عن إصابة إحدى النوى العصبية.

**- obstetric p. (= birth p.)**

شَلْلٌ تَوَلِيدِيٌّ.

**- oculomotor p.**

شَلْلٌ مُحَرِّكُ الْعَيْنِ. شلل العصب محرك العين.

**- organic p.**

شلل عُضْوِيٌّ. شلل ينتج عن إصابة نسيج أو بنية عصبية.

**- parotitic p.**

شَلْلٌ تَكَافِيٌّ. شلل يترافق مع داء التكاف.

**- periodic famillal p.**

شَلْلٌ دَوْرِيٌّ عَائِلِيٌّ. خلة وراثية جسمية سائدة تتصف بنوبات معاودة من شلل رخو مترقي سريع.

**- peripheral p.**

شَلْلٌ مُحِيطِيٌّ. شلل يتولد عن إصابة العصب في موقع بين نواته ونهايته في العضلة.


**- peroneal p. (= crossed leg palsy)**

شَلْلٌ شَظْوِيٌّ؛ شَلْلٌ تَصَالِبُ السَّاقِ

**- phonetic p.**

شَلْلٌ التَّصَوُّيَّةِ. شلل عضلات النطق.

- postdiphtheric p. شَلَلٌ تَالِي لِلْخَنَاقِ. شلل يتلو الإصابة بالخناق.
- posthemiplegic p. شَلَلٌ تَالِي لِلْفَالِجِ. ضعف عضلي يتلو سكتة الفالج.
- posticus p. شَلَلٌ خَلْفِيّ. شلل العضلة الحلقية الدرقية الخلفية.
- pressure p. شَلَلٌ انْضَغَاطِيّ. شلل يتولد عن انضغاط أحد الأعصاب وهو عادة ما يكون وقتياً.
- pseudobulbar p. شَلَلٌ بَصْلِيّ كَاذِب. ضعف تشنجي في العضلات التي تغذيها الأعصاب القحفية وهي عضلات الوجه والبلعوم واللسان بسبب آفة السبيل القشري النخاعي بالجانبين وعادة ما يترافق ذلك مع الضحك أو العويل الذي لا يمكن التحكم بهما.
- pseudohypertrophic muscular p. شَلَلٌ عَضَلِيّ ضَخَامِيّ كَاذِب. انظر dystrophy.
- radial p. (= musculospinal p.) شَلَلٌ الْكَعْبُرِيّ.
- Ramsay- Hunt p. (= juvenile paralysis agitans) شَلَلٌ رَمَزِيّ - هَنْت. شلل رعشي حداثي.
- reflex p. شَلَلٌ مُنْعَكِسِيّ. شلل ينتج عن تهيج محيطي ولكنه يحدث أحياناً بسبب بعض آفات النخاع الشوكي نفسه.
- Remak's p. شَلَلٌ رِيْمَاك. شلل العضلات الباسطة للرسغ والأصابع.
- rucksack p. شَلَلٌ حَقِيبَةِ الظَّهْرِ. اضطراب حسي حركي في وظائف الأطراف العلوية ينتج عن أذى يصيب الضفيرة العضدية نتيجة ارتداء حقيبة الظهر.
- saturday night p. (= musculospiral p.) شَلَلٌ لَيْلَةِ السَّبْت. شَلَلٌ الْكَعْبُرِيّ.
- sensory p. شَلَلٌ حِسِّيّ. فقدان الحس الذي يتولد عن إصابة مرضية للعصب الحسي.
- serum p. شَلَلٌ مُضَلِّيّ. شلل عصبي محيطي يتولد عن زرق مصل للجسم.
- sleep p. شَلَلٌ تَالِي لِلنَّوْمِ؛ شَلَلٌ نَوْمِيّ. شلل يحدث عند أول الاستيقاظ أو عند بدء النوم وهو امتداد لحالة النوم إلى اليقظة.
- spastic p. شَلَلٌ تَشَنُّجِيّ. شلل يتصف بتشنج عضلات القسم المشلول من الجسم مع زيادة المنعكسات الوترية بسبب آفة العصبون الحركي العلوي.
- spastic spinal p. شَلَلٌ تَشَنُّجِيّ نَخَاعِيّ. شلل تشنجي مترق ومتقطع من دون أي فقدان حسي، وكان يعتقد بأنه يتسبب عن التهاب النخاع والسحايا الزهري.
- spinomuscular p. شَلَلٌ نَخَاعِيّ عَضَلِيّ. شلل يتولد عن آفة المادة السنجابية للنخاع الشوكي أو للأعصاب التي تنبع منها.



paralysis, spastic

تشنج اليد في الشلل الدماغي يظهر كب الساعد وثني الرسغ والإبهام مع ثني المفاصل السنعية السلامية.

- supranuclear p. (= pseudobulbar p.)

شَلَلٌ بَصَلِّيٌّ كَاذِبٌ.

- Todd's p.

شَلَلٌ تَوْد. فالج (شلل شقي)

أو شلل أحادي يتلو نوبة الصرع.

- trlgeminal p. شَلَلُ الثَّلَاثِي التَّوَاتِم. شلل العصب

القحفي الخامس (ثلاثي التوائم) بسبب آفة فيه ويتصف بفقدان الحس في الوجه مع ضعف عضلات المضغ.

- ulnar nerve p. شَلَلُ الْعَصَبِ الزُّنْدِي. شلل

يؤدي إلى ضعف حركة انثناء الإصبعين الخنصر والبنصر مع ضمور كل العضلات الصغيرة في اليد ما عدا تلك الموجودة في النصف الوحشي في اليد مع فقدان الحس في الناحية الإنسية لأسفل الساعد وراحة اليد ويدوم لبضعة دقائق أو ساعات وقد يدوم أحياناً إلى عدة أيام بعد النوبة.

- p. vacillans (= chorea) رَقَصٌ.

- vasomotor p. شَلَلُ الْمُحَرِّكِ الْوَعَائِي. توقف

سيطرة المحرك الوعائي.

- waking p. (= sleep p.) شَلَلٌ اسْتَيْقَاطِيٌّ. حالة

ارتخاء تنويمي عند الاستيقاظ خاصة في حالات السبخ (النوم الانتبائي).

- wasting p. شَلَلٌ ضَمُورِيٌّ. ضمور عضلي

نخاعي المنشأ.

- writer's p. (= writer's cramp) مَعْصُ الْكَاتِبِ

دَاءُ الْكَلْبِ الشَّلَلِيّ

1. مَشْلُول (أشل؛ شلاء) 2. شَلَلِيٌّ. paralytic

1. شخص مصاب بالشلل 2. منسوب للشلل.

paralytogenic مُؤَلِّدُ الشَّلَل؛ مُشَلٌّ. ما

يولد الشلل.

paralyze شَلٌّ. يولد حالة الشلل.

paralyzer مُشَلٌّ؛ مُلَبِّطٌ. مادة تمنع أو

تبطئ التفاعل الكيميائي.

paramethadione بَارَامِيثَادِيُون. دواء مضاد

للاختلاج يستعمل في علاج نوبات الصرع الصغير.

paramimia خَطَلُ الْإِيْمَاءِ؛ خَطَلُ التَّأْشِيرِ.

حالة سوء استعمال الإشارات للتعبير عن الأفكار أو

استعمال إيماءات غير مناسبة أثناء الكلام.

paramnesia شُرُودُ الذَّاكِرَةِ. 1. حالة

اضطراب الذاكرة يختلط فيها الخيال مع الحقائق

2. حالة يتذكر فيها الشخص الكلمات ولكنه

يستعملها من دون فهم معانيها.

paramusia فَقْدَانُ الْجِسْمِ الْمُوسِيقِيّ.

شدوذ أو فقدان الحس والتعبير الموسيقيين.

paramyoclonus رَمَعٌ عَضَلِيٌّ مُتَعَدِّدٌ.

حالة تتصف بتقلصات عضلية رمعية في عدد من

العضلات.

- p. multiplex رَمَعٌ عَضَلِيٌّ شَامِلٌ. حالة تحدث

في الذكور أكثر مما تحدث في الإناث وتتصف بتقلصات عضلية فجائية تصيب أولاً العضلات القصوية للذراع وحزام الكتف ومن ثم عضلات الجذع والقسم السفلي من الأطراف ومن ثم عضلات الوجه والعضلات القصوية

داء التشنُّج العضلي التوتري. paramyotonia

داء يتصف بتشنج توتري بسبب اضطراب التوتر

العضلي وهو مرض وراثي وخلقي.

- ataxic p. داء التشنُّج العضلي التوتري الرنحي.

تشنج عضلي مع رنح بسيط عند محاولة الحركة.

- p. congenita داء التشنُّج العضلي التوتري

الخلقي. اضطراب وراثي جسدي سائد يشبه التوتر العضلي الخلقي ما عدا أنه يحفز بالتعرض للبرد ويزداد عند الحركة الفعالة ويصيب عضلات الاقسام العلوية من الأطراف والاجفان واللسان.

- symptomatic p. داء التشنُّج العضلي التوتري

الأعراض. تيبس موقت عند بدء المشي يشاهد في الشلل الرعشي.

paramyotonus تَشْنُجٌ عَضَلِيٌّ تَوْتَرِيٌّ.

حالة تتصف بتشنج العضلات التوتري.

paranalgesia (= para- analgesia)

تَسْكِينُ الْأَطْرَافِ السُّفْلِيَّةِ.

paranesthesia (= para- anesthesia)

خَذَرٌ اسْفَلِ الْجِسْمِ.

paraneural جَنْبُ الْعَصَبِ. بجانب العصب أو

محاذٍ له.

paranoia زَوَرٌ؛ دُهَانٌ كِبْرِيَانِيٌّ. اضطراب

ذهاني يتصف بتوهم ثابت بالاضطهاد أو بالغيرة

والحسد وبسلوك الشخصية الزورانية كالتشكك

وفقدان الثقة والرغبة بالخصام والقتال. وهناك

خمسة أنواع منه: الاضطهادي والحسدي والهوسي العشقي والجسدي والكبريائي.

**paranoid** اُزُور؛ زُوراء. مصاب بالزور أو منسوب إليه.

**paranomia** زُوراني. شبه بالزور.

**paranomia** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ. حبسة تتصف بعدم المقدرة على تسمية الاجسام الملموسة أو المنظورة.

**myotactic p.** حُبْسَةُ تَسْمِيَةِ الْمَفْهُوسَات. عدم المقدرة على تسمية الاجسام الملموسة.

**visual p.** حُبْسَةُ تَسْمِيَةِ الْمَنْظُورَات. عدم المقدرة على تسمية الاجسام المنظورة.

**paraparesis** خَزَلٌ سُفْلِي. خزل الاطراف السفلية.

**paraphasia (= nominal aphasia)** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ؛ خَطَلُ التَّسْمِيَةِ. حبسة جزئية يستعمل فيها المريض كلمات مغلوبة أو يستعمل كلمات في تركيبات لا تؤدي إلى معنى صحيح.

**central p.** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ المركزية. حبسة جزئية تنتج عن آفة دماغية.

**literal p.** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ اللاحرفية. حبسة كلامية تستعمل فيها بعض الاصوات في مواضع بعض حروف الكلمات.

**verbal p.** حُبْسَةُ التَّسْمِيَةِ اللفظية. إبدال بعض الكلمات أو المقاطع الكلامية بكلمات ومقاطع بديلة قد لا تؤدي المعنى المطلوب لعدم ارتباطها بالكلام المقصود.

**paraphemia** شذوذ الكلمات؛ حُبْسَةُ كَلَامِيَّة. حبسة يستعمل فيها المريض كلمات مغلوبة غير المقصودة.

**paraphilia** شذوذ جنسي. اضطراب جنسي نفسي يتصف بالرغبة الجنسية بأجسام غير بشرية وممارسات جنسية شاذة وهناك انواع عديدة منه.

**paraphobia** رُهابٌ بِسَيْط. رهاب خفيف.

**paraphonia** تَغْيِيرُ الصَّوْت. تغير الصوت المرخي أو انعدام الصوت الجزئي.

**p. puberum** تَغْيِيرُ الصَّوْتِ البُلُوغِي. تغير صوت الأحداث عند سن البلوغ.

**paraphora** خَلَلٌ عَقْلِي. اضطراب عقلي بسيط.

**paraphrasia (= paraphasia)** حُبْسَةُ

التسمية؛ شذوذ العبارة. حبسة الجمل الجزئية وهي وعيب كلامي يتصف بعدم انتظام ترتيب الكلمات المنطوقة.

**paraphrenia** اِزْوَار؛ دُهَانٌ تَخْلِيلِي. زور أو فصام زوراني يتصف بتوهم خيالي سخي وكامل الترابط ويدوم لسنتين طويلة من دون أي تردد شديد في شخصية المصاب وهي حالة وسطية بين الزور والفصام الزوراني.

**paraphrenitis** اِلْتِهَابُ مجاورات الجَبَاب. التهاب الحجاب الحاجز وحواله.

**paraphysis** النَّاتِيءُ الجَانِبِي. ناتئ رقيق الجدران يبرز من الصفيحة السطحية للدماغ الانتهازي ويظهر لفترة مؤقتة في جنين الإنسان.

**paraplectic (= paraplegic)** مَشْلُولُ الْأَسْفَل؛ شَلَلِي سُفْلِي.

**paraplegia** شَلَلٌ سُفْلِي؛ شَلَلٌ بَصْفِي سُفْلِي. شلل الاطراف السفلية والقسم السفلي من الجسم.

**alcoholic p.** شَلَلٌ سُفْلِي كُحُولِي. شلل سفلي يتولد عن إدمان الكحول المزمن وقد يتسبب عن التهاب الاعصاب المحيطية.

**ataxic p. (= acute combined degeneration of spinal cord)** شَلَلٌ سُفْلِي رَنَحِي. تنكس مشترك حاد للنخاع الشوكي.

**cerebral p.** شَلَلٌ سُفْلِي دِمَاعِي. شلل سفلي يتولد عن آفة تصيب جهتي الدماغ.

**Erb's spastic p.** شَلَلٌ اِزْبِ السُّفْلِي التَّشْنُجِي. نوع نادر من الزهري السحائي الوعائي الذي يتصف بتشنج مترقي مع ضعف الساقين والشلل السفلي والضمور العضلي والمذل وزيادة المنعكسات الركبية والكاحلية والسلس.

**Erb's syphilitic spastic p. (= Erb's spastic p.)** شَلَلٌ اِزْبِ السُّفْلِي الزَّهْرِي التَّشْنُجِي.

**flaccid p.** شَلَلٌ سُفْلِي رَخْو. شلل سفلي مع فقدان توتر عضلات الاقسام المشلولة من الجسم وفقدان المنعكسات الوترية.

**peripherat p.** شَلَلٌ سُفْلِي مُحِيطِي. شلل سفلي بسبب آفة العصبون الحركي السفلي.

**Pott's p.** شَلَلٌ بَوْتِ السُّفْلِي. شلل سفلي يتولد عن تسوس الفقرات أو عن سل السيساء.

**reflex p.** شَلَلٌ سُفْلِي اِنْعَكَاسِي. شلل الاطراف

السفلية الذي يتولد عن التهيج المحيطي للمراكز العصبية.

- **senile p.** شَلَلٌ سُفْلِيٌّ شَيْخُوخِيٌّ. نوع من الشلل السفلي الذي يتصف بتشنج توتري للعضلات المشلولة مع زيادة منعكساتها وهو يتسبب عادة عن آفات أفقية في النخاع الشوكي أو عن التصلب الأمامي الجانبي.

- **spastic p.** شَلَلٌ سُفْلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ. شلل سفلي يتصف بتشنج عضلات القسم المشلول من الجسم مع زيادة المنعكسات الوترية بسبب إصابة السبيل القشري النخاعي.

- **spastic p., congenital** شَلَلٌ سُفْلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ خِلْقِيٌّ. شلل سفلي تشنجي يوجد عند الولادة ويتسبب عن إصابات الولادة أو النزف الدماغي قبل الولادة أو عن التكون الشاذ للدماغ.

- **spastic p., infantile (= spastic p., congenital)** شلل سفلي تشنجي طفلي؛ شَلَلٌ سُفْلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ خِلْقِيٌّ.

- **spastic p., primary** شَلَلٌ سُفْلِيٌّ تَشْنُجِيٌّ أَوَّلِيٌّ. نوع من الشلل السفلي الذي يعتقد بأنه يتولد عن التنكس الأولي في السبيل الهرمي.

- **p. superior** شَلَلٌ نِصْفِيٌّ عُلوِيٌّ. شلل الأطراف العلوية.

- **syphilitic p. (= Erb's p.)** شَلَلٌ إِرْبُ السُّفْلِيِّ.

- **toxic p.** شَلَلٌ سُفْلِيٌّ تَسَمُّمِيٌّ. شلل سفلي يتولد عن تسمم الدم.

1. شَلَلِيٌّ سُفْلِيٌّ 2. مَشْلُولُ الْأَسْفَلِ. **paraplegic** منسوب أو متصف بالشلل السفلي أو مصاب به.

شَبِيهُ الشَّلَلِ السُّفْلِيِّ. **paraplegiform**

شَبِيهُة السَّكَنَةِ. حالة شبيهة بالسكرتة. **parapoplexy**

خَطَلُ الْأَدَاءِ. **parapraxia (= parapraxis)**

خَطَلُ الْأَدَاءِ. خطأ في أداء الأعمال مثل زلات اللسان عند الكلام أو سوء وضع المواد في غير مواقعها ومن دون قصد وبلا وعي.

**parapsia (= parapsis = paraphia)** شَذُوذُ اللَّفْسِ.

شَذُوذُ اللَّفْسِ. شذوذ في حس اللمس. **parapsis**

**parapsychology** الباراسيكولوجيا. دراسة التأثيرات والتجارب النفسية التي تقع خارج نطاق القوانين الفيزيائية كالتخاطر والتبصر.

**parareflexia** اضْطِرَابُ الْمُنْعَكَسَاتِ. خلل المنعكسات واضطرابها.

**parasexuality** شَذُوذٌ جِنْسِيٌّ. انحراف جنسي ذكري أو أنثوي.

1. تَعَذُّرُ الْاسْتِجَابَةِ 2. اضْطِرَابُ نَوْمِيٍّ. 1. حالة عدم استجابة المصاب للمنبهات الكلامية أو العقلية سوى الاستجابة للمنبهات المنعكسية 2. سلوك نومي شاذ مثل السير النومي أو بوال الفراش أو صريف الأسنان.

**paraspasm** تَشْنُجٌ مُتَنَاطِرٌ. تشنج عضلي متناظر بجهتي الجسم.

**paraspasmus (= paraspasm)** تَشْنُجٌ مُتَنَاطِرٌ.

- **p. faciale** تَشْنُجٌ وَجْهِيٌّ مُتَنَاطِرٌ. اضطراب حركي تشنجي غير مؤلم بجهتي الوجه.

**parasympathetic** اللاؤدي. متعلق بقسم اللاودي من الجهاز العصبي المستقل والذي يتكون من الأقسام البصرية والبصلية والعجزية.

**parasympathicotonia (= vagotonia)** غلبة اللاودي؛ غَلَبَةُ الْمُعْبَهُمِ.

**parasympathin** بَارَاسِمْبَاثِين. مادة فرضية يعتقد بأنها تفرز عند تنبيه عصب قحفي مستقل له تأثير تنبيهي على الجهاز العصبي اللاودي.

حَالُ اللَّؤُدِيِّ. ما يولد تأثيراً مشابهاً لقطع العصب اللاودي الذي يغذي أحد الأقسام أو الأعضاء أو أية مادة تقوم بمثل هذا العمل.

**parasympathomimetic** مُخَاجِي اللَّؤُدِيِّ. ما يولد تأثيراً مشابهاً لتنبيه العصب اللاودي الذي يغذي أحد الأقسام أو الأعضاء أو أية مادة تقوم بمثل هذا العمل.

**parathymia** خَطَلُ الْمِرَاجِ. شذوذ المزاج أو مزاج معكوس أو غير مناسب.

**paratonia** إِخْتِلَالُ التَّوَتُّرِ. اختلال التوتر العضلي أو غيره.

**parectasia (= parectasis)** فَرْطُ التَّمَدُّدِ.

**parectasis** فَرْطُ التَّمَدُّدِ. فرط تمدد أحد الأقسام أو الأعضاء.

**parectropia (= apraxia)** تَعَدُّرُ الأَدَاءِ.

**parencephalia** عَيْبُ دِمَاجِيٍّ خَلْقِيٍّ. عيب خلقي في تكوين الدماغ أو أحد أقسامه.

**parencephalous** مَعْيِبُ الدِّمَاغِ. المصاب بعيب الدماغ الخلقي.

**parergasia (= schizophrenic psychosis)** ذُهَانٌ قُصَايَمِيٌّ.

**paresis** خَزَلٌ. شلل بسيط أو جزئي.

**- canal p.** خَزَلٌ قَنَاتِيَّ العُنْشَا. عدم استجابة إحدى الأذنين أو كليهما للمنبهات الحرارية الباردة أو الحارة بسبب خلل دهليزي.

**- galloping p.** خَزَلٌ خَبِيْثٌ. خزل عام يتطور بسرعة كبيرة.

**- general p.** خَزَلٌ عَامٌ. زهري عصبي متني يولد فيه التهاب السحائي الدماغي المزمن فقدان وظائف القشرة تدريجياً ويسبب الخرف المترقي والشلل العام وهو يحدث عادة بعد 10-20 سنة بعد الإصابة الأولية بالزهري.

**- juvenile p.** خَزَلٌ يَفْعِيٌّ. الخزل الذي يحدث في الأطفال أو الأحداث أو الشباب بسبب داء الزهري الخلقي.

**- vestibular p. (= canal p.)** الخَزَلُ الدُّهْلِيْزِيٌّ.

**paresonalgesia** خَزَلٌ خَدْرِيٌّ. خزل مع فقدان حس الألم في الأقسام المصابة.

**paresthesia** مَذَلٌ. حس مرضي شاذ كحس محرق أو وخزي أو تنملي وما شاكل ذلك يظهر ذاتياً حتى من دون أي تنبيه أو أية استجابة لمتعكس.

**- Berger's p.** مَذَلٌ بِرُغَرٍ. مذل في أحد الأطراف السفلية أو في كليهما وضعفهما ولكن من دون أية أعراض ظاهرة أخرى ويصيب الأحداث.

**- Bernhardt's p. (= meralgia paresthetica)** أَلَمُ الْفَخْذِ الْمَذَلِّيِّ.

**- visceral p.** مَذَلٌ حَشَوِيٌّ. حس شاذ في أحد الأحشاء وهو حس غريب وليس زيادة أو فقدان إحدى الحواس الطبيعية للحشو.

**paresthetic** مَذَلِّيٌّ. متعلق بالمذل أو متصف به.

**paretic** خَزَلِيٌّ؛ أَخْزَلٌ؛ خَزْلَاءٌ. متعلق بالخزل أو مصاب به.

**parietal** جِدَارِيٌّ. 1. متعلق بجدار أحد الكهوف 2. متعلق أو قريب من العظم الجداري مثل الفص الجداري للدماغ.

**parkinsonian** بَارِكِنْسُونِيٌّ. متعلق أو منسوب للباركنسونية.

**parkinsonism** البَارِكِنْسُونِيَّةُ. مجموعة من الاضطرابات العصبية تتصف بقلّة الحركة والرعاش والصلل العضلي.

**- postencephalic p. (= parkinsonian syndrome)** البَارِكِنْسُونِيَّةُ التَّالِيَّةُ لالْتِهَابِ الدِّمَاغِ. انظر syndrome

**paroniria** كَابُوسٌ؛ حُلْمٌ مَرَضِيٌّ. حلم مرعب شاذ.

**parorexia (= pica)** وَحْمٌ؛ قَطَا؛ شَذُوذُ الشَّهِيَّةِ.

**parosmia** خَطَلُ الشَّمِّ. حس شمّي شاذ.

**parosphresia** اضْطِرَابُ الشَّمِّ.

**paroxysm** 1. انْتِبَاطٌ. 2. اشْتِدَادٌ. 1. نوبة أو تشنّج 2. عودة أحد الأعراض أو اشتداده المفاجيء.

**paroxysmal** انْتِبَاطِيٌّ. يعاود على شكل نوبات.

**pars** جُزْءٌ. (ج: أَجْزَاءٌ). قسم من عضو أو بنية كبيرة.

**- p. anterior commissurae anterioris cerebri (= p. anterior commissurae rostralis cerebri)** الْجُزْءُ الأَمَامِيٌّ لِلصُّوَارِ الْمُخَيِّ الأَمَامِيِّ.

**- p. anterior lobuli quadrangularis (= p. quadrangularis cerebelli)** الْجُزْءُ الأَمَامِيٌّ لِلْفُصَيْصِ الْمُرَبَّعِ الْمُخَيِّجِيِّ.

**- p. anterior pedunculi cerebri (= p. ventralis pedunculi cerebri)** الْجُزْءُ الأَمَامِيٌّ لِسُويْقَةِ الْمُخِّ.

**- p. autonómica systematis nervosi** الْجُزْءُ الْمَسْتَقْلَلِيَّ لِلجِهَانِ الْعَصْبِيِّ. قسم الجهاز العصبي الذي يتحكم في تنظيم فعاليات العضلات القلبية والمساء والغدد.

- p. basilaris pontis (= p. ventralis pontis) الجزء القاعدي للجسر.
- p. basolateralis corporis amygdaloidei الجزء القاعدي الوحشي للجسم اللوزي. القسم القاعدي للجسم اللوزي الذي يحوي النوى الوحشية والقاعدية والقاعدية الإضافية اللوزية.
- p. buccalis hypophyseos (= Rathke's pouch) جزء النخامية الشذقي. جراب راتكة.
- p. caudalis lobuli quadrangularis الفصيص (= lobulus simplex cerebelli) المخيخي البسيط.
- p. caudalis nervi vestibularis الجزء الذنبى للعصب الدهليزي. الفرع الذنبى أو السفلي للعصب الدهليزي الذي ينتهي في العرف الامبولي للقناة الهلالية الخلفية وفي بقعة الكيبس.
- p. centralis systematis nervosi الجزء المركزي للجهاز العصبي. الجزء الذي يحوي الدماغ والنخاع الشوكي.
- p. cephalica et cervicalis systematis الجزء الراسي والرقبي للجهاز autonomici المستقل. جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يوجد في الراس والرقبة وينبع قسمه الودي من الحبل الصدري العلوي ويترحل في العقد الرقبية الودية. وينبع قسمه اللاودي من جذع الدماغ خلال الاعصاب محرك العين والوجهي واللساني البلعومي والمبهم والإضافي ويترحل في العقد الهدبية والجناحية الحنكية والاذنية وتحت الفك السفلية والعقد الداخلية.
- p. cerebialis arteriae carotidis Internae الجزء الدماغى للشريان السباتي الباطن. الجزء الدماغى الانتهاى للشريان السباتي الباطن الذي ينقسم إلى القسمين الامامي والخلفي في الحفرة القحفية الوسطية.
- p. cervicalis medullae spinalis الجزء الرقبى للنخاع. قسم النخاع الشوكي الذي يوجد في القسم الرقبى من القناة الفقرية والذي يعطي الأزواج الثمانية من الاعصاب الشوكية الرقبية.
- p. coccygea medullae spinalis الجزء العصعصى للنخاع. قسم النخاع الشوكي الموجود في القسم العصعصى من القناة الفقرية والذي يعطي الأزواج الثلاثة من الاعصاب الشوكية العصعصية.
- p. cochlearis nervi octavi (= nervus cochlearis) الجزء القوقعي من العصب الثامن: العصب القوقعي.
- p. cochlearis nervi vestibulocochlearis (= nervus cochlearis) الجزء القوقعي من العصب الدهليزي القوقعي.
- p. compacta الجزء المكتنز. الجزء الظهري من المادة السوداء وهو يحوي خلايا متوسطة الحجم ومعظمها منصيفة.
- p. corticomedialis corporis الجزء القشري الإنسي للجسم اللوزي. الجزء الذي يحوي النوى اللوزية الإنسية والمركزية والقشرية ونواة السطر الشمي الوحشي والباحة اللوزية المتحولة الامامية.
- p. cranialis lobuli quadrangularis الجزء الخففي للفصيص المربع (= lobulus quadrangularis cerebelli).
- p. distalis adenohypophyseos الجزء القاصي للنخامية الغدية.
- p. dorsalis corporis geniculati الجزء الظهري للجسم الركبي الوحشي. lateralis
- p. dorsalis corporis geniculati الجزء الظهري للجسم الركبي الإنسي. medialis
- p. dorsalis diencephali الجزء الظهري للدماغ البيني. جزء الدماغ البيني فوق التلم الوطاني والذي يتكون من المهاد الفوقي والمهاد الظهري والمهاد التالي.
- p. dorsalis pedunculi cerebri الجزء الظهري للسويقة المخية. جزء السويقة المخية المتواصل عبر المستوى الناصف والذي يكون سقيفة الدماغ المتوسط.
- p. dorsalis pontis الجزء الظهري للجسر. الجزء السقيفي للجسر والذي يشبه النخاع المستطيل في بنيته والمتواصل مع سقيفة الدماغ المتوسط.
- p. frontalis capsulae internae (= crus anterius capsulae Internae) الساق الامامية للمخفظة الداخلية.
- p. frontalis radiationis corporis callosi الجزء الجبهي لشع الجسم الثفني. الشع الذي

- يتكون من الألياف تنحدر من الركبة إلى الفص الجبهي.
- p. grisea hypothalami **الجزءُ السِّنْجَابِيُّ**  
للوطاء. الكتل النووية للوطاء.
  - p. inferior gyri frontalis medii **الجزءُ**  
السُّفْلِيُّ لِلتَّلْفِيفِ الجَبْهِيِّ الوَسْطِيِّ.
  - p. inferior nervi vestibularis (= p. caudalis nervi vestibularis) **الجزءُ الذَّنْبِيُّ**  
للْعَصَبِ الدَّهْلِيْزِيِّ.
  - p. inferior partis vestibularis nervi octavi **الجزءُ الذَّنْبِيُّ لِلْقِسْمِ الدَّهْلِيْزِيِّ**  
لِلْعَصَبِ الثَّامِنِ.
  - p. infraclavicularis plexus brachialis **الجزءُ تَحْتَ التَّرْقَوِيِّ لِلضَّفِيرَةِ العَضْدِيَّةِ.** جزء  
الضفيرة العضدية الذي يقع في الإبط تحت مستوى  
الترقوة وتتفرع منه الأعصاب الصدرية الإنسية  
والوحشية والعظمية الجلدية والجلدي العضدي  
الإنسي وأمام الجلدي العضدي الإنسي والناصف  
والزندي والكعبري وتحت الكتفي والصدرية الظهرية  
والإبطية.
  - p. infundibularis lobi anterioris hypophyseos (= p. tuberalis adenohypophyseos) **الجزءُ الحَدْبِيُّ لِلنَّخَامِيَّةِ الغُدِّيَّةِ.**
  - p. insularis arteriae cerebri mediae **الجزءُ الجَزِيرِيُّ لِلشَّرَيَانِ المَخِّيِّ المُتَوَسِّطِ.** فروع  
الشريان المخي المتوسط التي تغذي الجزيرة والمناطق  
المجاورة لها والتي تتكون من الشرايين الجزيري  
والجبهي القاعدي الوحشي والصدغي الأمامي  
والمتوسط والخلفي.
  - p. Intermedia adenohypophyseos **الجزءُ**  
النَّخَامِيَّةِ الغُدِّيَّةِ المُتَوَسِّطِ.
  - p. Intracranialis nervi optici **الجزءُ العَصَبِ**  
البَصْرِيِّ دَاخِلَ القَنَاةِ. جزء العصب البصري الذي يمر  
خلال القناة البصرية.
  - p. Intracranialis nervi optici **الجزءُ العَصَبِ**  
البَصْرِيِّ دَاخِلَ القَنَاةِ. جزء العصب البصري الذي  
يمتد بين القناة البصرية والتصالبة البصرية.
  - p. Intralaminaris nervi optici **الجزءُ العَصَبِ**  
البَصْرِيِّ دَاخِلَ الصَّفِيْحَةِ. جزء العصب البصري  
داخل العقلة الذي يمتد خلال الصفيحة المصفوية  
للصلبة.
  - p. intraocularis nervi optici **جزءُ العَصَبِ**  
البَصْرِيِّ دَاخِلَ المَقْلَةِ. جزء العصب البصري الذي  
يوجد داخل مقلة العين والذي ينقسم إلى الأقسام خلف  
الصفحة وداخل الصفيحة وأمام الصفيحة.
  - p. lenticulothalamicus capsulae internae (= p. thalamolenticularis capsulae internae) **الجزءُ الغَدَسِيُّ المِهَادِيُّ**  
لِلْمَحْفَظَةِ البَاطِنِيَّةِ.
  - p. libera columnae fornicis **الجزءُ الحُرُّ**  
لِعَمُودِ القَبْوِ. أقسام عمود القَبْوِ خلف الصوار.
  - p. lumbalis medullae spinalis **الجزءُ**  
القَطْنِيَّ لِلنُّخَاعِ. جزء النخاع الشوكي الذي يوجد في  
القسم الصدري السفلي للأنبوب الفقري (في البالغين)  
والذي يعطي الأزواج الخمسة من الأعصاب الشوكية  
القطنية.
  - p. magnocellularis nuclei rubri **جزءُ**  
الْخَلَايَا الكَبِيرَةِ لِلنَّوَاةِ الحُمْراءِ. في الإنسان هو  
الجزء الذنب من النواة الحمراء الذي يحوي مجموعة  
من الخلايا الكبيرة عديدة الأقطاب وهي أقل عدداً من  
الخلايا الصغيرة المنتشرة خلال النواة.
  - p. mamillaris hypothalami (= the mamillary bodies) **الجزءُ الحَلْمِيُّ للمهاد:**  
الأجسامُ الحَلْمِيَّةِ.
  - p. marginalis sulci singuli **الجزءُ الهَامِشِيُّ**  
لِلْقَلَمِ الحَزَامِيِّ. جزء التلم الحزامي الذي ينثني بزاوية  
قائمة ويتجه نحو الحافة الظهرية لنصف كرة المخ.
  - p. nervosa hypophyseos **جزءُ النَخَامِيَّةِ**  
العَصْبِيِّ.
  - p. nervosa retinae **جزءُ الشَّبَكِيَّةِ العَصْبِيِّ.**  
وهو القسم الداخلي الشفاف من الشبكية والحساس  
للضوء والذي يحوي تسع طبقات.
  - p. occipitalis capsulae internae (= crus posterius capsulae Internae) **الجزءُ القَذَالِيَّ لِلْمَحْفَظَةِ البَاطِنَةِ:**  
السَّاقُ الخَلْفِيَّةُ لِلْمَحْفَظَةِ الغَائِرَةِ.
  - p. occipitalis coronae radiatae **الجزءُ**  
القَذَالِيَّ لِلْإِكْلِيلِ المُتَشَعِّعِ. جزء الإكليل المتشعع الذي  
يوجد في الفص القذالي.



- p. olfactoria corporis amygdaloidei  
(= p. corticomediales corporis amygdaloidei) **الجزء القشري الإنسي للجسم اللوزي.**

- p. opercularis gyri frontalis inferioris **الجزء الوصادي للتلفيف الجبهي السفلي.** جزء التلفيف الجبهي السفلي الذي يقع خلف الذراع الصاعد للتمم الوحشي والذي يغطي فص الجزيرة.

- p. optica retinae **جزء الشبكية البصري.** جزء الشبكية الذي يحوي المستقبلات الحساسة للضوء والذي يمتد إلى الخلف من الحافة المشرشرة على الجهة الداخلية لسطح المشيمية والمتواصل عند القرص البصري مع العصب البصري.

- p. orbitalis gyri frontalis inferioris **الجزء الحجاجي للتلفيف الجبهي السفلي.** جزء التلفيف الجبهي السفلي الذي يقع تحت الذراع الامامي للتمم الوحشي والذي يدور حول الحافة فوق الهدبية نحو السطح الحجاجي للفص الجبهي لنصف كرة المخ.

- p. orbitalis nervi optici **الجزء الحجاجي للعصب البصري.** جزء العصب البصري الذي يقع بين القناة البصرية والمقلة.

- p. parasympathica systematis nervosi autonomici **الجزء اللاودي للجهاز العصبي المستقلي.** القسم القحفي العجزي للجهاز العصبي المستقلي الذي تجري اليافه قبل العقدية في الاعصاب القحفية الثالث والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والجذور الامامية للاعصاب الشوكية العجزية الثاني والثالث والرابع. وتغذي اليافه القلب والعضلات الملساء وغدد الرأس والرقبة والاحشاء الصدرية والبطنية والحوضية وتقع العقد التي تتشابك معها هذه الالياف غالباً بالقرب من الاعضاء التي تغذيها.

- p. parietalis coronae radiatae **الجزء الجداري للإكليل المتشعب.** جزء الإكليل المتشعب الذي يوجد في الفص الجداري.

- p. parvocellularis nuclei rubri **جزء الخلايا الصغرى للنواة الحمراء.** قسم الخلايا الصغيرة المنتشرة في النواة الحمراء والتي يكثر انتشارها في القسم الذنب من هذه النواة في الإنسان.

- p. pelvica systematis autonomici **الجزء**

**الخوضي للجهاز المستقل.** جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يوجد في الحوض والذي يحوي أربع أو خمس عقد عجزية والمتصل بالقسم البطني أو القطني للجهاز.

- p. peripherica systematis nervosi **الجزء المحيطي للجهاز العصبي.** جزء الجهاز العصبي المكون من الاعصاب والعقد الموجودة خارج الدماغ والنخاع الشوكي.

- p. posterior commissurae anterioris cerebri **الجزء الخلفي للصوار المخي الأمامي.**

- p. posterior commissurae rostralis cerebri **الجزء الخلفي للصوار المخي الراسي.** الجزء الذي تربط اليافه التلفيفين الصدغيين الوسطي والسفلي والتلفيف حول الحصين مع الجسمين اللوزيين للجهتين.

- p. posterior pedunculi cerebri (= p. dorsalis pedunculi cerebri) **الجزء الظهري لسويقة المخ.**

- p. postlaminaris nervi optici **جزء العصب البصري خلف الصفيحة.** جزء العصب البصري خلف الصفيحة المصفوية للصلبة داخل العين.

- p. prelaminae nervi optici **جزء العصب البصري أمام الصفيحة.** جزء العصب البصري أمام الصفيحة المصفوية للصلبة العين.

- p. reticularis **الجزء الشبكي.** الجزء البطني من المادة السوداء الذي يحوي خلايا أقل مما يوجد في الجزء المكتنز منها ويحوي بعضها القليل من الصبغة.

- p. retrolenticularis capsulae internae **جزء المحفظة الغائرة خلف النواة العدسية.** قسم المحفظة الداخلية المستقر على السطح الوحشي للمهاد خلف النواة العدسية ويحتوي التشعب المهادي الخلفي.

- p. rostralis nervi vestibularis **الجزء المنقاري للعصب الدهليزي.** الفرع الراسي أو العلوي للعصب الدهليزي والذي تنتهي اليافه في العرف الامبولي للقناتين الهاليتين الامامية والوحشية وفي بقعة القربة.

- p. sacralis medullae spinalis **الجزء العجزي للنخاع.** قسم النخاع الشوكي الذي يوجد في القسم العجزي من القناة الفقرية والذي يعطي الأزواج الخمسة من الاعصاب الشوكية.

- **p. spinalis nervi accessorii (= radices spinales nervi accessorii)** **الجزء النخاعي**  
للعصب الإضافي. الجذور النخاعية للعصب الإضافي.
- **p. sublentiformis capsulae interna**  
**جزء المحفظة الغائرة تحت النواة العدسية.** جزء المحفظة الباطنة الذي يقع بالجهة البطنية للقسم الظهري من النواة العدسية والذي يحوي الالياف الصدى الجسرية والركبية المهادية والشع السمع.
- **p. superior gyri frontalis medii** **الجزء العلوي للتلفيف الجبهي الوسطي.**
- **p. superior partis vestibularis nervi octavi (= p. rostralis nervi vestibularis)**  
الجزء العلوي للقسم الدهليزي للعصب الثامن.
- **p. supraclavicularis plexus brachialis**  
**الجزء فوق الترقوي للضفيرة العضدية.** قسم الضفيرة العضدية الذي يقع في المنطقة الرقبية فوق مستوى الترقوة والذي تتفرع منه الاعصاب الكتفي الظهري والصدرى الطويل وفوق الكتفي وعصب العضلة تحت الكتفية.
- **p. sympathetica systematis nervosi autonomici** **الجزء الودي للجهاز العصبي المستقل.**
- **p. sympathica systematis nervosi autonomici** **الجزء الودي للجهاز العصبي المستقل.** جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يستلم الياف اتصاله مع الجهاز العصبي المركزي خلال التدفق الصدري القطني للالياف الحشوية الصادرة وتنبع هذه الالياف قبل العقدية من خلايا في المستويين الصدري والقطني للنخاع الشوكي وتتركه خلاله جذوره الامامية وتم تدخل عن طريق الفروع الموصلة إلى الجذع الودي حيث تتشابك بعضها مع خلايا عقده. وتم تعود هذه الالياف بعد العقدية إلى الاعصاب الشوكية خلال الفروع الموصلة لتغذي الاعوية الدموية والغدد والعضلات الملساء للجذع والاطراف أو تمر إلى الفروع الحشوية لتغذي الاعوية الدموية والعضلات الملساء وغدد الرقبة والرأس واحشاء الصدر والبطن. وتمر بعض الالياف قبل العقدية خلال الجذع الودي وتتشابك في العقد أمام الفقرية كما تغذي الالياف بعد العقدية من هذه العقد الاحشاء المجاورة.
- **p. temporalis radiationis corporis callosi** **الجزء الصدغي لشع الجسم الثفني.** الياف شع الجسم الثفني التي تمر إلى الفص الصدغي.
- **p. thalamolenticularis capsulae interna** **الجزء المهادي العدسي للمحفظة الغائرة.** قسم الذراع الخلفي للمحفظة الغائرة المجاور للمهاد والنواة العدسية والمكون من الياف من الشع المهادي والالياف القشرية النخاعية والقشرية الحمراء والقشرية الشبكية والقشرية المهادية والمهادية الجدارية والشع المهادي المركزي.
- **p. thoracalis systematis autonomici** **الجزء الصدري للجهاز المستقل.** جزء الجهاز العصبي المستقل الذي يوجد في الصدر ويستمد جزءه الودي من الحبل الصدري العلوي وجزءه اللاودي من العصب المبهم كما انه يحوي اليافاً ودية قبل العقدية التي تصل الاحشاء البطنية عن طريق الاعصاب الحشوية الصدرية.
- **p. thoracica medullae spinalis** **الجزء الصدري للنخاع.** جزء النخاع الشوكي الذي يوجد في الأرباع الثلاثة العلوية من القسم الصدري من القناة الفقرية (في البالغين) والذي يعطي الأزواج العصبية الشوكية الصدرية الإثنا عشرية.
- **p. triangularis gyri frontalis inferioris** **الجزء المثلث للتلفيف الجبهي السفلي.** الجزء الإسفيني الشكل للفص الجبهي السفلي الذي يقع بين الفرعين الصاعد والامامي للتمم الوحشي لنصف كرة المخ.
- **p. tuberalis adenohypophysis** **الجزء الأنثوبي للنخامية الغدية.** (= hypophyseal or pituitary stalk)
- **p. vagalis nervi accessorii (= radices craniales nervi accessorii)** **الجذور القحفية للعصب الإضافي.**
- **p. ventralis corporis geniculati lateralis (= nucleus corporis geniculati lateralis)** **نواة الجسم الركبي الإنسي؛ الجزء البطني للجسم الركبي الوحشي.**
- **p. ventralis corporis geniculati medialis (= nucleus corporis geniculati medialis)** **الجزء البطني للجسم الركبي الإنسي.**

- **p. ventralis diencephali** **الْجُزْءُ البَطْنِيّ**  
لِلدُّمَاغِ البَيِّنِيّ. جزء الدماغ البيني تحت النّلم الوطاني  
والمكون من المهاد البطني (تحت المهاد) والوطاء.

- **p. ventralis pedunculi cerebri** **الْجُزْءُ**  
البَطْنِيّ لِلسُّوَيْقَةِ الْمُخَيَّة. جزء السويقة البطني  
المكون من حزم كبيرة من سبل الألياف العصبية.

- **p. ventralis pontis** **الْجُزْءُ البَطْنِيّ لِلْجَسْرِ.**  
جزء الجسر الذي يربط المخ والمخيخ والنخاع  
المستطيل (البصلة) وهو شريط عريض مستعرض  
ينحني عبر السطح البطني من القسم السفلي للدماغ  
المؤخر ثم يتضيق على الجهتين ليدخل المخيخ  
كالسويق المخيخي الوسطي، وهو يحوي أليافاً  
طولانية تتأصل من القشرة المخية وأليافاً مستعرضة  
وكتلاً من المادة السنجابية والنوى الجسرية.

- **p. vestibularis nervi octavi (= nervus**  
**vestibularis)** **الجزء الدهليزي للعصب**  
**الثامن؛ الْعَصَبُ الدَّهْلِيْزِيّ.**

**parthenophobia** **رُهاب العذاري؛ رُهابُ**  
**البَنَات.** الخوف المرضي من البنات.

**passive** **لا فاعِل.** غير نشط وغير تلقائي  
أو غير مولد عن طريق جهد فعال.

**passivism** **الإنسِلَاسُ السَّلْبِيّ.** في  
الطب النفسي هو الشذوذ الجنسي الذي يتصف  
بالاستسلام والرضوخ الجنسي السلبي.

**passivity** **السَّلْبِيَّة.** في علم النفس هي  
عدم المقدرة أو عدم الرغبة في القيام بأية مبادرة  
أو أخذ أية مسؤولية اعتيادية في الحياة اليومية.

**patella** **الرَضْفَة.** عظم سمسماني مثلث  
يقع أمام الركبة في وتر مغرز العضلة الرباعية  
الرؤوس الفخذية الباسطة.

**pathetic** **عَصْبِيّ بَكَرِيّ.** متعلق أو منسوب  
للعصب البكري.

**pathomimesis (= malingering)**  
**تَمَارُض.** محاكاة المرض.

**pathomimia (= malingering)**  
**تَمَارُض.** محاكاة المرض.

**pathomimicry (= malingering)**  
**تَمَارُض.** محاكاة المرض.

**pathoneurosis** **عُصَابٌ مَرَضِيّ.** أعراض  
هستيرية تنتج عن مرض مزمن.

**pathophobia (= nosophobia)**  
**رُهابُ**  
**الْمَرَض.**

**pathopsychology** **عِلْمُ النَّفْسِ الْمَرَضِيّ.**  
علم نفس الأمراض النفسية.

**pathopsychosis** **دُهَانٌ مَرَضِيّ.** ذهان  
يتولد عن مرض عضوي كأورام الدماغ أو التهاباته.

**pathway** **سَبِيلٌ؛ مَسَلَكٌ.** في العلوم  
العصبية هو الطريق العصبي الذي تسلكه الدفعات  
الحسية التي تنقل للجهاز العصبي المركزي وقشرة  
المخ (الإشارات الواردة) أو تسلكه الدفعات  
العصبية الحركية من الدماغ إلى العضلات المنفذة  
(الإشارات الصادرة).

- **final common p.** **السَّبِيلُ الْإِنْتِهَائِي الْعَامّ.**  
العصبونات الحركية التي تمر خلالها كل الدفعات  
العصبية الصادرة من مختلف المراكز العصبية لتصل  
العضلات والغدد المحيطة.

- **internuncial p.** **السَّبِيلُ الْبَيِّنِيّ.** سبيل  
ترابطي يربط مختلف المراكز أو العصبونات في داخل  
الجهاز العصبي المركزي.

**pattern** **طَرَاز؛ غَرَار.** 1. تصميم يتبع  
عند بناء أو تركيب أية بنية أو آلة 2. مجموعة  
خاصة ومميزة من الخلايا أو الفعاليات مثل الطرز  
السلوكية.

- **action p. (= instinct)** **غَرِيْزَة؛ فِطْرَة.**  
أسلوب السلوك الموروث حيث تؤدي بعض المنبهات  
إلى استجابات نوعية خاصة لدى الفرد.

- **muscle p.** **طَرَازُ عَضَلِيّ.** عدد من العضلات  
المرتبة بنسق معين وتستجيب كلها مرة واحدة كوحدة  
وظيفية.

**pavor (= terror)** **فَوْع؛ رُعب.**

- **p. diurnus (= day terroris)** **رُعبٌ نَهَارِيّ.**  
نوبات قلق عند الاطفال تحدث أثناء نوم القيلولة بعد  
الظهر.

- **p. nocturnus** **رُعبٌ لَيْلِيّ.** اضطراب نومي عند  
الاطفال يتصف بقلق ورعب شديدين بعد بدء النوم  
بفترة قصيرة مع اضطرابات الجهاز المستقل وعدم  
تذكر الأحلام أو الكوابيس.

**pedialgia** ألم القدم.

**pedophilia** حُب الأطفال. 1. الحب المفرط

الشاذ للأطفال 2. ممارسة الكبار الجنسية مع الأطفال أو الرغبة الملحة الشاذة لعمل ذلك.

**pedophobia** رهاب الأطفال. الخوف الشاذ من الأطفال.

**peduncle** سَوْدَقَة. قسم رابط شبيه


بالساق يربط بنية سائبة بجسم العضو.

**cerebellar p., caudal** السَوْدَقَة المَخِيخِيَّة

الذَنَبِيَّة. حزمة كبيرة من الألياف العصبية تربط النخاع

الشوكي والنخاع المستطيل بالمخيخ وهي تمر حول

الحافة الوحشية للبطين الرابع وتدور ظهرياً نحو المخيخ.



السبيل البصري


pathway, visual

أحد الأنظمة الحسية العصبية الذي يبدأ من العين ويمر حتى قشرة المخ

- cerebellar p., cranial السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخَةُ الْقَحْفِيَّةُ. حزمة كبيرة من الألياف العصبية الإسقاطية تنبع بصورة رئيسية من النواة المسننة من كل من نصفي كرة المخيخ وتصل لتتصلب في الدماغ المتوسط وتنتهي بصورة رئيسية في النواة الحمراء والمهاد.

- cerebellar p., inferior (= cerebellar p., caudal) السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخَةُ السُّفْلِيَّةُ.

- cerebellar p., middle السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ. حزمة كبيرة من ألياف عصبية إسقاطية تتصل في النوى الجسرية للجهة المقابلة وتدخل



#### pathway, visual

السيبل العنصبي البصري المركزي (منظوراً من أسفل الدماغ) وممتداً من النصفين الأيسرين لشبكتي العينين وخلال التصلب البصرية ثم النواة الركبية وإلى القشرة البصرية في الفص القذالي للمخ.

المخيخ ناقلة نبضات من قشرة المخ إلى المخيخ الجديد وتتواصل مع الجسر عند خط اتصال العصب الثلاثي التوائم به.

- cerebellar p., pontine (= middle cerebellar p.)  
السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخِيَّةُ الجُسرِيَّةُ:  
السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ.

- cerebellar p., rostral (= caudal cerebellar p.)  
السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخِيَّةُ الدَّنْبِيَّةُ.

- cerebellar p., superior (= cranial cerebellar p.)  
السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخِيَّةُ العُلْوِيَّةُ.

- p's. of cerebellum  
سُوَيْقَاتُ الْمُخَيَّخِ.  
الحزم الكبيرة الثلاث من الألياف العصبية الإسقاطية على جهتي المخيخ والتي تربطه مع أقسام الدماغ الأخرى ومع النخاع الشوكي.

- cerebral p.  
سُوَيْقَةُ المَخ. الكتلتان الكبيرتان  
من المادة العصبية التي تهبط من نصفي كرة المخ والمفصولتان عن بعضهما بالحفرة بين السويقتين قبل أن تلتقيا عند دخولهما إلى الجسر حيث تكونان الجزء البطني للدماغ المتوسط وتنقسم كل سويقة إلى قسم بطني يتكون من حزمة من ألياف عصبية (قاعدة سويقة المخ) وقسم ظهري يتواصل عبر المستوى الناصف مكوناً سقيفة الدماغ المتوسط وتفصل المادة السوداء القسمين عن بعضهما البعض.

- p. of flocculus  
سُوَيْقَةُ النَّدْفَةِ. حزمة ضيقة  
من الألياف العصبية الواردة والصادرة تربط عقيدة المخيخ بالندفة ويتواصل قسمها الظهري مع القسم الأمامي الوحشي للشرع البصلي الذنبى والذي تشق منه معظم أليافها.

- olfactory p.  
السُّوَيْقَةُ الشَّمْعِيَّةُ. سويقة الألياف  
الشمعية خصوصاً عند اتصالها بنصف كرة المخ.

- pineal p. (= habenula)  
السُّوَيْقَةُ الصَّنوبرِيَّةُ:  
العُيَّان.

- p's. of thalamus  
سُوَيْقَاتُ المِهَاد. الإشعاعات  
الأربعة من الألياف المهادية القشرية ذات الاتجاهين التي تربط المهاد الظهري مع أقسام عديدة من قشرة المخ والتي تكون بمجموعها القسم الأكبر من المحفظة الداخلية والإكليل المتشقق. وتربط السويقة الأمامية الفص الجبهي للمخ مع المهادين الأمامي والإنسي وتربط السويقة العلوية التلفيفين أمام المركزي وخلف

المركزي والأقسام المجاورة لهما من الفصين الجبهي والجداري للمخ مع المهادين البطني والوحشي وتربط السويقة الخلفية القشرتين القذالية والجدارية مع المهادين الخلفي والوحشي وتربط السويقة السفلية الجسم الركبي الإنسي والمهاد الخلفي مع بعض مناطق قشرة الفص الصدغي للمخ.

- p. of thalamus, caudal (= inferior thalamic p.)  
سُوَيْقَةُ المِهَادِ السُّفْلِيَّةِ.

pedunculotomy  
قَطْعُ السُّوَيْقَةِ. قطع  
السويقة المخية والألياف الهرمية وخارج الهرمية للتفريق عن الرعاش في داء باركنسون.

pedunculus (= peduncle)  
سُوَيْقَةُ.

PEG (= pneumoencephalography)  
التَّصْوِيرُ الغَايِّي الدماغي.

pellagra  
بَلْغَرَّة. متلازمة عوز سريرية  
لمادة النياسين تتصف بالتهاب الجلد والاعشبة المخاطية والإسهال واضطرابات نفسية تشمل الكآبة والإثارة والقلق والتخليط والتوهم والتوهان والهلوسة.

pentobarbital  
بِنْتُوْبَارِبِيْتَال. دواء  
يستعمل عن طريق الفم كمهدى ومنوم.

- p. sodium  
بِنْتُوْبَارِبِيْتَال الصُّودِيُوم. دواء  
يستعمل كنوم ومهدى ومضاد للاختلاج وعند بدء التبنيج أو معزز له وكدواء نساوي عند الولادة.

peotillomania  
هَوَسُ سَحَبِ القَضِيب.  
هوس عادة سحب القضييب واللعب به.

percept  
المُدْرَك. الصورة الفكرية التي  
تكونها الحواس للمواد والأشياء الموجودة في المحيط.

perception  
إِدْرَاك. التسجيل الفكري  
الواعي للمنبهات الحسية.

- depth p.  
إِدْرَاكُ العمق. إدراك عمق المحيط  
أو البعد النسبي لمختلف الأجسام والمواد المنظورة في المحيط.

- extrasensory p. (ESP)  
إِدْرَاكٌ خَارِجُ الحسّ.  
إدراك خارج الحس أو استجابات لأفكار أو أحداث خارجية من دون الحواس.

- stereognostic p. إدْرَاكٌ تَجَسُّيْمِيّ. إدراك الأجسام والأشياء بواسطة حسّ اللمس.

perceptivity الإدْرَاكِيَّة. المقدرة على إدراك الانطباعات الحسية.

perceptorium (= sensorium) مَحَسَّن.

percipient 1. إدْرَاكِيّ 2. مُدْرِك. 1. منسوب للإدراك 2. شخص يدرك أو قادر على الإدراك.

perencephaly (= porencephalia) تَنْقُبُ الدِّمَاغ. وُجُودُ المَسَامِ في الدِّمَاغ.

perfectionism تَحَرِّي الكَمَال؛ الكَمَالِيَّة. خلة شخصية تتصف بوضع مقاييس مثالية كاملة لتصرفات الشخص وأعماله وأخلاقه وغالباً أعلى من المقاييس التي تقتضيها الحالات المختلفة أو الممكن تطبيقها.

periaqueductal حَوْلُ المَسَال. حول أحد المسالات.

periaxonal حَوْلُ المِخْوَار. حول أحد المحاور.

pericallosal حَوْلُ الثَّقْنِي. حول الجسم الثفني.

pericephalic حَوْلُ الرَّأْس. يحيط بالرأس.

pericranium سَفْحَاقُ القُفْص. السّمحاق الخارجي للّقحف.

peridural حَوْلُ الجَافِيَّة. حول أو خارج الجافية.

peridurogram صُورَةُ حَوْلُ الجَافِيَّة.

peridurography تَصْوِيرُ حَوْلُ الجَافِيَّة. التصوير الشعاعي للقناة النخاعية والباحات الخلاقية بعد زرق مادة تباينية حول الجافية.

periencephalitis إِلْتِهَابٌ مُحِيطُ الدِّمَاغ. التهاب سطح الدماغ أو التهاب السحايا وقشرة الدماغ.

periencephalography تَصْوِيرُ مُحِيطُ الدِّمَاغ. التصوير الشعاعي لسحايا الدماغ.

periglial حَوْلُ الدِّبْقِي. حول دبقيات الدماغ.

perikaryon جِسْمُ العَصَبُون. جسم الخلية العصبية ما عدا نواتها وتشعباتها.

perimedullary حَوْلُ البَصَلَة. حول النخاع المستطيل.

perimeningitis (= pachymeningitis) إِلْتِهَابُ الجَافِيَّة.

perimyelitis (= spinal meningitis) إِلْتِهَابُ السَّحَايَا النُّخَاعِيَّة.

perimyelography تَصْوِيرُ حَوْلُ النُّخَاع. التصوير الشعاعي بعد زرق مادة تباينية في الحيز تحت العنكبوتية النخاعية.

perineural حَوْلُ العَصَب. يحيط بالعصب أو بالأعصاب.

perineurial متعلّق بِغَمْدِ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة.

perineuritis إِلْتِهَابُ غَمْدِ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة.

perineurium ظَهَارَةُ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة؛ غَمْدُ الحُرْمَةِ العَصَبِيَّة. غمد النسيج الضام الذي يحيط بحزمة من الألياف العصبية المحيطة.

period دَوْر. (ج: أنوار). فترة زمنية أو الوقت اللازم الطبيعي لعودة إحدى الظواهر أو العمليات.

- absolute refractory p. دَوْرُ الجِرَانِ المُطْلَق. جزء فترة الحران عندما لا يتمكن فيها العصب أو العضل من الاستجابة لأي منبه مهما كان شديداً بعكس دور الحران النسبي.

- isoelectric p. دَوْرُ تَسَاوِي التَّكْهَرُب. اللحظة في التقلص العضلي عندما تتساوى عندها الكهربائية العضلية ولا يظهر أي تغيير في جهاز قياس هذه الفعالية.

- p. of isometric contraction (= presphygmie p.) دور التقلص المتساوي القياسات؛ دَوْرُ التَّقْلُصِ اللَّاتَقْصُرِي.

- p. of isometric relaxation (= postsp-hygmie p.) دور الإنبساط المتساوي القياسات؛ دَوْرُ الإِنْبَسَاطِ اللَّاتَقْصُرِي.

- isovolumic p. (= presphygmie p.) دَوْرُ إِسْوِيَّةِ الحَجْم.

- latency p. (= latent p.) دَوْرُ الكُمُون. الدور غير الفعال ظاهرياً الذي يمر بين تنبيه النسيج وبدء

ظهور الاستجابة أو بين التعرض للعامل المخرب و ظهور أعراض التخريب.

- **postsphygmic p.** الفترة التالية للنَّبْض. الفترة القصيرة بعد انبساط البطين التي تتلو فترة النبض عندما تنبسط العضلة من دون تغيير طولها.

- **presphygmic p.** الفترة السابقة للنَّبْض. الطور الأول لتقلص البطين عندما تنقلص العضلة من دون تغيير طولها ولكن بزيادة توترها.

- **reaction p. (= reaction time)** دَوْرُ الإِسْتِجَابَةِ. هي الفترة التي تمر بين التنبيه أو الإصابة وبين رد الفعل أو الإِسْتِجَابَةِ لأي منهم.

- **refractory p.** دَوْرُ الحِرَان. فترة زوال استقطاب غشاء الخلية بعد تهيجها ولا تتمكن خلالها العضلة أو العصب من الاستجابة لمنبهات أخرى.

- **relative refractory p.** دَوْرُ الحِرَانِ النِسْبِي. الفترة القصيرة التي تتلو دور الحران المطلق يعود خلالها الاستقطاب تدريجياً لحِدٍ يمكن الليف العصبي أو العضلي من الاستجابة للمنبهات الشديدة ولو بمستوى أضعف من حالة الراحة.

**periodic** دَوْرِي. يعاود بفترات متقطعة ولكنها منتظمة.

**peripheral** مُحِيطِي. ما يقع عند أو بالقرب من المحيط وخارج المركز أو البنية المركزية.

**peripherocentral** مُحِيطِي مَرْكَزِي. محيطي ومركزي.

**periphereceptor** مُسْتَقْبَلَةٌ مُحِيطِيَّة. أي من المستقبلات الموجودة في النهايات المحيطية للعصبونات الحسية والتي تستلم المنبهات.

**peripheromittor** نَهَايَةٌ تَنْبِيهِيَّةٌ مُحِيطِيَّة. نهاية انتهائية توجد بالقرب من مستقبل ليف عضلي أو خلية غدية تقوم بنقل النبضات للليف أو للخلية الغدية وتنبيهها.

**peritonealgia** أَلَمُ الصِّفَاق. ألم في الصفاق.

**personality** شَخْصِيَّة. الطريقة الخاصة المميزة التي يفكر بها الشخص ويشعر ويسلك بها في تصرفاته وهي تشمل المواقف الواعية والقيم والأساليب بالإضافة للمتناقضات دون الواعية والفعالية الدفاعية.

- **affective p. (= cyclothymia)** شَخْصِيَّةٌ عَاطِفِيَّة: شخصية دوروية المزاج.

- **alternating p. (= multiple p.)** شَخْصِيَّةٌ تَنَاقُوبِيَّة.

- **anakastic p. (= obsessive compulsive p.)** شَخْصِيَّةٌ وَسْوَاسِيَّةٌ قَسْرِيَّة.

- **antisocial p.** شخصية مُعَادِيَةٌ للمجتمع؛ شَخْصِيَّةٌ لَا إِجْتِمَاعِيَّة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بسلوك معاد للمجتمع مزمن ومستمر ينتهك المصاب به حقوق الآخرين ويترافق مع ذلك التهور والتركيز على الذات وعدم القدرة على تحمل المسؤولية والملل أو الإخفاق والإشارة والعدوانية والطيش والكذب وعدم التمكن من مواصلة العمل وتعمل المسؤولية في المعاملة أو في تربية الأولاد.

- **asthenic p.** شَخْصِيَّةٌ وَاهِنَةٌ. اضطراب الشخصية الذي يتصف بسرعة التعب والإعياء والضعف وعدم الحماس للعمل أو التلذذ به وفرط الحساسية للكرب الجسدي أو العاطفي.

- **avoidant d.** شَخْصِيَّةٌ إِجْتِنَابِيَّة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بالانزعاج الاجتماعي وفرط الحساسية للانتقاد وتجنب الفعاليات التي تقتضي الاتصال بالآخرين مع القلق والمبالغة في الصعوبات والجبن العام والتلهف للعطف والقبول من الآخرين والخوف من رفضهم له.

- **borderline p.** شَخْصِيَّةٌ حَدِيَّة: شخصية مُبْهَمَةٌ. اضطراب الشخصية الذي يتصف بعدم الاستقرار وسرعة انفعال المزاج واضطراب العلاقات الشخصية مع الذات ومع الآخرين مع أفعال تهوورية وإيذاء للذات وحالات غضب لا يكبت والشعور المزمن بالضجر والفراغ ولوم الذات ومحاولة الانتحار.

- **compulsive p. (= obsessive compulsive p.)** شخصية استحواذية؛ شَخْصِيَّةٌ قَسْرِيَّة.

- **cycloid p. (= cyclothymia)** شَخْصِيَّةٌ دَوْرَوِيَّةُ المِزَاج.

- **cyclothymic p. (= cyclothymia)** شَخْصِيَّةٌ دَوْرَوِيَّةُ المِزَاج.

- **dependent p.** شَخْصِيَّةٌ إِتْكَالِيَّة. اضطراب



الشخصية الذي يتصف بالشعور بالعجز عند الانفراد أو عند ترك المقربين له والشعور بهجرانهم له مع الصعوبة في أخذ القرارات من دون استشارة الآخرين وسماع نصائحهم مع شدة الحساسية للانتقاد والمعارضة.

- double p. (= dual p. = multiple p.)

شخصية إزدواجية.

- epileptoid p. شخصية شبه صرعية. اضطراب انفجاري متقطع.

- explosive p. شخصية انفجارية. اضطراب انفجاري متقطع.

- histrionic p. (= hysterical p.) شخصية متكلفة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بفرط العاطفية والبحث عن اهتمام الآخرين به مع فرط الاهتمام بالمظهر الخارجي والجاذبية الجنسية والانزعاج الشديد من عدم شكر الآخرين له مع سرعة التغير العاطفي وضحالة التعبير عنه.

- hysterical d. (= histrionic p.) شخصية هستيرية.

- inadequate p. شخصية غير كافية. صنف تشخيصي للأشخاص غير الكفويين اجتماعياً وثقافياً وجسدياً وهم غير مشمولين بأي من تصانيف الشخصية الأخرى.

- multiple p. شخصية متعددة. اضطراب نفسي وظيفي يتصف بوجود شخصيتين أو ثلاث أو أكثر في شخصية واحدة ولكل من هذه الشخصيات المتميزة ذاكرته الخاصة وسلوكه الخاص وعلاقاته الاجتماعية الخاصة التي تقرر تصرفاته عند طغيان أي من تلك الشخصيات عليه ويمكن أن يكون الانتقال من إحدى الشخصيات للأخرى مفاجئاً ولا تشعر الشخصية الأساسية بوجود هذه الشخصيات الإضافية المتعددة لديه ولكنه يشعر فقط بوجود فجوات زمنية في حسه العام.

- narcissistic p. شخصية نرجسية. اضطراب الشخصية الذي يتصف بالشعور بالعظمة (في السلوك أو في التخيل) وقلة الاهتمام العاطفي الاجتماعي مع فرط الحساسية لاحكام الآخرين والانفجار معهم والحس بالاهمية وبضرورة الاهتمام به ومواصلة مدحه.

- obsessive p. (= obsessive compulsive p.) شخصية وسواسية قسرية.

- obsessive compulsive p. شخصية وسواسية قسرية. اضطراب الشخصية الذي يتصف بسلوك ضيق وتقليدي جدي وعرفي مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل الدقيقة بالقواعد والاصول والنظم والجدول والقوائم والالاحاح الشديد على تنفيذ الامور بطريقته الخاصة من دون اعتبار لآراء الآخرين مع الإخلاص الشديد للعمل والإنتاج حتى على حساب الإضرار بالعلاقة مع الآخرين بالإضافة إلى التردد في اتخاذ القرارات للخوف من الوقوع بالغلط

- paranoid p. شخصية زورانية. اضطراب الشخصية الذي يؤدي بالمصاب إلى اعتبار الآخرين أعداء له أو منحرفين لا يمكن الثقة بهم مع رد فعل عدواني للفشل أو للحوادث التي يتصورها مهينة له ويرافق ذلك الشك بإخلاص الاصدقاء له وحمل الضغينة ضدهم وحمل كلماتهم البسيطة على محمل السوء وتفسيرها بانها إهانة له.

- passive aggressive p. شخصية عدوانية لا فاعلة. اضطراب الشخصية الذي يتصف بمقاومة المصاب غير المباشرة عند الطلب منه باتباع السلوك المهني الاجتماعي المناسب وغبه ومقاومته لسلطة رؤسائه أو لمطالب الآخرين والتي تظهر على شكل التعويق والتأجيل والعناد والتواني والتناسي وفقد الكفاءة المقصودة.

- psychopathic p. (= antisocial p.) شخصية معتلة نفسياً؛ شخصية لا اجتماعية. شخصية معادية للمجتمع.

- sadistic p. شخصية سادية. اضطراب الشخصية الذي يتصف بنمط سلوكي عدواني وقاسي والخط من قدر الآخرين. ويتلذذ المصاب بتهديد الآخرين وإهانتهم وإكراههم على طاعته مع هيجان المزاج عند النقاش والتلذذ بإيذاء الآخرين وإضرارهم والاعتداء عليهم بالعنف والحساسية المفرطة والسيدة.

- schizoid p. شخصية شبه فصامية. اضطراب الشخصية الذي يتصف بعدم الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية ومع ضيق الخبرات والتعبير العاطفية ويشمل أيضاً ضعف المقدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية والتكبر وعدم الاهتمام بالنقد أو الاطراء أو بمشاعر الآخرين بصورة عامة.

- schizotypal p. شَخْصِيَّةٌ فَصَامِيَّةُ النَّمَطِ.

اضطراب الشخصية الذي يتصف بضعف العلاقات مع الآخرين وغبابة أطوار التفكير والمظهر والسلوك كلاعتمادات الغريبة أو التفكير السحري وقلة الأصدقاء والقلق الاجتماعي والشك والتفكير الزوراني.

- seclusive p., shut-in p. (= schizoid p.)

شَخْصِيَّةٌ شَبَه فَصَامِيَّة.

- self-defeating p. شَخْصِيَّةٌ ذَاتِيَّةُ الْإِخْفَاقِ.

اضطراب الشخصية الذي يتصف بالشعور بالعذاب المستديم وبالانحراف الذي يؤدي به إلى المشاكل والعلاقات الصعبة والفشل في إنجاز المهمات الضرورية للحياة مع الرغبة في الانصراف إلى المبالغة بالتضحية بالذات وعدم المقدرة على التلذذ بمكافآت نجاحه.

- sociopathic P. (= antisocial p.) شَخْصِيَّةٌ لَا إِجْتِمَاعِيَّة.

- split p. شَخْصِيَّةٌ إِزْدَوَاجِيَّة. كان يستعمل

هذا المصطلح للدلالة على مرض الفصام ولكنه يستعمل اليوم للدلالة على الشخصية الازدواجية.

personology عِلْمُ الشَّخْصِيَّة. علم دراسة الشخصية.

pervert مُنْحَرِف؛ ضُلُول. شخص منحرف يمارس أفعالا جنسية غير طبيعية.

pes قَدَم. (ج: أَقْدَام). قدم الساق أو قسم مشابه لها.

- p. abductus قَدَمٌ بَعْدَاء. قدم مشوهة قسمها الأمامي منحرف ويبعدها إلى خارج المحور العمودي للساق.

- p. adductus قَدَمٌ قَرَبَاء. قدم مشوهة قسمها الأمامي منحرف ويقربها إلى داخل المحور العمودي للساق.

- p. anserinus (goose's foot) الْقَدَمُ الْوَرَّيَّة. 1. الضفيرة النكفية للعصب الوجهي 2. المغرز المشترك للامتداد الوترى للعضلات الخياطية والناحلة والوترية النصف.

- p. cavus قَدَمٌ كَهْفِيَّة. زيادة كبيرة في ارتفاع القوس الطولانية للقدم الذي يوجد عند الولادة أو يظهر بعد ذلك بسبب تقفع العضلات أو خلل توازنها.

- p. hippocampi قَدَمُ الْخُصَيْن. تكوين من ارتفاعين أو ثلاثة ارتفاعات على النهاية الرأسية للسطح البطني للحصين.

- p. hippocampi major (= p. hippocampi) قَدَمُ الْخُصَيْنِ الْكَبِيرَةِ.

- p. hippocampi minor (= calcar avis) قَدَمُ الْخُصَيْنِ الصَّغِيرَةِ: مِهْمَازُ الطَّيْرِ.

- p. pedunculi (= crus cerebri) الْقَدَمُ السُّوَيْقِيَّة: سَاقُ الْمَخ.

- p. planovalgus (= p. planus = flatfoot) قَدَمٌ رَحَاء. قدم مشوهة تكون فيها مواضع عظامها بالنسبة لأحدهما للآخر متغيرة مما يؤدي إلى انخفاض أقواس القدم.

- p. pronatus قَدَمٌ كَبَاء. قدم مشوهة تكون الحافة الخارجية لقسمها الأمامي أعلى من حافتها الداخلية.

- p. supinatus قَدَمٌ بَطْحَاء. قدم مشوهة تكون الحافة الداخلية لقسمها الأمامي أعلى من حافتها الخارجية.

- p. valgus (= flatfoot) قَدَمٌ رَحَاء.

- p. varus (= talipes varus) قَدَمٌ فَخْجَاء: حَنْفٌ فَحْجِي.

pessimum تَقْلُصٌ تَلَوِي. تقلص العضلة الضعيف الذي يتلو تقلصها الشديد الذي يتولد استجابة لتنبه جهازها العصبي العضلي بتيار كهربائي عالي الذبذبة.

pethidine hydrochloride (= meperidine hydrochloride)

هَيْدُرُوكُلُورِيدُ الْبِثِيدِين. مخدر موضعي يستعمل بالحقن.

petit mal الصَّرَعُ الصَّغِير. انظر epilepsy.

petropharyngeus الصَخْرِيَّةُ الْبُلْعُومِيَّة. عضلة توجد أحيانا متصلة في السطح السفلي للقسم الصخري من العظم الصدغي وتنغرز في البلعوم.

petrosalpingostaphylinus (= musculus levator veli palatini)

الْعَضَلَةُ الرَّافِعَةُ لِشِرَازِ الْحَنَك.

petrostaphylinus (= musculus

levator veli palatini) الْعَصَلَةُ الرَّافِعَةُ لِشِرَازِ الْحَنَكِ.

phagomania هَوَسُ الْأَكْلِ. الرغبة الجامحة للطعام أو الاهتمام الوسواسي بالأكل.

phagophobia رُهابُ الْأَكْلِ. الخوف بدون سبب من الأكل.

phakoma وَرَمٌ عَدَسِيٌّ. ورم عابي يظهر كافة كيسية عديدة العقد الصفراء تنمو من القرص البصري وتمثل ورم النسيج الدبقي.

phakomatosis مُتَلَاَزِمَةٌ عَدَسِيَّةٌ. مجموعة من العيوب الخلقية الوراثية التي تتولد من نسيج الأديم الظاهر (الجهاز العصبي المركزي والعين والجلد) وتولد أوراماً عابية منتشرة في أنسجة هذه الأعضاء وتتكون عادة من نسيج دبقي ومن أهم ظواهرها ورم ليفي عصبي وتصلب تدرني وتوسع الشعيرات الرنحي وداء هيل - ليندا ومتلازمة شتوركة سوير.

phantasia (= fantasy) الْفُخْيَلَةُ؛ اُخْلَامٌ الْيَقْظَةُ.

phantasm وَهْمٌ؛ خَيَالٌ. انطباع أو صورة ذهنية لا تتولد عن تنبيه حقيقي.

phantasy (= fantasy) تَخَيُّلٌ؛ الْفُخْيَلَةُ؛ اُخْلَامٌ الْيَقْظَةُ.

phantogeusia ذَوْقٌ وَهْمِيٌّ. ذوق شاذ مستمر في الفم وعادة ما يكون ذوقاً معدنياً أو ملحياً ومن دون وجود منبه له.

phantom شَبَحِيٌّ. 1. وهم، خيال. 2. نموذج الجسم أو لجزء منه.

- p. limb طَرَفٌ شَبَحِيٌّ. انظر limb.

pharmacophilia هَوَسُ الْأَدْوِيَةِ. الرغبة الملحة الشاذة في تعاطي الأدوية.

pharmacophobia رُهابُ الْأَدْوِيَةِ. الخوف بدون سبب من تعاطي الأدوية.

pharmacopsychosis ذُهَانٌ الْأَدْوِيَةِ. الذهان الذي يتولد عن تعاطي الكحول أو العقاقير أو السموم.

pharyngism (= pharyngismus)

تَشْنُجُ الْبُلْعُومِ.

pharyngismus تَشْنُجُ الْبُلْعُومِ. تشنج عضلات البلعوم.

pharyngodynia وَجَعُ الْبُلْعُومِ. ألم في البلعوم أو في منطقتة.

pharyngoplegia شَلْلُ الْبُلْعُومِ. شلل عضلات البلعوم.

phemitone فِيمِيتُون. انظر mephobarbital.

phenacemide فِينَاسِيَمِيد. دواء يستعمل في الصرع الحركي النفسي والصرع الكبير والصغير وفي حالات الصرع المختلطة.

phenacetin فِينَاسِيَتِين. دواء مسكن ومضاد للحمى.

phenaglycodol فِينَاغْلِيكُودُول. دواء مهدئ.

phenantoin. mephentyoin انظر

phenazocine hydrobromide

هَيْدُرُوزِيُومِيد فِينَازُوسِين. دواء صناعي مسكن مخدر.

phencyclidine hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيد الْفِينَسِيكْلِيدِين. دواء يستعمل كمسكن ومخدر.

phenelzine sulfale سَلَفَاتُ الْفِينِلَزِين. دواء يعطى عن طريق الفم كمضاد للكآبة.

phengophobia (= photophobia) رُهابُ الضَّوءِ.

phenmetrazine hydrochloride

هَيْدُرُوكْلُورِيد الْفِينِمَتْرَازِين. دواء منبه للجهاز العصبي المركزي كدواء مقهم فيقلل الشهية للطعام.

phenobarbitone (= phenobarbital)

فِينُوبَارْبِيْتُون.

phenomenon ظَاهِرَةٌ. (ج. ظَوَاهِر). آية علامة أو عرض ظاهر وملاحظ.

- Babinski's p. ظَاهِرَةُ بَابِنْسكي. ثني خلفي

- لإبهام القدم وانثناء أصابعها الأخرى وتباعدها عوضاً عن الشني الأخصي لكل الأصابع عند تنبيه أخمص القدم وهي علامة تلف السبيل القشري النخاعي.
- **cheek p.** **ظاهرةُ الخدّ.** عند ضغط الخدين تحت الناتئ الوجني في حالات التهاب السحايا ينتفض الذراعان للأعلى مع انثناء المرفقين.
- **cogwheel p.** **ظاهرةُ الدوّلاب المُسنّن.** عند تمديد عضلة مفرطة التوتر بصورة لا فاعلة فإنها تقاوم التمديد بطريقة نفضية ارتجاجية غير منتظمة.
- **finger p.** **ظاهرةُ الأصابع.** انبساط كل أصابع اليد أو الإبهام والسبابة عند الضغط على العظم الحمصي الشكل في الشلل الشقي (الفالج).
- **Grasset's p.** **ظاهرةُ غراسيت.** عدم استطاعة المريض رفع ساقيه سوية بالرغم من استطاعته رفع كل واحدة منهما على انفراد ويشاهد ذلك في الشلل الشقي العضوي غير الكامل.
- **Grasset- Gaussel p. (= Grasset's p.)** **ظاهرةُ غراسيت.**
- **hip- flexion p.** **ظاهرةُ ثني الورك.** في حالات الشلل السفلي عندما يحاول المريض الجلوس من وضع الاستلقاء يثني ورك الجهة المشلولة.
- **Hochsinger's p.** **ظاهرةُ هُوخسِنجر.** يؤدي الضغط على الجهة الداخلية للعضلة ذات الرأسين إلى انقباض قبضة اليد في حالة التكرز.
- **Hoffmann's p.** **ظاهرةُ هُوفمان.** زيادة استثارية الأعصاب الحسية للمنبهات الكهربائية وعادة ما يفحص العصب الزندي لقياس ذلك.
- **Hunt's paradoxical p.** **ظاهرةُ هُنْت المُتناقضة.** في حالة خلل التوتر العضلي المشوه عندما يحاول الفاحص ثني القدم بشدة نحو الأخصم يزداد تشنجها الظهري ولكن لو طلب من المريض بسط قدمه فإنه يثنيها نحو الأخصم.
- **Kohnstamm's p. (= aftermovement)** **حركةُ تَلَوّية.** ظاهرة كونستام.
- **Lust's p.** **ظاهرةُ لُسْت.** ثني خلفي وتباعد القدم عند طرق العصب المأبضي الظاهر تحت رأس الشظية مباشرة وهو دلالة على سرعة التشنج.
- **muscle p.** **ظاهرةُ عضليّة.** نزعة العضلة المخططة على التقلص بكتل صلبة عند طرقها.
- **Negro's p. (= cogwheel p.)** **ظاهرةُ الدوّلاب المُسنّن.**
- **Orbelli's p.** **ظاهرةُ أوربيلي.** عندما تتناقص استجابة المستحضر العصبي العضلي للمنبهات بسبب التعب يؤدي تنبيه العصب الودي إلى زيادة شدة تقلص العضلة.
- **paradoxical p. of dystonia (= Hunt's paradoxical p.)** **ظاهرةُ خلل التوتّر المُتناقضة.**
- **peroneal nerve p. (= Lust's p.)** **ظاهرةُ العَصَبِ المَأْبُضِي.**
- **Pool's p.** **ظاهرةُ بُول.** في حالة التكرز تتقلص عضلات الذراع عند رفعه فوق الرأس مع بسط الساعد مما يمدد الضفيرة العضدية ويشاهد ذلك في التكرز التالي للعمليات الجراحية.
- **psi p.** **ظاهرةُ بسي.** ظاهرة نفسية. شعور أو تأثير يتولد من دون أي عامل أو منبه فيزيائي.
- **radial p.** **ظاهرةُ الكَعْبُرِي.** الثني للخلف اللاإرادي للمعصم الذي يحدث عند ثني الأصابع نحو الراحة.
- **rebound p.** **ظاهرةُ الإرتداد.** ظاهرة فقدان التنسيق بين مجموعات العضلات المتضادة في الأطراف في حالة الاضطرابات العيخية ومن الممكن إظهارها بالطلب من المريض بسط ذراعيه أفقياً فعند طرق الفاحص لذراع الشخص السليم بشدة فإنها ترد إلى موضعها رأساً أما في حالة ذراع المريض المصاب فإنها تتأرجح عند طرقها لعدة مرات حول موضعها قبل أن تستقر فيه. كما يمكن إظهار ذلك بوضع مرفق ساعد المريض على المنضدة ويحاول ثنيها ضد مقاومة الفاحص للثني. فإذا ما أوقف الأخير مقاومته لذلك يترد ساعد المريض لصدره بشدة أما ساعد الشخص السليم فلا يثني إلا قليلاً ليعود إلى وضعه الأصلي.
- **release p.** **ظاهرةُ التَحْرِير.** تحرر المراكز السفلية عند إزالة المراكز العلوية المثبطة لها.
- **Schüller's p.** **ظاهرةُ شُولر.** في حالة الشلل الشقي (الفالج) يتمكن المريض من السير إلى الجهة المشلولة أسهل من سيره إلى الجهة المصابة.
- **Sherrington's p.** **ظاهرةُ شِيرينغتون.**

ظاهرة تقلص عضلات الأطراف السفلية عند تنبيه عصب حركي متنكس.

- Sinkler's p. **ظَاهِرَةُ سِنْكَلِرْ**. يؤدي الثني الشديد لإبهام القدم في الطرف المصاب بالشلل التشنجي إلى ثني الركبة والورك.

- Souque's p. **ظَاهِرَةُ سُوْكَزْ**. ظاهرة تشاهد في الشلل الشقي غير التام وهي بسط الأصابع وانفصالها لا إرادياً عند رفع الذراع، وتسمى أيضاً ظاهرة الأصابع.

- staircase p. (= treppe) **ظَاهِرَةُ السُّلَمِ**. ظاهرة الزيادة التدريجية في درجة التقلص العضلي بعد تنبيهها المتتالي السريع.

- Strümpell p. **ظَاهِرَةُ شْتْرُومْبِلْ**. الثني الخلفي وبسط القدم عند ثني الساق الممدودة بوجه المقاومة التي يضعها الفاحص ضدها.

- toe p. (= Babinski's reflex) **ظَاهِرَةُ إِبْهَامِ الْقَدَمِ**. منعكس بابنسكي.

- tongue p. **ظَاهِرَةُ اللِّسَانِ**. تقلص اللسان وظهور حفر عميقة فيه عنه النفخ عليه ويشاهد في حالات التكرز.

- Trousseau's p. **ظَاهِرَةُ تْرُوسُو**. التقلص التشنجي للعضلات عند الضغط على الأعصاب التي تغذيها.

- Wedensky's p. **ظَاهِرَةُ وِيدَنْسْكِي**. عند وضع سلسلة من المنبهات السريعة على العصب تتقلص العضلة بسرعة استجابة للمنبه الأول ومن ثم تتوقف عن الاستجابة ولكن لو وضعت المنبهات بسرعة أبطأ لاستجابات العضلة لها كلها وباستمرار.

**النَمَطُ الظَّاهِرِيُّ**. التكوين الفيزيائي **phenotype** والكيميائي الحيوي والفيزيولوجي للشخص والذي يتعين وراثياً وبيئياً.

#### phenoxybenzamine hydrochloride

**هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الْفِينُوكْسِي بَنْزَامِينِ**. دواء محصر للمفعول الأدريناليني الفعّل ألفا ويستعمل كمضاد لارتفاع ضغط الدم.

**phensuximide** **فِنْسُكْسِيمِيد**. دواء يستعمل في علاج الصرع الصغير ويعطى عن طريق الفم.

**phenylketonuria (PKU)** **بَيْلَةُ الْفَنِيلِ**

كيتون. داء وراثي ينتج عن اختلال استقلاب الفنيل كيتون ويتصف بالتخلف العقلي وفرط الحركة والصرع بالإضافة إلى أعراض عامة أخرى.

#### phenylramidol hydrochloride

**هَيْدُرُوكْلُورِيدُ الْفِينِيرَامِيدُولِ**. دواء مسكن ومرح للعضلات الهيكلية.

**phenytoin** **فِينَيْتُونِ**. دواء مضاد للاختلاج يستعمل في معالجة كل أنواع الصرع ما عدا الصرع الصغير وكذلك كمضاد لاختلال نظم القلب.

**phetharbital** **فَيْتَارْبَيْتَالْ**. باريبوتورات غير منوم يستعمل في معالجة الاختلاج.

**phlebalgia** **أَلَمٌ وَرِيدِيّ**. ألم يتولد عن دوال على سطح العصب أو في داخله.

**phlebanesthesia (= phlebonarcosis)** **تَخْدِيرٌ وَرِيدِيّ**. تخدير يولد بالحقن داخل الوريد.

**phobia** **رُهَابٌ**. خوف شديد ودائم ومن دون سبب من شيء معين أو من فعالية أو حالة معينة وقد يدرك المصاب نفسه أن خوفه مبالغ فيه وغير منطقي. وعندما يكون الرهاب سبباً للضائقة أو يتعارض مع فعاليات الشخص الاجتماعية فإنه يعتبر نوعاً من الاختلال العقلي. ويصنف الرهاب إلى رهاب الساح والرهابات الاجتماعية والرهابات البسيطة.

**simple p.** **رُهَابٌ بَسِيطٌ**. اختلال رهابي لا يشمل رهاب الأفراد أو الوجود في المحلات العامة (رهاب الساح) أو الخوف من الإحراج في المواقف الاجتماعية (الرهاب الاجتماعي) وأنواع الرهاب البسيط الشائعة هي رهاب الحيوانات خصوصاً الكلاب والأفاعي والحشرات والفئران أو رهاب الانفلاق أو رهاب المرتفعات.

**social p.** **رُهَابٌ أَجْتِمَاعِيّ**. الرهاب الذي يشمل تجنب المجتمعات لأن المصاب يخاف من التعرض للمواقف المحرجة كالإذلال أو الإهانة كما يشمل الخوف من التحدث في الاجتماعات أو التمثيل فيها أو الأكل في المحلات العامة أو استعمال المرافق الصحية العامة.

**phobic** **رُهَابِيّ**. ذو طبيعة رهابية أو منسوب للرهاب.

**phobophobia** **رُهَابُ الرُّهَابِ**. تخوف الشخص من الإصابة بالرهاب.

**phonasthenia** وَهْنُ الصَّوْتِ. ضعف الصوت أو صعوبته بسبب التعب.

**phonation** تَصَوُّيْت. إخراج الأصوات.

**phonophobia** رُهابُ الأصوات. الخوف الشاذ من سماع الأصوات أو من الكلام بصوت عالٍ.

**photalgia** أَلَمٌ ضَوْئِيٌّ. ألم العين عند تعرضها للضوء.

**photaugiaphobia** رُهابُ الوُهيَج. الخوف الشديد من وهيج الضوء.

**photodynia (= photalgia)** أَلَمٌ ضَوْئِيٌّ.

**photoperceptive** مُدْرِكٌ لِلضَّوْءِ. يتمكن من إدراك الضوء.

**photophobia** رُهابُ الضَّوْءِ. عدم تحمل العين الشاذ للضوء.

**photoreception** اسْتِقْبَالُ الضَّوْءِ. عملية التحسس للموجات الضوئية التي تتراوح أطوال موجاتها بين 370 و 760 نانومتراً وهي طيف الضوء المرئي.

**photoreceptor** مُسْتَقْبِلَةٌ ضَوْئِيَّةٌ. عضو انتهائي عصبي أو مستقبل حساسة للضوء.

**phrenalgia** أَلَمُ الحِجَابِ. ألم الحجاب الحاجز.

**phrenemphraxis (= phrenicotripsy)** هَزْسُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ.

**phrenetic (= 1. maniacal 2. maniac)** 1. هَوَسِيٌّ 2. مَهْوُوسٌ.

**phrenic** 1. حِجَابِيٌّ 2. عَقْلِيٌّ. 1. نسبة للحجاب الحاجز 2. نسبة للعقل.

**phrenicectomy (= phreniconeurectomy)** قَطْعُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ.

**phreniclasia (= phreniclasia)** هَزْسُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ. هرس العصب الحجابي بملقاط.

**phrenicoexairesis** قَلْعُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ.

**phrenicoexeresis** قَلْعُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ.

**phreniconeurectomy** قَطْعُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ.

قَطْعُ كل أو جزء من العصب الحجابي.

**phrenicotomy** قَطْعُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ.

**phrenicotripsy** هَزْسُ العَصَبِ الحِجَابِيِّ. عملية هرس العصب الحجابي.

**phrenodynia** أَلَمُ الحِجَابِ. ألم الحجاب الحاجز.

**phrenology** فِرَاسَةُ الدِّمَاغِ. علم دراسة أخلاق الشخص وقابلياته العقلية من خلال دراسة شكل جمجمته.

**phrenoplegia** شَلْلُ الحِجَابِ. شلل الحجاب الحاجز.

**phronema** القَشْرَةُ العَقْلِيَّةُ؛ المَذهَبُ. قسم قشرة الدماغ الذي تحتله المراكز الفكرية والارتباطية للمخ.

**physocephaly** تَفَاخُ الرُّأْسِ. تورم نفاخي بالرأس.

**physostigmine** فِيرُوسْتِغْمِين. قلواني كوليني الفعل له نشاط مضاد للكولينستراز ويستعمل موضعياً لتضييق حدقة العين ولإنقاص ضغط داخل العين في الزرق كما يستعمل داخل الجسم للتأثيرات التي تحدثها الجرعات المفرطة من الأدوية المضادة للفعل الكوليني.

**p-salicylate** سَالِيسِيْلَاتُ الفِيرُوسْتِغْمِين. ملح ساليسيلات الفيزوستغمين وله نفس تأثير الفيزوستغمين.

**p-sulfate** سُلْفَاتُ الفِيرُوسْتِغْمِين. ملح سلفات الفيزوستغمين وله تأثير الفيزوستغمين نفسه.

**pia** 1. لَيِّنٌ؛ رَخْوٌ؛ رَقِيقٌ 2. الأُمُ الحَنُونُ.

**p. mater** الأمُ الحَنُونُ. انظر pia mater.

**pia-arachnitis (= leptomeningitis)** الْتِهَابُ الحَنُونِ والعَنْكَبُوتِيَّةِ.

**pia-arachnoid (= leptomeninges)** الحَنُونُ والعَنْكَبُوتِيَّةُ. الأم الحنون والعنكبوتية وتعتبران معاً كوحدة وظيفية واحدة.

**pia-glia** الحَنُونُ الدِّبْقِيَّةُ. غشاء يتكون من اندماج الأم الحنون والدبقية الهامشية ويكونان إحدى طبقات الحنون العنكبوتية.

**pial** حَنُونٌ. نسبة إلى الأم الحنون.

**pia mater** الأُمُ الحَنُونُ. الغشاء الداخلي للأغشية الثلاثة (السحايا) التي تغطي الدماغ والنخاع والذي يغلفهما جيداً ويمتد إلى أعماق شقوقهما وأتلامهما ويتكون من الياف شبكية ومرنة وكلاجينية.

**p. m. encephali** الأُمُ الحَنُونُ الدِّمَاغِيَّة. الأم الحنون التي تغطي الدماغ وهي طبقة رقيقة على قشرة المخ واسمك من تلك التي تغطي جذع الدماغ وتتشعب أوعية الدماغ الدموية في داخلها والتي تدخل الدماغ لمسافة قصيرة مغطاة بطبقة من الحنون الدماغية.

**p. m. spinalis** الأُمُ الحَنُونُ النُّخَاعِيَّة. الأم الحنون التي تغطي النخاع الشوكي وتتكون من ألياف كولاجينية وهي تكون الرباط المسنن والألياف الشبكية التي تغلف النخاع وتكون مختلف الحواجز وأغلفة الجذور العصبية.

**piamatral (= pial)** حَنُونِي.

**piarachnitis (= pia-arachnitis)** الِتهَابُ الحَنُونِ والعَنَكَبُوتِيَّة.

**piarachnoid (= pia-arachnoid)** الحَنُونِ العَنَكَبُوتِيَّة.

**pica** وَحْمٌ؛ قَطَا؛ شَذُوذُ الشَّهِيَّة. أكل المواد غير المغذية الإجباري كالطين والأصباغ والثلج والجبس والشعر ونشاء الغسيل وهي ممارسة شاذة عند بعض الحوامل أو في المرضى المعوزين للزئبق أو للحديد.

**picrotoxin** بِكْرُوتُوكْسِين. مادة منبهة لكل أقسام الجهاز العصبي المركزي لأنها تحصر الدفوعات العصبية المثبطة قبل التشابكية. وقد استعملت كمادة منبهة مركزية وتنفسية في علاج تسمم الجهاز العصبي المركزي بالمواد المخدرة خصوصاً مواد الباربيتورات التي تدخل عن طريق الوريد.

**piesesthesia** حِسُّ الضَّغْط. حس منبهات الضغط.

**piesimeter** مِقْيَاسُ حِسِّ الضَّغْط. مقياس حس الضغط في الجلد.

**piezesthesia (= piesesthesia)** حِسُّ الضَّغْط.

**piezometer** 1. مِقْيَاسُ حِسِّ الضَّغْط

2. مِقْيَاسُ الضَّغْطِ الحَاجَاجِي. 1. مقياس حس الضغط. 2. مقياس الضغط داخل الحجاج.

**pilocarpine** بِيلُوكَرْبين. قلواني محاكي الكولين له تأثيرات مسكارينية الفعل فهو يضيق حدقة العين عند استعماله موضعياً مع ارتفاع عابر ثم انخفاض دائم للضغط داخل العين ويستعمل في علاج الزرق.

**p. hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد البِيلُوكَرْبين. له نفس خواص البيلوكربين.

**p. nitrate** نَيْتْرَاتُ البِيلُوكَرْبين. له نفس خواص البيلوكربين.

**pilomotor** مُقَفَّةُ الشَّعْرِ. العضلات الصغيرة التي يؤدي تقلصها إلى انتصاب الشعر وإلى «جلد الوز».

**pineal** صَنْوَبَرِي. نسبة إلى الجسم الصنوبري أو صنوبري الشكل.

**pinelectomy** إِسْتِئْصَالُ الصَّنُوبَرِيَّة؛ استئصال الجسم الصنوبري.

**pinealism** الحَالَةُ الصَّنُوبَرِيَّة. حالة اختلال إفرازات الجسم الصنوبري.

**pinealoblastoma** وَرَمٌ أرومي صَنْوَبَرِي. ورم صنوبري ولكن خلاياه الصنوبرية غير متميزة جيداً.

**pinealocytoma, pinealoma** وَرَمٌ صَنْوَبَرِي. ورم الصنوبرية.

**pinealopathy** إِغْتِلَالُ الصَّنُوبَرِيَّة. أي مرض يصيب الغدة الصنوبرية.

**pineoblastoma** وَرَمٌ أرومي صَنْوَبَرِي.

**pineocytoma** وَرَمٌ صَنْوَبَرِي.

**piperacetazine** بِيْرَاسِيَتَازِين. دواء مُضَادُّ لِلدَّهَانِ يستعمل في علاج الأنواع المتعددة من الفصام في البالغين ويدخل عن طريق الفم.

**piperidolate hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد البِيْرِيدُوليت. دواء مضاد للفعل الكولينيني يقلل من حركة العضلات الملساء وخصوصاً تلك التي في الجهاز المعدي المعوي

ويستعمل كدواء مضاد للتشنج في هذا الجهاز ويعطى عن طريق الفم.

### **piperocaine hydrochloride**

هيدروكلوريد البيروكائين. دواء يستعمل كبنج موضعي أو نخاعي أو ذنب.

### **piperoxan hydrochloride**

هيدروكلوريد البيروكسان. مادة محصرة لادرينالين الفأ. ويستعمل قبل العمليات وأثناءها لمقاومة تأثير الأدرينالين الذي يفرز أثناء العملية.

### **pipoxalan hydrochloride**

الببوكسالان. دواء يستعمل كمرخ للعضلات.

### **pipradrol hydrochloride**

هيدروكلوريد البيرادرول. دواء يستعمل كمضاد للاكتئاب ويستعمل عن طريق الفم.

### **pirandamine hydrochloride**

هيدروكلوريد البيرندامين. دواء يستعمل كمضاد للاكتئاب.

### **pituicyte**

خلية نخامية. أي من الخلايا المغزلية الشكل والسائدة في النخامية العصبية والمنتشرة بين الألياف العصبية والتي تعتبر خلايا دبقية عصبية متخصصة.

### **pituitarism**

الحالة النخامية. اضطراب وظائف الغدة النخامية.

### **pituitarium (= pituitary)**

النخامية 1. نخامي. 2. الغدة النخامية 2. منسوب للغدة النخامية.

### **- anterior p.**

النخامية الأمامية. الفص الأمامي للغدة النخامية وهو النخامية الغدية أو مستحضر من هذا الفص للغدة.

### **- pharyngeal p.**

النخامية البلعومية. مجموعة صغيرة متبقية من النسيج الغدي للنخامية الغدية توجد في السمحاق المخاطي لسقف البلعوم الأنفي وتتطور من كيس رائكة في الجنين.

### **- posterior p.**

النخامية الخلفية. الفص الخلفي للغدة النخامية وهي النخامية العصبية كما أنه يستحضر من هذا الفص بعد تجفيفه ويستعمل كمضاد للتبول في البوالة التقهة أو لتنبية العضلات الملساء خصوصاً في الرحم عند نزفه.

### **pituitectomy (= hypophysectomy)**

استئصال النخامية.

### **placebo**

غفل. علاج بدواء تمثيلي كاذب ليس له أية فعالية دوائية لمرض الشخص أو لشكواه يعطى لمجرد أغراض نفسية فيزيولوجية.

### **plagiocephaly**

رأس وارب؛ دنح. رأس ملتف وغير متناظر يتولد عن عدم انتظام انسداد الدروز القحفية.

### **plantar**

أخمص. نسبة للأخمص.

### **plaque**

لويحة. (ج. لويحات). أية لطفة أو منطقة مسطحة.

### **- attachment p's.**

لويحات الارتكاز. مناطق صغيرة كثيفة في غمد الليف العضلي ترتكز عليها الخيوط العضلية.

### **- fibromyelinic p's.**

لويحات ليفية مياينية. مناطق في القشرة المخيخية المصابة بالنخر التصلبي الشراييني غير الكامل تظهر فيها لويحات من الألياف العصبية المغلفة المفرطة النمو.

### **- Lichtheim p's.**

لويحات ليختايم. مناطق تنكس في المادة البيضاء للمخ تشاهد في فقر الدم الوبيل.

### **- Redlich - Fisher miliary p's.**

لويحات ريدليخ - فيشر الدخنية. مناطق متتخنة غامقة اللون في الشبكة الدبقية للمخ تشاهد في دهانات الشيوخ.

### **- senile p's.**

لويحات الشيخوخة. آفات مجهرية مكونة من شدة مقطعة من نهايات المحاور والتغصينات العصبية تشاهد في قشرة المخ في الشيوخ في داء الزهايمر.

### **platybasia (= basilar impression)**

تفلطح القاعدة؛ تسطح القاعدة. تشوه خلقي في العظم القذالي والنهاية العلوية للفقار الرقبي الذي يدفع قاعدة القذالي للأعلى ويعطيها شكل الصفيحة.

### **platycephalic**

عريض الرأس. ذو رأس عريض يكون فيه معامل العرض للطول أقل من 70.

### **platycrania**

تسطيح القحف. تسطح القحف صناعياً.

### **pleocytosis**

كثرة خلايا السائل الدماغي النخاعي. وجود عدد من الخلايا في السائل الدماغي النخاعي أكثر من العدد السوي.



**pleonexia** هَوَسُ التَّمَلُّكِ: الجَشَعُ. الطمع  
والرغبة المفرطة في التملك والحصول على الثروة.

**pleurodynia** وَجَعُ الجَنْبَةِ. ألم انتبائي  
في العضلات الوربية بسبب الروماتزم العضلي أو  
تهيج سطح الجنبَةِ.

**plexal** ضَفِيرِيّ. نسبة للضفيرة.

**plexalgia** أَلَمُ ضَفِيرِيّ. ألم يسبب آفة  
ضفيرة.

**plexectomy** إِسْتِنْصَالُ الضَّفِيرَةِ. قطع  
الضفيرة وإزالة جزء منها أو كلها.

**plexitis** إِتِهَابُ الضَّفِيرَةِ. التهاب إحدى  
الضفائر العصبية.

**plexopathy** إِعْتِلَالُ الضَّفِيرَةِ. اعتلال  
إحدى الضفائر وخصوصاً العصبية منها.

**- lumbar p.** إِعْتِلَالُ الضَّفِيرَةِ القَطْنِيَّةِ. اعتلال  
عصبي للضفيرة القطنية.

**plexus** ضَفِيرَةٌ. (ج: ضَفَائِرُ). شبكة من  
الأعصاب أو الأوعية اللمفية أو الأوردة.

**- annular p.** الضَّفِيرَةُ الحَلَقِيَّةُ. ضفيرة من  
الألياف العصبية تحيط بحافة القرنية.

**- anserine p. (p. parotidus nervi  
facialis)** الضفيرة الوزية: الضَّفِيرَةُ النَّكَيَّةُ  
لِلْعَصَبِ الوُجْهِيِّ.

**- p. aorticus abdominalis** الضَّفِيرَةُ الأَبْهَرِيَّةُ  
البَطْنِيَّةُ. ضفيرة مفردة غير مزدوجة تتكون من حزم  
الياف عصبية رابطة تتصل من الضفائر البطنية  
المساريقية العلوية وتنزل مع الأبرر حيث تستلم  
فروعاً من الأعصاب المساريقية القطنية لتصبغ  
الضفيرة الخثلية العلوية تحت انشعاب الشريان الأبرر  
وتتوزع فروعها متجاورة مع فروع الشريان المذكور.

**- p. aorticus thoracalis (= p. aorticus  
thoracicus)** الضَّفِيرَةُ الأَبْهَرِيَّةُ الصَّدْرِيَّةُ.

ضفيرة توجد حول الأبرر الصدري تتكون من الياف  
من الجذعين الوديين والعصبيين المبهمين وتتفرع منها  
فروع صغيرة ترافق فروع الأبرر وهي متواصلة عند  
جهتها السفلية مع الضفائر البطنية والأبهرية البطنية.

**- p. arteriae cerebri anterioris** الضَّفِيرَةُ

الشَّرْيَانِيَّةُ المُخَيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. ضفيرة رقيقة من  
الأعصاب الودية تحيط بالشريان المخي الأمامي.

**- p. arteriae cerebri mediae** الضَّفِيرَةُ  
الشَّرْيَانِيَّةُ المُخَيَّةُ المُتَوَسِّطَةُ. ضفيرة رقيقة من  
الأعصاب الودية تحيط بالشريان المخي المتوسط.

**- p. arteriae chorioideae** الضَّفِيرَةُ الشَّرْيَانِيَّةُ  
المَشِيمِيَّةُ. ضفائر دقيقة ترافق الشرايين المشيمية.

**- Auerbach's p. (= p. myentericus)**  
الضَّفِيرَةُ العَضَلِيَّةُ المِعْوِيَّةُ.

**- p. auricularis posterior** الضَّفِيرَةُ الأَذِينِيَّةُ  
الخَلْفِيَّةُ. ضفيرة أعصاب ودية توجد على الشريان  
الأذيني الخلفي.

**- autonomic p's. (= p's. autonomici)**  
الضَفَائِرُ المَسْتَقْلِيَّةُ. شبكة واسعة من الياف وأجسام  
الخلايا العصبية التي تصاحب الجهاز العصبي  
المستقل وتوجد بصورة خاصة في البطن والصدر  
والحوض وتحوي أليافاً ودية ولا ودية وحشوية واردة.

**- basilar p. (= p. basilaris)** الضَّفِيرَةُ القَاعِيَّةُ.  
ضفيرة وريدية توجد في الأم الجافية وتقع على القسم  
القاعدي من العظم القذالي والقسم الخلفي من العظم  
الوتدي وتمتد من الجيب الكهفي حتى الثقب العظمي  
كما أنها تتصل بجميع جيوب الجافية.

**- brachial p. (= p. brachialis)** الضَّفِيرَةُ  
العَضْدِيَّةُ. ضفيرة تتأصل من الفروع البطنية  
للأعصاب النخاعية الرقبية الأربعة الأخيرة ومن معظم  
الفرع البطني للعصب الصدري الأول وهي تقع جزئياً  
في الرقبة وجزئياً في الإبط وتتكون من الفروع  
والجذوع البطنية - القسم فوق الترقوي والمجاور  
للشريان تحت الترقوة والذي يتفرع إلى الأعصاب  
الكتفي الظهرية والصدري الطويل وتحت الترقوي  
والفوق الكتفي. ويتكون القسم تحت الترقوي من  
الفروع التي تقع خلف الترقوة تقريباً ومن الحبال  
والفروع التي توجد في الإبط بجوار الشريان الإبطي  
ويتفرع إلى الأعصاب الصدريين الإنسي والحشي  
والجلدي العضدي الإنسي والجلدي الساعدي الإنسي  
والناصف والزندي والكعبري وتحت الكتفي والصدري  
الظهري والإبطي.

**- cardiac p., deep** الضَّفِيرَةُ القَلْبِيَّةُ العميقة.

قسم الضفيرة القلبية الذي يقع بين القوس الأبهرى وانشعاب الرغامى.

- cardiac p., superficial (= anterior cardiac p.) الضفيرة القلبية السطحية.


قسم الضفيرة القلبية الذي يقع تحت قوس الأبهر وإلى اليمين من الرباط الشرياني.

- p. cardiacus (= cardiac p.) الضفيرة القلبية. الضفيرة حول قاعدة القلب وبصورة خاصة في تامور القلب وهي مكونة من الفروع القلبية للعصب المبهم والجذعين والعقد الودية وتحوي أليافاً حشوية واردة وتتفرع إلى فروع للقوس الأبهر وللأذنين الأيسر واليمين والشريانين التاجيين الأيمن والأيسر.

- p. cardiacus profundus (= deep cardiac p.) الضفيرة القلبية العميقة.

- p. cardiacus superficialis (= superficial cardiac p.) الضفيرة القلبية السطحية.

- p. caroticus communis الضفيرة السباتية الأصلية. ضفيرة عصبية على الشريان السباتي الأصلي تتكون من فروع من الضفيرتين السباتيتين الظاهرة والباطنة ومن العقد الودية الرقبية.



plexus, brachial

الضفيرة العصبية وقطع النخاع الرقبية والصدرية المناظرة لها.

أ - الجزء فوق الترقوة: (1) الجذع العلوي (2) الجذع المتوسط (3) الأقسام الخلفية

ب - الجزء تحت الترقوة: (4) العصب الكعبري (5) العصب العضلي الجذلي (6) العصب الناصف (المتوسط) (7) العصب الزندي (8) الأقسام الأمامية (9) الجذع السفلي (10) العصب الصدري الأول (11) العصب الرقبى الثامن (12) العصب الرقبى السابع (13) الأربطة المسننة (14) العصب الرقبى السادس (15) عصب شوكي (16) العصب الرقبى الخامس (17) العقدة الشوكية (18) الجذر الأمامي (19) الجذر الخلفي.

**- p. caroticus externus** **الضَفِيرَةُ السَّبَاتِيَّةُ الظَّاهِرَةُ.** ضفيرة عصبية تقع حول الشريان السباتي الظاهر تتكون من الأعصاب السباتية الظاهرة من العقد الرقبية العلوية وتغذي اليافاً ودية ترافق فروع الشريان السباتي الظاهر.

**- p. caroticus internus** **الضَفِيرَةُ السَّبَاتِيَّةُ الْبَاطِنَةُ.** ضفيرة عصبية تقع حول الشريان السباتي الباطن تتكون من العصب السباتي الباطن وهي تغذي أعصاباً ودية إلى فروع الشريان السباتي الباطن وإلى الضفيرة الطبلية وإلى أعصاب الجيب الكهفي وبصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى العقد القحفية اللاودية لتمر خلالها.

**- p. cavernosus** **الضَفِيرَةُ الْكَهْفِيَّةُ.** ضفيرة من ألياف عصبية ودية توجد في الجيب الكهفي للآم الجافية.

**- p. cavernosus clitoridis** **الضَفِيرَةُ الْكَهْفِيَّةُ الْبَطْرِيَّةُ.** ضفيرة ألياف عصبية في جذر البظر تتأصل من الضفيرة المثانية وتغذي الجسم الكهفي للبظر.

**- p. cavernosus penis** **الضَفِيرَةُ الْكَهْفِيَّةُ الْقَضِيبِيَّةُ.** ضفيرة عصبية في جذر القضيب تتأصل من الضفيرة المثانية وتغذي الجسم الكهفي للقضيب.

**- celiac p. (= p. celiacus = p. coeliacus)** **الضَفِيرَةُ الْبَطْنِيَّةُ.**

**- cervical p., posterior** **الضَفِيرَةُ الرَّقَبِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ.** ضفيرة عصبية في المنطقة الرقبية الخلفية تتكون من الفروع الظهرية للأعصاب النخاعية الرقبية. الثلاث أو الأربع الأولى.

**- p. cervicalis** **الضَفِيرَةُ الرَّقَبِيَّةُ.** ضفيرة عصبية تتكون من الفروع البطنية للأعصاب الرقبية الأربعة العلوية ومرتبطة على شكل سلسلة عرى غير منتظمة وتعطي فروعاً سطحية (الأعصاب القذالي الصغير والأذني الكبير والرقبي المستعرض والفوق الترقوي) وفروعاً عميقة (الأعصاب الحجاجي والحجاجي الإضافي والعروة الرقبية وأعصاباً عضلية أخرى).

**- cervicobrachialis p.** **الضَفِيرَةُ الرَّقَبِيَّةُ الْعَضْدِيَّةُ.** الضفيرتان الرقبية والعضدية معاً.

**- choroid p.** **الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ.** لفات من الأوعية الدموية للآم الحنون تغطيها طبقة رقيقة من خلايا البطانة العصبية فتولد بروزات عنقودية في

البطينات الثالث والرابع والجانبى للدماغ وهي تفرز السائل الدماغي النخاعي.

**- p. choroideus ventriculi lateralis**

**الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الْجَانِبِيِّ.** وهي لفات وعائية مع طيات من الآم الحنون في القسم المركزي للبطين الجانبى وسقف قرنه الصدغي وهي تولد السائل الدماغي النخاعي.

**- p. choroideus ventriculi quarti** **الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِعِ.** لفات وعائية مع طيات من الآم الحنون في سقف القسم الخلفى من البطين الرابع تمتد إلى الردب الوحشي وخلالها وتولد السائل الدماغي النخاعي.

**- p. choroideus ventriculi terti** **الضَفِيرَةُ الْمَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الثَّلَاثِ.** ضفيرة وعائية مع طيات من الآم الحنون في سقف البطين الثالث تساهم في توليد السائل الدماغي النخاعي.

**- ciliary ganglionic p.** **الضَفِيرَةُ الْعُقْدِيَّةُ الْهَذِيبِيَّةُ.** ضفيرة مستقلة تتكون من العصبين الهدبيين القصير والطويل وتقع على العضلة الهدبية وتغذي العضلتين الموسعة والمضيق للحدقة.


**- coccygeal p. (= p. coccygeus)** **الضَفِيرَةُ الْغُصَصِيَّةُ.** ضفيرة صغيرة تتكون من الفروع البطنية للأعصاب العصبية والعجزى الخامس وتوصيلة من العصب العجزى الرابع وتعطي العصب الشرجى العصبى.

**- p. coeliacus** **الضَفِيرَةُ الْبَطْنِيَّةُ.** قسم الضفيرة أمام الفقرية الواقعة على أمام وجوانب الأبهى عند منابت الجذعين البطنيين والشريانين المساريقي والكليوي وهي تحوي العقدتين البطنيتين المزدوجتين والعقد المساريقية العلوية وكتلة من العقد غير المسماة وترسل فروعاً تمتد مع الشرايين المجاورة وتسمى أيضاً الضفيرة الشمسية.

**- colic p., left** **الضَفِيرَةُ الْقَوْلُونِيَّةُ الْيُسْرَى.** قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي يرافق الشريان القولوني الأيسر.

**- colic p., middle** **الضَفِيرَةُ الْقَوْلُونِيَّةُ الْوَسْطَى.** قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي يرافق الشريان القولوني الوسطى.

- **colic p. right** الضفيرة القولونية اليمنى. قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي يرافق الشريان القولوني الايمن.
- **p. coronarius cordis anterior** الضفيرة التاجية القلبية الأمامية. ضفيرة من اعصاب ودية أمام القلب ومتعلقة بصورة رئيسية مع فروع الشريان التاجي الامامي.
- **p. coronarius cordis posterior** الضفيرة التاجية القلبية الخلفية. ضفيرة اعصاب ودية خلف القلب ومتعلقة بصورة رئيسية مع فروع الشريان التاجي الايمن.
- **crural p. (= p. femoralis)** الضفيرة الفخذية. ضفيرة عصبية بالقرب من المرارة ومتعلقة بالشريان الكيسي.
- **cystic p.** الضفيرة الكيسية. ضفيرة عصبية بالقرب من المرارة ومتعلقة بالشريان الكيسي.
- **deferential p. (= p. deferentialis)** الضفيرة الأسهرية. القسم الثانوي من الضفيرة الختلية السفلية الذي يغذي اليافاً عصبية للقناة الاسهرية.
- **p. dentalis inferior** الضفيرة السننية السفلية. ضفيرة من الياف عصبية من العصب السنخي السفلي تقع حول جذور الاسنان السفلية.
- **p. dentalis superior** الضفيرة السننية العلوية. ضفيرة من الياف عصبية من الاعصاب السنخية العلوية تقع حول جذور الاسنان العلوية.
- **enteric p. (= p. entericus)** الضفيرة المعوية. ضفيرة من الياف عصبية مستقلة داخل جدار الانبوب الهضمي ومكونة من الضفائر تحت المخاطية والعضلية المعوية وتحت المصلية وتحوي أليافاً حشوية وأليافاً ودية بعد العقدية ولا ودية قبل العقدية وبعد العقدية واجسام خلايا لا ودية بعد العقدية.
- **epigastric p. (= p. celiacus)** الضفيرة الشرسوفية. الضفيرة البطنية.
- **esophageal p. (= p. oesophageus)** الضفيرة المريئية.
- **Exner's p. (= molecular p.)** ضفيرة إكسنر. طبقة الياف مماسة لقشرة المخ في طبقة الجزيئية.
- **facial p. (= p. of facial artery)** الضفيرة الوجهية. ضفيرة عصبية على سطح الشريان الوجهي.
- **femoral p. (= p. femoralis)** الضفيرة الفخذية. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الفخذي تشتق من الضفيرة الابهرية عن طريق الضفائر الوركية العامة والخارجية.
- **gastric p's. (= p. gastrici)** الضفائر المعدية. قسم ثانوي من الجزء البطني من الضفائر أمام الفقرية ترافق الشريان المعدي وفروعه وتغذي أليافاً عصبية للمعدة.
- **p. gastricus anterior (= rami gastrici anteriores nervi vagi)** الضفائر المعدية الأمامية. الضفائر المعدية الامامية للعصب المبهم.
- **p. gastricus inferior** الضفيرة المعدية السفلية. ضفيرة من الالياف العصبية على الحنية المعدية الكبرى.
- **p. gastricus posterior (= rami gastrici posteriores nervi vagi)** الضفائر المعدية الخلفية. الضفائر المعدية الخلفية للعصب المبهم.
- **p. gastricus superior** الضفيرة المعدية العلوية. ضفيرة من الالياف العصبية على الحنية المعدية الصغرى.
- **gastroepiglottic p., left** الضفيرة المعدية القزبية اليسرى. ضفيرة عصبية بالقرب من الحنية المعدية الكبرى.
- **hepatic p. (= p. hepaticus)** الضفيرة الكبدية. قسم ثانوي من الضفيرة البطنية يرافق الشريان الكبدى حتى الكبد.
- **p. hypogastricus inferior** الضفيرة الختلية السفلية. ضفيرة عصبية تتكون على جهتي السطح الامامي للقسم السفلي من العجز باتحاد الاعصاب الختلية والحشوية الحوضية وتجهز فروعاً للأعضاء الحوضية.
- **p. hypogastricus superior** الضفيرة الختلية العلوية. الاستمرارية السفلية للضفيرة الابهرية وتقع أمام القسم العلوي من العجز تحت انشعاب الابهر مباشرة وتستلم أليافاً من الاعصاب الحشوية القطنية السفلية وتنقسم إلى العصبين الختلي الايمن والختلي




plexus, esophageal

منظر أمامي لجوف الصدر يبين الضفيرة المرئية والعصبين المبهم الأيمن والأيسر والجذع الودي: (1) الشريان السباتي الأصلي (2) العصب المبهم (العصب القحفي العاشر) (3) العقدة الودية الرقبية المتوسطة (4) العضلة الأخمعية الأمامية (5) العروة تحت الترقوية (6) الشريان تحت الترقوة (7) العقدة الودية الصدرية الثانية (8) العصب المبهم (9) العصب الحنجري الراجع الأيمن (10) الأبرص الصاعد (11) الفروع العصبية للعصب المبهم (12) القصبة الأولية اليمنى (13) الجذع الودي (14) المريء (15) العقد الصدرية الودية (16) العصب الحشوي الكبير (17) العصب الحشوي الصغير (18) الحجاب (19) البواب (20) الإثنا عشري (21) الأبرص البطني (22) العصب تحت العضلي 12 (23) المعدة (24) الضفيرة المعدية (من العصب المبهم) (25) الجزء البطني للمريء (26) فروع عصبية موصلة (بين الجذع الودي والأعصاب الوربية) (27) الضفيرة المرئية للعصبين المبهمين (الأيمن والأيسر) (28) الأبرص الصدري (29) الأعصاب الوربية (30) القصبة الرئيسية اليسرى (31) الفروع القصية للعصب المبهم (32) العصب الحنجري الراجع (الأيمن) (33) الضفيرة القلبية الأبهريّة (34) العصب المبهم (35) العروة تحت الترقوية (36) الشريان تحت الترقوة (37) العصب الحنجري الراجع (الأيسر) (38) العضلة الأخمعية الأمامية (39) الرغامى (40) العقدة الرقبية الصدرية.

- ileocolic p. الضفيرة المعوية القولونية.  
قسم الضفيرة المساريقية العلوية الذي يرافق الشريان المعوي القولوني.
- iliac p. (= p. iliacus) الضفيرة الحرقفية.  
ضفيرة تتأصل بصورة رئيسية من الضفيرة الأبهريّة وترافق الشرايين الحرقفية الأصلية.
- infraorbital p. الضفيرة تحت الحجاجية.  
ضفيرة عصبية تقع بالعمق من العضلة رافعة الجفن العلوي وتتكون من الفروع الشفوية العلوية للعصب تحت الحجاج وفروع من العصب الوجهي.
- intermesenteric p., lumboaortic (= p. aortic abdominalis) الضفيرة القطنية الأبهريّة بين المساريقية: الضفيرة الأبهريّة البطنية.  
الضفيرة بين المساريقية، قسم الضفيرة الأبهريّة الذي يقع بين أصل الشريانين المساريقيين العلوي والسفلي.
- p. intermesentericus الضفيرة بين المساريقية.  
قسم الضفيرة الأبهريّة الذي يقع بين أصل الشريانين المساريقيين العلوي والسفلي.
- intramuscular p. الضفيرة داخل العضل.  
ضفيرة خلايا عصبية مستقلة داخلية واللياف عصبية توجد في جدران الأمعاء والمثانة بصورة تامة وتساهم أو تتحكم في المنعكسات والفعاليات الموضعية لهذه الأعضاء.
- ischiadic p. (= p. sacralis) الضفيرة الأسكية: الضفيرة العجزية.  
الضفيرة الحنجريّة. ضفيرة عصبية على السطح الخارجي للعضلة المضيقية السفلية للبلعوم وهي فرع جانبي للضفيرة البلعومية وتتكون من اللياف من الأعصاب الودية والحنجري الظاهر.
- lingual p. (= p. lingualis) الضفيرة اللسانية.  
ضفيرة عصبية ترافق الشريان اللساني.
- p. lumbalis الضفيرة القطنية. ضفيرة تتكون من الفروع البطنية للأعصاب القطنية 2-5 (وأحياناً فروع من العصب القطني الأول) وتوجد عند العضلة القطنية الكبيرة. ويتصل الفرع السفلي من العصب القطني الرابع مع العصب القطني الخامس ليكونا الجذع القطني العجزي والذي يكون جزءاً من الضفيرة العجزية. أما فروع العصب القطني الأول فهي العصبين الحرقم الأربي والحرقفي الخليلي. أما فروع الضفيرة القطنية الأصلية فهي الأعصاب التناسلي

- الفخذي والجلدي الفخذي الوحشي والسدادي والفخذي.
- p. lumbaris (= p. lumbalis) الضفيرة القطنية.  
الضفيرة القطنية العجزية. الضفيران القطنية والعجزية وتعتبران كضفيرة واحدة لاتصالهما المباشر.
- p. mammarius internus الضفيرة الثديية الباطنة. ضفيرة ترافق الشريان الصدري الباطن وفروعه.
- p. maxillaris externus (= p. of facial artery) الضفيرة الفكّية العلوية الظاهرة.  
الضفيرة الفكّية العلوية الباطنة. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الفكّي العلوي الباطن.
- Meissner's p. (= p. submucosus) الضفيرة تحت المخاطية.  
الضفيرة السحائية. ضفيرة عصبية ترافق الشريان السحائي المتوسط.
- p. meningeus الضفيرة السحائية.  
الضفيرة المساريقية السفلية. قسم ثانوي من الضفيرة الأبهريّة يرافق الشريان المساريقي السفلي.
- p. mesentericus inferior الضفيرة المساريقية العلوية. قسم من الضفيرة البطنية يرافق الشريان المساريقي العلوي.
- p. mesentericus superior الضفيرة المساريقية العلوية. قسم من الضفيرة البطنية يرافق الشريان المساريقي العلوي.
- myenteric p. (= p. myentericus) الضفيرة العضلية المعوية. قسم الضفيرة المعوية الذي يوجد في داخل الغلالة العضلية.
- nasopalatine p. الضفيرة الأنفية الحنكية. ضفيرة عصبية بالقرب من الثقب القاطعية.
- nerve p. ضفيرة عصبية. ضفيرة مكونة من اللياف عصبية متشابكة.
- p. nervorum spinalium ضفيرة عصبية نخاعية. ضفيرة تتكون من تشابك اللياف عصبين نخاعيين أو أكثر مثل الضفيرتين العضدية والقطنية العجزية.
- nervous p. (= nerve p.) ضفيرة عصبية.



الأعصاب والأوعية الدموية لجدار البطن الخلفي والصفيرة القطنية: (1) الشريان الحجابي السفلي (2) العصب الحشوي الكبير (3) الوريد الأجوف السفلي (4) الوريد والشريان الكلويان (5) الوريد والشريان الخصويان (6) العصب تحت الضلعي (الصدري) (7) العصب الحرقفي الخثلي (8) العصب التناسلي الفخذي (9) العصب الحرقفي الأربي (10) العضلة القطنية الكبيرة (11) العصب الفخذي (12) الفرع الفخذي للعصب التناسلي الفخذي (13) القناة الأسهرية (14) الجزء الحوضي للحالب (15) الوريد والشريان العجزيان المتوسطان (16) المستقيم (17) الوريد والشريان الشرسوفيان السفليان (18) الوريد والشريان الحرقفيان (19) الوريد والشريان المنعطفان الحرقفيان (20) الفرع التناسلي للعصب التناسلي الفخذي (21) العصب الفخذي الجلدي الوحشي (22) العضلة البطنية المستعرضة (23) العصب الحرقفي الأربي (24) فروع العصب الفخذي (للمعضلة الحرقفية) (25) الشريان الحرقفي القطني (26) العصب السداي (27) الوريد والشريان الحرقفيان القطنيان (28) الجذع القطني العجزي (29) الشريان القطني الرابع (30) الوريد والشريان الحرقفيان القطنيان (31) الشريان المساريقي السفلي (32) الأيهر البطني (33) الجذع الودي (34) العصب تحت الضلعي (العصب الصدري) (12) (35) العضلة القطنية المربعة (36) الوريد القطني الصاعد الأيسر (37) الجذع البطني (38) الشريان المساريقي العلوي (39) فرجة المريء.

- الضَفِيرَةُ occipital p. (= p. occipitalis)** الضَفِيرَةُ القَذَالِيَّةُ. ضفيرة عصبية ترافق الشريان القذالي.
- الضَفِيرَةُ المريئية p. oesophageus** ضفيرة عصبية تحيط بالمريء وتتكون من فروع من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر والجذعين الوديين كما تحوي أيضاً أعصاباً حشوية وإرادة من المريء وهي تنقسم إلى قسمين أمامي وخلفي.
- الضَفِيرَةُ العينية ophthalmic p. (= p. ophthalmicus)** الضَفِيرَةُ العينية. ضفيرة عصبية ترافق الشريان العيني.
- الضَفِيرَةُ ovarian p. (= p. ovaricus)** الضَفِيرَةُ المَبِيضِيَّةُ. قسم ثانوي من الضفيرة الأبهريّة يرافق الشرايين المبيضة.
- الضَفِيرَةُ pancreatic p. (= p. pancreaticus)** الضَفِيرَةُ البَنُكْرِيَّاسِيَّةُ. قسم ثانوي من الضفيرة البطنية يرافق الشرايين البنكرياسية.
- الضَفِيرَةُ parotid p. of facial nerve (= p. parotideus nervi faialis)** الضَفِيرَةُ النَكَفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيّ. ضفيرة عصبية تتكون من تشابك الفروع الانتهازية من فروع العصب الوجهي الصدغي والوجني والشدقي والفكي السفلي الهامشي وفروعه الرقبية التي تبدأ عند الغدة النكفية.
- الضَفِيرَةُ pelvic p. (= p. hypogastricus inferior)** الضَفِيرَةُ الحَنْثَلِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ. الضفيرة الحوضية.
- الضَفِيرَةُ periarterial p. (= p. periarterialis)** الضَفِيرَةُ حَوْلَ الشَّرْيَانِيَّةِ. شبكة من اليااف عصبية ذاتية وحسية توجد في الغلالة البرانية للشريان وتتبع مساره بغرض الوصول إلى إحدى البنيات أو الأعضاء لتغذيته كما يغذي بعضها الشريان نفسه.
- الضَفِيرَةُ p. pharyngeus ascendens** الضَفِيرَةُ البَلْعُومِيَّةُ الصَّاعِدَةُ. ضفيرة عصبية ترافق الشريان البلعومي الصاعد.
- الضَفِيرَةُ p. pharyngeus nervi vagi** الضَفِيرَةُ البَلْعُومِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيّ. ضفيرة تتكون بصورة رئيسية من فروع من العصبين المبهمين ولكنها تحوي أيضاً أليافاً من العصبين اللسانيين البلعوميين ومن الجذوع الودية وهي تغذي أعصاباً حركية وحسية عامة ومستقلية لبعضلات البلعوم والحفّاف ومخاطبتهما ما عدا العضلة الموترة للحفّاف (شراع الحنك).
- الضَفِيرَةُ phrenic p. (= p. phrenicus)** الضَفِيرَةُ الحِجَابِيَّةُ. ضفيرة عصبية ترافق الشريان الحجابي السفلي إلى الحجاب الحاجز والغدتين الكظريتين.
- الضَفِيرَةُ popliteal p. (= p. popliteus)** الضَفِيرَةُ المَآبِضِيَّةُ. ضفيرة اليااف عصبية ترافق الشريان المآبضي.
- الضَفَائِرُ أمامَ الفَقْرِيَّةِ p. s.** ضفائر أعصاب مستقلة تقع في الصدر والبطن والحوض أمام العمود الفقاري وتتكون من اليااف حشوية وإرادة ومن اليااف لادية قبل العقدية ومن اليااف ودية قبل العقدية وبعد العقدية وعقد تحوي خلايا عصبية عقدية ودية تغطي أليافاً بعد عقدية. وأكبر هذه الضفائر هي القلبية والرئوية والمريئية والبطنية والمسارقية والحنثلية وكلها متعلقة بالأبهر وتغذي أليافها الموجودة في البطن والحوض الأحشاء المجاورة لها بانقسامها إلى فروع ترافق فروع الشريان الأبهر وتسمى باسم هذه الفروع وأحياناً بأسماء الأعضاء التي تغذيها.
- الضَفِيرَةُ البروستاتية p. prostaticus** قسم ثانوي من الضفيرة الحثلية يغذي أليافاً عصبية للبروستاتة والأنسجة المجاورة لها.
- الضَفِيرَةُ الرئوية p. pulmonalis** ضفيرة عصبية تتكون من عدة جذوع من العصب المبهم وتتصل بها عند جذر الرئة فروع من الجذع الودي والضفيرة القلبية وعادة ما تنقسم هذه الضفيرة إلى قسمين أمامي وخلفي تتفرع منهما اليااف ترافق الأوعية الدموية والقصبات إلى الرئتين.
- الضَفِيرَةُ الرئوية p. pulmonalis anterior** الضَفِيرَةُ الرئوية الأمامية. القسم الصغير من الضفيرة الرئوية أمام جذر الرئة والذي يرتبط مع الضفيرة الرئوية الخلفية.
- الضَفِيرَةُ الرئوية p. pulmonalis posterior** الضَفِيرَةُ الرئوية الخَلْفِيَّةُ. القسم الكبير من الضفيرة الرئوية خلف جذر الرئة والذي يرتبط مع الضفيرة الرئوية الأمامية.
- الضَفِيرَةُ البوابية pyloric p.** الضَفِيرَةُ العَصْبِيَّةُ التي تغذي منطقة البواب.
- الضَفِيرَةُ راشكوف p. of Raschkow** ضَفِيرَةُ رَاشْكَو. ضفيرة اليااف عصبية رقيقة تحت الأرومة السنية في الحليمة السنية أثناء تطور العاج.
- الضَفَائِرُ المُسْتَقِيمَةُ p. rectales inferiores** الضَفَائِرُ السُّفْلِيَّةُ. ضفائر ترافق الشريان المستقيمي السفلي



- وتشتق بصورة رئيسية من العصب المستقيمي السفلي.
- **p. rectales medii** **الضَفِيرَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ**  
الْوَسْطِيَّةُ. أقسام ثانوية من الضفيرة الخثلية السفلية بالقرب من المستقيم الذي تغذيه باللياف عصبية.
- **p. rectalis superior** **الضَفِيرَةُ الْمُسْتَقِيمِيَّةُ**  
الْعُلْوِيَّةُ. ضفيرة ترافق الشريان المستقيمي العلوي إلى المستقيم وتشتق من الضفيرتين المساريقيتين السفلية والخثلية السفلية.
- **Remak's p. (= p. submucosus)** **الضَفِيرَةُ**  
**تَحْتَ الْمُخَاطِيَّةِ.**
- **p. renalis** **الضَفِيرَةُ الْكُلَوِيَّةُ.** قسم ثانوي  
من الضفيرة البطنية يرافق الشريان الكلوي.
- **p. sacralis** **الضَفِيرَةُ الْعَجْزِيَّةُ.** ضفيرة  
تتأصل من الفروع البطنية للعصبين النخاعيين القطنيين الأخيرين اللذين يكونان الجذع القطني العجزي ومن الأعصاب العجزية الأربعة. ولهذه الضفيرة التي تقع أمام العضلة الكثيرة الشكل اثنا عشر فرعاً خمسة منها تغذي بنيات حوضية (الأعصاب الكثيرة الشكل لرافعة الشرج والعصعص ولمضيقة الشرج والعصب الفرجي) وسبعة فروع تغذي الآلية والأطراف السفلية (الأعصاب الألوي العلوي والألوي السفلي والفخذي الجلدي الخلفي والجلدي الناقب والعصب الوركي والعصبين المغذيين للعضلتين الرباعية الرؤوس الفخذية والمسدة الباطنة).
- **solar p. (= p. celiacus)** **الضَفِيرَةُ الشَّمْسِيَّةُ؛**  
**الضَفِيرَةُ الْبَطْنِيَّةُ.**
- **spermatic p. (= p. testicularis)** **الضَفِيرَةُ**  
**الْمُنَوِيَّةُ؛ الضَفِيرَةُ الْخُصُونِيَّةُ.**
- **splenic p. (= p. splenicus)** **الضَفِيرَةُ**  
**الطَّحَالِيَّةُ.** قسم ثانوي من الضفيرة البطنية يرافق الشريان الطحالي.
- **stroma p.** **الضَفِيرَةُ السَّدَوِيَّةُ.** ليفات عصبية  
سطحية وعميقة في المادة المخصوصة للقنينة.
- **subclavian p. (= p. subclavius)** **الضَفِيرَةُ**  
**تَحْتَ التَّرَقُوتِيَّةُ.** ضفيرة عصبية ودية على الشريان تحت الترقوي تنبع من العقدة الرقبية الصدرية وتساهم باللياف إلى العصب الحجابي وإلى فروع الشريان تحت الترقوي تمر لتتواصل إلى الشريان الإبطي.
- **p. submucosus (= submucous p.)**  
**الضَفِيرَةُ تَحْتَ الْمُخَاطِيَّةِ.** قسم الضفيرة المعوية الذي يوجد في تحت المخاطية.
- **subsartorial p.** **الضَفِيرَةُ تَحْتَ الْخِيَاطِيَّةِ.**  
ضفيرة عصبية للعضلة الخياطية تتكون من الاتصالات بين فروع العصب الفخذي الجلدي الإنسي والعصبين الصافن والسداداي.
- **subserosal p. (= p. subserosus)** **الضَفِيرَةُ**  
**تَحْتَ الْمَصْلِيَّةِ.** قسم الضفيرة المعوية التي تقع تحت السطح المصلي للغلالة المصلية.
- **subtrapezius p.** **الضَفِيرَةُ تَحْتَ شِبْهِ الْمُخَاحِرْفَةِ.**  
ضفيرة صغيرة تقع تحت العضلة شبه المنحرفة تتكون من اتصالات بين فروع العصب الإضافي والأعصاب الرقبية.
- **suprarenal p. (= p. suprarenalis)**  
**الضَفِيرَةُ الْكَظَرِيَّةُ.** قسم ثانوي من الضفيرة البطنية بجوار الغدة الكظرية التي يغذيها باللياف عصبية.
- **p. sympathici (= p. autonomici)** **الضَفِيرَةُ**  
**الْوَدِّيَّةُ.** الضفيرة المستقلة.
- **p. temporalis superficialis** **الضَفِيرَةُ**  
**الضُدْعِيَّةُ السُّطْحِيَّةُ.** ضفيرة ألياف عصبية ترافق الشريان الصدغي السطحي.
- **testicular p. (= p. testicularis)** **الضَفِيرَةُ**  
**الْخُصُونِيَّةُ.** قسم ثانوي من الضفيرة الأبهريّة يرافق الشرايين الخصوية.
- **p. thyroideus inferior** **الضَفِيرَةُ الدَّرَقِيَّةُ**  
**السُّفْلِيَّةُ.** ضفيرة عصبية ترافق الشريان الدرقي السفلي إلى الحنجرة والبلعوم ومنطقة الدرقية.
- **p. thyroideus superior** **الضَفِيرَةُ الدَّرَقِيَّةُ**  
**الْعُلْوِيَّةُ.** ضفيرة عصبية ترافق الشريان الدرقي العلوي إلى الحنجرة والبلعوم ومنطقة الدرقية.
- **tonsillar p.** **الضَفِيرَةُ الْوَزْنِيَّةُ.** ضفيرة حول  
اللوزة تتكون من الاتصال بين العصبين الحنكيين الوسطي والخلفي وبين الفروع اللوزية للعصب اللساني البلعومي وتجهز أليافاً إلى اللوزة والحنك الرخو ومنطقة الحلق.
- **tympanic p. (= p. tympanicus)** **الضَفِيرَةُ**  
**الطَّبْلِيَّةُ.** ضفيرة عصبية على طنف الأذن الوسطى تتكون من العصبين الطبلي والسباتي الطبلي وتعطي

العصب الصخري الصغير وفرع العصب الصخري الكبير واليااف حسية للغشاء المخاطي للتجويف الطبلي والقناة السمعية والخلايا الخشائية الهوائية.

- ureteric p. الضْفِيرَةُ الحَالِبِيَّةُ. ضفيرة تغذي الحالب - مشتقة من الضفيرتين الكلوية والختلية.
- uterine p. الضْفِيرَةُ الرَّجْمِيَّةُ. قسم من الضفيرة الرحمية المهبلية التي تعطي اليافاً إلى عنق الرحم وإلى قسمه السفلي.

- uterovaginal p. (= p. uterovaginalis) الضْفِيرَةُ الرَّجْمِيَّةُ المَهْبِلِيَّةُ. قسم ثانوي من الضفيرة الختلية السفلية يغذي اليافاً عصبية للرحم والأنسجة الناعطة للدمليز.

- vaginal p. الضْفِيرَةُ المَهْبِلِيَّةُ. قسم الضفيرة الرحمية المهبلية الذي يعطي اليافاً عصبية لجدار المهبل.

- vertebral p. (= p. vertebralis) الضْفِيرَةُ الفَقَارِيَّةُ. ضفيرة عصبية ترافق العصب الفقاري وتتكون من اليااف من العقد الفقارية والرقبية الصدرية وتحمل اليافاً ودية إلى الحفرة القحفية الخلفية خلال الاعصاب القحفية.

- vesical p. (= p. vesicalis) الضْفِيرَةُ المَثَانِيَّةُ. قسم ثانوي من الضفيرة الختلية السفلية يغذي اليافاً ودية إلى المثانة وإلى الحالب والقناة الاسهرية والحوصلة المنوية.

- Vidian p. (= nervus canalis pterygoidei) ضْفِيرَةُ فيديان. عصب القناة الجناحية.

- visceral p's. (= p. viscerales = p. autonomici) الضَفَائِرُ الحَشَوِيَّةُ. الضفائر المستقلة.

- p. viscerales et vasculares الضَفَائِرُ الحَشَوِيَّةُ والوعائِيَّةُ. ضفائر عصبية محيطية تغذي الاحشاء والوعية باليااف عصبية.

فَتْحَةٌ. (ج: فَتْحَاتٌ). مصطلح عام لطية أو حرف كطية في الصفاق أو في اي غشاء آخر.

1. فَتْقٌ رِثْوِيٌّ 2. قَبْلَةُ هَوَائِيَّةُ. pneumatocele
1. بروز فَتْقِي للنسيج الرثوي خلال شق خلفي في الصدر 2. كيسة في الرئة ممتلئة بالهواء كالتني

تتولد في التهاب الرئة بالمكورات العنقودية 3. ورم أو كيسة تحوي غازات خصوصاً تلك التي تتولد في الصفن.

- p. cranii (= extracranial p.) قَبْلَةُ هَوَائِيَّةُ. أورام غازية تتولد تحت فروة الرأس بعد كسور القحف التي تتصل بالجيوب مجاورة الأنفية.

- Intracranial p. (= pneumocephalus) قَبْلَةُ هَوَائِيَّةُ قَحْفِيَّةُ.

pneumatocephalus (= pneumocephalus) إِسْتِرَوَاحُ الرَّأْسِ؛ قَبْلَةُ غَازِيَّةُ قَحْفِيَّةُ.

pneumatorrhachis قَبْلَةُ غَازِيَّةُ فَقَارِيَّةُ. وجود الهواء أو بعض الغازات في القناة الفقرية.

pneumencephalography (= pneumoen- cephalography) تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِيّ: تصوير الدماغ المحقون بالغاز.

pneumoangiogram صُورَةُ الأَوْعِيَّةِ الغَازِيَّةِ. صورة شعاعية هوائية للدماغ وأوعيته الدماغ تؤخذ بصورة مشتركة.

pneumoangiography تَصْوِيرُ الأَوْعِيَّةِ الغَازِيّ. التصوير الشعاعي للأوعية الدموية للرئة.

pneumocephalus إِسْتِرَوَاحُ القَحْفِ. وجود الهواء في داخل تجويف القحف.

pneumocrania (= pneumocephalus) إِسْتِرَوَاحُ القَحْفِ.

pneumoencephalogram صُورَةُ الدِّمَاغِ الغَازِيَّةِ. الصورة التي يحصل عليها بالتصوير الغازي للدماغ.

pneumoencephalography تصوير الدماغ المحقون بالغاز؛ تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِيّ. التصوير الشعاعي للبنيات الدماغية التي تحوي سائله بعد سحب السائل الدماغى الشوكي بصورة متقطعة بطريقة البزل النخاعي وتعويضه بالهواء أو الاكسجين أو الهليوم.

pneumoencephalomyelogram صُورَةُ الدِّمَاغِ والنَّخَاعِ الغَازِيَّةِ. الصورة التي يحصل عليها بالتصوير الغازي للدماغ والنخاع.

**pneumoencephalomyelography**

تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ الغَازِي. التصوير الشعاعي للدماغ والنخاع بعد بزل السائل الدماغي النخاعي وتعويضه بالهواء أو الأكسجين أو الهليوم.

**pneumoencephalos**

إِسْتِرَوَاحُ القَحْف. وجود الهواء أو الغاز داخل تجويف القحف.

**pneumography**

تَصْوِيرٌ غَازِي. تصوير أحد أقسام الجسم بعد حقن أحد الغازات فيه.

**- cerebral p.**

تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِي. تصوير الدماغ بعد حقن أحد الغازات لداخله.

**pneumomyelography**

تَصْوِيرُ النُّخَاعِ الغَازِي. التصوير الشعاعي للنخاع الشوكي بعد سحب السائل الدماغي النخاعي منه وحقن أحد الغازات إلى القناة النخاعية.

**pneumoventriculi**

إِسْتِرَوَاحُ البُطِينَات. وجود الهواء في بطينات الدماغ.

**pneumoventriculography**

تَصْوِيرُ البُطِينَاتِ الغَازِي. تصوير بطينات الدماغ بعد حقن الهواء أو أحد الغازات إلى داخلها.

**podalgia**

أَلَمُ القَدَم. ألم في القدم بسبب الروماتزم أو النقرس مثلاً.

**poikilothermic**

مُتَغَيِّرُ الحَرَارَةِ. حيوان تتغير درجة حرارة جسمه بتغير درجة حرارة محيطه.

**poikilothermy**

تَغْيِيرُ الحَرَارَةِ. تغير درجة حرارة جسم الحيوان بتغير درجة حرارة المحيط مع قدرته على التكيف لذلك.

**poikilothymia (= cyclothymia)**

تَغْيِيرُ المَزَاج؛ دَوْرِيَّةُ المَزَاج. حالة نفسية تتصف باختلافات المزاج الشادة.

**poliencephalitis**

(= polioencephalitis) إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ.

**poliencephalomyelitis (= polioencephalomyelitis)**

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ.

**polio (= poliomyelitis)**

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ.

**polioclastic**

مُخَرَّبُ السِّنْجَابِيَّة. مدمر المادة السنجابية للجهاز العصبي ويستعمل المصطلح للتعبير عن الفيروسات المخربة للمادة السنجابية والمولدة لالتهاب سنجابية النخاع أو التهاب الدماغ الوبائي أو داء الكلب.

**poliodystrophia (= poliodystrophy)**

حَثَلُ السِّنْجَابِيَّة.

**- p. cerebri**

حَثَلُ سِنْجَابِيَّةِ الدِّمَاغ. مرض نادر يصيب الأطفال الصغار ويتصف بتتكس عصبيات قشرة الدماغ ومواقع أخرى منه ويترافق مع تردد نفسي متروق واضطرابات حركية والموت المبكر.

**poliodystrophy**

حَثَلُ السِّنْجَابِيَّة. ضمور المادة السنجابية للدماغ.

**polioencephalitis**

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغ. التهاب المادة السنجابية للدماغ.

**- p. acuta infantum**

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ الحَاد. التهاب حاد لسنجابية الدماغ في الأطفال دون سن السادسة يتصف بالحمى والقيء والاختلاج وعادة ما ينتهي بالشلل الدائم للأطراف التي تصاب أيضاً بالاختلاجات.

**- acute bulbar p. (= acute bulbar**

paralysis) التهاب سنجابية الدماغ البصلي الحاد؛ شَلْلٌ بَصْلِيٌّ حَاد.

**- acute superior hemorrhagic p.**

التهاب سنجابية الدماغ النزفي العلوي الحاد؛ إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ فَرْنِيكِي. انظر Wernicke's encephalopathy.

**- inferior p. (= bulbar paralysis)**

التهاب سنجابية الدماغ السفلي؛ شَلْلٌ بَصْلِيٌّ

**- posterior p.**

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ الخَلْفِي. التهاب المادة السنجابية للقسم الخلفي من البطين الرابع.

**- superior hemorrhagic p. (= Wernicke's**

encephalopathy) إغْتِلَالٌ دِمَاعِيٌّ فَرْنِيكِي.

**polioencephalomyelitis**

إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والسَّحَايَا. التهاب يصيب سنجابية الدماغ والنخاع والسحايا التي تحيط بهما.

**polioencephalomyelitis** **التهَابُ**

**سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ.** التهاب يصيب المادة السنجابية للنخاع والدماغ.

**polioencephalopathy** **اِغْتِلَالُ سِنْجَابِيَّةِ**

**الدِّمَاغِ.** أي مرض يصيب سنجابية الدماغ.

**polioencephalotropic** **مَوْجِهٌ لِسِنْجَابِيَّةِ**

**الدِّمَاغِ؛** الِثْفُ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ. ما له ألفة خاصة بسنجابية الدماغ.

**poliomyelencephalitis**

**التهَابُ (= polioencephalomyelitis)**

**سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ.** التهاب سنجابيتي الدماغ والنخاع.

**poliomyeliticidal** **مُبِيدُ فَيْرُوسِ التَّهَابِ**

**سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاعِ.** أي عامل أو مادة تبيد الفيروس المسبب لالتهاب سنجابية النخاع.

**poliomyelitis (= infantile parafysis)**

**شللُ الأطفال؛** التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ. داء فيروسي حاد يحدث بصورة فردية أو وبائية ويتصف بالحمى والتهاب الحلق والصداع والقيء وغالباً مع تيبس الرقبة والظهر وهذه أعراض الالتهاب الصغير، أما في حالة التهاب سنجابية النخاع الكبير فإنه يشمل إصابة الجهاز العصبي المركزي مع تيبس الرقبة وكثرة خلايا السائل الدماغي الشوكي وأحياناً مع الشلل وقد يتلو ذلك ضمور مجموعات من العضلات الذي يؤدي إلى تقلصها الدائم وتشوهها.

**- acute anterior p. (= poliomyelitis)**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الأمامي الحاد؛** شلل الأطفال.

**- acute lateral p. (= spinal paralytic p.)**

**التهاب سنجابية الدماغ الوحشي الحاد؛** التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الشَّلَلِي.

**- anterior p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الأمامية.**

**- ascending p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الصَّاعِد.** التهاب سنجابية النخاع الذي يؤدي إلى الشلل الذي يبدأ أولاً في الساق ثم يصعد تدريجياً باتجاه الرأس.

**- bulbar p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ البَصَلَةِ.** نوع شديد من التهاب السنجابية الذي يمتد إلى النخاع

المستطيل (البصلة) والذي يتصف بخلل وظائف البلع والتنفس والدوران.

**- cerebral p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ الدِّمَاغِ.** التهاب السنجابية الذي يمتد إلى سنجابية الدماغ وخصوصاً جذع الدماغ وقشرة المخ الحركية.

**- endemic p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الْمُتَوَطَّن.** حالات فردية من التهاب سنجابية النخاع أو مجموعات صغيرة خاصة أثناء فصول السنة الحارة في العديد من البلدان في العالم.

**- epidemic p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الْوَبَائِي.** التهاب سنجابية الدماغ الذي يظهر بصورة مرض وبائي.

**- post-inoculation p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ التَّالِي لِلْقَاحِ.** التهاب سنجابية النخاع الذي يظهر بعد حوالي ثلاثة أسابيع من التلقيح ببعض أنواع اللقاح.

**- post-tonsillectomy p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ التَّالِي لِاسْتِئْصَالِ اللُّوزَتَيْنِ.** التهاب السنجابية الذي يظهر بعد فترة قصيرة من استئصال اللوزتين.

**- postvaccinal p. (= post-inoculation p.)**

**التَّهَابُ السِنْجَابِيَّةُ التَّالِي لِلْقَاحِ.**

**- spinal paralytic p.**

**التَّهَابُ سِنْجَابِيَّةُ النُّخَاعِ الشَّلَلِي.** النوع الشائع من التهاب سنجابية النخاع الامامية الذي يظهر فيه الشلل الرخو عادة لأحد الأطراف أو لأكثر من ذلك.

**poliomyeloencephalitis**

**التهَاب (= polioencephalomyelitis)**

سنجابية النخاع والدماغ.

**poliomyelopathy** **اِغْتِلَالُ سِنْجَابِيَّةِ**

**النُّخَاعِ.** أي مرض يصيب سنجابية النخاع.

**polioneuromere** **قُسَمٌ عَصَبِيٌّ سِنْجَابِيٌّ؛**

**قُسَمٌ سِنْجَابِيٌّ نَخَاعِيٌّ.** أحد القسمات الابتدائية للمادة السنجابية للنخاع الشوكي.

**poliovirus** **الْفَيْرُوسَةُ السِنْجَابِيَّةُ.**

الفيروس المولد لالتهاب السنجابية.

**polus (= pole)** **قُطْبُ.** (ج: أَقْطَابُ).

أي من نهايتي المحور أو العضو.

- p. anterior bulbi oculi القُطْبُ الأَمَامِي  
للمُعَقَّة. مركز المنحنى الأمامي لمقلة العين.

- p. frontalis hemispherii cerebri القُطْبُ  
الأَمَامِي لِنِصْفِ كُرَةِ المُخ. الجزء الأكثر بروزاً من  
النهاية الأمامية لنصف كرة المخ.

- p. occipitalis hemispherii cerebri القُطْبُ  
القُدَالِي لِنِصْفِ كُرَةِ المُخ. الجزء الأكثر بروزاً للنهاية  
الخلفية للفص القذالي لنصف كرة المخ.

- p. posterior bulbi oculi القُطْبُ الخَلْفِي للمُعَقَّة.  
مركز المنحنى الخلفي لمقلة العين.

- p. temporalis hemispherii cerebri القُطْبُ  
الصُدْغِي لِنِصْفِ كُرَةِ المُخ. النهاية الأمامية البارزة  
للفص الصدغي للدماغ.

polyalgia تَعَدُّدُ التَّأَلُم. شعور المريض  
بعده وخزات في وقت واحد عند وخزه لمرة واحدة  
فقط.

polydipsia العُطَاش. العطاش الشديد  
المزمن كالذي يحصل في الداء السكري أو البوالة  
التفهة.

polydysspondylism تَشَوُّهُ الْفِقْرَات  
المُتَعَدِّد. تشوه عدة فقرات مترافق مع القزامة  
ونقص الذكاء وتشوه السرج التركي.

polyesthesia تَعَدُّدُ التَّحَسُّس. حس  
المريض بعدة إحساسات في عدة مواضع من  
جسمه لمنبه واحد ينبه موضعاً واحداً منه.

polyesthetic مُتَعَدِّدُ الْإِحْسَاسَات. ما ينبه  
عدة حواس أو يولد عدة إحساسات.

polygyria كَثْرَةُ التَّلَافِيف. وجود تلافيف  
دماغية أكثر من العدد السوي.

polymicrogyria كَثْرَةُ التَّلَافِيف الصَّغِيرَةِ.  
تشوه في الدماغ يتصف بتكون الكثير من التلافيف  
الصغيرة فيه.

polymyalgia أَلَمُ العَضَلَات. ألم عضلي  
يصيب عدة عضلات مرة واحدة.

- p. arteritica (= p. rheumatica) أَلَمُ  
العَضَلَاتِ الشَّرْيَانِي. ألم العضلات الروماتزمي.

- p. rheumatica أَلَمُ العَضَلَاتِ الرُّوماتَزْمِي.

الدانية والعضلات مع ارتفاع سرعة تثقل الكريات  
الحمر وعادة ما يترافق مع التهاب الشريان الصدغي  
وغالباً ما يتحدد المرض ذاتياً.

polymyoclonus رَعَاشُ  
عضلي دقيق.

polymyopathy اِعْتِلَالُ العَضَلَات. اعتلال  
عدة عضلات في وقت واحد.

polymyositis اِلْتِهَابُ العَضَلَات. داء  
التهابي مترقّ مزمن يصيب العضلات الهيكلية في  
الأطفال والبالغين ويتصف بضعف متناظر في  
أحزمة الأطراف والرقبة والبلعوم ويترافق عادة مع  
الآلم أو الإيلام وقد يسبق أو يتلو مظاهر شبيهة  
بتصلب الجلد أو التهاب المفاصل أو الذأبة الحمامية  
الجهازية أو متلازمة جوغرن. كما أنه يترافق أحياناً  
مع الخباثة أو مع آفات جلدية مميزة أخرى.

التهاب trichinous p. (= trichinosis)  
العضلات بالشعريينات: داء الشَّعْرِيَّات.

polyneurual مُتَعَدِّدُ التَّغَصُّيب. ما يغذى  
بعدد من الأعصاب.

polyneuralgia أَلَمُ الْأَعْصَاب. آلام عصبية  
لعدة أعصاب.

polyneuritis اِلْتِهَابُ الْأَعْصَاب. التهاب  
العديد من الأعصاب في وقت واحد أو التهاب  
الأعصاب المتعدد أو المنتشر.

- acute febrile p. اِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الحُمُوي  
الحَاد. شلل العصبون الحركي المساعد السريع  
المترقى المجهول السببيات وعادة ما يتلو الالتهاب  
المعوي أو التنفسي، وهو يبدأ بمذل القدم الذي يتلو  
شلل رخو وضعف الساقين ثم يترقى إلى الذراعين  
والجذع والوجه مع حمى بسيطة وشلل بصلي وفقدان  
أو قلة المنعكسات الوترية وزيادة بروتين السائل  
الدماغي النخاعي من دون زيادة خلاياه.

- acute idiopathic p. (= acute febrile p.)  
اِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ الحَادِ المَجهُولِ السَّبَب. التهاب  
الأعصاب الحموي الحاد.

- acute infective p. (= acute febrile p.)  
اِلْتِهَابُ الْأَعْصَابِ العدواني الحَاد. التهاب الأعصاب

- **acute postinfectious p. (acute febrile)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ التَّالِي لِلْعُدْوَى الْحَاد. التهاب  
الأعصاب العدواني الحاد.

- **anemic p.** التهاب الأعصاب بفقر الدم. التهاب  
الأعصاب الذي يشاهد في التنكس المشترك دون الحاد  
للنخاع الشوكي الذي يحدث في فقر الدم الوبيل.

- **p. cerebri meningiformis** التهاب  
الأعصاب المُخَيَّة الشَّيْبَة بالتهاب السَّحَايَا. أعراض  
تهيج الأعصاب القوقعية والدَهْلِيْزِيَّة والوجهية وثلاثي  
التوائم التي تحدث في الدور الأولي للزهرى.

- **endemic p. (= p. endemica = beri beri)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْمُتَوَطَّن. بري بري.

- **Guillain-Barré p. (= acute febrile p.)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْحُمُويِّ الْحَاد.

- **postinfectious p. (= acute febrile p.)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ التَّالِي لِلْعُدْوَى الْحَاد.

- **p. potatorum (= alcoholic neuropathy)**  
إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ كُحُولِيٍّ.

**polyneuromyositis** التهاب الأعصاب  
وَالْعَضَلَات. التهاب العضلات والأعصاب المحيطية  
مع فقدان المنعكسات والإحساسات مع المذل.

**polyneuropathy** إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ. داء  
يصيب عدة أعصاب في وقت واحد وقد يكون  
مرضاً جهازياً سميّاً أو استقلابياً أو غير معروف  
السببيات وقد يكون داءً مزيلاً لنخاعين الألياف  
العصبية.

- **acromegalic p.** إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ المرافق  
لضخامة النهايات. التهاب الأعصاب غير المصحوب  
بالأعراض أو المصحوب بها أو الأعراض الذي يرافق  
ضخامة النهايات والتي يمكن أن تسبب انحباس  
الأعصاب مثل اعتلال الأعصاب الانحباسي لذنب الفرس  
أو للعصب الناصف الذي يسبب متلازمة النفق  
الرسغي.

- **acute febrile p. (= Guillain-Barré syndrome)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْحُمُويِّ الْحَاد. متلازمة  
غيان باريه، وهي داء شلل العصبون الحركي  
الصاعد المتروقي السريع المجهول السبب والذي يتلو  
غالباً عدوى الجهاز التنفسي أو المعوي، وهو يبدأ بمذل  
القدمين ويتلو ذلك شلل الساقين الرخو وضعفهما

والذي يصعد تدريجياً إلى الذراعين والجذع والوجه مع  
حمى بسيطة ومن ثم شلل بصلي وفقدان أو ضعف  
المنعكسات الوترية وزيادة بروتين السائل الدماغي  
النخاعي مع عدم الزيادة المناسبة لكريات الدم البيضاء  
فيه.

- **acute idiopathic p. (= Guillain-Barré syndrome)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْحَادِ المجهول  
السبب.

- **acute infective p. (= Guillain-Barré syndrome)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ العدواني الْحَاد.

- **acute postinfectious p. (= guillain-Barré syndrome)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ التَّالِي لِلْعُدْوَى الْحَاد.

- **alcoholic p. (= alcoholic neuropathy)**  
إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ كُحُولِيٍّ.

- **amyloid p. (= amyloid neuropathy)**  
إِغْتِلَالُ عَصَبِيٍّ نَشَوَانِيٍّ. اعتلال عصبي يتصف  
بترسب النشاء (الداء النشواني) في الأعصاب  
المحيطة.

- **anemic p.** إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ بفقر الدم. اعتلال  
الأعصاب الذي يشاهد في التنكس المشترك دون الحاد  
للنخاع الشوكي في فقر الدم الخبيث.

- **buckthorn p.** إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ النَّبَقِيٍّ.  
اعتلال الأعصاب الذي يتولد أحياناً عن أكل النبق  
المسهل الذي يحوي مادة الكينون السام.

- **carcinomatous p.** إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ  
السرطاني. اعتلال الأعصاب الذي يترافق مع  
الإصابات السرطانية وقد ينتج عن ارتشاح الأعصاب  
الطرفية بالسرطان وغالباً ما يكون بصورة اعتلال  
عصبي حسي حركي و يترافق مع اعتلال عضلي.

- **cranial p. (= cranial polyneuritis)**  
إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْقَحْفِيَّة.

- **diabetic p.** إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ السُّكْرِيِّ. اعتلال  
الأعصاب الذي يصيب مرضى السكري، وهناك أربعة  
أنواع منه أحدها استقلابي السبب يصيب المرضى  
الأحداث ومتوسطي العمر وهو اعتلال حسي حركي.  
ويصيب النوع الثاني مرضى السكر المسنين ويتصف  
بالآلم وفقدان الحس وانعدام المنعكسات خصوصاً في  
الأطراف السفلية الذي يتولد عن إقفارها وقد يشابه  
التابس الظهري حيث لا تستجيب الحدقتان للضوء.

وفي النوع الثالث يحدث اعتلال في أعصاب محيطية متفرقة (خصوصاً في العصب محرك العين وفي العصب الفخذي) ويحدث ذلك بسبب الإقفار كما يحصل في الضمور العضلي. أما النوع الرابع فهو اعتلال الأعصاب المستقلة السكري كما يحصل في الضفائر العصبية المستقلة الباطنة.

- erythredema p.

وَجَعُ النِّهَائِيَاتِ.

انظر acrodynia.

- familial recurrent p. إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْعَائِلِيّ. نوع انتكاسي غير شائع من اعتلال الأعصاب المزمل للميالين الذي يصيب أكثر من عضو واحد في العائلة.

- Isoniazid p. إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْإيزُونِيَاذِي. اعتلال عصبي حسي حركي يصيب المحاور وينتج عن نقص البيريدوكسين (فيتامين B<sub>6</sub>) في مرضى السل الذين يعالجون بالايزوتيازيد.

- lead p. إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرَّصَاصِيّ. اعتلال الأعصاب الذي يتولد في التسمم المزمن بالرصاص وقد يكون اعتلالاً حسياً حركياً متناظراً في الجهتين وغالباً ما يكون متوضعاً مع ضعف موضعي وقليل من فقدان الحس مع تدلي الإصبع أو الترسخ.

- paraneoplastic p. (= carcinomatous p.) إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ السَّرَطَانِيّ.

- recurrent p. (= relapsing p.) إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرَّاجِعِ.

- relapsing p. إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الرَّاجِعِ. نوع من اعتلال الأعصاب دون الحاد المزمل للميالين الذي تحدث فيها الهدأت والنكسات بصورة تلقائية. وقد تحدث النكسة أثناء الحمل وغالباً ما ترافقها ضخامة الأعصاب الطرفية.

- uremic p. إِغْتِلَالُ الْأَعْصَابِ الْيُورِيمِيّ. اعتلال أعصاب حسي حركي محوري يحدث في المرضى المصابين بفشل كلوي مزمن وقد يتحسن بعد دialis الكلية أو بعد غرس كلية للمريض.

polyneuroradiculitis إِتِهَابُ الْجُذُورِ وَالْأَعْصَابِ. إِتِهَابُ الْعَقْدِ النَّخَاعِيَةِ الشَّوْكِيَةِ وَالْجُذُورِ الْعَصْبِيَةِ وَالْأَعْصَابِ الْمَحِيطِيَةِ.

polyphagia (= balimia) نَهَمٌ. فَرَطُ الْأَكْلِ.

polyphobia رُهَابٌ مُتَعَدِّدٌ. الْخَوْفُ مِنْ عِدَّةِ أَشْيَاءٍ أَوْ لَعْدَةِ أَسْبَابٍ.

polyplegia شَلْلٌ مُتَعَدِّدٌ. شَلْلٌ عِدَّةِ أَقْسَامٍ أَوْ عِدَّةِ أَعْضَاءٍ مِنَ الْجِسْمِ.

polyradiculitis إِتِهَابُ الْجُذُورِ. إِتِهَابُ عِدَّةِ جُذُورٍ عَصْبِيَةٍ.

polyradiculoneuritis إِتِهَابُ الْجُذُورِ وَالْأَعْصَابِ وَالنَّخَاعِ. إِتِهَابُ الْأَعْصَابِ الْمَحِيطِيَةِ وَجُذُورِهَا وَالنَّخَاعِ الشَّوْكِي.

polyradiculoneuropathy (= Guillain-Barré syndrome) إِغْتِلَالُ الْجُذُورِ وَالْأَعْصَابِ وَالنَّخَاعِ.

polysensitivity تَعَدُّدُ التَّحَسُّسِ. التَّحَسُّسُ لِلْعِدِيدِ مِنَ الْمُنْبَهَاتِ الْمَتَبَايِنَةِ.

polysensory مُتَعَدِّدُ التَّحَسُّسِ. الْمَقْدَرَةُ عَلَى الْاسْتِجَابَةِ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُنْبَهَاتِ، وَيُقَالُ ذَلِكَ عَنْ عَصَبُونَاتٍ قَشْرَةِ الْمَخِ أَوْ مَا تَحْتَهَا.

polysynaptic عَزِيدُ التَّشَابِكَاتِ. سَبِيلٌ عَصْبِيٌّ عَزِيدُ التَّشَابِكَاتِ وَهُوَ عَزِيدُ الْعَصَبُونَاتِ أَيْضاً.

ponograph مِخْطَاطُ الْأَلَمِ. جِهَازٌ لِقِيَاسِ وَتَسْجِيلِ شِدَّةِ التَّحَسُّسِ لِلْأَلَمِ.

pons 1. جِسْرٌ. 2. الجِسْرُ. 1. أي جزء من نسيج أو مجموعة أنسجة تربط قسمين من أقسام أحد الأعضاء. 2. قسم الجهاز العصبي المركزي الذي يقع بين النخاع المستطيل والدماغ الوسطي وفي الجهة البطنية للمخيخ ويتكون من الجزئين الظهري والبطني.

- p. cerebelli (= pons) الجِسْرُ.

- p. hepatis جِسْرُ الْكَبِدِ. بروز ليفي يظهر أحياناً يعبر شق الكبد الطولاني.

- p. Tarini (= substantia perforata posterior) جِسْرُ تَارِينِي؛ الْمَادَّةُ الْمُثَقَّبَةُ الْخَلْفِيَّةُ.

pons- oblongata الجِسْرُ وَالْبَصَلَةُ. الجِسْرُ وَالنَّخَاعُ الْمُسْتَطِيلُ (البَصَلَةُ).

pontibrachium (= pedunculus cerebellaris medius) السُّوَيْقَةُ الْمُخَيَّخَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ.

**pontile (= pontine)** جَسْرِيّ. متعلق أو منسوب للجسر.

**pontobulbar** جَسْرِيّ بَصَلِّيّ. منسوب إلى الجسر ومنطقة النخاع المستطيل التي تقع في ظهره أو بما يؤثر فيهما أو أنهما تسيطران على وظائفه.

**pontobulbia (= syringobulbia)** تَكَهَفُ البَصَلَةِ والجَسْرِ.

**pontocerebellar** جَسْرِيّ مُخَيَّخِيّ. منسوب للجسر والمخيخ.

**pontomedullary** جَسْرِيّ بَصَلِّيّ. منسوب للجسر والبصلة (النخاع المستطيل).

**pontomesencephalic** جَسْرِيّ دِمَاقِيّ مَتَوَسِّطِيّ. منسوب للجسر والدماغ المتوسط.

**pontopeduncular** جَسْرِيّ سَوِيْقِيّ. منسوب إلى الجسر والسويقتين المخيئتين أو يؤثر بهما أو يتصل بهما.

**porencephalia** تَكَهَفُ الدِّمَاغِ؛ مَسَامِيَّةُ الدِّمَاغِ. 1. وجود أكياس أو كهوف في قشرة الدماغ تتصل بمسام مع الحيز العنكبوتي. 2. وجود كهوف في الدماغ تولدت خلال الحياة الجنينية أو الطفولة المبكرة قد تتصل بالحيز العنكبوتي بثقوب أو قد لا تتصل به وقد تتولد هذه الكهوف إما بسبب مرضي أو بسبب خلل التطور الجنيني للدماغ.

**porencephalitis** تَكَهَفُ الدِّمَاغِ الالتهابي؛ مَسَامِيَّةُ الدِّمَاغِ الإِلْتِهَابِيَّةِ. تنقب الدماغ وتكهفه الذي يرافق التهاباته.

**porencephaly (= porencephalia)** تَكَهَفُ الدِّمَاغِ؛ مَسَامِيَّةُ الدِّمَاغِ.

**porlomania** هَوَسُ التَّرْخَالِ. الرغبة في السفر التي لا تقاوم.

**porosis** تَكَهَفُ. تكون الكهوف. تَكَهَفُ الدِّمَاغِ. حالة تكون الكهوف داخل الدماغ.

**portio** قِسْم. (ج: أَقْسَام). جزء من عضو أو بنية.

**- p. dura paris septimi (= nervus facialis)** العَصَبُ الوَجْهِيّ.

**- p. intermedia nervi acustici (= nervus intermedius)** العَصَبُ المتوسِّط.

**- p. major nervi trigemini (= radix sensoria nervi trigemini)** القسم الكبير من العصب الثلاثي التوائم؛ الجَذَرُ الجِسْميّ للعَصَبِ الثلاثي التوائم.

**- p. minor nervi trigemini (= radix motoria nervi trigemini)** القسم الصغير من العصب الثلاثي التوائم؛ الجَذَرُ الحَرَكيّ للعَصَبِ الثلاثي التوائم.

**- p. mollis paris septimi (= nervus vestibulo-cochlearis)** العَصَبُ الدِّهْلِيْزِيّ القَوَاقِيّ.

**position** وَضْع؛ وَضْعِيَّة. 1. وضعة الجسم أو الموقف الذي يتخذه المريض الأكثر راحة له. 2. وضعة الجنين في رحم الأم عند الحمل. 3. الوضعة التي يوضع بها المريض عند إجراء أي فحص له أو أية عملية جراحية.

**positrocephalogram** صُورَةُ الدِّمَاغِ البُورْتُرُونِيّ. تصوير يؤخذ بإشعاع البورترونات (الالكترونات الموجبة) من نظائر الزرنيخ التي تحقق في لتعيين مواضع الأورام الدماغية.

**positron** بُورْتُرُون. إلكترون حر موجب الشحنة الكهربائية.

**postbulbar** خَلْفَ البَصَلَةِ. خلف أو تحت النخاع المستطيل (البصلة).

**postcentral** خَلْفَ المَرْكَزِيّ. ما يقع خلف المركز مثل التلفيف خلف المركزي.

**postcentralis** الشَّقُّ خَلْفَ المَرْكَزِيّ. الشق خلف المركزي للمخ.

**postcisterna (= cisterna cerebellomedullaris)** الصِّهْرِيْجُ المَخَيَّخِيّ النَخَاعِيّ البَصَلِّيّ.

**postganglionic** بَعْدَ العُقْدَةِ؛ خَلْفَ العُقْدَةِ. ما يقع بعد العقدة أو خلفها وخاصة الألياف العصبية المستقلة بعد العقدية.

**posthypophysis** النُخَامِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ. القسم الخلفي من النخامية.



**postural** وَضْعِي. نسبة إلى وضعية الجسم.  
**posture** وَضْعَة. وضع الجسم.

**potential** 1. كَامِن 2. الجُهد. 1. يوجد في حالة استعداد للعمل أو تمكنه من ذلك ولكنه غير فعال في الوقت الحاضر 2. العمل اللازم لوحدة الشحنة الكهربائية كي تحرك جسماً مشحوناً من نقطة الأساس في الساحة الكهربائية إلى نقطة أخرى فيها ويقاس فرق الجهد بين نقطتين بالعمل اللازم لتحريك وحدة شحنة موجبة من نقطة لأخرى.

**- action p.** جُهدُ الفِعل. الفعالية الكهربائية التي تتولد في العضلة أو في الليف العصبي أثناء فعاليتها. ومن الممكن إثارة هذه الفعالية بالتنبيه الكهربائي أو الكيميائي أو الآلي أو الحراري وما شاكل ذلك.

**- after p.** الجُهدُ التَلَوِّي. الفترة التي تتلو الجهد المسماري ذات الطورين السالب والموجب.

**- after p., negative** الجُهدُ التَلَوِّي السَّالِب. الفترة التي تتلو الجهد المسماري تنبأطء خلالها عودة جهد الغشاء الهيج إلى مستوى جهد الراحة.

**- after p., positive** الجُهدُ التَلَوِّي المُوجِب. الفترة التي تتلو نهاية الجهد التلوي السالب.

**- bioelectric p.** الجُهدُ الكَهْرَبَائِي الحَيَوِي. الجهد الكهربائي الذي يصاحب كل الفعاليات الكيميائية الحيوية كالذي يظهر في المخطط الكهربائي للقلب أو للدماغ أو للعضل.

**- demarcation p.** جُهدُ التَحْدِيد. فرق الجهد الكهربائي بين نقطة سليمة على طول العضلة أو العصب ونهايتهما المخربة أو المقطوعة.

**- evoked cortical p's.** الجُهوْدُ القَشْرِيَّة المُسْتَنَارَة. التفريغ الكهربائي الذي يشاهد في قشرة المخ عند تنبيه أعضاء الحس أو إحدى النقاط على السبل العصبية الصاعدة إليها.

**- excitatory postsynaptic p.** الجُهدُ الإِسْتِثَارِي بَعْدُ التَّشَابُكِ. النقص العابر في استقطاب غشاء العصبون بعد التشابكي الذي تولده رشقة من الدفعات العصبية في السبل الاستثاري الوارد ويؤدي تراكم هذه الجهود إلى تفريغ العصبون وتوليد النبضة العصبية.

**- generator p. (= receptor p.)** جُهدُ المُولَد. جهد المستقبل. إزالة الاستقطاب الذي يولد في

المستقبل العصبية عند استجابتها للتنبيه بأحد المنبهات النوعية الخاصة بها.

**- inhibitory postsynaptic p.** الجُهدُ التَثْبِيطِي بَعْدُ التَّشَابُكِ. الزيادة العابرة في استقطاب غشاء العصبون بعد التشابكي عند تعرضه لرشقة من النبضات العصبية التي تردده من السبل التثبيطي الوارد والتي تؤدي إلى التقليل من هيوجية العصبون.

**- membrane p.** جُهدُ الغِشَاء. الجهد الكهربائي الذي يوجد على جهتي غشاء الخلية أو عبره.

**- Nernst p.** جُهدُ نَرْنِسْت. الفولتية التي يولدها الانحدار التركيبي لإحدى الشوارد (الأيونات) عبر الغشاء التي تتمكن من النفوذ خلال مساماته بينما لا تتمكن الشوارد متعاكسة الشحنات من النفوذ خلالها.

**- receptor p. (= generator p.)** جُهدُ المُسْتَقْبَلَة.

**- resting p.** جُهدُ الرَّاحَة. فرق الجهد عبر غشاء الخلية في حالة الراحة وهو الفرق بين الجهد في داخل الخلية وخارجها.

**- spike p.** جُهدُ السَّفَاة. التغيير الأولي الكبير في جهد غشاء الخلية الهيج عند استثارته بأحد المنبهات.

**potentiometer** مَقْيَاسُ الجُهد. آلة لقياس الجهد الكهربائي أو الفولتية بصورة دقيقة.



**preanesthesia** مُقَدِّمَةُ التَّخْدِير. تنبج خفيف أو تخدير يولد بإعطاء بعض الأدوية قبل إعطاء المَبْنَج العميق.

1. مُقَدِّمُ التَّخْدِير 2. قَبْلُ التَّخْدِير. 1. دواء يستعمل كمقدمة للتخدير 2. يحدث قبل التخدير.

**precognition** عَرَاة: إِسْتِثْبَاقُ الحَوَاثِث. إدراك مُسَبِّق. إدراك خارج الحس للحوادث المقبلة.

**precoma** مُقَدِّمَاتُ الغَيْبِيَةِ؛ طَلِيقَةُ السُّبَات. حالة عصبية نفسية تسبق السبات كما يحصل في اعتلال الدماغ.

**preconscious** خَارِجُ الوَعْي. قسم الفكر الذي هو خارج حدود الوعي المباشر ولكنه من الممكن تذكره ببذل بعض الجهد.



#### posture

يعاني العمود الفقري عند رفع ثقل عن الأرض بعض الإجهاد ويكون ذلك شديداً عند انثنائه (كما يظهر في الشكل 2) أكثر مما هو عندما يكون مستقيماً (كما هو في 1). ويظهر ذلك جلياً عند النظر في توزيع الضغط على الفقرات. ففي حالة العمود المستقيم يتوزع الضغط بطريقة متجانسة على سطوح الفقرات. أما في حالة العمود المنثني فيتكون ضغط شديد على مقدمة الفقرات بينما يحصل جذب عكسي على جهتها الخلفية مما يسبب أحياناً تخريباً فيها.

**precordialgia** ألم بركي؛ ألم البرك. ألم في الصدر في المنطقة أمام القلبية.

**prefrontal** مُقَدَّمُ الجَبْهِيّ. يقع في القسم الأمامي من الفص الجبهي أو من المنطقة الجبهية.

**preganglionic** قَبْلُ العُقْدَةِ. يقع أمام أو قبل العقدة ويوصف بهذا الليف العصبي الودي قبل العقدي.

**pregenital** قَبْلُ النَّسْلِيّ. المراحل الأولى في التطور النفسي الجنسي (الفموي والشرجي) قبل أن تسيطر الأعضاء التناسلية على السلوك الجنسي للطفل.

**prehypophyseal** نُخَامِيّ أَمَامِيّ. منسوب إلى الفص الأمامي للغدة النخامية.

**prehypophysis** النُخَامِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ. الفص الأمامي للغدة النخامية.

**preictal** مُقَدِّمَةُ السَّكَّةِ. ما يحدث قبل السكّة أو الهجمة، مثلاً قبل نوبة الصرع الحاد.

**prenarcosis** مُقَدِّمَةُ التَّخْدِيرِ. التخدير الذي يولد بإعطاء بعض المخدرات قبل البدء بالتخدير العام أو الموضعي.

**preperception** إدْرَاكٌ مُسَبِّقٌ. التكهن المسبق بالأمور.

**presbycusis (= presbycusis)** صَمَمٌ شَيْخُوخِيّ. صمم إدراكي مترقٍ يصيب الأذنين عند الشيخوخة.

**presbyophrenia (= Wernike's dementia)** خَرَفٌ شَيْخُوخِيّ. خرف شيخوخي يتصف بالنسابة والتخريف والتخليط والتوهان.

**pressoreceptive** حَسَّاسٌ لِلضَّغْطِ. حساس للمنبهات المولدة عن الفعاليات الحركية الوعائية مثل ضغط الدم.

**pressoreceptor** مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْطِ. مستقبلية عصبية، ساسة للضغط المولد عن الفعاليات الحركية الوعائية.

**pressosensitive (= pressoreceptive)** حَسَّاسٌ لِلضَّغْطِ.

**presynaptic** قَبْلُ التَّشَابُكِ. ما يقع قبل العبور التشابكي.

**pretectal** أَمَامُ السَّقْفِ. يقع أمام سقف الدماغ المتوسط.

**priapism** قُسُوح. انتصاب القضيب الشاذ والمستمر من دون أن تصاحبه رغبة جنسية ويصاحبه ألم شديد وإيلام ويشاهد في أمراض وإصابات النخاع الشوكي وقد يتولد عن حصاة المثانة أو إصابات القضيب نفسه.

**principle** 1. مَبْدَأٌ. 2. جَوْهَرٌ. 1. قانون أو أسلوب سلوكي 2. المادة الأساسية التي يعتمد عليها فعل الدواء.

**- pleasure-pain p.** مَبْدَأُ البَهْجَةِ والأَلَمِ. في نظريات التحليل النفسي هي النزعة الولادية لاجتناب الألم والبحث عن البهجة وذلك بالتقليل من التوتر بطريقة مباشرة أو بطريقة إشباع الرغبات.

**- reality p.** مَبْدَأُ الوَاقِعِيَّةِ. في نظرية التحليل النفسي هي الوظائف الغريزية التي تطور متطلبات مبدأ البهجة لإشباع رغبات الحياة الواقعية.

**procaine** بَرُوكَايْنِ. مادة كيميائية تستعمل كمبْنَجٌ موضعي.

**procaine hydrochloride** هِيْدُرُوكْلُورِيْدُ البرُوكَايْنِ. دواء يستعمل كمبْنَجٌ حول الجافية أو محصر للأعصاب المحيطية ومبْنَجٌ نخاعي شوكي.

**process** 1. نَاتِيءٌ. 2. حَدَثٌ. 3. استطالة. 4. طريقة. 1. بارزة من عظم أو من بنية أو عضو 2. عملية أو سلسلة عمليات نوعية تؤدي إلى تحقيق نتيجة معينة.

**- dendritic p.** النَاتِيءُ التَغصُّنِيّ. الفرع المتفرع من العصبون.

**- floccular p. (= flocculus)** النُدْفَةُ.

**proctalgia** أَلَمُ المُسْتَقِيمِ. ألم عصبي في الشرج والقسم السفلي من المستقيم.

**- p. fugax** أَلَمُ المُسْتَقِيمِ العَارِضِ. ألم عارض شديد في المستقيم يوقظ المريض أحياناً من نومه وقد يكون ناتجاً عن تشنج العضلة رافعة الشرج والعضلات العصبية.

**proctodynia** وَجَعُ الشَّرَجِ. ألم في الشرج أو في المنطقة المحيطة به.

**proencephalon (= prosencephalon)** الدِّمَاغُ الْمُقَدَّم.

**progeria** شَيْخَاح. متلازمة وراثية غير مؤكدة تتصف بالشيخوخة المبكرة والشديدة والموت من مرض الشريان التاجي وعادة ما تحدث قبل سن العاشرة.

**progression** تَقَدُّم. الحركة أو السير إلى الامام.

**- backward p.** التَّرَاجُع لِلخَلْف. السير للخلف. حركة تشاهد في بعض الامراض العصبية.

**- cross- legged p.** تَقَدُّمٌ مُتَصَالِبُ السَّاقَيْنِ. سير إلى الامام تدور فيه اصابع القدم للداخل وتقدم القدم امام القدم المعاكسة.

**- metadromic p.** تَقَدُّمٌ هَزَوَلِيّ. أحد عقابيل التهاب الدماغ الوبائي الذي يتصف بعدم مقدرة المريض على السير ولكنه لا يجد صعوبة في الجري إلى الامام.

**progressive** مُتَرَقٍّ؛ تَقَدُّمِيّ. 1. يزداد تدريجياً في الشدة أو الاتساع كان يتطور من السيء إلى الأسوأ 2. يتقدم إلى الامام.

**projection** 1. إِزْتِسَام 2. إسقاط. 1. عملية رسم الانطباعات التي تتولد من تنبيه أعضاء الحس على المواد أو الأشياء التي تولدها بحيث يتمكن الشخص من تعيين مواضعها بدقة. 2. الارتباطات بين قشرة المخ والأعضاء الأخرى من الجهاز العصبي أو أعضاء الحس.

**- eccentric p. (= referred sensation)** إرتسام لا متراكز؛ حسٌ محوّل؛ حسٌ رَجِيع.

**- erroneous p.** إِزْتِسَامٌ وَضْعِيٌّ مَغْلُوط. سوء تعيين موضع الأجسام بسبب ضعف أو شلل عضلات العين.

**- thalamocortical p. (= thalamocortical fibres)** الإسقاطُ المِهَادِيّ القَشْرِيّ.

**prolepsis** تَبْكِيرُ الانتِيَاب. عودة الانتياب وتكرره قبل موعده المتوقع.

**proleptic** مُبَكِّرُ الانتِيَاب. نوبة مرضية معاودة قبل موعدها المتوقع.

**promazine hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد البرُومَازِين. دواء يستعمل كمضاد للذهان ومضاد للقيء ومسكن وكمعزز للبنج ومن الممكن إدخاله عن طريق الفم أو بداخل العضل أو الوريد.

**promethazine hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد البرُوميثَازِين. دواء يستعمل كمضاد للهستامين ومسكن ومضاد للقيء ويستعمل عن طريق الفم أو بداخل العضل أو الوريد.

**prominentia** شَامِخَةٌ. (ج: شَوَامِخ). ناتئ أو تبارز صغير من أحد الأعضاء أو البنيات.

**pronation** الكَبْ؛ الانبطاح. عملية الانكباب أو الاستلقاء بوضع الكب ويطلق عادة على وضع اليد بوضعة الكب مع وضع الوجه للأسفل أو بتدوير الراحة إلى الخلف أو الأسفل وذلك بالتدوير الإنسي للساعد.

**propantheline bromide** بَرُومِيد البرُوبَانْتِيلِين. مادة مضادة للفعل الكولينى وتنشط فرط حركية الجهاز المعدي المعوي وتستعمل في علاج القرحة الهضمية.

**propiomazine hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد البرُوبيومَازِين. دواء مسكن مضاد للقيء.

**propoxycaine hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد البرُوبوكسيكائِين. دواء يستعمل كمسكن للألم.

**proprioception** الحِسُّ العَمِيق. الحس الذي يتولد من الانسجة العميقة من داخل العضل أو أوتارها مثلاً.

**proprioceptive** مُسْتَقْبِلُ حِسِّيٍّ عَمِيق. يستقبل الحس العميق.

**proprioceptor** مُسْتَقْبِلَةُ الحِسِّ العَمِيق. نهاية عصبية حسية توفر المعلومات الخاصة عن حركات الجسم ووضعاته وهي توجد بصورة رئيسية في العضلات والأوتار والتهيه.

**propriospinal** نُخَاعِيَّةٌ عَمِيقَةٌ. وصف للسبل العصبية الصاعدة والنازلة في النخاع الشوكي التي تربط قسيماته العديدة ببعضها البعض.

**proptosis (= exophthalmos)** جُحُوظ.

**propulsion** 1. إندفاع 2. حَبَب. 1. الميل  
للسقوط على الوجه عند السير 2. السير السريع.

**proroxan hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيد  
الْبِرُوزُوكْسَان. دواء مضاد للفعل الأدريناليني.

**prosencephalon** الدُمَاغُ الْمُقَدَّم. قسم  
الدماغ الذي يتطور من الحويصلة الامامية من  
الحويصلات البدائية الثلاث للأنبوب العصبي  
الجنيني والذي ينقسم بعد ذلك إلى الدماغ  
الانتهائي والدماغ البيني.

**prosocele (= prosocoele)** تَجْوِيف  
الدُمَاغُ الْمُقَدَّم.

**prosocoele** تَجْوِيفُ الدُمَاغِ الْمُقَدَّم. التجويف  
الامامي للدماغ وهو التجويف البطني للدماغ  
المقدم.

**prosopagnosia** عَمَةُ الْوُجُوه. نوع من  
العمه البصري يتصف بعدم مقدرة المريض على  
التعرف على أوجه معارفه وحتى على وجهه نفسه  
في المرأة والذي يتسبب عن إصابة الفصين  
القذاليين السفليين الإنسيين على طول الوجهين  
الإنسيين البطينين للفصين الصدغيين.

**prosopalgia (= trigeminal  
neuralgia)** الأَلَمُ الْعَصَبِيُّ الثَّلَاثِي التَّوَاتِم.

**prosophenosia (= prosopagnosia)**  
عَمَةُ الْوُجُوه.

**prosopodiplegia** 1. شَلْلُ الْوَجْهِ وَالطَّرَف  
السُّفْلِي 2. شلل وجهي مزدوج. 1. شلل الوجه  
وأحد الأطراف السفلية. 2. شلل جهتي الوجه.

**prosopodysmorphia** ضُمُورُ الْوَجْهِ الشَّقِي.  
ضمور أحد نصفي الوجه.

**prosoponeuralgia** أَلَمٌ عَصَبِيٌّ وَجْهِي.  
ألم أعصاب الوجه.

**prosopoplegia (= facial paralysis)**  
شَلْلُ الْوَجْهِ.

**prosopoplegic** مَشْلُولُ الْوَجْهِ. مصاب  
بشلل الوجه.

**prosopospasm** تَشَنُّجُ الْوَجْهِ. تشنج  
عضلات الوجه.

**prostaglandin** بَرُوسْتَاغْلَنْدِين. واحد من  
المجموعة الكبيرة من المركبات المشتقة من  
الحموض الدهنية ذات العشرين كربوناً، ولكل واحد  
من هذه المجموعة وظائف وتأثيرات عديدة  
ومتباينة.

**protospasm** التَشَنُّجُ الْأَوَّلِي. تشنج يبدأ في  
منطقة محدودة ثم يمتد إلى النواحي الأخرى من  
الجسم وهو التشنج الأولي البسيط في الصرع  
الجاكسوني.

**protriptyline hydrochloride**  
هِيدُرُوكْلُورِيدُ الْبِرُوتْرِپْتِيلِين. دواء مضاد للكآبة  
ويستعمل عن طريق الفم.

**proximoataxia** رَنَحٌ دَانِي. رنح يصيب  
القسم الداني لأحد الأطراف مثل الساعد أو الذراع  
أو الفخذ أو الساق.

**proximoceptor (= contiguous  
receptor)** مُسْتَقْبَلَةٌ تَلَامُسِيَّة. مُسْتَقْبَلَةٌ  
حسية تستوجب تلامسها مع العامل أو المادة  
المنبهة لها لتولد الاستجابة مثل مستقبلات حَسُّ  
الذوق.

**psalterium (= commissura fornicis)**  
صَوَارُ الْقُبُور.

**pselaphesia (= tactile sense)** حَسُّ  
اللَّمْس.

**psellism (= stuttering)** تَأْتَأَةٌ.

**pseudaphia** خَطْلُ اللَّمْس. خلل في حس  
اللمس.

**pseudesthesia** حَسٌّ كَاذِبٌ. حس وهمي  
يتولد من دون وجود أي منبه خارجي أو حس لا  
يتناسب مع المنبه المولد له.

**pseudoaphasia (= functional  
aphasia)** حُبْسَةٌ وَظِيفِيَّة.

**pseudoapoplexy** سَكَّةٌ كَاذِبَةٌ. حالة  
تشبه السككة ولكن من دون نزف دماغي.

**pseudobulbar** بَصْلِيٌّ كَاذِبٌ. شبيه بالبصلي  
ظاهرياً ولكن في الحقيقة من دون إصابة بصلية.

**pseudocoele (= cavitas septi pellucidi)** جَوْفُ الْحَاجِزِ الشَّفَافِ.

**pseudocephalocele** قَيْلَةٌ دِمَاعِيَّةٌ كَاذِبَةٌ. فَتَقْ دِمَاعِيٌّ غَيْرُ خَلْقِي وَلَكِنَّهُ نَاتِجٌ عَنْ مَرَضٍ أَوْ كَسْرٍ فِي الْقَحْفِ.

**pseudochorea** رَقَصٌ كَاذِبٌ. حَالَةٌ عَدَمٍ تَنَاسِقُ عَامَ كَامِلٍ مَعَ أَعْرَاضٍ تَشَابَهَ أَعْرَاضَ الرَقَصِ.

**pseudochromesthesia** حِسٌّ لَوْنِيٌّ كَاذِبٌ. نَوْعٌ مِنَ الْحِسِّ الْمَشْتَرَكِ تُولَدُ فِيهِ بَعْضُ الْأَصْوَاتِ حَسًّا بِبَعْضِ الْأَلْوَانِ.

**pseudoclaudication** عَرَجٌ كَاذِبٌ. عَرَجٌ مُتَقَطِعٌ يَنْتِجُ عَنْ انْضِغَاطِ ذَنْبِ الْفَرَسِ.

**pseudoclonus** رَمَعٌ كَاذِبٌ. اسْتِجَابَةٌ رَمَعِيَّةٌ قَصِيرَةُ الْأَمَدِ.

**pseudocoele (= pseudocoele)** جَوْفُ الْحَاجِزِ الشَّفَافِ.

**pseudodementia** خَرَفٌ كَاذِبٌ. 1. اضْطِرَابٌ يَشَبُهَ الْخَرَفَ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ مَرَضٍ دِمَاعِيٍّ عَضْوِيٍّ وَمِنْ الْمُمْكِنِ مَعَالَجَتُهُ وَشَفَاؤُهُ 2. خُمُولٌ شَدِيدٌ وَعَدَمُ الْاهْتِمَامِ بِالْمَحِيطِ وَحَوَادِثُهُ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ أَيِّ مَرَضٍ عَقْلِيٍّ.

**- hysterical p.** خَرَفٌ هِسْتِيرِيٌّ كَاذِبٌ. حَالَةٌ تَتَصَفُّ بِشَلَلِ الذَّاكِرَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَقْدَرَةِ عَلَى الْإِجَابَةِ حَتَّى عَنْ الْأَسْئَلَةِ الْبَسِيطَةِ مَعَ حَالَةٍ تَشَابَهَ الْحَالَةَ النَّفْسِيَّةَ وَسُلُوكَ شَاذٍ وَنَوْبَاتُ هِيَاجٍ أَوْ ذَهُولٍ.

**pseudoesthesia (= pseudesthesia)** حِسٌّ كَاذِبٌ.

**pseudoganglion** عُقْدَةٌ كَاذِبَةٌ. تَتَخَنُ فِي الْعَصَبِ يَشَبُهَ الْعُقْدَةَ.

**pseudogeusesthesia** ذَوْقٌ كَاذِبٌ. حَسُّ ذَوْقٍ كَاذِبٌ يَتَرَفَّقُ مَعَ إِحْسَاسَاتٍ أُخْرَى.

**pseudogeusia** مَذَاقٌ كَاذِبٌ؛ ذَوْقٌ مَغْلُوطٌ. حَسُّ ذَوْقٍ لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ ذَوْقِ الْمَادَّةِ الْمُنْبِئَةِ لَهُ أَوْ حَسُّ ذَوْقٍ يَحْدُثُ مِنْ دُونِ وَجُودِ أَيِّ مَنبِئٍ لَهُ.

**pseudohallucination** هَلُوسَةٌ كَاذِبَةٌ. هَلَسٌ يَتَوَلَّدُ عَنْ فِعْلِ الذَّاكِرَةِ وَالْخِيَالِ وَيَشْعُرُ الشَّخْصُ الْمَصَابُ بِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ.

**pseudohydrocephalus** مَوءُ الرُّأْسِ الْكَاذِبِ. ضَخَامَةُ الرَّاسِ الْمَفْرُطَةِ وَالسُّوِيَّةِ وَلَكِنَّهَا تَظْهَرُ كَأَنَّهَا شَاذَةٌ بِسَبَبِ صَفَرِ حِجْمِ الْوَجْهِ وَالْجِسْمِ بِالنِّسْبَةِ لِحِجْمِ الرَّاسِ.

**pseudohypertrophy** ضَخَامَةٌ كَاذِبَةٌ. زِيَادَةُ الْحِجْمِ مِنْ دُونِ الضَخَامَةِ الْمَفْرُطَةِ.

**- muscular p.** ضَخَامَةٌ عَضَلِيَّةٌ كَاذِبَةٌ. زِيَادَةُ حِجْمِ الْعَضَلَاتِ لَيْسَ بِسَبَبِ ضَخَامَتِهَا وَلَكِنْ بِسَبَبِ ارْتِشَاحِ الْعَضَلَةِ بِالنَّسِجَةِ أُخْرَى.

**pseudomyotonia** تَأَثَّرٌ عَضَلِيٌّ كَاذِبٌ. التَّقَلُّصُ وَالْإِنْبَسَاطُ الْبَطْنِيَّانِ اللَّذَانِ يَحْدُثَانِ بِالتَّنَاقُوبِ فِي قُصُورِ الدَّرْقِيَّةِ.

**pseudonarcotic** مُخَدَّرٌ كَاذِبٌ. مَادَّةٌ مَسْكُونَةٌ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ مُخَدَّرَةً.

**pseudonarcotism** تَخَدُّرٌ كَاذِبٌ. حَالَةٌ هِسْتِيرِيَّةٌ تَشَبُهُ حَالَةَ التَّخَدُّرِ.

**pseudoneuritis** الْتِهَابٌ الْأَعْصَابِ الْكَاذِبِ. حَالَةٌ تَبَيُّغِ الْحَلِيمَةِ الْبَصَرِيَّةِ تَحْدُثُ كَعَيْبٍ خَلْقِيٍّ.

**pseudoneuroma** وَرَمٌ عَصَبِيٌّ كَاذِبٌ. تَوَرَّمٌ عَلَى الْعَصَبِ يَشَبُهُ الْوَرَمَ الْعَصَبِيَّ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْوَرَمِ الْعَصَبِيِّ.

**pseudonystagmus (= end position nystagmus)** رَاوَاةُ الْوَضْعِ الْآخِرِ.

**pseudopapilledema** وَدْمَةُ الْخَلِيمَةِ الْبَصَرِيَّةِ الْكَاذِبَةِ. ارْتِفَاعُ الْقَرَصِ الْبَصَرِيِّ الشَّاذِ.

**pseudoparalysis** شَلْلٌ كَاذِبٌ. فَقْدَانُ الْقُوَّةِ الْعَضَلِيَّةِ الظَّاهِرِيٍّ مِنْ دُونِ شَلَلٍ حَقِيقِيٍّ فِيهَا وَيَتَصَفُّ بِضَعْفِ التَّنْسِيقِ فِي حَرَكَاتِهَا أَوْ تَحْدِيدِ الْحَرَكَاتِ بِسَبَبِ الْمَهَا.

**- p. agitans (= paralysis agitans)** شَلْلٌ رَعَشِيٌّ كَاذِبٌ؛ شَلْلٌ رَعَشِيٌّ.

**- arthritic general p.** شَلْلٌ غَامٌ كَاذِبٌ بِالْتِهَابِ الْمَفَاصِلِ. حَالَةٌ تَشَبُهُ الشَّلْلَ الْعَامَ تَنْتِجُ عَنْ عَصِيدَةٍ دَاخِلِ الْقَحْفِ فِي شَخْصٍ مَصَابٍ بِالنَّقْرَسِ أَوْ بِالْتِهَابِ الْمَفَاصِلِ الْعَامِ.

**- congenital atonic p. (= amyotonia congenita)** شَلْلٌ وَهْنِيٌّ خَلْقِيٌّ كَاذِبٌ؛ وَهْنٌ عَضَلِيٌّ خَلْقِيٌّ.

**شلل زهري** Parrot's p. (= syphilitic p.) -  
كَاذِب. شلل كاذب لاحد الاطراف أو لعدة أطراف في  
الأطفال ينتج عن التهاب العظم والغضروف الإفرنجي  
للمشاشات.

**شلل سفلي كاذب.** pseudoparaplegia  
شلل سفلي زائف كالذي يحصل في حالات  
التمارض أو الهستيريا.

**خزل كاذب.** حالة pseudoparesis  
مستيرية أو حالة لا عضوية أخرى تشبه الخزل.

**حس ضوئي** pseudophotoesthesia  
كَاذِب. حس ضوئي يتولد عن استلام منبهات غير  
ضوئية.

**شلل كاذب.** شلل هستيري pseudoplegia  
أو أي شلل كاذب آخر.

**التهاب سنجابية** pseudopoliomyelitis  
الدماغ الكاذب. داء شبيه بالتهاب سنجابية الدماغ  
ينتج عن الفيروس المعوي غير فيروس السنجابية.

**حس النهايات الكاذب.** pseudopolymelia  
حس وهمي يحس في عدة أجزاء انتهائية في الجسم  
مثل الأنف والحلمة وحشفة القضيب والأصابع  
والأباحس.

**إبصار كاذب.** هلوسة أو انخداع pseudopsia  
بصري.

**دُهان كاذب.** pseudopsychosis (= Ganser's  
syndrome)

**تابس كاذب.** أي اعتلال pseudotabes  
عصبي يتصف بأعراض تشبه أعراض التابس  
الظهري من دون أن يكون ناتجاً عن الزهري.

**تكرز كاذب.** تقلص pseudotetanus  
عضلي مستمر شبيه بالكزاز ولكنه غير ناجم عن  
الإصابة بجراثيمه.

**ضرر كاذب.** اضطراب pseudotrimus  
حركي في الفم له أعراض تشابه أعراض الضرز.

**ورم كاذب.** تضخم شبيه pseudotumor  
بالورم.

**ورم دماغي كاذب.** حالة تولدها - p. cerebri  
وذمة الدماغ بأسباب مرضية مختلفة وتتصف بارتفاع

ضغط داخل القحف مع الصداع والقيء وذمة القرص  
البصري ولكن من دون أية علامات عصبية سوى شلل  
العصب القحفي السادس أحياناً.

**التهاب القطنية.** التهاب إحدى psotitis  
العضلات القطنية أو غدها.

**آلم نفسي** psychalgia (= psychalgia)  
المنشأ.

**آلم نفسي المنشأ.** 1. صداع psychalgia  
يُحس به وكأنه ناتج عن أسباب عاطفية ويمكنه أن  
يكون مصاحباً لأفكار غريبة غير محتملة أو  
لوسواس أو لهوس 2. آلم نفسي المنشأ ناتج عن  
أسباب مستيرية ويُحس به كأنه آلم جسدي.

**تحليل نفسي.** psychanalysis (= psychoanalysis)

**عمى نفسي المنشأ.** psychanopsia (= psychic blindness)

**وهن نفسي.** مصطلح psychasthenia  
يستعمل للدلالة على كل العصابات النفسية غير  
الهستيرية التي تشمل ما يسمى اليوم بالرهاب  
وعصاب القلق.

**رنج نفسي.** حالة اضطراب psychataxia  
عقلي تتصف بالتخليط وعدم المقدرة على التركيز.

**النفس.** قدرة الإنسان على التفكير psyche  
والتحكم والشعور العاطفي وقد تشمل هذه الحياة  
النفسية عمليات واعية أو لا شعورية.

1. **ذهاني الأعراض** psychedelic  
2. **ذهاني التأثير.** 1. منسوب إلى أو لما يتصف  
بالاهلاس البصرية والإدراك الشديد وأحياناً  
السلوك الشبيه بالذهان 2. عقار يولد أعراضاً  
شبيهة بكل ذلك.

**نفس.** منسوب للطب psychiatric  
النفسى أو يقع في حقل هذا الاختصاص.

**الطب.** psychiatrics (= psychiatry)

**الطبيب النفسي.** الطبيب psychiatrist  
الاختصاصي في الطب النفسي.

**الطب النفسي.** فرع الطب psychiatry  
الذي يعنى بدراسة ومعالجة الأمراض النفسية  
وطرق الوقاية منها.

- الطِبُّ النَّفْسِيَّ البَيُولُوجِيَّ.** biological p. -  
 فرع الطب النفسي الذي يؤكد على الأسباب الكيميائية  
 الحياتية والعصبية والدوائية عند معالجة الأمراض  
 النفسية.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الْمُجْتَمَعِيَّ.** community p. -  
 فرع الطب النفسي الذي يعنى بالتحري عن حالات  
 الأمراض النفسية ومعالجتها والوقاية منها في منطقة  
 جغرافية أو حضارية معينة مع التأكيد على تأثير  
 العوامل المحيطة عليها.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الْمُقَارَن.** cross- cultural p. (= comparative p.) -  
 الدراسة المقارنة للأمراض  
 النفسية والصحة العقلية بين مختلف المجتمعات  
 والقوميات والحضارات.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الثَّقَافِيَّ.** cultural p. -  
 فرع الطب النفسي الاجتماعي الذي يعنى بالمرضى  
 النفسيين وعلاقتهم بمحيطهم الثقافي.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الوَصْفِيَّ.** descriptive p. -  
 النفسي الذي يعتمد على الاعراض والوصاف  
 السلوكية الظاهرة أكثر من الاعتماد على العوامل  
 النفسية الديناميكية الكامنة.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الدِّينَامِيكِيَّ.** dynamic p. -  
 النفسي الذي يعتمد على الآليات غير الواعية  
 والتناقضات والفعاليات العاطفية الأخرى أكثر من  
 العوامل السلوكية الظاهرة.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الوُجُودِيَّ.** existential p. -  
 النفسي الذي يعتمد على الفلسفة الوجودية التي ترتأي  
 بأن الشخص يتحمل مسؤولية وجوده.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الشَّرْعِيَّ.** forensic p. -  
 النفسي الذي يعنى بالنواحي القانونية للاضطرابات  
 النفسية.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ المِهْنِيَّ.** industrial p. (= occupational p.) -  
 فرع الطب النفسي المهني الذي يعنى بتشخيص ومعالجة الأمراض  
 العقلية في الأوساط الصناعية والوقاية منها وعودة  
 المرضى المهنيين إلى أعمالهم ودراسة أسباب تغييرهم  
 عن العمل واحتمال إصابتهم بالاعراض وسلوكهم  
 الشخصي وتعبهم المهني وتكيفهم للعمل وتقاعدهم  
 منه والظواهر الأخرى المتعلقة بعملهم.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ العَضْوِيَّ.** organic p. -  
 العلم الذي يعنى بالنواحي النفسية في الأمراض  
 الدماغية العضوية.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ التَّقْوِيْمِيَّ الجَزَائِيَّ.** orthomolecular p. -  
 النظرية التي تنص على أن الأمراض النفسية تنتج عن  
 اضطرابات المحيط الجزيئي للدماغ ومن الممكن  
 شفاؤها بإعادة التراكيز المثلى للمواد التي توجد عادة  
 في الجسم كالفيتامينات والأملاح.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الوَقَائِيَّ.** preventive p. -  
 مصطلح عام يستعمل للدلالة على تخفيف الأمراض  
 النفسية ومكافحتها والإقلال من الإعاقة التي تولدها  
 للمرضى.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ الإِجْتِمَاعِيَّ.** social p. -  
 النفسي الذي يعنى بالحقائق والوقائع الثقافية والبيئية  
 والاجتماعية التي تؤثر على سلوك المرضى والتي  
 تطيل أمد المرض وتعمده أو تولد اختلالاته وتؤثر  
 على معالجته.
- الطِبُّ النَّفْسِيَّ المُقَارَن.** transcultural p. (= cross- cultural p.) -  
 نفسِي: نَفْسَانِيَّ. نسبة إلى النفس  
 أو العقل.
- مُؤَثِّرُ نَفْسِيَّ.** psychoactive -  
 ما يؤثر في النفس أو في السلوك مثل الدواء المؤثر النفسي.
- مُؤَثِّرُ نَفْسِيَّ: مُنْعَشِّ.** psychoanaleptic -  
 نفسِي. ما يؤدي إلى تأثير مهيج للنفس.
- التَحْلِيلُ النَّفْسِيَّ.** psychoanalysis -  
 طرق إظهار التجارب العاطفية السابقة للمريض وأدوارها  
 في التأثير على حياته العقلية الحاضرة بغرض  
 اكتشاف التناقضات والآليات التي تؤدي إلى  
 الحالات المرضية العقلية لديه والتعرف على بعض  
 الدلائل التي تساعد في علاجه النفسي وتستخدم  
 في هذا التحليل العلاقات الحرة بين التجارب وتذكر  
 الأحلام ودلالاتها وظواهر المقاومة لها والتحول  
 عنها وما شاكل ذلك.
- المُحَلِّلُ النَّفْسِيَّ.** psychoanalyst -  
 الاختصاصي الذي يمارس التحليل النفسي.
- سَمْعِيَّ نَفْسِيَّ.** psychoauditory -  
 متعلق بالإدراك الواعي والذكي للأصوات.



**psychocatharsis (= catharsis)** تَفْرِيعٌ  
فِكْرِيٌّ؛ تَفْرِيعٌ نَفْسِيٌّ.

**psychochemistry** الْكِيمِيَاءُ النَّفْسِيَّةُ.  
العلم الذي يعنى بدراسة العلاقات بين الكيمياء  
والفعاليات النفسية.

**psychochrome** اللَّوْنُ النَّفْسِيٌّ. الرابطة  
الفكرية الشخصية بين بعض الإحساسات الجسمية  
وبعض الألوان.

**psychochromesthesia** حِسُّ اللَّوْنِ  
النَّفْسِيِّ. الحالة التي تولد فيها المنبهات السمعية  
والمنبهات غير البصرية إحساسات بالألوان أو  
إحساسات مرتبطة باللون.

**psychocortical** قَشْرِيٌّ عَقْلِيٌّ. منسوب  
إلى العقل وقشرة الدماغ كموضع للفعاليات  
النفسية.

**psychocutaneous** جِلْدِيٌّ نَفْسِيٌّ. منسوب  
إلى العلاقة بين العوامل الفكرية أو العاطفية  
والاضطرابات الجلدية.

**psychedelic (= psychedelic)** ذُهَانِيٌّ  
التَّأثير؛ ذُهَانِيٌّ الأعراض.

**psychodiagnosis** تَشْخِصٌ نَفْسِيٌّ.  
استعمال الطرق القياسية النفسية في تشخيص  
الاضطرابات النفسية.

**psychodimeter** مِقْيَاسٌ نَفْسِيٌّ. آلة  
تستعمل لقياس سرعة الفعاليات العقلية.

**psychodometry** الْقِيَاسُ النَّفْسِيُّ. قياس  
سرعة الفعاليات الفكرية.

**psychodrama** تَمَثُّيلٌ نَفْسِيٌّ. أسلوب  
معالجة نفسانية يشجع فيه المرضى على تمثيل  
تناقضاتهم العاطفية والنفسية بصورة مؤثرة.

**psychodynamics** الدِّينَامِيكا النَّفْسِيَّةُ.  
تفاعلات العوامل كالقلق والتناقضات والآليات التي  
تولد التعبير عن الفعاليات النفسية.

**psychodysleptic** مُخَمِّدٌ نَفْسِيٌّ. ما يولد  
حالة شبيهة بالأحلام أو التوهم.

**psychogenesis** التَّنَامِي النَّفْسِيٌّ.

1. التنامي والتطور النفسي 2. تكون الأعراض  
المرضية بعوامل نفسية وليس بعوامل عضوية.

**psychogeriatrics** الطَّبُّ النَّفْسِيُّ الشَّيْخُوخِيَّ.  
معالجة المشاكل النفسية عند الشيوخ.

**psychogogic** مُهَيِّجٌ نَفْسِيٌّ. ما يثير ويشد  
التوترات النفسية أو ينبهها.

1. مخطط الشخصية 2. مَخْطُطٌ  
نَفْسِيٌّ. 1. مخطط الجلال النفسية والصفات  
الشخصية للفرد 2. حس بصري يترافق مع الأفكار  
الذهنية كحس رؤية شكل الأرقام عند التفكير بها.

**psychograph** خَطٌّ بَيَانِيٌّ نَفْسِيٌّ. 1. مخطط  
يرسم خلال النفسية والصفات الشخصية  
للشخص بشكل خط بياني 2. وصف مكتوب  
للوظائف النفسية للشخص.

**psychokinesia (= psychokinesis)**  
حَرَكَيةٌ نَفْسِيَّةٌ المنشأ.

**psychokinesis** حَرَكَيةٌ نَفْسِيَّةٌ. 1. التأثير  
المتوقع للأفعال الإرادية على المواد الفيزيائية، أو  
التأثير الفكري على المادة من دون استعمال أية  
قوة فيزيائية 2. عمل انفجاري بسبب عدم تثبيط  
الغرائز الابتدائية.

**psycholagny** التَلَذُّذُ الْجِنْسِيُّ النَّفْسِيُّ؛ شَبَقٌ  
نَفْسِيٌّ. الشعور باللذة الجنسية بمجرد تصور أو  
تخيل العملية الجنسية.

**psycholepsy** نَوْبَةٌ نَفْسِيَّةٌ. هبوط مفاجيء  
وشديد للمزاج يدوم عادة لفترة قصيرة.

**psycholinguistics** اللُّغَوِيَّاتُ النَّفْسِيَّةُ.  
دراسة العوامل النفسية التي تؤثر على تطوير  
واستعمال اللغة.

**psychologic (= psychological)** نَفْسِيٌّ.  
متعلق بعلم النفس.

**psychologist** اختصاصي علم النفس.

**psychology** عِلْمُ النَّفْسِ. العلم الذي  
يعنى بالعقل والعمليات النفسية خاصة ما يتعلق  
منها بسلوك البشر والحيوانات.

عِلْمُ النَّفْسِ الْمَرَضِيِّ. - abnormal p.  
دراسة الاضطرابات النفسية والاختلالات السلوكية.

- **analytic p. (= analytical p.)** عِلْمُ النَّفْسِ التَّحْلِيلِيّ. علم النفس الذي يعتمد على دراسة المفاهيم والمعتقدات اللاشعورية.

- **animal p.** عِلْمُ نَفْسِ الْحَيَوَانَات. دراسة سلوك الحيوانات.

- **behavioristic p. (= behaviorism)** عِلْمُ النَّفْسِ السُّلُوكِيّ.

- **child p.** عِلْمُ نَفْسِ الْأَطْفَال. دراسة تطور عقل الطفل.

- **clinical p.** عِلْمُ النَّفْسِ السَّرِيرِيّ. استعمال المعلومات والطرق النفسية في معالجة الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو سلوكية أو نمائية.

- **cognitive p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِدْرَاكِيّ. فرع علم النفس الذي يعني بدراسة طرق استلام العقل للأفكار والانطباعات وكيفية تحليلها وتفهمها.

- **community p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِجْتِمَاعِيّ. تطبيق المعلومات والأسس النفسية في دراسة الصحة النفسية للأفراد ضمن مجتمعاتهم.

- **criminal p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِجْرَامِيّ. دراسة عقليات ودوافع المجرمين وسلوكهم الاجتماعي.

- **depth p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْعَمَقِيّ. دراسة العمليات النفسية العميقة.

- **developmental p.** عِلْمُ النَّفْسِ النِّمَاطِيّ. دراسة التغيرات السلوكية التي تحصل للشخص خلال عمره الطويل.

- **environmental p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْبَيْئِيّ. دراسة التأثيرات الفيزيائية والاجتماعية في المحيط الاجتماعي على سلوك الفرد.

- **experimental p.** عِلْمُ النَّفْسِ التَّجْرِبِيّ. دراسة العمليات العقلية باستعمال الطرق المختبرية المحكمة.

- **gestalt p. (= gestaltism)** علم النفس الغشتاليني؛ التَّكُونِيَّةُ الْإِدْرَاكِيَّةُ.

- **Individual p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْفَرْدِيّ. المبدأ النفسي الذي ينص على أن الشعور بالنقص هو مصدر معظم المشاكل النفسية والمشاكل بين الأفراد.

- **physiologic p. (= physiological p.)** عِلْمُ النَّفْسِ الْفِيْزِيُولُوجِيّ. فرع علم النفس الذي يدرس العلاقة بين العمليات الفيزيولوجية والسلوك.

- **social p.** عِلْمُ النَّفْسِ الْإِجْتِمَاعِيّ. علم النفس الذي يركز على العلاقات الاجتماعية والطريقة التي يؤثر فيها سلوك الآخرين على سلوك الفرد نفسه.

**psychometer** مَقْيَاسُ نَفْسِيّ. جهاز يستعمل لقياس العمليات النفسية.

**psychometrics (= psychometry)** الْقِيَاسُ النَّفْسِيّ.

**psychometry** الْقِيَاسُ النَّفْسِيّ. قياس الفعاليات الفكرية والعمليات السلوكية والنفسية.

**psychomotor** نَفْسِيّ حَرَكَيّ. نسبة للتأثيرات الحركية التي تتولد من التفاعلات الدماغية أو النفسانية.

**psychoneural** نَفْسِيّ عَصَبِيّ. نسبة إلى العملية العصبية التي تبدأ بالتنبيه الحسي والتي قد تؤدي إلى خزنه أو إلى تمييزه أو إلى نتاج أو استجابة من نوع ما لهذا التنبيه.

**psychoneurosis** عَصَابٌ ذُهَانِيّ. عصابات تشمل الهستيريا والوسواس والرهاب وتتولد نتيجة تجارب أثناء الطفولة.

**psychonomy** الْقَوَانِينُ النَّفْسِيَّةُ. علم يعني بقوانين الفعاليات النفسية.

**psychopath** مُعْتَلُّ النَّفْسِ. شخص مصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.

**psychopathology** السيكوباتولوجيا. 1. مرضيات الاضطرابات العقلية التي تعنى بدراسة أسباب وأعراض الأمراض العقلية 2. سلوك أو فعالية عقلية مرضية.

**psychopathy** سيكوباتيا؛ إغْتِلَالُ نَفْسِيّ. اعتلال النفس سواء ترافق ذلك مع انحطاط الذكاء لدون المستوى السوي أم لا.

**psychopharmacology** الدَوَائِيَّاتُ النَّفْسَانِيَّةُ؛ الفارماكولوجيا النفسية. 1. دراسة تأثير الأدوية على الوظائف النفسية والحالات النفسية 2. استعمال الأدوية لتحويل الوظائف النفسية ومعالجة انحرافاتهما.

**psychophysics** الْفِيْزِيَاءُ النَّفْسِيَّةُ. العلم الذي يعني بدراسة العلاقات الكمية بين صفات

وأنماط المنبهات الفيزيائية والإحساسات المولدة بها.

**psychophysiology** فيزيولوجيا النفس. علم وظائف النفس.

**psychoplegia** شلل نفسي. نوبة خرف حادة.

**psychedeation** تهدئة نفسية. عملية تزيل عن المريض الخوف والتوجس وذلك باستعمال دواء مركز نفسي.

**psychedeative** مهدئ نفسي. عامل يزيل التوجس بتأثيره على المراكز دون القشرية في الدماغ ولا يولد إلا القليل من التأثير على الوظائف الحسية أو الحركية لتأثيره الضعيف على القشرة المخية.

**psychosensory** حسي نفسي. متعلق بالأدراك الواعي للدفعات الحسية التي تصل الدماغ.

**psychoses** ذهانات. جمع ذهان.

**psychosexual** جنسي نفسي. متعلق بالناحية النفسية للجنس.

**psychosis** ذهان. (ج. ذهانات). اضطراب عقلي يتصف بخلل كبير في إدراك الواقع والذي يتصف بالتوهم والأهلاس والكلام غير المترابط والسلوك غير المتناسق أو المضطرب من دون وعي المريض بعدم الترابط أو الانسجام في سلوكه. ويستعمل المصطلح للدلالة على عدم مقدرة المريض على القيام بأمور الحياة بصورة طبيعية.

**- affective p.** ذهان عاطفي. اضطراب المزاج.

**- alcoholic p's.** ذهانات كحولية. ذهانات ترافق مع استعمال الكحول وتشمل الهذيان الارتعاشي ومتلازمة كورساكوف والهلاس الكحولي والزور الكحولي.

**- brief reactive p.** ذهان تفاعلي قصير. فترة من أعراض نفسانية تشمل عدم الترابط وضعف التمييز والتوهم والأهلاس والسلوك اللامنسجم، وتظهر كل هذه الأعراض بصورة مفاجئة نتيجة مشاكل أو أعراض حياتية مزعجة وتدوم لمدة حوالي شهر واحد.

**- circular p.** ذهان دوري. اضطراب هوسي اكتئابي متناوب.

**- depressive p.** ذهان اكتئابي. اكتئاب شديد.

**- drug p.** ذهان دوائي. ذهان يتولد عن استعمال أحد الأدوية.

**- functional p.** ذهان وظيفي. ذهان لا يتولد عن آفة عضوية أو عن خلل وظيفي معين واضح لأحد أقسام الدماغ.

**- hysterical p.** ذهان هستيري. ذهان قصير الأمد يحدث عند المرضى المصابين باضطرابات الشخصية.

**- involutional p. (= involutional melancholia)** ذهان أوبي.

**- Korsakoff's p. (= Korsakoff's syndrome)** متلازمة كورساكوف.

**- manic p.** ذهان هوسي. اضطراب دوري هوسي.

**- manic- depressive p. (= bipolar p.)** ذهان هوسي اكتئابي. ذهان دوري.

**- organic p.** ذهان عضوي. ذهان يتولد عن آفة عضوية نفسانية.

**- postpartum p.** ذهان تالي للوضع. نوبة اضطراب نفسي تحدث بعد الوضع.

**- prison p.** ذهان السجن. ذهان تحفز ظهوره لدى المريض ظروف السجن القاسية.

**- schizoaffective p. (= schizoaffective disorder)** ذهان فصامي عاطفي.

**- senile p.** ذهان شيخوخي. خوف شيخوخي مع اكتئاب أو توهم زوراني أو هلاس.

**- symbiotic p. (= symbiotic infantile p.)** ذهاني تعائشي. حالة تشاهد في الأطفال بين سن

الثانية حتى الرابعة من العمر تتصف بعلاقة شاذة مع الأم كالقلق الشديد من الانفصال عنها والخوف الشديد ومقاطعة الكلام النافع والانطواء على الذات.

**- toxic p.** ذهان سسمي. ذهان يتولد عن تناول مادة سامة كالكحول أو الأفيون أو عن وجود الذيفان في الجسم.

**- unipolar p. (= major depression)** ذهان أحادي القطب. اكتئاب كبير.

**psychosocial** نفسي اجتماعي. متعلق بالنفس وبالمجتمع.

**psychosomatic** نَفْسِيّ جِسْمِيّ. متعلق بالعلاقة بين الجسد والنفس أو وجود أعراض جسدية ناتجة عن أسباب نفسية أو عاطفية أو عقلية.

**psychosomimetic (= psychotomimetic)** مَحَاكِي الذَّهَانِ.

**psychostimulant** مُنَبِّه نَفْسَانِيّ. 1. عامل يولد زيادة عابرة في الفعالية النفسية الحركية 2. دوار يولد مثل هذه الزيادة كالامفيتامين أو الكافئين.

**psychosurgery** الْجِرَاحَةُ النَّفْسِيَّة. جراحة دماغية تجري لمعالجة الاضطرابات العقلية.

**psychotechnics** التِّقْنِيَّاتُ النَّفْسِيَّة. استعمال الطرق النفسية في دراسة المشاكل الاجتماعية وما شاكل.

**psychotherapeutics (= psychotherapy)** الْمُعَالَجَةُ النَّفْسِيَّة.

**psychotherapy** الْمُعَالَجَةُ النَّفْسِيَّة. معالجة الامراض النفسية والاضطرابات السلوكية باستعمال التقنيات النفسية كالتشجيع والإيحاء والاغراء والتثقيف والتطمين والتبصر لتشجيع تنمية الشخصية وإصلاح النمط الحياتي غير المنسجم مع المحيط لدى المريض.

**- brief p.** مُعَالَجَةُ نَفْسِيَّةٍ قَصِيْرَةٍ. معالجة نفسية نشطة وفعالة تدوم لعشر إلى عشرين جلسة لمعالجة مشكلة نفسية خاصة أو عرض سلوكي معين.

**- existential p.** مُعَالَجَةُ نَفْسِيَّةٍ وَجُودِيَّة. معالجة نفسية تعتمد على الفلسفة الوجودية التي تؤكد على التفاعلات الانية وتجارب الإحساسات الذاتية بصرف النظر عن التفكير المنطقي.

**- personologic p.** مُعَالَجَةُ نَفْسِيَّةٍ شَخْصِيَّة. معالجة تركز على شخصية المريض بصرف النظر عن الاعراض السريرية التي تظهر عليه.

**- supportive p.** مُعَالَجَةُ نَفْسِيَّةٍ دَاعِمَةٍ. طريقة علاجية تشجع دفاعات المريض لتثبيت العوامل النفسية المقلقة لتجنب التناقضات العاطفية.

**psychotic** ذُهَانِيّ. منسوب للذهان أو يتصف به أو ينتج عنه أو مصاب به.

**psychotogenic** مُؤَلِّدُ الذَّهَانِ. دواء أو عامل يولد الذهان.

**psychotomimetic** مَحَاكِي الذَّهَانِ. يتصف أو يولد أعراضاً تشبه الذهان كالهلاس البصري أو انحراف الإدراك والسلوك الشبيه بالانقصام.

**psychotropic** مُؤَثِّرُ نَفْسِيّ. عامل أو دواء يؤثر على العقل ويمكنه تغيير الفعاليات النفسية.

**psychoalgia** أَلَمُ الْبَرْد؛ أَلَمُ بُرُودِيّ. الحس المؤلم للبرد.

**psychoesthesia** حِسُّ الْبَرْد. حالة يحس بها الشخص جزءاً من جسمه بارداً رغم سخونته.

**puberty** الْبُلُوْغ. الفترة التي تبدأ فيها الصفات الجنسية الثانوية بالظهور وعندها يتمكن الفرد من التناسل الجنسي.

**- precocious p.** الْبُلُوْغُ الْمُبَكِّر. النضوج الجنسي المبكر الغامض أو المرضي والذي تظهر فيه الصفات الخاصة بالجنس مبكراً أو تتنامى فيه صفات الجنس المعاكس.

**pulvinar** الْوَسَادَةُ. الكتلة الوسادية الشكل البارزة التي تكون الجزء الإنسي من النهاية الخلفية للمهاد والتي تغطي جزئياً الأكيمة الرأسية وعضدها وتكون مفصولة في الأسفل عن الجسم الركبي بعضد الأكيمة الرأسية، وهي تستلم أليافاً من النوى المهادية الأخرى وترسل إسقاطات عديدة إلى قشرة المخ.

**- p. thalami (= nuclei posteriores thalami)** نَوَى الْمِهَادِ الْخَلْفِيَّة.

1. يَزُولُ 2. ثَقْب؛ وَخَز. ثقب بنية بارزة أو الثقب المكونة عن ذلك.

**- Bernard's p.** وَخَزُ بَرْنَارْد. وخز نقطة معينة في قاع البطين الرابع تجريبياً يؤدي إلى توليد السكرى لدى الحيوان.

**- cisternal p.** يَزُولُ الصَّهْرِيْج. ثقب الصهريج المخيخي البصلي خلال الرباط القذالي الفقهي لغرض سحب السائل الدماغي النخاعي.

**- cranial p. (= cisternal p.)** يَزُولُ الْقَحْف.

**- Intracisternal p. (= cisternal p.)** يَزُولُ الصَّهْرِيْج.

**putamen** البطامة؛ قَشْرَةُ العَدْسِيَّة. قشرة النواة العدسية وهي القسم الأكبر والأعمق لوناً والوحشي من النواة العدسية وتفصلها عن الكرة الشاحبة الوحشية الصفيحة النخاعية الوحشية.

**pygalgia** أَلَمُ الأُلْيَةِ. ألم في الأليتين.

**pyknoepilepsy (= absence epilepsy)** الصَّرَعُ الغيبوبي.

**pyramid** هَرَمٌ. مصطلح يستعمل للدلالة على هرم البصلة (النخاع المستطيل).

- **p. of cerebellum (= pyramis vermis)** هَرَمُ الدُّوْدَةِ.

- **p. of medulla oblongata (= pyramis medullae oblongatae)** هَرَمُ البَصَلَةِ. هرم النخاع المستطيل.

**pyramidotomy** قَطْعُ الهَرَم. قطع السبيل الهرمي.

**pyramis** هَرَمٌ. مصطلح عام لوصف البنيات الشبيهة بالهرم.

- **p. cerebelli (= p. vermis)** هَرَمُ الدُّوْدَةِ.

**p. medullae oblongatae** هَرَمُ البَصَلَةِ. هرم النخاع المستطيل وهو إحدى الكتلتين المدورتين الموجودتين على جهتي الشق الناصف الأمامي للبصلة والمكون من الألياف الحركية (السبيل الهرمي) النازلة من قشرة المخ إلى البصلة والنخاع الشوكي.

- **p. vermis** هَرَمُ الدُّوْدَةِ. قسم دودة المخ بين حلبة الدودة ولهاتها.

**pyrolagnia** شَبَقُ النار؛ التَلَذُّذُ الجِنْسِيُّ بالنيران. التلذذ الجنسي بمشاهدة النيران أو بإشعالها.

**pyromania** هَوَسُ النيران. الرغبة الملحة في إشعال النيران.

- **erotic p. (= pyrolagnia)** شَبَقُ النار؛ التَلَذُّذُ الجِنْسِيُّ بالنيران.

**pyrophobia** رَهَابُ النَّار. الخوف الشاذ من النار.

**pyrrocaine** بِيَرُوكَاثِين. دواء يستعمل كمخدر موضعي.

- **p. hydrochloride** هِيدُرُوكْلُورِيدُ البِيَرُوكَاثِين. دواء يستعمل كمبنج موضعي في طب الاسنان وذلك بحصر أعصاب الاسنان الحسية.

# Q

**quadriplegia (= tetraplegia)** شَلْلٌ رُبَاعِيٌّ.

شلل الأطراف الأربعة.

**quotient** حَاصِلٌ. رقم يحصل عليه نتيجة القسمة.

**- achievement q.** حاصل الإنجاز. مدى إنجاز الطفل وتقدمه في تعلمه نسبة إلى قابلياته العامة.

**- intelligence q.** حَاصِلُ الذِّكَاء. مقياس الذكاء الذي يحصل عليه بـقسمة عمر المريض العقلي (الذي يحصل عليه باختبار بينيت) على عمره الزمني وضرب الناتج بمئة.

**- spinal q. (= Ayala's q.)** الحَاصِلُ النُّخَاعِي؛

حاصل أياالا. حاصل ضغط السائل الدماغي النخاعي الذي يحصل عليه بـقسمة ضغطه بعد إزالة 10 مليلترات منه على ضغطه الذي نحصل عليه قبل إزالة هذه الكمية منه وضرب الناتج بالرقم عشرة. والحاصل الطبيعي هو حوالي 5.5-5.6. فإذا كان الحاصل أقل من 5 فإن ذلك يدل على مستودع صغير للسائل كما يحصل في الانسداد تحت العنكبوتي أما إذا كان فوق الـ 7 فإنه يدل على مستودع متوسع للسائل كما يشاهد في التهاب السحايا المصلي أو في مَوء الرأس.

# R

## racephedrine hydrochloride

هيدروكلوريد الرسفدرين. مادة كيميائية تستعمل كمادة محاكية للودي.

**rachial (= rachidial)** سِيَسَائِيّ. متعلق بالسياساء أو العمود الفقري.

**rachialgia** أَلَمٌ سِيَسَائِيّ. ألم في العمود الفقري.

**rachianalgesia (= spinal anesthesia)** تَخْدِيرٌ نُخَاعِيّ.

**rachicentesis (= lumbar puncture)** بَزْلٌ قَطَنِيّ.

**rachidial** سِيَسَائِيّ. متعلق بالسياساء أو بالعمود الفقري.

**rachidian (= rachidial)** سِيَسَائِيّ.

**rachigraph** مِرْسَامُ السِّيَسَاء. آلة لرسم شكل السياساء والظهر.

**rachilysis** إِفْتِكَاكٌ سِيَسَائِيّ. طريقة آلية لمعالجة العمود الفقري الرقبي بالسحب والضغط.

**rachiocampsis** إِنْجِنَاءُ السِّيَسَاء. انحناء العمود الفقري.

**rachiocentesis (= lumbar puncture)** بَزْلٌ قَطَنِيّ.

**rachiochysis** مَوَّةُ السِّيَسَاء. انصباب مائي بداخل القناة الفقرية.

**rachiocephosis (= kyphosis)** حُدَاب.

**rachiodynia** وَجَعٌ سِيَسَائِيّ. ألم في العمود الفقري.

**rachiokephosis (= kyphosis)** حُدَاب.

**rachimeter** مِقْيَاسُ السِّيَسَاء. آلة لقياس انحناءات العمود الفقري.

**rachiomylitis** إِلْتِهَابُ النُّخَاع. التهاب النخاع الشوكي.

**rachiopathy** إِعْتِلَالٌ سِيَسَائِيّ. أي داء يصيب العمود الفقري.

**rachioscoliosis** جَنْفُ السِّيَسَاء. الانحناء الجانبي للعمود الفقري.

**rachiotome** مِبْضَعُ السِّيَسَاء. آلة لبضع الفقرات.

**rachiotomy** بَضْعُ السِّيَسَاء؛ بضع الفقار. بضع السياساء أو إحدى فقراته.

**rachiresistance** مُقَاوِمَةٌ للتخدير النخاعي. حالة تتصف بعدم توليد أي تأثير للتخدير النخاعي.

**rachiresistant** مُقَاوِمٌ للتخدير النخاعي. شخص يتصف بالمقاومة للتخدير النخاعي.

**rachis (= vertebral column)** السِّيَسَاء؛ الْعَمُودُ الْفِقَارِيّ.

**rachisagra** نَوْبَةٌ سِيَسَائِيَّة. ألم في العمود الفقري أو نقرس العمود الفقري.

**rachischisis** إِنْشِقَاقُ السِّيَسَاء. شق خلقي في العمود الفقري.

**- r. partialis (= merorachischisis)** إِنْشِقَاقُ السِّيَسَاء الْجُزْئِيّ.

**- r. posterior (= spina bifida)** انشقاق السياساء الخلفي؛ السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ.

**- r. totalis (= holorachschisis)** إِنْشِقَاقُ السِّيَسَاء الْكَامِل.

**rachisensibility** حَسَاسِيَّةٌ لِلتَّخْدِيرِ النِّخَاعِي. حالة الحساسية المفرطة الشاذة للتخدير النخاعي.

**rachisensible** حَسَّاسٌ لِلتَّخْدِيرِ النِّخَاعِي. شخص ذو حساسية للتخدير النخاعي مفرطة شاذة.

**rachitic** رَخْدِيّ. متعلق بالرخد أو منسوب إليه.

**rachitis** 1. رَخَدٌ. 2. إِتِهَابُ السِّنْسَاء. 1. داء الرخد 2. مرض التهابي للعمود الفقاري.

**radiatio** شُعْ. بنية متشعبة، ويستعمل اللفظ في التشريح للدلالة على مجموعة من الألياف العصبية التي تربط أقسام الدماغ المختلفة.

**r. acustica** - الشُعُ السَّمْعِيّ. سبيل الألياف عصبية يبدأ من النواة الركبية الإنسية ويمر إلى الجهة الوحشية في القسم تحت العدسي من المحفظة الداخلية لينتهي في التلافيف الصدغية المستعرضة للفص الصدغي للمخ وهو سبيل للاتصالات المتبادلة ويكون السويق الذنبي للمهاد.

**r. corporis callosi** - شُعُ الجِسْمِ الثَّقَنِيّ. ألياف الجسم الثَّقَنِيّ التي تنتشر إلى كل أقسام الدماغ الحديث.

**r. corporis striati** - شُعُ الجِسْمِ الْمُخَطَّط. ألياف تمتد من المهاد والوطاء إلى الجسم المخطط.

**r. optica** - الشُعُ البَصَرِيّ. سبيل ليفي عصبي يبدأ من الجسم الركبي الوحشي ويمر إلى الجهة الوحشية خلال الجزء خلف العدسي للمحفظة الباطنة وثم يسقط للجهة الخلفية لينتهي في الباحة المخططة على السطح الإنسي للفص القذالي وعلى جهتي الثلم المهمازي. ويجهز هذا الشع ارتباطات متبادلة ويكون جزءاً من السويق الذنبي للمهاد ويسمى أيضاً السبيل الركبي المهمازي والشع المهادي القذالي.

**r. pyramidalis** - الشُعُ الهرَمِيّ. إسقاط الألياف عصبية من قشرة المخ إلى السبيل الهرمي.

**radiationes thalamicae anteriores** - الشُعَاتُ المِهَادِيَّةُ الأَمَامِيَّة. الألياف المهادية القشرية للساق الخلفية للمحفظة الداخلية والتي تربط النوى الأمامية والإنسية مع قشرة الفص الجبهي.

**radiationes thalamicae centrales** - الشُعَاتُ المِهَادِيَّةُ المَرْكَزِيَّة. الألياف المهادية القشرية

للساق الخلفية للمحفظة الداخلية التي تحمل الدفعات الحسية العامة من النوى المهادية البطنية إلى التلفيف خلف المركزي وتسمى أيضاً الشُعَاتُ المهادية العلوية.

**radiationes thalamicae posteriores**

الشُعَاتُ المِهَادِيَّةُ الخَلْفِيَّة. الألياف المهادية القشرية للقسم خلف العدسي الشكل للمحفظة الداخلية والتي تربط قشرات الفصوص القذالية والجدارية مع القسم الذنبي من المهاد.

2.1. شُعُ 3. إشعاع. تباعد radiation

من مركز مشترك 2. بنية مكونة من عناصر متباعدة مثل سبل الألياف العصبية في الدماغ 3. طاقة تنتقل بموجات خلال حيز أو خلال أحد الأوساط الناقلة كالإشعاع الكهربائي المغناطيسي.

الشُعُ - acoustic r. (= radiatio acustica) السَّمْعِيّ.

الشُعُ السَّمْعِيّ. - auditory r. (= acoustic r.)

الشُعُ - occipitalthalamic r. (= optic r.) القذالي المهادي: الشُعُ البَصَرِيّ.

الشُعُ البَصَرِيّ. - optic r. (= radiatio optica)

الشُعُ السَّقِيفِيّ. ألياف تتشعب tegmental r. وحشياً من النواة الحمراء.

الشُعُ المِهَادِيّ. سبل الألياف عصبية - thalamic r. تربط المهاد بصورة متبادلة مع قشرة المخ عن طريق المحفظة الداخلية.

الشُعُ - thalamotemporal r. (= acoustic r.) المِهَادِيّ الصَّدْغِيّ: الشُعُ السَّمْعِيّ.

**radiculalgia** أَلَمُ الجَذَر. ألم يتولد عن مرض جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.

**radicectomy** قَطْعُ الجَذَر. قطع جذر أو جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.

**radiculitis** إِتِهَابُ الجَذَر. التهاب جذر أحد الأعصاب النخاعية الشوكية خاصة في الجزء الذي يقع بين النخاع الشوكي والقناة بين الفقرتين.

**radiculoganglionitis** إِتِهَابُ الجُذُور. التهاب الجذر الخلفي لأعصاب النخاع الشوكي وعقدها.

**radiculomedullary** جَذَرِيّ نَخَاعِيّ. ما يتعلق ما يصيب الجذور العصبية والنخاع الشوكي.



**radiculomeningomyelitis** التهاب الجذور والسحايا والنخاع. التهاب الجذور العصبية والنخاع الشوكي والسحايا.

**radiculomyelopathy** اعتلال الجذور والنفق الفقري. اعتلال الجذور العصبية والنفق الفقري.

**radiculoneuritis (= acute febrile polyneuritis)** التهاب الجذور والأعصاب. اعتلال الأعصاب الحموي الحاد.

**radiculoneuropathy** اعتلال الجذور والأعصاب. اعتلال الجذور العصبية والأعصاب.

**radiculopathy** اعتلال الجذور العصبية. مرض الجذور العصبية.

**- spondylotic caudal r.** اعتلال الجذور العصبية الفقارية الذئبية. انضغاط ذنب الفرس بسبب عبوره على قناة شوكية صغيرة خلقياً والناتج عن قسط فقاري والذي يؤدي إلى عرج أو اضطرابات عصبية في الأطراف السفلية.

**radiectomy** استئصال الجذر. بتر أحد الجذور العصبية.

**radioencephalogram** مخطط الدماغ الإشعاعي. مخطط يظهر مرور النظير المشع الذي يحقن خلال الاوعية الدماغية كما يظهرها العداد الومضاني الخارجي.

**radioencephalography** تخطيط الدماغ الإشعاعي؛ التخطيط الأسلكي للدماغ. تسجيل تغيرات الجهود الكهربائية للدماغ من دون توصيل جهاز التسجيل بالمريض مباشرة أو تنتقل الإشارات بصورة موجات شعاعية من المريض للجهاز.

**radiomuscular** كُفبري عضلي. عصب يمر من العصب الكبير إلى العضلة.

**radioneuritis** التهاب عصبي إشعاعي. التهاب الأعصاب الذي يتولد عن التعرض إلى أشعة رونتجن أو أية طاقة شعاعية أخرى.

**radiophobia** رهَابُ الإشعاع. الخوف الشديد أو القلق من آثار التخريب الذي تولده الأشعة السينية أو الراديوم.

**radioulnar** كُفبري زندي. نسبة للكعبرة والزند.

**radisectomy** قطع الجذر. قطع أو بتر الجذر العصبي.

**radix (= root)** جذر. الجزء السفلي من البنية أو الجزء الذي تثبت بواسطته إحدى البنيات كجذور الشعر أو الأظافر أو الأسنان أو الأعصاب.

**- r. anterior nervorum spinalium** الجذر الأمامي للعصب النخاعي.

**- r. brevis ganglii ciliaris (= r. oculomotoria ganglii ciliaris)** الجذر القصير للغدة الهدبية.

**- r. cochlearis nervi acustici (= r. inferior nervi vestibulocochlearis)** الجذر الفوقي للعصب السمعي.

**- radices cranialis nervi accessorii** الجذور القحفية للعصب الإضافي. جذور تتصل من النواة الملتبسة وتبرز من جانب النخاع المستطيل بالأسفل من جذور العصب المبهم ثم تتحد مع الجذور الشوكية في الثقبة الوداجية وتكون أليافها الفرع الباطن الذي يتحد مع العصب المبهم وتوزع إلى شراع الحنك (الحفاف) ومضيقات البلعوم والحنجرة. كما أنها تسمى الجزء المبهم من العصب الإضافي.

**- r. dorsalis nervorum spinalium** الجذر الظهرى للعصب النخاعي. القسم الحسي من العصب الشوكي النخاعي والذي يتصل بالنخاع الشوكي مركزياً ثم يتحد محيطياً مع القسم البطني (الحركي) ليكونا العصب النخاعي الذي يمر خلال الثقبة بين الفقرتين ويحمل كل جذر ظهري عقدة نخاعية شوكية وينقل الدفعات العصبية من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي. يسمى أيضاً الجذر الخلفي أو الحسي للعصب النخاعي.

**- r. facialis (= nervus canalis pterygoidei)** الجذر الوجهي. عصب القناة الجناحية.

**- r. inferior ansae cervicalis** الجذر السفلي للغزوة الرقبية. حزمة من الألياف تربط العروة الرقبية مع فروع العصبين الرقبين الثاني والثالث.

**- r. inferior nervi vestibulocochlearis** الجذر السفلي للعصب الدهليزي القوقي.

الاستمرارية المركزية للجزء القوقعي للعصب الثامن من العقدة الحلزونية الذي يمر على الجهة الظهرية للسويقة المخيخية السفلية ليدخل الدماغ. يسمى أيضاً الجذر القوقعي للعصب السمعي.

- **r. lateralis nervi mediani** الجَذْرُ الوَحْشِيُّ  
لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. الألياف العصبية التي يساهم بها الحبل الوحشي للصفيرة العضدية في تكوين العصب الناصف.

- **r. lateralis tractus optici** الجَذْرُ الوَحْشِيُّ  
لِلسَّبِيلِ البَصْرِيِّ. الألياف عصبية من السبيل البصري تدخل إلى الجسم الركيبي الوحشي.

- **r. longa ganglii ciliaris (= r. nasociliaris ganglii ciliaris)** الجَذْرُ الطَوِيل  
لِلْعُقْدَةِ الهَدَبِيَّةِ. الجذر الأنفي الهدبي للعقدة الهدبية.

- **r. medialis nervi mediani** الجَذْرُ الْإِنْسِي  
لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. الألياف التي يساهم بها العمود الإنسي للصفيرة العضدية لتكوين العصب الناصف.

- **r. medialis tractus optici** الجَذْرُ الْإِنْسِي  
لِلسَّبِيلِ البَصْرِيِّ. الألياف من السبيل البصري تدخل إلى الأكمة العلوية والمنطقة أمام السقيفة.

- **r. mesencephalica nervi trigemini** الجَذْرُ الدِّمَاغِي الْمَتَوَسِّطِي لِلْعَصَبِ  
(= tractus mesencephalicus nervi trigemini) الثَّلَاثِي التَّوَاتِمِ.

- **r. motoria nervi trigemini** الجَذْرُ الْحَرَكِي  
لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَاتِمِ. أصغر الجذرين اللذين يتصل بواسطتهما العصب الثلاثي التوائم بالجسر، وهو يحوي أليافاً مستقبلية حسية عميقة وأليافاً حركية وهو يمر تحت عقدة ثلاثي التوائم ليتصل بالعصب الفك السفلي. كما أنه يسمى القسم الأصغر للعصب الثلاثي التوائم.

- **r. motoria nervorum spinalium (= r. ventralis nervorum spinalium)** الجَذْرُ  
الْحَرَكِي لِلْعَصَبِ النَّخَاعِيِّ.

- **r. nasociliaris ganglii ciliaris** الجَذْرُ الْأَنْفِي  
الْهَدَبِي لِلْعُقْدَةِ الهَدَبِيَّةِ. ألياف حسية من القرنية والقرحية والجسم الهدبي والمشيحية تمر خلال العقدة الهدبية إلى العصب الأنفي الهدبي. وهي تسمى أيضاً الجذر الطويل أو الحسي للعقدة الهدبية.

- **r. nervi facialis** جَذْرُ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ. جذر

يتكون من الألياف تمر من نواة العصب الوجهي إلى الأكمة الوجهية ومنها إلى الوجه البطني للجزء السفلي من الجسر.

- **r. oculomotoria ganglii ciliaris** جَذْرُ مُحَرِّكِ  
الْعَيْنِ لِلْعُقْدَةِ الهَدَبِيَّةِ. مجموعة قصيرة من الألياف تمر من الفرع السفلي للعصب محرك العين إلى القسم السفلي الخلفي من العقدة الهدبية. وهو يحوي أليافاً لا ودية قبل عقدية للعضلتين مضيقية الحدقة والهدبية وهو يسمى أيضاً الجذر القصير للعقدة الهدبية.

- **r. parasympathetica ganglii ciliaris** الجَذْرُ  
(= r. oculomotoria ganglii ciliaris) اللَّأَوْدِي لِلْعُقْدَةِ الهَدَبِيَّةِ.

- **r. sensoria nervi trigemini** الجَذْرُ الْحِسِّي  
لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَاتِمِ. أكبر الجذرين اللذين يتصل بواسطتهما العصب الثلاثي التوائم بالجسر وهو يحوي أليافاً حسية ويتوسع إلى عقدة مسطحة كبيرة (عقدة ثلاثي التوائم) التي تعطي الأعصاب العيني والفكي السفلي والفكي العلوي.

- **r. sensoria nervorum spinalium (= r. dorsalis nervorum spinalium)** الجَذْرُ  
الْحِسِّي لِلْعَصَبِ النَّخَاعِيِّ: الجذر الظهراني للعصب النخاعي.

- **radices spinales nervi accessorii** الجُذُورُ  
النَّخَاعِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ. الألياف تتصل من المادة السنجابية للنخاع الشوكي وتبرز من جانبه حتى المستوى بين العصبين العنقيين الثالث والرابع وتكون جذعاً يصعد في القناة الفقرية ويمر خلال الثقبة العظمى ويتحد مع القسم القحفي للعصب في الثقبة الوداجية. وتكون هذه الألياف الفرع الظاهر الذي يغذي العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.

- **r. superior ansae cervicalis** الجَذْرُ الْعُلَوِّي  
لِلْعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّةِ. الألياف من العصب الرقبي الأول أو الثاني تهبط مرافقة للعصب تحت اللساني وترتبط مع العروة الرقبية وتغذي العضلة تحت اللامية وتسمى أيضاً الفرع الهابط للعصب تحت اللساني.

- **r. superior nervi vestibulocochlearis** الجَذْرُ الْعُلَوِّي لِلْعَصَبِ الدِّهْلِيْزِيِّ  
(= r. vestibularis nervi vestibulocochlearis) الْقُوقَعِيِّ.

**الجَذْرُ الْوُدِّي r. sympathica ganglii ciliaris**  
لِلْعُقْدَةِ الْهَدْيِيَّةِ. الياف بعد عقدة من العقدة الرقبية العلوية مشتقة من الضفيرة السباتية الباطنة تمر إلى العقدة الهدبية لتتوزع كاعصاب هدية قصيرة إلى العضلة موسعة الحدقة والعضلة الحاجبية والعضلات الجفنية والاوعية الدموية للعين.

**r. sympathica ganglii submaxillaris**  
(= ramus sympathicus ad ganglion submandibularis) **الجَذْرُ الْوُدِّي لِلْعُقْدَةِ تَحْتَ**  
**الْفَكِّةِ الْعُلْوِيَّةِ.**

**r. ventralis nervorum spinalium** **الجَذْرُ**  
**الْبَطْنِيُّ لِلْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ.** القسم الحركي من العصب النخاعي يتصل مركزياً بالنخاع الشوكي ويتصل طرفياً مع نظيره الجذر الظهرى (الحسي) ليكونا العصب الذي يبرز من الثقب بين الفقرتين. وهو يحوي أليافاً حركية إلى العضلات الهيكلية والأليافاً ذاتية قبل عقدة في المستويات الصدرية والقطنية والعجزية. ويسمى أيضاً الجذر الأمامي أو الحركي للعصب النخاعي.

**r. vestibularis nervi vestibulocochlearis** **الجَذْرُ الدَّهْلِيْزِيُّ لِلْعَصَبِ الدَّهْلِيْزِيِّ**  
**الْقَوَقَعِيِّ.** الاستمرارية المركزية للعصب الدهليزي من العقدة الدهليزية ويدخل الدماغ مباشرة على الجهة الوحشية للعصب المتوسط وأمام السويقة المخيخية السفلية. ويسمى أيضاً الجذر العلوي للعصب الدهليزي القوقعي.

**rage** استِسْطَاطَة؛ غَيْظٌ. حالة غضب شديد.

**- sham r.** استِسْطَاطَة كاذبة؛ غَيْظٌ كاذِبٌ. حالة سلوكية تتصف بالغضب الشديد تظهر في الحيوانات منزوعي قشرة المخ شبيهة بالخوف الشديد مع الغضب وقد تظهر حالة شبيهة بذلك عند الإنسان في حالة نقص سكر الدم المولد بالانسولين أو التسمم بإحادي أكسيد الكربون.

**ramicotomy (= ramisection)** **قَطْعُ**  
**الْفُرُوعِ.**

**ramisection** **قَطْعُ الْفُرُوعِ.** عملية قطع الفروع الاتصالية للجهاز العصبي الودي بعضها أو كلها.

**ramisectomy (= ramisection)** **قَطْعُ**  
**الْفُرُوعِ.**

**ramitis** **إِلْتِهَابُ الْفُرْعِ.** التهاب أحد الفروع.

**ramus** **فَرْعٌ.** (ج. فُرُوعٌ). مصطلح عام لبنية صغيرة تتفرع من أخرى كبيرة.

**- rami alveolares superiores anteriores nervi infraorbitalis** **الْفُرُوعُ السِّنِّيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ**  
**الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَاجِجِيِّ.** فروع من العصب تحت الحاجبي تغذي الاسنان القواطع والانياب في الفك العلوي وتساعد في ذلك فروع من الضفيرة السنية العلوية كما أنها تغذي قاع الأنف. وهي أعصاب حسية عامة.

**- r. alveolaris superior medius nervi infraorbitalis** **الْفَرْعُ السِّنِّيُّ الْعُلْوِيُّ الْوَسْطِيُّ**  
**لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَاجِجِيِّ.** فرع من العصب تحت الحاجبي يغذي الاسنان الضاحكة للفك العلوي عن طريق الضفيرة السنية العلوية، وهو عصب حسي عام.

**- rami alveolares superiores posteriores nervi maxillaris** **الْفُرُوعُ**  
**السِّنِّيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلْوِيِّ.** فروع عصبية تغذي جيب الفك العلوي والوجنة واللثة والاسنان الضاحكة والرحى في الفك العلوي وتكون جزءاً من الضفيرة السنية العلوية وهي أعصاب حسية عامة.

**- r. anastomoticus (= r. communicans)** **فَرْعٌ تَفَاعُغَرِيٌّ؛ فَرْعٌ اتِّصَالِيٌّ.** فرع يوصل أحد الاعصاب بعصب آخر.

**- r. anterior ascendens fissurae cerebri lateralis (sylvii) (= r. ascendens sulci lateralis cerebri)** **الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ الصَّاعِدُ لِلشَّقِّ**  
**الْمَخِيِّ الْوَحْشِيِّ (السِّلْفِيِّ).**

**- r. anterior horizontalis fissurae cerebri lateralis (= r. anterior sulci lateralis cerebri)** **الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ الْأَفْقِيّ لِلشَّقِّ**  
**الْمَخِيِّ الْوَحْشِيِّ.**

**- r. anterior nervi auricularis magni** **الْفَرْعُ**  
**الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْأُذْنِيِّ الْكَبِيرِ.** عصب يتوزع إلى جلد الوجه فوق الغدة النكفية وهو عصب حسي عام.

**- rami anteriores nervorum cervicalium (= rami ventrales nervorum cervicalium)** **الْفُرُوعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ.**

**- r. anterior nervi coccygel (= r. ventralis nervi coccygel)** **الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ**

لِلْعَصَبِ الْغُصَصِيِّ.

- r. anterior nervi cutanei anterbrachii  
الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْجَنْدِيِّ (medialis)  
الإنسيّ للسّاعد. عصب يغذي جلد الجهتين الامامية  
والإنسية للسّاعد وهو عصب حسي عام.
- r. anterior nervi laryngei inferioris  
الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ.
- rami anteriores nervorum lumbalium  
(= rami ventrales nervorum lumbalium)  
الْفُرُوعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْقَطَنِيَّةِ.
- r. anterior nervi obturatorii  
الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ السِّدَائِيِّ. عصب يغذي العضلات الرشيقة  
والمقربتين الطويلة والقصيرة والعانية ويعطي أحياناً  
فرعاً للجهة الإنسية من الفخذ والساق وهو عصب  
حركي وحسي عام.
- rami anteriores nervorum sacralium  
(= rami ventrales nervorum sacralium)  
الْفُرُوعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْعَجَزِيَّةِ.
- r. anterior nervorum spinalium (= r.  
ventralis nervorum spinalium)  
الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ.
- rami anteriores nervorum thoracalium  
(= rami ventrales nervorum  
thoracorum)  
الْفُرُوعُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ.
- r. anterior ramorum cutaneorum  
lateralium (pectoralium et abdominal-  
lum) nervorum intercostalium  
الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلتَّلَمِ الْوُخْشِيِّ (بَيْنَ  
الْفُرُوعِ الْجَلْدِيَّةِ الْوُخْشِيَّةِ لِلْعَصَبِ الْوَرَبِيِّ) (بَيْنَ  
الْأَضلاع).
- r. anterior sulci lateralis cerebri  
الْفَرْعُ الْأَمَامِيُّ لِلتَّلَمِ الْوُخْشِيِّ الْمُخِّي. تلم يسير إلى الامام  
لمسافة قصيرة إلى التلفيف الجبهي السفلي ويسمى  
أيضاً الفرع الأمامي للتلفيف المخي الوحشي.
- r. ascendens sulci lateralis cerebri  
الْفَرْعُ الصَّاعِدُ لِلتَّلَمِ الْوُخْشِيِّ الْمُخِّي. تلم يجري إلى  
الأعلى لمسافة قصيرة حتى التلفيف الجبهي السفلي.
- r. auricularis nervi vagi  
الْفَرْعُ الْأُذُنِيُّ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فرع ينبع من العقدة العلوية للعصب  
المبهم ويغذي السطح القحفي للاذن وقاع الصماخ

السمعي الظاهر والمنطقة المجاورة من غشاء الطبل  
وهو عصب حسي عام.

- rami bronchiales anteriores nervi vagi  
الْفُرُوعُ الْقَصْبِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.
- rami bronchiales nervi vagi  
الْفُرُوعُ الْقَصْبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع العصب المبهم التي  
تغذي القصبات والاعوية الدموية الرئوية بصورة  
مباشرة عن طريق القسمين الامامي والخلفي للضفيرة  
الرئوية وهي اعصاب ودية وحشوية واردة.
- rami buccales nervi facialis  
الْفُرُوعُ الشَّدَقِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ. فروع تغذي العضلات  
الوجنية ورافعة الشفة العلوية والمبوقة والفم الدويرية  
وهي اعصاب حركية وحسية عامة.
- rami calcanei laterales nervi suralis  
الْفُرُوعُ الْعَقَبِيَّةُ الْوُخْشِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرُّبْلِيِّ. فروع  
تغذي جلد خلف الساق والجهة الوحشية للقدم والعقب  
وهي اعصاب حسية عامة.
- rami calcanei mediales nervi tibialis  
الْفُرُوعُ الْعَقَبِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ. فروع  
تغذي الجهة الإنسية للعقب والقسم الخلفي من  
الاحمض وهي اعصاب حسية عامة.
- rami capsulae internae  
الْفُرُوعُ الْمُحْفَظَةُ الدَّاخِلِيَّةُ. فروع صغيرة من الشريان المشيمائي  
الامامي تغذي المحفظة الداخلية.
- rami cardiaci cervicales inferiores  
nervi recurrentis (= rami cardiaci  
cervicales inferiores nervi vagi)  
الْفُرُوعُ الْقَلْبِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّاجِعِ.
- rami cardiaci cervicales inferioris  
nervi vagi  
الْفُرُوعُ الْقَلْبِيَّةُ الرَّقِيبِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع (تسمى أحياناً الرقبية  
الصدرية) تنبع من العصبين المبهمين ومن العصب  
الحنجري الراجع في مدخل الصدر وتتحد مع الاعصاب  
الرقبية الصدرية الودية القلبية ويمر العصب الموحد  
منهما إلى الضفيرة القلبية وهي اعصاب لا ودية  
وحشوية واردة. وتسمى أيضاً الفروع القلبية السفلية  
للعصب الحنجري الراجع.
- rami cardiaci cervicales superiores  
الْفُرُوعُ الْقَلْبِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع مختلفة تنبع من العصب المبهم في

المنطقة الرقبية وعادة ما تتصل بالأعصاب الودية الرقبية ومن ثم تنزل هذه الأعصاب المتحدة أمام أو خلف قوس الأبر إلى الصغيرة القلبية وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

**- rami cardiacii inferiores nervi**

**recurrentis (= rami cardiacii cervicales inferiores nervi vagi)** الفروع القلبية السفلية للعصب الرابع.

**- rami cardiacii thoracici nervi vagi** الفُروع القَلْبِيَّة الصَّدْرِيَّة لِلْعَصَبِ المُبْهَم. فروع تنبع في الصدر من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر والعصب الحنجري الرابع الأيسر وتسير مباشرة إلى الجدران الخلفية للالذين وإلى الضفائر الشاجية والرئوية الأمامية.

**- rami celiacii nervi vagi (= rami coeliacii nervi vagi)** الفُروع البَطْنِيَّة لِلْعَصَبِ المُبْهَم.

**- rami coeliacii nervi vagi** الفُروع البَطْنِيَّة لِلْعَصَبِ المُبْهَم. فروع تنبع من الجذعين المبهمين الأمامي والخلفي وتتحد مع الصغيرة البطنية وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

**- r. colli nervi facialis** الفُروع الرَقْبِيَّة لِلْعَصَبِ الوُجْهِي. فرع عصبي يقع تحت العضلة الجذلية للعنق التي يغذيها باللياف حركية.

**- r. communicans** فُروع مُوصِّل. 1. فرع عصبي يوصل عصبين 2. فرع يوصل شريانين.

**- r. communicans albus** الفُروع المَوْصِّل الأبيض. اليااف عصبية بيضاء مغمدة قبل عقدية تجري من العقد الودية إلى الجذور البطنية والظهرية للأعصاب النخاعية.

**- r. communicans cochlearis** الفُروع المَوْصِّل القَوَاقِعِي. فرع من العصب الدهليزي يتحد مع العصب القوقعي.

**- r. communicans fibularis nervi fibularis communis** الفُروع الشَطْوِي المَوْصِّل لِلْعَصَبِ الشَطْوِي الأَصْلِي. فرع صغير ينبع من العصب الشطوي الأصلي إما مع العصب الجذلي الربلي الوحشي أو بصورة منفصلة، ثم يتصل مع العصب الجذلي الربلي الإنسي ليكونا العصب الربلي.

**- r. communicans ganglii ciliaris cum nervo nasocillari** الفُروع المَوْصِّل لِلْعُقْدَةِ

الهِدْبِيَّة مَعَ الْعَصَبِ الأَنْفِي الهِدْبِي. فرع أو فروع تحمل الياافاً عصبية حسية من القرنية والقزحية والجسم الهدبي والمشيماء ويمر خلال العقدة الهدبية إلى العصب الأنفي الهدبي. ويسمى أيضاً الجذر الحسي للعقدة الهدابوية.

**- r. communicans ganglii otici cum chorda tympani** الفُروع المَوْصِّل لِلْعُقْدَةِ الأُذُنِيَّة مَعَ جُذْع الطَّبَل. فرع عصبي صغير يربط العقدة الأذنية مع عصب حبل الطبل.

**- r. communicans ganglii otici cum nervo auriculotemporalis** الفُروع المَوْصِّل لِلْعُقْدَةِ الأُذُنِيَّة مَعَ الْعَصَبِ الأُذُنِي الصُدْغِي. فرع يحمل الياافاً لا ودية بعد عقدية من العقدة الأذنية إلى العصب الأذني الصدغي لتتوزع إلى الغدة النكفية.

**- r. communicans ganglii otici cum nervo pterygoideo mediali** الفُروع المَوْصِّل لِلْعُقْدَةِ الأُذُنِيَّة مَعَ الْعَصَبِ الجَنَاحِي الإنْسِي. فرع من العصب الجناحي الإنسي يتصل مع العقدة الأذنية.

**- r. communicans ganglii otici cum ramo meningeo nervi mandibularis** الفُروع المَوْصِّل لِلْعُقْدَةِ الأُذُنِيَّة مَعَ الفُروع السِّحَاحِي لِلْعَصَبِ الفَكِّي السُّفْلِي. فرع يحمل الياافاً مستقلة متوجهة للسحايا من العقدة الأذنية إلى الفرع السحاحي من العصب الفكي السفلي.

**- rami communicantes ganglii submandibularis cum nervo linguai** الفُروع المَوْصِّلَة لِلْعُقْدَةِ تَحْتَ الفَكِّيَّة السُّفْلِيَّة مَعَ الْعَصَبِ اللِّسَانِي. فروع عصبية تربط العصب اللساني مع العقدة تحت الفككية السفلية التي تتعلق بواسطتها من العصب وهي تنقل الياافاً قبل عقدية مشتقة من حبل الطبل وتتشابك مع اليااف بعد عقدية في العقدة تحت الفككية السفلية وتسمى أيضاً الجذور الحركية للعقدة تحت الفككية السفلية.

**- r. communicans griseus** الفُروع المَوْصِّل السِّنْجَابِي. أي من اليااف العصبية غير المغمدة وبعد العقدية التي تسير من العقد الودية كالألياف الحشوية الصادرة التي تغذي الأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الملساء.

**- r. communicans griseus ganglii sympathetici** الفُروع السِّنْجَابِي المَوْصِّل

للعقدة الودية. أحد الفرعين العصبيين الموصلين بين العقدة الودية والعصب الشوكي وهو ينقل الدفعات بعد العقدة إلى العصب الشوكي ثانية وثم ليوصل إلى الأوعية الدموية والغدد العرقية والعضلات الملساء.

**- rami communicantes nervi**

**auriculotemporalis cum nervo faciali**

الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِي الصَّدْغِي مَعَ الْعَصَبِ الْوَجْهِي. فروع تحوي أليافاً حسية من العصب الأذني الصدغي تتصل بالعصب الوجهي في داخل الغدة النكفية لتنتشر مع فروعها الأخرى.

**- r. communicans nervi facialis cum**

**nervo glossopharyngeo** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ

لِلْعَصَبِ الْوَجْهِي مَعَ اللُّسَانِي الْبَلْعُومِي. فرع يربط العصب اللساني البلعومي مع العصب الوجهي بعد خروج الأخير من الثقبة الإبرية الخشائية.

**- r. communicans nervi facialis cum**

**plexus tympanico** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ

الْوَجْهِي مَعَ الضَّفِيرَةِ الطَّبْلِيَّة. فرع يربط العصب الوجهي مع الضفيرة الطبلية للعصب اللساني البلعومي.

**- r. communicans nervi glossopharyngei**

**cum ramo auricularis nervi vagi** الْفَرْعُ

الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ اللُّسَانِي الْبَلْعُومِي مَعَ الْفَرْعِ الْأَذْنِي لِلْعَصَبِ الْمُبْهَم.

**- r. communicans nervi intermedii cum**

**nervo vagi** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ الْمُتَوَسِّطِ

مَعَ الْعَصَبِ الْمُبْهَم.

**- r. communicans nervi intermedii**

**cum plexus tympanico** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ

لِلْعَصَبِ الْمُتَوَسِّطِ مَعَ الضَّفِيرَةِ الطَّبْلِيَّة.

**- r. communicans nervi lacrimalis cum**

**nervo zygomatico** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ

الذَّمْعِي مَعَ الْعَصَبِ الْوَجْهِي. فرع يحمل أليافاً لا ودية بعد عقدة يتأصل في العقدة الجناحية الحنكية ويتجه نحو الغدة الدمعية.

**- r. communicans nervi laryngei inferi-**

**oris cum ramo laryngeo interno** الْفَرْعُ

الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ مَعَ الْفَرْعِ الْحَنْجَرِيِّ الْغَائِرِ. فرع صغير يربط العصب الحنجري

السفلي مع الفرع الباطن للعصب الحنجري العلوي خلف أو في العضلة الحلقية الطرجهالية.

**- r. communicans nervi laryngei**

**superioris cum nervo laryngeo inferiore**

الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ الْعُلَوِيِّ مَعَ الْعَصَبِ الْحَنْجَرِيِّ السُّفْلِيِّ. فرع صغير يربط الفرع الباطن للعصب الحنجري العلوي مع العصب الحنجري السفلي خلف أو في العضلة الحلقية الطرجهالية.

**- r. communicans nervi lingualis cum**

**chorda tympani** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ

اللُّسَانِي مَعَ الْحَبْلِ الطَّبْلِيِّ. الحبل الطبلي عند اتصاله بالعصب اللساني في الحفرة تحت الصدغية بالجهة الانسية من العضلة الجناحية الوحشية وهو عصب لا ودي وحسي خاص.

**- rami communicantes nervi lingualis**

**cum nervo hypoglosso** الْفُرُوعُ الْمُوصِّلَةُ

لِلْعَصَبِ اللُّسَانِي مَعَ الْعَصَبِ تَحْتَ اللُّسَانِي. فروع انتهائية ضفيرية الشكل تربط العصب اللساني مع العصب تحت اللساني مباشرة أمام العضلة تحت اللسانية.

**- r. communicans nervi mediani cum**

**nervo ulnari** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ

مَعَ الْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. فرع صغير يعبر العضلة المثبتة للأصابع العميقة يربط العصب الناصف بالعصب الزندي.

**- rami communicantes nervorum**

**spinalium** الْفُرُوعُ الْمُوصِّلَةُ لِلْأَعْصَابِ

النَّخَاعِيَّة. فروع تربط الأعصاب النخاعية الشوكية مع العقد الودية حيث يستلم كل عصب نخاعي فرعاً موصلًا سنجايباً كما تستلم الأعصاب الصدرية والقطنية بالإضافة لذلك فروعاً موصلة بيضاء.

**- r. communicans nervi vagi cum nervo**

**glossopharyngeo** الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ

الْمُبْهَم مَعَ الْعَصَبِ اللُّسَانِي الْبَلْعُومِي. فرع صغير يربط الفرع الأذني للعصب المبهم مع العصب اللساني البلعومي.

**- r. communicans peroneus nervi**

**peronei communis (= r. communicans**

**fibularis nervi fibularis communis)**

الْفَرْعُ الْمُوصِّلُ لِلْعَصَبِ الشَّظْلَوِيِّ الْأَصْلِيِّ.

**- r. communicans ulnaris nervi radialis**

الفَرْعُ المُوصِّلُ الزَّنْدِي لِلْعَصَبِ الْكُفْبَرِيِّ. فرع صغير في اليد يربط العصب الاصبعي الظهري الإنسي من الفرع السطحي للعصب الكعبري مع العصب الاصبعي الظهري الوحشي المجاور من الفرع الظهري للعصب الزندي.

**- rami cutanei anteriores nervi**

الفُرُوعُ الجِلْدِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ femorales الفُخْذِيِّ. ألياف عصبية تغذي الجلد على الوجهين الأمامية والإنسية للفخذ والرضفة وتساهم في تكوين الضفيرتين الرضفية وتحت الخياطية وهي الألياف حسية عامة.

**- r. cutaneus anterior nervi**

الفَرْعُ الجِلْدِيُّ الأَمَامِيُّ iliohypogastrici لِلْعَصَبِ الْحَرْقَفِيِّ الْخَلْطِيِّ. فرع يسير إلى الأمام بين العضلتين المائلتين الظاهرة والباطنة ويغذي الجلد فوق العانة وهو عصب حسي عام.

**- r. cutaneus anterior (pectoralis/ abdominalis) rami ventralis nervi thoracici**

الفَرْعُ الجِلْدِيُّ الأَمَامِيُّ (الصَّدْرِيُّ والبَطْنِيُّ) لِلْفُرُوعِ البَطْنِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ. فرع يساعد في تغذية جلد المناطق الأمامية الإنسية للبطن والصدر بالاشتراك مع الفروع الثديية الإنسية التي تتفرع في منطقة الثدي وهي أعصاب حسية عامة.

**- r. cutaneus lateralis nervi**

الفَرْعُ الْوُخْشِيُّ الجِلْدِيُّ iliohypogastrici لِلْعَصَبِ الْحَرْقَفِيِّ الْخَلْطِيِّ. فرع يتوزع على جانب الألية وهو عصب حسي عام.

**- r. cutaneus lateralis (pectoralis/ abdominalis) nervorum intercostalium**

الفَرْعُ الْوُخْشِيُّ الجِلْدِيُّ (الصَّدْرِيُّ والبَطْنِيُّ) لِلْعَصَبِ الْوُزْبِيِّ.

**- r. cutaneus lateralis (pectoralis/ abdominalis) ramorum ventralium**

الفَرْعُ الْوُخْشِيُّ الجِلْدِيُّ (الصَّدْرِيُّ والبَطْنِيُّ) لِلْفُرُوعِ البَطْنِيَّةِ لِلْعَصَبِ الصَّدْرِيِّ. تنقسم الفروع الوحشية الوربية إلى قسمين أمامي وخلفي ليغذيا الجلد على جهتي الجسم الوحشية والخلفية وهي فروع حسية عامة.

**- r. cutaneus lateralis ramorum**

dorsalium nervorum thoracorum

الفَرْعُ الْوُخْشِيُّ الجِلْدِيُّ لِلْفُرُوعِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ. الفرع الوحشي من القسمين الانتهايين للفرع الظهري من كل من الأعصاب الصدرية والذي يغذي العضلة الرافعة للضلع ثم العضلات الصدرية الطويلة والقطنية الضلعية الصدرية. أما الفروع السفلية من هذه الأعصاب فإنها تنقب العضلة العريضة الظهرية وتغذي جلد الظهر.

**- r. cutaneus medialis ramorum**

dorsalium nervorum thoracorum

الفَرْعُ الْإِنْسِيُّ الجِلْدِيُّ لِلْفُرُوعِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ. الفرع الإنسي للقسمين الانتهايين من الفرع الظهري الصدري. وتغذي الفروع العلوية من هذه الأعصاب جلد الظهر أما الفروع السفلية فإنها تغذي العضلة الناصبة للفقرار كما تغذي المجموعتان السحقاق والأوتار والمفاصل المجاورة.

الفَرْعُ الجِلْدِيُّ r. cutaneus nervi obturatorii لِلْعَصَبِ السِّدَائِيِّ. فرع ينبع من الفرع الأمامي للعصب السدادي مكوناً جزءاً من الضفيرة تحت الخياطية ويغذي جلد الناحية الإنسية للفخذ والساق وهو عصب حسي عام.

**- r. cutaneus palmaris nervi ulnaris**

الفَرْعُ الرَّاجِعِيُّ (= r. palmaris nervi ulnaris) لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ.

**- rami dentales inferiores plexus**

الفُرُوعُ السِّنِّيَّةُ السُّفْلِيَّةُ dentalis inferioris لِلضَّفِيرَةِ السِّنِّيَّةِ السُّفْلِيَّةِ. فروع تغذي الأسنان السفلية بأعصاب حسية عامة.

**- rami dentales superiores plexus**

الفُرُوعُ السِّنِّيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ dentalis superioris لِلضَّفِيرَةِ السِّنِّيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ. فروع تغذي الأسنان العلوية بأعصاب حسية عامة.

**- r. descendens nervi hypoglossi (= radix superior ansae cervicalis)**

الفَرْعُ النَّازِلُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِ. الجذر العلوي للعروة الرقبية.

**- r. digastricus nervi facialis**

فَرْعُ ذَاتِ البَطْنَيْنِ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِيِّ. فرع يغذي البطن الخلفي للعضلة ذات البطنين بألياف حركية ويسمى عصب ذات البطنين.

**- r. dorsalis manus nervi ulnaris (= r.**

dorsalis nervi ulnaris) الفَرْعُ الظَّهْرِيُّ الْيَدَوِيُّ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ.

**- rami dorsales nervorum cervicallum**

الفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ للأعصابِ الرِّقَبِيَّة. الفروع الظهرية للأعصاب الرقبية الشمانية.

**- r. dorsalis nervi coccygei**

الفَرْعُ الظَّهْرِيُّ للعَصَبِ العَصَصِيِّ. الفرع الظهري للعصب النخاعي الأخير الذي يساعد في تغذية الجلد الذي يغطي العصعص باللياف حسية عامة.

**- rami dorsales nervorum lumballum**

الفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ للأعصابِ القَطَنِيَّة. الفروع الظهرية للأعصاب القطنية الخمسة.

**- rami dorsales nervorum sacralium**

الفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ للأعصابِ العَجْزِيَّة. الفروع العصبية الظهرية للأعصاب العجزية الخمسة.

**- r. dorsalis nervorum spinalium**

الفَرْعُ الظَّهْرِيُّ للأعصابِ النُّخَاعِيَّة. أصغر الفرعين الرئيسيين التي يتفرع لهما العصب النخاعي الشوكي عند مجرد ظهوره من الثقبة بين الفقرتين وتغذي الفروع الظهرية الجلد والعضلات والمفاصل وعظام المنطقتين الخلفيتين للرقبة والظهر وينقسم عادة كل فرع ظهري إلى قسم إنسي وآخر وحشي.

**- rami dorsales nervorum thoracicorum**

الفُرُوعُ الظَّهْرِيَّةُ للأعصابِ الصَّدْرِيَّة. الفروع العصبية الظهرية للأعصاب الصدرية الإثني عشر.

**- r. dorsalis nervi ulnaris**

الفَرْعُ الظَّهْرِيُّ للعَصَبِ الزَّنْدِي. فرع جلدي كبير يتأصل من العصب الزندي ويمر إلى الجزء الأسفل من الساعد إلى الجهة الإنسية من ظهر اليد حيث ينقسم إلى ثلاثة وأحياناً إلى أربعة أعصاب ظهرية أصبعية ويسمى أيضاً الفرع الظهري اليدوي للعصب الزندي وهو عصب حسي.

**- r. externus nervi accessorii**

الفَرْعُ الظَّاهِرُ للعَصَبِ الإِضَافِي. فرع العصب الإضافي القحفي الحادي عشر الذي ينبع من الجذور النخاعية للعصب ويرسل فروعاً عضلية لتغذية العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.

**- r. externus nervi laryngei superioris**

الفَرْعُ الظَّاهِرُ للعَصَبِ الحَنَجَرِيِّ العُلْوِيِّ. أصغر الفرعين اللذين ينقسم لهما العصب الحنجري العلوي والذي ينزل تحت غطاء العضلة القصية الدرقية ويغذي العضلتين الحلقية الدرقية ومضيقة البلعوم السفلية وهو عصب حركي.

**- rami fauciales nervi lingualis (= rami isthmi faucium nervi lingualis)**

الفُرُوعُ الحَلْقِيَّةُ للعَصَبِ اللِّسَانِيِّ.

**- r. femoralis nervi genitofemoralis**

الفَخْذِيُّ للعَصَبِ التَّنَاسُلِيِّ الفَخْذِيِّ. فرع يتكون من انقسام العصب التناسلي الفخذي فوق الرباط الأربي ثم يدخل الغمد الفخذي ويدور إلى الامام ليفذي جلد المثالث الفخذي وهو عصب حسي عام.

**- r. frontalis nervi frontalis**

الفَرْعُ الجَبْهِيُّ للعَصَبِ الجَبْهِيِّ.

**- rami ganglionares nervi lingualis**

الفَقْدِيَّةُ للعَصَبِ اللِّسَانِيِّ. اليااف عصبية تربط العصب اللساني بالعقدة تحت اللسانية.

**- rami ganglionares nervi maxillaris**

الفُرُوعُ الفَقْدِيَّةُ للعَصَبِ الفَكِّيِّ العُلْوِيِّ. اليااف عصبية تربط العصب الفكي العلوي بالعقدة الجناحية الحنكية.

**- r. ganglionis trigemini**

الفَرْعُ العُقْدِيُّ لِلثَّلَاثِيِّ التَّوَاتِمِ. فرع صغير من الجزء الكهفي من الشريان السباتي الباطن يغذي العقدة ثلاثية التوائم.

**- rami gastrici anteriores nervi vagi**

الفُرُوعُ المَعْدِيَّةُ الأَمَامِيَّةُ للعَصَبِ المُبْهَمِ. فروع تنبع من الجذع الأمامي للعصب المبهم بالقرب من النهاية الفؤادية للمعدة وتغذي الوجه الأمامي للحنية المعدية الصغرى والسطح الأمامي للمعدة حتى البواب تقريباً، وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

**- rami gastrici nervi vagi**

الفُرُوعُ المَعْدِيَّةُ للعَصَبِ المُبْهَمِ.

**- rami gastrici posteriores nervi vagi**

الفُرُوعُ المَعْدِيَّةُ الخَلْفِيَّةُ للعَصَبِ المُبْهَمِ. فروع تنبع من الجذع الخلفي للمبهم بالقرب من النهاية الفؤادية وتغذي الفوهة الفؤادية وقاع المعدة والنناحية الخلفية للحنية المعدية الصغرى والوجه الخلفي للمعدة حتى غار البواب وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

**- r. genitalis nervi genitofemoralis**

التَّنَاسُلِيُّ للعَصَبِ التَّنَاسُلِيِّ الفَخْذِيِّ. فرع ينبع من العصب التناسلي الفخذي فوق الرباط الأربي ثم يدخل القناة الأربية خلال الحلقة العميقة ويغذي العضلة المشتمرة ثم يستمر ليفذي جلد الصنفن أو الشفر الكبير



ومناطق الفخذ المجاورة له وهو عصب حركي وحسي عام.

#### - rami gingivales inferiores plexus

**الفُرُوعُ اللُّثَوِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ dentalis inferioris**  
لِلضَفِيرَةِ السَّنِيَّةِ السُّفْلِيَّةِ. فروع تنبع من الضفيرة السننية العلوية وتغذي لثة الفك الأسفل بأعصاب حسية عامة.

#### - rami glandulares ganglii

**الفُرُوعُ الغُدِّيَّةُ لِلْعُقْدَةِ submandibularis**  
تحت **الفَكَّةِ السُّفْلِيَّةِ**. فروع قصيرة تجري من العقدة تحت الفك السفلي لتغذي الغدة تحت الفك السفلي وهي تحمل أليافاً لا ودية بعد عقدية (أليافاً إفرازية) من هذه العقدة وأليافاً ودية بعد عقدية من العقدة الرقبية العلوية.

#### - rami hepatici nervi vagi

**الفُرُوعُ الكَبِدِيَّةُ لِلْعَصَبِ المُبْهِمِ**. فروع (وأحياناً فرع واحد) تنبع من الجذع الأمامي للمبهم تسير إلى الضفيرة الكبدية وتساعد في تغذية الكبد والمرارة والبنكرياس والبواب والإثنا عشري، وهي أعصاب لا ودية وحشوية واردة.

#### - rami inferiores nervi cutanei colli

(= rami inferiores nervi transversi colli)  
**الفُرُوعُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الجِلْدِيِّ الرَّقْبِيِّ**.

#### - r. inferior nervi oculomotorii

**الْفَرْعُ السُّفْلِيُّ لِلْعَصَبِ المُحَرِّكِ لِلْعَيْنِ**. فرع العصب المحرك للعين الذي يغذي العضلات المستقيمة السفلية والإنسية والمائلة السفلية للعين ويغذي من خلال الجذر الحركي للعقدة الهدبية الذي يمر إلى الأعصاب الهدبية القصيرة العضلات مضيقفة الحدقة والهدبية وهو عصب حركي ولا ودي.

#### - rami inferiores nervi transversi colli

**الفُرُوعُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرَّقْبِيِّ المُسْتَعْرِضِ**. أوطا الفروع العصبية التي تنبع من العصب الرقبى المستعرض قرب الحافة الأمامية للعضلة القصية الترقوية الخشائية ويغذي الجلد والأنسجة تحت الجلدية في المنطقة الرقبية الأمامية بأعصاب حسية عامة.

#### - r. infrapatellaris nervi sapheni

**الْفَرْعُ تَحْتَ الرُّضْفَةِ لِلْعَصَبِ الصَّافِنِ**. فرع عصبي يجري إلى الجهة السفلية الوحشية من العصب الصافن إلى الضفيرة الرضفية وهو عصب حسي عام.

**الفُرُوعُ بَيْنَ الْعُقَدِ rami Interganglionares**  
فروع عصبية تربط عقد الجذع الودي.

#### - r. Internus nervi accessorii

**الْفَرْعُ الْغَائِرُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ**. الفرع العصبي الذي يستمر من الجذور القحفية للعصب الإضافي حاملاً أليافاً حركية تنتشر عن طريق فروع العصب المبهم إلى شراع الحنك (الحقاف) ومضيقات البلعوم والحنجرة.

#### - r. Internus nervi laryngel superioris

**الْفَرْعُ الْغَائِرُ لِلْعَصَبِ الْحَنَجَرِيِّ الْعُلْوِيِّ**. أكبر الفرعين من العصب الحنجري العلوي الذي يغذي الغشاء المخاطي للفلكة (لسان المزمار) وقاعدة اللسان والحنجرة وهو عصب حسي عام.

#### - rami isthmi faucium nervi lingualis

**الفُرُوعُ الْبِزْرَجِيَّةُ الْخَلْقِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ**. فروع من العصب اللساني إلى بروز الحلق لتغذيه بأعصاب حسية عامة. وهي تسمى أيضاً الفروع الحلقية للعصب اللساني.

#### - rami labiales inferiores nervi mentalis

**الفروع الشفوية السفلية للعصب الذقني**. فروع من العصب الذقني تغذي الشفة السفلية بأعصاب حسية عامة.

#### - rami labiales superiores nervi

**الفُرُوعُ الشَّفَوِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ لِلْعَصَبِ infraorbitalis**  
تحت **الْحَاجَاجِيِّ**. فروع من العصب تحت الحاجاجي تنتشر إلى الأغشية المخاطية للخم ولجلد الشفة العليا وتغذيها بأعصاب حسية عامة.

#### - rami laryngopharyngeal ganglii

**الفُرُوعُ الْحَنَجَرِيَّةُ cervicalis superioris**  
**الْبُلْعُومِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الرَّقْبِيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ**. فروع من العقدة الرقبية العلوية إلى الحنجرة وجدار البلعوم وتغذيها بألياف ودية.

#### - r. lateralis nervi supraorbitalis

**الْفَرْعُ الْوَحْشِيُّ لِلْعَصَبِ فَوْقَ الْحَاجَاجِيِّ**. فرع يغذي الجيب الجبهي والجفن العلوي وجلد الجبهة وأنسجتها تحت الجلدية والجهة الوحشية للفرجة حتى منطقة الصدغ وهو فرع حسي عام.

#### - r. lateralis ramorum dorsallum

**الْفَرْعُ الْوَحْشِيُّ لِلْفَرْعِ nervorum cervicalium الظَّهْرِيِّ لِلْأَعْصَابِ الرَّقْبِيَّةِ**. الفرع الوحشي الذي ينبع من الفرع الظهري لكل من الأعصاب الرقبية الثمان ويغذي العضلات المجاورة.

**- r. lateralis ramorum dorsalium nervorum lumbalium** الفرع الوحشي للفرع الظهري للأعصاب القطنية. الفرع الذي يجري نحو الجهة

السفلية الوحشية من الفرع الظهري من كل من الأعصاب القطنية ليغذي العضلات المجاورة وتكون الفروع العليا من هذه المجموعة عند نهاياتها الأعصاب الأولية التي تغذي جلد الالية.

**- r. lateralis ramorum dorsalium nervorum sacralium** الفرع الوحشي للفرع الظهرية للأعصاب العجزية. الفرع الوحشي الذي ينبع من الفرع الظهري من كل من الأعصاب العجزية العلوية الثلاث.

**- r. lateralis ramorum posteriorum nervorum cervicalium (= r. lateralis ramorum dorsalium nervorum cervicalium)** الفرع الوحشي للفرع الخلفية للأعصاب الرقبية.

**- r. lateralis ramorum posteriorum nervorum lumbalium (= r. lateralis ramorum dorsalium nervorum lumbalium)** الفرع الوحشي للفرع الخلفية للأعصاب القطنية.

**- r. lateralis ramorum posteriorum nervorum sacralium (= r. lateralis ramorum dorsalium nervorum sacralium)** الفرع الوحشي للفرع الخلفية للأعصاب العجزية.

**- rami ilenales plexus coeliaci** الفرع الطحالية للضفيرة البطنية.

**- r. lingualis nervi facialis** الفرع اللساني للعصب الوجهي. فرع عصبي غير ثابت للعصب الوجهي ينبع أحياناً مع الفرع الإبري اللامي ويساعد في تغذية العضلتين الإبرية اللسانية واللسانية الحنكية باللياف حركية.

**- rami linguales nervi glossopharyngei** الفرع اللسانية للعصب اللساني البلعومي. فروع من العصب اللساني البلعومي تغذي الثلث الخلفي من اللسان باللياف حسية عامة وخاصة.

**- rami linguales nervi hypoglossi** الفرع اللسانية للعصب تحت اللساني. فروع من

العصب تحت اللساني تغذي العضلات الظاهرة والباطنة للسان باللياف عصبية حركية.

**- rami linguales nervi lingualis** الفرع اللسانية للعصب اللساني. فروع تغذي الثلثين الامامين للسان وبأحات الفم المجاورة والثة باللياف حسية عامة وخاصة.

**- rami mammarii laterales rami cutanei lateralis nervorum intercostalium** الفرع الثديية الوحشية للفرع الجذبية الوحشية للعصب الوربي.

**- rami mammarii laterales rami cutanei lateralis nervorum thoracicorum** الفرع الثديية الوحشية للفرع الجذبية الوحشية للعصب الصدري (الوربي). وهي أعصاب حسية عامة.

**- r. marginalis mandibulae nervi facialis** الفرع الهامشي الفكي السفلي للعصب الوجهي. فرع من العصب الوجهي يجري إلى الامام من الغدة النكفية على طول حافة الفك السفلي وبالعق من العضلتين الجذبية للعنق ومخفضة زاوية الفم ويغذيها والعضلات الضحكية وخافضة الشفة السفلية والذقنية باللياف عصبية حركية.

**- r. medialis nervis supraorbitalis** الفرع الإنسي للعصب فوق الحاجي. فرع يغذي الجيب الجبهي والجفن العلوي والجلد والانسجة تحت الجلدية للجبهة وفروة الرأس حتى العظم الجداري من الخلف باللياف حسية عامة.

**- r. medialis ramorum dorsalium nervorum cervicalium** الفرع الإنسي للفرع الظهرية للأعصاب الرقبية. فرع ينبع من الفرع الظهري من كل من الأعصاب الرقبية الثمانية ويغذي العضلات والسماح والمفاصل والاربطة ثم ينتهي بفروع جلدية ما عدا الأعصاب الاول والسادس والسابع والثامن.

**- r. medialis ramorum dorsalium nervorum lumbalium** الفرع الإنسي للفرع الظهرية للأعصاب القطنية. فروع تنبع من الفرع الظهري لكل من الأعصاب القطنية الخمسة وتغذي بصورة رئيسية العضلات ولكنها تساعد أيضاً في تغذية الاربطة والسماح والمفاصل.

- r. medialis ramorum dorsalium nervorum sacralium      **الْفَرْعُ الْإِنْسِيّ لِلْفُرُوعِ الظَّهْرِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْعَجْزِيَّةِ.** فرع ينبع من الفرع الظهري لكل من الأعصاب العجزية العلوية الثلاث.
- r. medialis ramorum posteriorum nervorum cervicalium (= r. medialis ramorum dorsalium nervorum cervicalium)      **الْفَرْعُ الْإِنْسِيّ لِلْفُرُوعِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ.**
- r. medialis ramorum posteriorum nervorum lumbalium (= r. medialis ramorum dorsalium nervorum lumbalium)      **الْفَرْعُ الْإِنْسِيّ لِلْفُرُوعِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْقَطَنِيَّةِ.**
- r. medialis ramorum posteriorum nervorum sacralium (= r. medialis ramorum dorsalium nervorum sacralium)      **الْفَرْعُ الْإِنْسِيّ لِلْفُرُوعِ الْخَلْفِيَّةِ لِلْأَعْصَابِ الْعَجْزِيَّةِ.**
- r. membranae tympani nervi auriculotemporalis      **الْفَرْعُ الْغَشَائِيّ الطَّبَنِيّ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِيّ الصَّدْغِيّ.** فرع من عصب الصماخ الظاهر من فرع العصب الأذني الصدغي يغذي غشاء الطبل باللياف عصبية حسية عامة.
- r. meningeus medius nervi maxillaris      **الْفَرْعُ السِّحَائِيّ الْوَسْطِيّ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ الْعُلَوِيِّ.** فرع ينبع من العصب الفكي العلوي في الحفرة القحفية الوسطية ويرافق الشريان السحائي الوسطي ليفذي الأم الجافية بأعصاب حسية عامة. ويسمى أيضاً العصب السحائي.
- r. meningeus nervi mandibularis      **الْفَرْعُ السِّحَائِيّ لِلْعَصَبِ الْفَكِّيِّ السُّفْلِيِّ.** فرع يتفرع عن جذع العصب الفكي السفلي ثم يعود ليدخل القحف خلال الثقبية الشوكية مرافقاً الشريان السحائي المتوسط ليفذي الجافية ويساعد في تغذية الغشاء المخاطي للخلايا الهوائية الخشائية. ويسمى أيضاً العصب الشوكي.
- r. meningeus nervi ophthalmici (= r. tentori nervi ophthalmici)      **الْفَرْعُ السِّحَائِيّ لِلْعَصَبِ الْعَيْنِيِّ.**
- r. meningeus nervorum spinalium      **الْفَرْعُ السِّحَائِيّ لِلْأَعْصَابِ النُّخَاعِيَّةِ.** الفرع الصغير من كل من الأعصاب النخاعية الذي يعود ليدخل الثقبية بين الفقرتين ليفذي الأم الجافية والعمود الفقاري والأربطة المتعلقة به.
- r. meningeus nervi vagi      **الْفَرْعُ السِّحَائِيّ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ.** فرع ينبع في الثقبية الوداجية من عقدة العصب المبهم العليا ويفذي الأم الجافية في الحفرة القحفية الخلفية.
- rami mentales nervi mentalis      **الْفُرُوعُ الدَّقْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ الدَّقْنِيِّ.** فروع تغذي جلد الذقن باللياف حسية عامة.
- rami musculares      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ.** فروع الأعصاب المحيطية التي تغذي العضلات وليس لها اسم مميز خاص بها.
- rami musculares nervi accessorii      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ.** فروع الفرع الظاهر للعصب الإضافي التي تغذي العضلات القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.
- rami musculares nervi axillaris      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِبْطِيِّ.** فروع تغذي العضلات الدالية والمدورة الكبيرة باللياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi femoralis      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ.** فروع تغذي عضلات الفخذ الأمامية باللياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi fibularis profundi      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الشَّظْوِيِّ الْعَمِيقِ.** اللياف تغذي العضلات الظنبوبية الأمامية وبأسطة أصابع القدم الطويلة وبأسطة إبهام القدم الطويلة والشظوية الثالثة باللياف حركية.
- rami musculares nervi fibularis superficialis      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الشَّظْوِيِّ السُّطْحِيِّ.** اللياف تغذي العضلات الشظوية الطويلة والشظوية القصيرة باللياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi iliohypogastrici      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْخَرْقَفِيِّ الْخَلْتِيِّ.** اللياف غالباً ما تكون حسية ما عدا فروع صغيرة للعظام الهرمية.
- rami musculares nervi ilioinguinalis      **الْفُرُوعُ الْعَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْخَرْقَفِيِّ الْأَزْبِيِّ.** اللياف عصبية غالباً ما تكون حسية عامة.

- rami musculares nervorum  
intercostalium      الفُرُوعُ العَضَلِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ  
intercostalium      الوُزْبِيَّةُ. الياف عضلية حركية.
- rami musculares nervi Ischiadici      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوَرِكِيِّ.
- rami musculares nervi mediani      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. فروع تغذي معظم  
العضلات المثنية في الواجهة الامامية للساعد ومعظم  
العضلات القصيرة للابهام بالياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi musculocutanei      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ العَضَلِيِّ الجُلْدِيِّ. فروع  
تغذي العضلات الغرابوية العضدية وذات الراسين  
والعضدية وهي فروع حركية وحسية عامة.
- rami musculares nervi obturatorii      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ السِّدَّادِيِّ. فروع تنبع من  
الفرعين الامامي والخلفي للعصب السدادي وتغذي  
العضلات المسدة الظاهرة والرشيقة والمقربة وأحياناً  
العضلة العانية أيضاً، وهي الياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi peronei  
profundi (= rami musculares nervi  
fibularis profundi)      الفُرُوعُ العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ  
الشظوي العميق.
- rami musculares nervi peronei  
superficialis (= rami musculares nervi  
fibularis superficialis)      الفُرُوعُ العَضَلِيَّةُ  
للعَصَبِ الشظوي السطحي.
- rami musculares nervi radialis      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْكَفْبَرِيِّ. فروع تغذي العضلات  
ثلاثية الرؤوس والمرفقية والعضدية الكعبرية وباسطة  
الرسغ الكعبرية كما انها تجهز فرعاً للعضلة العضدية  
يحتمل أن يكون حسيّاً، وهي فروع حركية وحسية.
- rami musculares nervi tibialis      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الظَّنْبُوبِيِّ. فروع تغذي عضلات  
ظهر الساق بالياف عصبية حركية.
- rami musculares nervi ulnaris      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. فروع تغذي العضلة مثنية  
الرسغ الزندية والنصف الزندي من العضلة مثنية  
الاصابع العميقة بالياف عصبية حركية.
- rami musculares plexus lumbalis      الفُرُوعُ  
العَضَلِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ القَطَنِيَّةِ.
- r. musculi stylopharyngei nervi  
glossopharyngei      الفُرْعُ العَضَلِيَّ الْإِبْرِيَّ  
الْبَلْعُومِيَّ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ. فرع يغذي  
العضلة الإبرية البلعومية بالياف عصبية حركية.
- rami nasales anteriores nervi  
ethmoidalis anterioris (= rami nasales  
nervi ethmoidalis anterioris)      الفُرُوعُ  
الْأَنْفِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَانِيِّ الْأَمَامِيِّ.
- r. nasalis externus nervi ethmoidalis  
anterioris      الفُرْعُ الْأَنْفِيُّ الظَّاهِرُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَانِيِّ  
الْأَمَامِيِّ. فرع استمراري أو انتهائي للعصب الغربالي  
الامامي يغذي جلد القسم الظهري من الانف بالياف  
عصبية حسية عامة.
- rami nasales externi nervi infraorbitalis      الفُرُوعُ  
الْأَنْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَاجِجِيِّ. فروع تغذي  
جلد القسم الجانبي من الانف بالياف  
حسية عامة.
- rami nasales interni nervi ethmoidalis  
anterioris      الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْبَاطِنَةُ لِلْعَصَبِ  
الْغُرْبَانِيِّ الْبَاطِنِ. يغذي الفرعان الإنسي والوحشي  
منها حاجز الانف والغشاء المخاطي للجدار الوحشي  
لتجويف الانف بالياف عصبية حسية عامة.
- rami nasales laterales nervi  
ethmoidalis anterioris      الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ  
الْوَحْشِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَانِيِّ الْأَمَامِيِّ. فروع تنبع من  
الفروع الانفية الباطنة للعصب الغربالي الامامي وتغذي  
الغشاء المخاطي للجدار الوحشي لتجويف الانف  
بالياف عصبية حسية عامة.
- rami nasales mediales nervi  
ethmoidalis anterioris      الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ  
الْإِنْسِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَانِيِّ الْأَمَامِيِّ. فروع تنبع من  
الفروع الانفية الباطنة للعصب الغربالي الامامي وتغذي  
حاجز الانف بالياف عصبية حسية عامة.
- rami nasales nervi ethmoidalis  
anterioris      الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْغُرْبَانِيِّ  
الْأَمَامِيِّ. الفرعان الانفيان الباطن والظاهر للعصب  
الغربالي الامامي وفروعهما.

- rami nasales posteriores inferiores  
(laterales) ganglii pterygopalatini  
(sphenopalatini)

الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ (الْوَحْشِيَّةُ) لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع من العصب الحنكي الكبير تغذي الصماخين الأنفيين الوسطي والسفلي والقرين السفلي باللياف عصبية حسية عامة.

- rami nasales posteriores inferiores  
nervi palatini

الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْحَنَكِيِّ.

- rami nasales posteriores superiores  
(laterales) ganglii pterygopalatini  
(sphenopalatini)

الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ الْغُلُوبِيَّةُ الْوَحْشِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع تغذي القرنين العلوي والسفلي والجيوب الغربالية الخلفية باللياف حسية عامة.

- rami nasales posteriores mediales  
ganglii pterygopalatini

الفُرُوعُ الْأَنْفِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ الْإِنْسِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع من العصب الأنفي الحنكي تغذي حاجز الأنف باللياف عصبية حسية عامة.

- r. nasociliaris ganglii ciliaris (= radix  
nasociliaris ganglii ciliaris)

الفَرْعُ الْأَنْفِيُّ الْهَدَبِيُّ لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ.

- rami nuclei rubris

فُرُوعُ النُّوَاةِ الْحُمْرَاءِ. فروع من الشريان المشيماني تغذي النواة الحمراء.

- r. occipitalis nervi auricularis  
posterioris

الفَرْعُ الْقَذَالِيُّ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِيِّ الْخَلْفِيِّ. فرع يغذي البطن القذالية للعضلة القذالية الجبهية بأعصاب حركية.

- rami oesophagei nervi laryngei  
recurrentis

الفُرُوعُ الْمَرِيئِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْحَنَجَرِيِّ الرَّاجِعِ. فروع تساعد في تغذية المريء، وهي ألياف عصبية حشوية واردة وحسية عامة.

- rami orbitales ganglii pterygopalatini  
(sphenopalatini)

الفُرُوعُ الْحَاجِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فروع تمر من العقدة الجناحية الحنكية خلال الشق الحجابي السفلي لتغذي سمحاق الحاجاج والجيبين الغربالي والوتدي، وهي أعصاب حسية عامة ولا ودية.

الفَرْعُ الرَّاحِي لِلْعَصَبِ النَّاصِفِ. فرع ينبع من العصب الناصف في القسم السفلي من الساعد ويغذي جلد القسم الوحشي من اليد باللياف عصبية حسية عامة.

- r. palmaris nervi ulnaris  
الفَرْعُ الرَّاحِي لِلْعَصَبِ الزُّنْدِيِّ. فرع ينبع من العصب الزندي ويغذي البنيات الجلدية للقسم الإنسي من اليد باللياف عصبية حسية عامة.

- rami palpebrales inferiores nervi  
infraorbitalis  
الفُرُوعُ الْجَفْنِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْحَاجِيَّةِ. فروع تغذي جلد الجفن السفلي وملتحمته باللياف عصبية حسية عامة.

- rami palpebrales nervi  
infratrochlearis  
الفُرُوعُ الْجَفْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ تَحْتَ الْبُكْرِيِّ. فروع عصبية تساعد في تغذية الأجفان باللياف عصبية حسية عامة.

- rami parotidei nervi  
auriculotemporalis  
الفُرُوعُ النَّكَفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِيِّ الصُّدْغِيِّ. فروع تحمل اليافاً لا ودية بعد عقدية من العقدة الأذنية إلى الغدة النكفية.

- r. pericardiacus nervi phrenici  
الفَرْعُ التَّامُورِيُّ لِلْعَصَبِ الْحَاجِيَّةِ. فرع ينبع من العصب الحجابي أو من الحجابي الإضافي ويغذي التامور باللياف حسية عامة.

- rami perineales nervi cutanei femoris  
posterioris  
الفُرُوعُ الشَّظْوِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ الْخَلْفِيِّ. فروع تنبع من العصب الفخذي الجلدي الخلفي عند الحافة السفلية للعضلة الالوية الكبيرة وتغذي جلد الأعضاء التناسلية الظاهرة باللياف عصبية حسية عامة.

- r. pharyngeus ganglii pterygopalatini  
الفَرْعُ الْبَلْعُومِيُّ لِلْعُقْدَةِ الْجَنَاحِيَّةِ الْحَنَكِيَّةِ. فرع عصبي يجري من القسم الخلفي من العقدة الجناحية الحنكية خلال القناة البلعومية مع الفرع البلعومي للشريان الفكي العلوي إلى الفشاء المخاطي للقسم الأنفي من البلعوم الخلفي حتى القناة السمعية.

- rami pharyngei nervi glossopharyngei  
الفُرُوعُ الْبَلْعُومِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبَلْعُومِيِّ. فروع تغذي الفشاء المخاطي للبلعوم باللياف عصبية حسية عامة.

- **rami pharyngei nervi vagi** **الْفُرُوعُ**  
البُلْعُومِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْمُبْهَمِ. فروع تغذي عضلات البلعوم وغشائه المخاطي وهو عصب حركي وحسي عام.
- **rami phrenicoabdominales nervi phrenici** **الْفُرُوعُ الجِجَابِيَّةُ البَطْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ**  
الجِجَابِي. فروع من العصبين الجبابي والجبابي الإضافي تغذي الحجاب الحاجز وتشارك في الضفيرة البطنية وهي الياف حسية عامة وحركية.
- **r. posterior fissurae cerebri lateralis (Sylvii)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ للشَّقِ المُخَيِّ الوُخْشِيِّ.**
- **r. posterior nervi auricularis magni** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الأذنيِّ الكَبِيرِ.** فرع يتكون من انقسام العصب الأذني الكبير وهو يغذي الجلد فوق النائيء الخشائي وظهر الأذن الخارجية بالياف حسية عامة.
- **rami posteriores nervorum cervicium (= rami dorsales nervorum cervicalium)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ للأعصابِ الرَقَبِيَّةِ.**
- **r. posterior nervi coccygei (= r. dorsalis nervi coccygei)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ العُصْفُصِيِّ.**
- **r. posterior nervi cutanei antebrachii medialis** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ السَّاعِدِيِّ**  
الجِلْدِيِّ الإنْسِيِّ. فرع يغذي جلد الناحيتين الظهرية الإنسية من الساعد بالياف حسية عامة ويسمى أيضاً الفرع الزندي للعصب الساعدي الجلدي الإنسي.
- **r. posterior nervi laryngei inferioris** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ الحَنَجَرِيِّ السُّفْلِيِّ.**
- **rami posteriores nervorum lumbalium (= rami dorsales nervorum lumbalium)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ للأعصابِ القُطْنِيَّةِ.**
- **r. posterior nervi obturatorii** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ السِّدَائِيِّ.** فرع ينزل ليغذي مفصل الركبة كما يعطي فروعاً عضلية للعضلات المسدة الظاهرة والمقربة الكبيرة وأحياناً المقربة الصغيرة وهي الياف حركية وحسية عامة.
- **rami posteriores nervorum sacralium (= rami dorsales nervorum sacralium)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ للأعصابِ العَجْزِيَّةِ.**
- **r. posterior nervorum spinalium (= r. dorsalis nervorum spinalium)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ.**
- **rami posteriores nervorum thoracicarum (= rami dorsales nervorum thoracicarum)** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ للأعصابِ الصَّدْرِيَّةِ.**
- **r. posterior ramorum cutaneorum lateralis (abdominalium et pectoralis) nervorum intercostalium** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلْفُرُوعِ الجَنْدِيَّةِ الوُخْشِيَّةِ (البَطْنِيَّةِ والصَّدْرِيَّةِ) للأعصابِ الوُزْبِيَّةِ.**
- **r. posterior sulci lateralis cerebri** **الْفُرُوعُ الخَلْفِيَّةُ لِلتَّلَمِ المُخَيِّ الوُخْشِيِّ.** قسم التلم المخي الوخشي الذي يجري بصورة مائلة إلى الخلف بين الفصين الصدغي والجداري. ويسمى أيضاً الشق الخلفي المخي الوخشي (السيلفي).
- **r. profundus nervi plantaris lateralis** **الْفُرُوعُ العَمِيقُ لِلْعَصَبِ الأُخْمَصِيِّ الوُخْشِيِّ.** فرع يرافق الشريان الأُخْمَصِيَّ الوخشي وعلى جهته الإنسية وعلى القوس الأُخْمَصِيَّ ويغذي العضلات بين العظام والخراطينيات الثانية والثالثة والرابعة والمقربة لإبهام القدم وبعض المفاصل أحياناً بالياف حسية عامة.
- **r. profundus nervi radialis** **الْفُرُوعُ العَمِيقُ لِلْعَصَبِ الكَعْبَرِيِّ.** فرع ينبع من العصب الكعبري ويدور على الجهة الوحشية حول الكعبرة إلى ظهر الساعد ليغذي العضلات الباسطة وباسطة الأصابع وباسطة الخنصر والباسطة الزندية للرسغ وغالباً الباسطة الكعبرية للزند أيضاً. ويغذي استمراره العصب بين العظمي الخلفي عضلات القسم القاصي من الساعد والمفاصل الرسغية وبين الرسغية وهو ليف عصبي حركي.
- **r. profundus nervi ulnaris** **الْفُرُوعُ العَمِيقُ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ.** الفرع العميق الذي يرافق الفرع الراحي العميق للشريان الزندي ويدور حول العظم الكلابي ويتبع القوس الراحي العميق تحت أوتار المثنية ويغذي مفصل الرسغ والعضلات بين العظام والخراطينيتين الثالثة والرابعة والمقربة لإبهام اليد وعادة الرأس العميق للعضلة الصغيرة المثنية للإبهام، وهو فرع حركي وحسي عام.

## - rami pulmonales plexus cardiaci

(= rami pulmonales systematis automatici) الفُرُوعُ الرِّئَوِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ الْقَلْبِيَّةِ.

## - rami pulmonales systematis autonomici

الفُرُوعُ الرِّئَوِيَّةُ لِلجَّهَازِ الْمُسْتَقْلِيِّ. فروع من الجذعين الوديين والصفيرة القلبية والتي ترافق الاوعية الدموية والقصيبات خلال الضفائر الرئوية إلى الرئة، وهي فروع عصبية ودية وحشوية واردة.

## - r. renalis nervi splanchnici minoris

الفُرْعُ الكُلَوِيُّ لِلْعَصَبِ الحَشَوِيِّ الصَّغِيرِ. فرع من العصب الحشوي الصغير إلى العقدة الابهرية الكلوية مكون من اليااف ودية قبل عقدية وحشوية واردة.

## - rami renales nervi vagi

الفُرُوعُ الكُلَوِيَّةُ لِلْعَصَبِ المُبْهَمِ. فروع تمر من جذع العصب المبهم خلال الصفيرة البطنية إلى الكلية، وهي اليااف لا ودية وحشوية واردة.

## - rami renales plexus coeliaci (= rami

renales nervi vagi) الفُرُوعُ الكُلَوِيَّةُ لِلضَّفِيرَةِ البَطْنِيَّةِ.

## - r. sinus carotici nervi glossopharyngei

فُرْعُ الجَنَبِ السَّبَاتِيِّ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْغُومِيِّ. فرع يغذي المستقبلات الضغطية والكيميائية للجيب والجسم السباتيين باليااف عصبية حشوية واردة.

## - r. stylohyoideus nervi facialis

الفُرْعُ الإِبْرِيُّ السَّامِيَّ لِلْعَصَبِ الوَجْهِيِّ. فرع ينبع من العصب الوجهي تحت قاعدة القحف مباشرة ليغذي العضلة الإبرية اللامية باليااف عصبية حركية.

## - r. stylopharyngeus nervi glossopharyngei (= r. musculi stylopharyngei)

الفُرْعُ الإِبْرِيُّ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْغُومِيِّ. الفُرْعُ العُلَوِيُّ لِلْعَصَبِ الرِّقَبِيِّ الرَّقَبِيِّ.

## - rami submaxillares ganglii

submaxillaris (= rami glandulares ganglii submandibularis) الفُرُوعُ تَحْتَ الفَكِّيَّةُ العُلَوِيَّةُ لِلْعُقْدَةِ تَحْتَ الفَكِّيَّةِ العُلَوِيَّةِ: الفروع الغدية للعقدة تحت الفكية العلوية.

## - rami substantiae nigrae

فُرُوعُ المَادَّةِ السُّودَاءِ. فروع صغيرة من الشريان المشيمائي الامامي تغذي العادة السوداء.

## - r. superficialis nervi plantaris lateralis

الفُرْعُ السَّطْحِيُّ لِلْعَصَبِ الأَخْمَصِيِّ الوَحْشِيِّ. فرع ينبع من العصب الأخمصي الوحشي عند الحافة الوحشية للعضلة المربعة الأخمصية يمر إلى الامام وينقسم إلى القسم الوحشي الذي يغذي جلد الجهة الوحشية للأخمص وأصبع القدم الصغير ومفاصله والعضلة الصغيرة المثنية لإصبع القدم الصغير، وإلى القسم الإنسي الذي يكون العصب الأخمصي العام لأصابع القدم الذي يعطي عصبين أصبعيين أخمصيين إلى إصبعي القدم الرابع والخامس، وهو فرع عصب حسي عام.

## - r. superficialis nervi radialis

الفُرْعُ السَّطْحِيُّ لِلْعَصَبِ الكُعْبُرِيِّ. استمرارية العصب الكعبري الذي يرافق الشريان الكعبري في الساعد ويدور نحو جهته الظهرية ليغذي الجهة الوحشية لظهر اليد وينقسم إلى الأعصاب الإصبعية الظهرية التي تغذي الوجة الظهرية والأسطح المجاورة للإبهام والسبابة والوسطى وأحياناً الوجه الكعبري للبصر، وهو عصب حسي عام.

## - r. superficialis nervi ulnaris

الفُرْعُ السَّطْحِيُّ لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ. فرع العصب الزندي في اليد الذي يغذي العضلة الراحية القصيرة وينقسم إلى عصب راحي إصبعي أصلي للجهة الإنسية من الخنصر وإلى عصب راحي إصبعي عام يعطي بحصبين أصليين ليغذي الجهتين المتجاورتين من الخنصر والبصر ويعطي أحياناً أعصاباً راحية إصبعية لتغذية الجهتين المتجاورتين للأصبعين الوسطى والبصر، وهو عصب حركي وحسي عام.

## - rami superiores nervi colli (= rami

superiores nervi transversi colli) الفُرُوعُ العُلَوِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الرِّقَبِيَّةِ.

## - r. superior nervi oculomotorii

الفُرْعُ العُلَوِيُّ لِلْعَصَبِ مُحَرِّكِ العَيْنِ. الفرع العلوي والأصغر من فرعي العصب محرك العين الذي يغذي العضلة المستقيمة العلوية وينتهي ليغذي رافعة الجفن العلوي وهو فرع حركي.

## - rami superiores nervi transversi colli

الفُرُوعُ العُلَوِيَّةُ لِلْعَصَبِ الرِّقَبِيِّ المُسْتَعْرِضِ. الفروع العلوية من الفروع التي تنبع من العصب الرقبى المستعرض بالقرب من الحافة الامامية للعضلة القصية الترقوية الخشائية وتغذي جلد المنطقة الرقبية الامامية وأنسجتها تحت الجلدية بأعصاب حسية عامة.

**- r. sympathicus ad ganglii ciliaris**

**(= radix sympathic ganglii ciliaris) الفَرْعُ**  
الوَدِّي لِلْعُقْدَةِ الْهَدَبِيَّةِ.

**- r. sympathicus ad ganglion submandibularis**

**الفَرْعُ الْوَدِّي إِلَى الْعُقْدَةِ**  
تَحْتَ الْفَكِّيَّةِ. فرع يحمل اليافاً ودية بعد عقدية من  
العقدة الرقبية العلوية مشتقة من ضفيرة على الشريان  
الوجهي إلى العقدة تحت الفكية لتتوزع للغدة اللعابية  
تحت الفكية.

**- rami temporales nervi facialis**

**الفُرُوعُ**  
الصُّدْغِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ. الفروع الانتهازية للعصب  
الوجهي التي تغذي العضلتين الأذنتين العلوية  
والسفلية والبطن الجبهي للعضلة القذالية الجبهية  
والعضلتين الدويرية العينية والمغضنة بالياف حركية.

**- rami temporales superficiales nervi auriculotemporalis**

**الفُرُوعُ الصُّدْغِيَّةُ**  
السُّطْحِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْأَذْنِي الصُّدْغِيِّ. فروع تنتشر إلى  
المنطقة الصدغية من جلد فروة الرأس وهي الياف  
عصبية حسية عامة.

**- r. tentorii nervi ophthalmici**

**الفَرْعُ**  
الْخَيْمِيُّ لِلْعَصَبِ الْغَيْثِيِّ. فرع ينبع من العصب  
العيني بالقرب من منشئه بالقرب من عقدة ثلاثي  
التوائم ويدور للخلف ليغذي الام الجافية للخيمة  
المخيخية ومنجل المخ وهو فرع عصبي حسي عام.

**- r. thyreohyoideus nervi hypoglossi**

**(= r. thyreohyoideus ansae cervicalis)**  
الفَرْعُ الدَّرَقِيُّ الْأَمِّي لِلْعَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيِّ.

**- r. thyreohyoideus ansae cervicalis**

**الفَرْعُ**  
الدَّرَقِيُّ لِلْعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّةِ. فرع من الجذر العلوي  
للعروة الرقبية يغذي العضلة الدرقية اللامية بأعصاب  
حركية.

**- rami tonsillares nervi glossopharyngei**

**الفُرُوعُ الْلُوزِيَّةُ لِلْعَصَبِ اللِّسَانِيِّ الْبُلْغُومِيِّ.** فروع  
تغذي الغشاء المخاطي الذي يغطي اللوزة الحنكية  
والمنطقة المجاورة من الحفّاف (شراع الحنك).

**- rami tracheales nervi laryngei**

**الفُرُوعُ الرُّغَامِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْحَنَجَرِيِّ**  
الرَّاجِعِ. فروع تنتشر للغشاء المخاطي للرغامى، وهي  
الياف حسية عامة.

**الفَرْعُ الْغَيْرِيُّ**  
لِلضَّفِيرَةِ الطَّبَلِيَّةِ. فرع من الضفيرة الطبلية إلى  
الأنبوب السمعي وهو فرع حسي عام.

**- r. ulnaris nervi cutanei antebrachii**

**medialis (= r. posterior nervi cutanei**  
**antebrachii medialis) الفَرْعُ الزَّنْبِيُّ لِلْعَصَبِ**  
**الْجُدِّيِّ السَّاعِدِيِّ الْإِنْسَانِيِّ.**

**- rami ventrales nervorum cervicalium**

**الفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الرَّقَبِيَّةِ.** الفروع الأربعة  
الرقبية العلوية التي تكون الضفيرة الرقبية والفروع  
الأربعة الرقبية السفلية التي تكون الضفيرة العضدية،  
وتسمى أيضاً الفروع الأمامية للأعصاب الرقبية.

**- r. ventralis nervi cocceygei**

**الفَرْعُ الْبَطْنِي**  
لِلْعَصَبِ الْعُصْفُصِيِّ. الفرع البطني للجذر النخاعي  
الشوكي الأخير والذي يبرز من الفرجة العجزية  
ويساعد في تكوين الضفيرة العصصية.

**- rami ventrales nervorum lumballium**

**الفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْقَطْنِيَّةِ.** الفروع البطنية  
للأعصاب القطنية الخمسة وتتكون الفروع الأربعة  
العلوية من الضفيرة القطنية ويشارك الخامس وجزء  
من الرابع في تكوين الضفيرة العجزية.

**- rami ventrales nervorum sacralium**

**الفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الْعُجْزِيَّةِ.** تبرز الفروع  
الأربعة العلوية من العجز خلال الثقوب العجزية  
الأمامية وتساعد في تكوين الضفيرة العجزية أما الفرع  
الخامس فإنه يبرز خلال الفرجة العجزية ويشارك  
باتصال مع الفرع الرابع في تكوين الضفيرة  
العصصية.

**- r. ventralis nervorum spinalium**

**الفَرْعُ**  
الْبَطْنِيُّ لِلْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ. الفرع الأكبر من الفرعين  
الذي ينقسم لهما العصب النخاعي الشوكي مباشرة  
بعد ظهوره من الثقبة بين الفقرتين وتغذي الفروع  
البطنية القسمين البطني والوحشي من الجذع وكل  
أقسام الأطراف.

**- rami ventrales nervorum thoracicorum**

**الفُرُوعُ الْبَطْنِيَّةُ لِلْأَعْصَابِ الصَّدْرِيَّةِ.** وهي الفروع  
الأحد عشر الأولى من الأعصاب الصدرية النخاعية  
الشوكية الوربية وتعطي الفروع الثلاثة الأولى فروعاً  
للضفيرة العضدية ولجدار الصدر وتغذي الفروع  
الرابعة والخامسة والسادسة جدار الصدر فقط



وتنتشر الفروع السابع حتى الحادي عشر إلى الجدار الصدري البطني. أما القسم الامامي الاولي للعصب الصدري فهو تحت الاضلاع أكثر مما هو بينها ويختلف في مساوره وعلاقته عن الفروع الأخرى ويسمى العصب تحت الاضلاع.

- r. volaris manus nervi ulnaris (= r. palmaris nervi ulnaris) **الْفَرْعُ الرَّاحِي لِلْعَصَبِ الزَّنْدِيِّ.**

- r. volaris nervi cutanei antebrachii medialis (= r. anterior nervi cutanei antebrachii medialis) **الْفَرْعُ الرَّاحِي لِلْعَصَبِ الْجِلْدِيِّ السَّاعِدِيِّ الْإِنْسِيِّ.**

- rami zygomatici nervi facialis **الْفُرُوعُ الْوُجْنِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْوُجْهِِيِّ.** فروع تعبر العظم الوجني وتغذي العضلة الدويرية العينية باللياف عصبية حركية.

- r. zygomaticofacialis nervi zygomatici **الْفَرْعُ الْوُجْنِي الْوُجْهِِيِّ لِلْعَصَبِ الْوُجْنِيِّ.** فرع يعبر من الجدار الوحشي للحجاج ويتقب العظم الوجني ليغذي الجلد الذي يغطيه باللياف حسية عامة.

- r. zygomaticotemporalis nervi zygomatici **الْفَرْعُ الْوُجْنِي الصَّدْعِيُّ لِلْعَصَبِ الْوُجْنِيِّ.** فرع يمر من الجدار الوحشي للحجاج ويتقب العظم الوجني ليغذي جلد المنطقة الصدغية الامامية باللياف عصبية حسية عامة.

**رَفَاءَ.** (ج: أَرْفَئِيَة). مصطلح عام لخط الالتحام نصفى البنيات المتناظرة.

- r. corporis callosi **رَفَاءُ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.**

- r. medullae oblongatae **رَفَاءُ الْبَصَلَةِ.** الخط الناصف نصفى النخاع المستطيل (البصلة) الجانبيين والذي يستمر حتى القسم الظهري من الجسر.

- r. pontis **رَفَاءُ الْجِسْرِ.** الخط الناصف لالتحام نصفى الجسر الجانبيين وهو امتداد لرفاء النخاع المستطيل إلى ظهر الجسر.

1. رَدُّ الْفِعْلِ 2. اسْتِجَابَةٌ 3. تَفَاعُلٌ. **reaction**  
1. فعل مضاد أو معاكس 2. استجابة للمنبهات، وفي علم النفس هي الحالة العقلية أو النفسية التي تتولد استجابة لظرف أو لتنبيه أو لحالة معينة 3. الظاهرة التي تتولد بتفاعل العوامل الكيميائية أو

الحالة التي تتحول فيها مادة كيميائية إلى مادة أو مواد أخرى.

- acute situational r. (= acute stress r.) **اسْتِجَابَةٌ كَرْبِيَّةٌ حَادَّةٌ.**

- acute stress r. **اسْتِجَابَةٌ كَرْبِيَّةٌ حَادَّةٌ.** استجابة عاطفية عابرة حادة لحالة نفسية كربية شديدة.

- alarm r. **اسْتِجَابَةُ النَّذِيرِ.** التأثيرات الفيزيولوجية التي تنتقل عن طريق الجهاز الودي العصبي وتحفز الأدرينالين من الغدة الكظرية استجابة لحالة كرب حاد أو خوف أو غيظ وتتصف بارتفاع ضغط الدم وزيادة النتاج القلبي وزيادة جريان الدم للعضلات الهيكلية ونقصه للأحشاء وزيادة تحليل الجلوكوز وارتفاع سكر الدم.

- anxiety r. (= anxiety neurosis) **عُصَابُ الْفَلَقِ.**

- associative r. **اسْتِجَابَةٌ تَرَابُطِيَّةٌ.** تفاعل تتوقف فيه الاستجابة حتى تربط الفكرة المنبهة بفكرة أخرى مترابطة أو متداخلة معها.

- axon r. (= axonal r.) **تَفَاعُلٌ مَخَوَارِيٍّ.** سلسلة التغييرات التي تحدث في الخلية العصبية (كالانحلال الكروماتيني وانزياح النواة) عند قطع محاورها.

- consensual r. **اسْتِجَابَةٌ إِتْفَاقِيَّةٌ.** 1. منعكس متصالب 2. فعل لا إرادي يصاحب الفعل الإرادي

- r. of degeneration **اسْتِجَابَةُ التَّنَكُّسِ.**

استجابة العضلات متنكسة الأعصاب للتنبيه الكهربائي ويتكون من فقدان استجابة العضلة للتنبيه الفارادي وفقدان العصب للتنبيهين الفارادي والغلغاني بينما تزداد استثارية العضلة للتنبيه الغلغاني.

- fight- or-flight r. (= alarm r.) **اسْتِجَابَةُ الْعِرَاكِ أَوْ الْفَرَارِ.**


- gross stress r. (= post- traumatic stress disorder) **اسْتِجَابَةُ الْكَرْبِ الشَّدِيدِ:** اضطراب كربي تالي للرضح.

- lengthening r. **اسْتِجَابَةُ التَّطْوِيلِ.** تطويل العضلة الباسطة الذي يؤدي إلى ثني الذراع ويسمى منعكس المطواة الممسكة.

- myasthenic r. **اسْتِجَابَةُ الْوَهْنِ الْعَضَلِيِّ.** ضعف الاستجابة العضلية التدريجي للتنبيه الكهربائي المتكرر.


- myotonic r. **اسْتِجَابَةُ تَوْتَرِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ.** عدم

- ارتخاء العضلة مباشرة بعد توقف التقلص الإرادي أو التقلص الذي يولده التنبيه الكهربائي.
- **neurotonic r.** **إِسْتِجَابَةٌ تَوَثِّرِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ.** استمرار التقلص العضلي بعد توقف المنبه المولد له.
- **pain r.** **إِسْتِجَابَةٌ أَلَمٌ.** توسع الحدقة عند الشعور بالألم.
- **startle r.** **إِسْتِجَابَةٌ الْإِجْفَالِ.** الظواهر النفسية الفيزيولوجية التي تشمل الاستجابات الحركية اللاإرادية والاستجابات الودية التي تظهر عند الشخص عند تنبيهه بمنبه غير متوقع كسماعه صوتاً حاداً عالياً بصورة مفاجئة.
- **sympathetic stress r. (= alarm r.)** استجابة الكرب الودي؛ **إِسْتِجَابَةٌ النَّذِيرِ.**
- **vestibular pupillary r.** **الاستجابة الدهليزية.** الحُدُقَةُ. توسع الحدقتين عند تنبيه القناة السمعية الظاهرة.
- reaction- formation** **تَكْوِينُ الْإِسْتِجَابَةِ.** آلية دفاعية لاشعورية يتخذ فيها الشخص موقفاً معاكساً لرغباته ودوافعه.
- rebound** **إِرْتِدَادٌ.** استجابة معكوسة تتولد عند سحب المنبه.
- **REM r.** **إِرْتِدَادُ الْحَرَكَاتِ الْعَيْنِيَّةِ السَّرِيعَةِ.** زيادة نوم الحركات العينية السريعة لدى الشخص عند نومه بعد أن حرم منه لفترة طويلة.
- recall** **تَذَكُّرٌ؛ تَذَكُّرٌ.** عملية تذكر الحوادث الماضية وجلبها لمستوى الوعي.
- receptor** **مُسْتَقْبَلَةٌ.** (ج: مُسْتَقْبَلَاتٌ). 1. بنية جزيئية داخل الخلية أو على سطحها تختص بـ (أ) ارتباط انتقائي مع مادة معينة، (ب) التأثير الفيزيولوجي المعين الذي يرافق هذا الارتباط مثل مستقبلات سطح الخلايا للهرمونات اليبتيديّة وللناقلات العصبية والمستضدات وللشذافات المتممة وللغلوبيينات المناعية وكذلك المستقبلات الهيولية للهرمونات الستيرويدية 2. نهاية عصبية حسية تستجيب للمنبهات المختلفة.
- **adrenergic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِيِّ.** مواقع على الأعضاء المنفذة تغذيهالياف عصبية بعد عقدة أدرينالينية الفعل من الجهاز العصبي الودي تصنف إلى مستقبلات ألفا ومستقبلات بيتا حسب نوع استجابتها للنورأبينيفرين أو للابينيفرين على التوالي ولبعض المحصرات الخاصة للعوامل المنبهة.
- **alpha- adrenergic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِيِّ أَلْفَا.** مستقبلات تستجيب للنورأبينيفرين (نورأدرينالين) ولعوامل محصرة مثل الفينوكسي بنزامين والفينيتول أمين.
- **beta- adrenergic r.** **مُسْتَقْبَلَةُ الْفِعْلِ الْأَدْرِينَالِيِّ بِيَّتَا.** مستقبلات تستجيب للابينيفرين ولعوامل محصرة مثل بروبرانولول وهناك نوعان منها بيتا 1 وبيتا 2.
- **cholinergic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ الْفِعْلِ الْكُولِينِيِّ.** مستقبلات سطحية خلوية ترتبط مع الناقل العصبي أسيتيل كولين وتنقل فعله إلى الخلايا بعد الاتصالية التي تشمل الخلايا المنفذة المستقلة اللاودية والخلايا الودية واللاودية المستقلة العقدية والعضلات المخططة وبعض عصبونات الجهاز العصبي المركزي.
- **contact r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ تَلَامُسِيَّةٌ.** عضو حسي يستجيب للمنبهات من المواد والأجسام التي تلامس سطح الجسم مباشرة.
- **contiguous r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ تَجَاوُرِيَّةٌ.** مستقبلات تتحسس عندما تكون بتلامس مباشر مع المنبه مثل مستقبلات اللمس والذوق.
- **distance r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ بُعْدِيَّةٌ.** مستقبلات تتحسس للمنبهات الصادرة من مصادر بعيدة عن الجسم كمنبهات البصر والسمع والشم.
- **gustatory r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ ذَوْقِيَّةٌ.** مستقبلات حس الذوق وهي البراعم الذوقية.
- **muscarinic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ مُسْكَارِينِيَّةٌ.** مستقبلات الفعل الكولينيني التي تتنبه بالقلواني مسكارين وتحصر بالأتروبيين وهي توجد على الخلايا الذاتية المنفذة وعلى العصبونات المركزية في المهاد وفي قشرة الدماغ.
- **nicotinic r's.** **مُسْتَقْبَلَاتُ نِيكُوتِينِيَّةٌ.** مستقبلات الفعل الكولينيني التي تنبهه أولاً ثم تحصر بالجرعات الكبيرة من النيكوتين أو بالتوبوكورارين وتوجد على الخلايا العقدية المستقلة والعضلات المخططة وعلى العصبونات المركزية للنخاع الشوكي.
- **pressure r.** **مُسْتَقْبَلَةٌ ضَغْطٌ.** مستقبلات تنبه بالضغط أو اللمس الشديد.



#### receptor

بعض المستقبلات العصبية الحسية العامة: (1) جسيمة باسيني وتُظهر فيها صفائحها المترابطة حول الليف العصبي وهي شديدة الحساسية للضغط إذ يكفي حرفها 0.2-0.5 ميكرومتر حتى تولد الدفعات العصبية (2) البصلة الانتهازية لكرأوزة وتُظهر فيها بروز بعض نهايات فروعها العصبية خلال محفظتها وهي حساسة للمس وتوجد في الجلد وفي الأغشية المخاطية (3) جسيمة مايسنر الحساسة للمس وتُظهر فيها صفائحها المطبقة والتي تنتشر بينها النهايات العصبية (4) النهايات العصبية الحرة الحساسة للحس والضغط والألم وتنتشر في مناطق عديدة من الجسم.



receptor

مقطع في الجلد يبين بعض انواع المستقبلات الحسية: (1) جسيمات باسيني وهي نهايات عصبية للمس (2) نهايات عصبية حرة لحس الألم.

- visual r. مستقبلية بصرية. إحدى مستقبلات العصيات والمخاريط في شبكية العين.

رَدْب. (ج: رُدُوب). recess (= recessus)

رَدْب. حيز صغير فارغ أو فجوة أو تجويف.

- r. anterior fossae interpeduncularis الرَدْبُ الأمامي للحفرة بين السويقتين. قسم الحفرة بين السويقتين الذي يمر تحت الجسمين الحليين.

- r. chiasmatis (= r. opticus) الرَدْبُ التَّصَالِبِي.

- r. cochlearis vestibuli الرَدْبُ القَوَاعي لِلهَلِيز. باحة صغيرة منخفضة على الجدار الإنسي لدهليز الأذن يمر من فتحة فيها عصب أنبوب القوقعة.

- r. infundibuli الرَدْبُ القِنَعِي. وحدة قمعية الشكل في القسم الأمامي من قاع البطين الثالث للدماغ في داخل قمع النخامية.

- r. lateralis fossae rhomboidei (= r. lateralis ventriculi quarti) الرَدْبُ الوَحْشِيُّ لِلْحَفْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ.

- r. lateralis ventriculi quarti الرَدْبُ الوَحْشِيُّ لِلْبُطِينِ الرَّابِعِ. استطالة ضيقة ومنحنية لتجويف البطين الرابع للدماغ تمتد وحشياً على السطح الظهري على السويقة المخيخية السفلية وتحوي استطالة وحشية للصفيرة المشيمائية وتسهل مرور السائل الدماغي النخاعي إلى الحيز تحت العنكبوتية.

- r. opticus الرَدْبُ البَصَرِي. ومدة في قاع البطين الثالث للدماغ تقع بين التصالبة إلى الخلف والصفحة الانتهاية إلى الأمام.

- r. pinealis الرَدْبُ الصَّنَوْبَرِي. امتداد للبطين الثالث إلى سويقة الجسم الصنوبري.

- r. posterior fossae interpeduncularis الرَدْبُ الخَلْفِي لِلْحَفْرَةِ بَيْنَ السُويَقَتَيْنِ. جزء الحفرة بين السويقتين الذي يقع جزئياً تحت حافة الجسر الأمامية.

- r. suprapinealis الرَدْبُ فَوْقَ الصَّنَوْبَرِي. الامتداد الخلفي للبطين الثالث للدماغ فوق وحول الجسم الصنوبري.

- r. triangularis الرَدْبُ المثلث. رَدْبٌ مثلث صغير على الجدار الأمامي للبطين الثالث للدماغ وتقع

قاعدته تحت الصوار الأمامي وتتكون جوانبه من تقارب عمودي قبو المخ.

أَلَمُ المُسْتَقِيمِ. rectalgia (= proctalgia)

رَجْعَةٌ. عودة الأعراض recurrence بعد هدأتها.

رَاجِع. 1. يجري إلى الخلف أو إلى مصدره. 2. العودة بعد فاصلة زمنية أو حيزية.

مُنْعَكَس. (ج: مُنْعَكَسَات). فعل أو حركة reflex أو صور منعكسة من جسم أو مجموع فعاليات أية حركة لا إرادية.

- abdominal r's. المُنْعَكَسَاتُ البَطْنِيَّة. تقلص العضلات البطنية عند تخديش جدار البطن.

- abdominocardiac r. المُنْعَكْسُ البَطْنِيُّ القَلْبِي. أي منعكس قلبي يتولد عن تنبيه الأعصاب الودية البطنية.

- accommodation r. مُنْعَكْسُ التَكْيِيفِ. التغييرات المنسقة التي تتم عند تكيف العين للنظر القريب وهي تضيق الحدقة وتقارب العينين وزيادة تحدب عدسيتها.

- Achilles tendon r. (= jerk, triceps surae) مُنْعَكْسُ العُرْقُوبِ.

- acoustic r. مُنْعَكْسُ السَّمْعِ. تقلص العضلة الركابية عند التنبيه بصوت عالٍ.

- acquired r. (= conditioned r.) مُنْعَكْسٌ مُكْتَسَبٌ؛ منعكس شرطي.

- adductor r. (of thigh) مُنْعَكْسُ المُقَرَّبَةِ. عند نقر وتر العضلة المقربة الكبيرة عندما يكون الفخذ في حالة التباعده تنقلص العضلات المقربة.

- allied r's. المُنْعَكَسَاتُ المُتَحَالِفَةُ؛ المُنْعَكَسَاتُ المُتَّحِدة. منعكسات يستعمل فيها منبهان يردان إلى نفس السبيل المشترك أو تولد تأثيرات على عضلتين متآزرتين.

- anal r. مُنْعَكْسُ الشَّرْجِ. تقلص مصرة الشرج عند تهيج جلده أو الجلد المحيط به.

- ankle r. (= jerk, triceps surae) مُنْعَكْسُ العُرْقُوبِ. منعكس الكاحل.

- antagonistic r's. مُنْعَكَسَاتُ مُضَادَّة. حركات منعكسية لا تحدث في العضلة المنبهة نفسها بل في العضلة المضادة لها.

- مُنْعَكْسُ - Aschner's r. (= oculocardiac r.)** أَشْنَر: المنعكس العيني القلبي.
- attention r. of pupil** مُنْعَكْسُ الْإِنْتِبَاهِ الْحَدَقِي. تغير سعة الحدقة عند تثبيت الانتباه بصورة مفاجئة.
- attitudinal r's.** الْمُنْعَكْسَاتُ الرُّضِيعِيَّة. المنعكسات المتعلقة والمرافقة لوضع الجسم.
- audio- oculoogyric r.** الْمُنْعَكْسُ السَّمْعِيُّ الْفُحْرُكُ لِلْعَيْنِ. توجيه العينين سوية إلى جهة الصوت عند سماع صوت مفاجيء.
- auditory r.** مُنْعَكْسُ سَمْعِي. أي من المنعكسات التي ترافق سماع الأصوات وخصوصاً غلق العينين عند سماع صوت مفاجيء.
- aural r.** مُنْعَكْسُ أُذْنِي. أي منعكس يترافق مع فعاليات جهاز السمع.
- auricle r.** مُنْعَكْسُ الْأُذُن. حركة الأذن اللاإرادية التي تتولد عند سماع صوت مفاجيء.
- auriculocervical nerve r. (= Snellen's r.)** مُنْعَكْسُ الْعَصَبِ الْأُذْنِي الرَّقَبِيِّ. احتقان أحد الأذنين عند تنبيه النهاية الدنيا للعصب الأذني الكبير المقطوع.
- auriculopalpebral r. (= Kehr's r.)** الْمُنْعَكْسُ الْأُذْنِي الْجَفْنِي. غلق العين نتيجة التنبيه للمس أو الحراري لأعمق قسم من الصماخ السمعي الظاهر وغشاء الطبل.
- autonomic r.** مُنْعَكْسٌ مُسْتَقْلِي. استجابات العضلات الملساء أو الغدد أو النسيج الناقل في القلب والتي تغير الحالة الوظيفية للعضو الذي يغذيه العصب المنبه.
- axon r.** الْمُنْعَكْسُ الْمُخَوَّارِي. منعكس ينتج عن تنبيه أحد فروع العصب الذي يولد دفعات تسير باتجاه مركز العصبون حتى نقطة تفرعه حيث تنعكس الدفعات إلى الفرع الثاني وإلى العضو المنفذ.
- Babinski's r.** مُنْعَكْسُ بَابِنْسْكِ. ثني خلفي لإبهام القدم عند تنبيه أخمص القدم الذي يحدث في آفات السبيل الهرمي والذي يدل على وجود شلل عضوي وبذلك يفرق عن الشلل الهستيري.
- Babkin's r.** مُنْعَكْسُ بَابِكِن. يؤدي الضغط بإبهام الفاحص على راحتي يدي الوليد إلى فتح فمه ولا يحدث ذلك عند الولدان في حالة الوسن أو السبات.
- Bainbridge r.** مُنْعَكْسُ بَيْنْبْرِيدْج. يؤدي ارتفاع الضغط أو تمدد الأوردة الجسمية الكبيرة أو تمدد الأذين الأيمن المفرط إلى تسرع القلب.
- Barkman's r.** مُنْعَكْسُ بَارْكَمَان. تقلص العضلة المستقيمة البطنية على نفس الجهة عند تنبيه الجلد تحت الحلمة.
- basal joint r. (= finger- thumb r.)** مُنْعَكْسُ الْمُفَصِّلِ الْقَاعِي.
- behavior r. (= conditioned response)** مُنْعَكْسٌ سُلُوكِي. استجابة شرطية.
- Bekhterev's r.** مُنْعَكْسٌ بِخْتِيرِيف. واحد من المنعكسات الأربع التالية. 1. العميق deep B.r. يؤدي الثني اللافاعل للقدم وأصابعها باتجاه الأخص ثم إطلاقها إلى عودتها لتنتهي بالاتجاه الظهري المعاكس ويترافق ذلك مع حركات انثنائية للركبة والورك. 2. الخثلي hypogastric B.r. تقلص العضلات السفلية للبطن عند تخديش جلد السطح الإنسي للفخذ. 3. الحدقي paradoxical pupillary B.r. توسع الحدقة عند تعرضها للضوء والذي يشاهد أحياناً في التابس الظهري والشلل العام. 4. الانفي nasal B.r. تؤدي دغدغة الغشاء المخاطي للتجويف الأنفي بريشة أو بقطعة ورق إلى تقلص عضلات نفس الجهة من الوجه ويسمى هذا المنعكس الأنفي.
- Bekhterev- Mendel r. (= Mendel-Bekhterev r.)** مُنْعَكْسٌ بِخْتِيرِيف - مَنْدِيل.
- biceps r.** مُنْعَكْسُ ذَاتِ الرَّأْسَيْنِ. تقلص عضلة ذات الرأسين للذراع عند نقر وترها وهو منعكس سوي ولكن تدل زيادته المفرطة على الإصابة بأحد الأمراض مثل زيادة منعكس الركبة.
- bladder r.** مُنْعَكْسُ الْمَثَانَةِ. أي من المنعكسات العديدة التي تساعد على إفراغ البول من دون جهد وإدانة ذلك من دون وعي ومنها تقلص المثانة عند امتلائها بالبول أو تقلصها عند تنبيه الإحليل بالجريان أو تقلصها عند تمدد القسم الداني من الإحليل أو توسع الإحليل عند جريان السائل فيه أو توسع المثانة الذي يؤدي إلى ارتخاء المصرة الإحليلية الخارجية أو ارتخاء العضلة الإحليلية الدانية الملساء عند تمدد المثانة.
- blink r. (= corneal r.)** مُنْعَكْسُ الطَّرْف.
- Brain's r.** مُنْعَكْسُ بَرَيْن. امتداد الذراع المثني

- للشخص المشلول نصفياً عند تسنم المريض وضعة  
الأرجل الأربعة.
- **bregmocardiac r.** **الْمُنْعَكْسُ الْهَامِي الْقَلْبِيّ.**  
يؤدي الضغط على اليافوخ الهامي إلى بطء القلب.
- **Brissaud's r.** **مُنْعَكْسُ بريسو.** تقلص  
العضلة الموترة للفاقة الفخذية عند دغدغة أخمص  
القدم.
- **bulbocavernous r.** **الْمُنْعَكْسُ الْبَصْلِيُّ الْكَهْفِيّ.**  
يؤدي نقر ظهر القضيب إلى تقلص العضلة البصلية  
الكهفية.
- **bulbomimic r.** **الْمُنْعَكْسُ الْمُحَاكِي لِلْبَصْلِيّ.**  
في حالة السبات الناتج عن السكته يؤدي الضغط على  
المقلة إلى تقلص عضلات نصف الوجه المعاكس للآفة  
أما عند السبات الناتج عن التسمم فيحدث المنعكس  
على جهتي الوجه.
- **carotid sinus r.** **مُنْعَكْسُ الْجَنِبِ السَّبَاتِيّ.**  
يؤدي الضغط على الشريان السباتي أو في داخله عند  
مستوى تفرعه إلى بطء سرعة القلب ويتأصل هذا  
المنعكس من جيب الشريان السباتي الباطن.
- **cerebral cortex r. (= Haab's r.)** **مُنْعَكْسُ**  
**قَشْرَةِ الْمَخ.** تقلص حدقتي العينين عند جلوس  
المريض في غرفة مظلمة ومن دون أي تكيف أو تقارب  
لهما عندما يوجه نظره إلى جسم مضيء موجود في  
الساحة البصرية.
- **Chaddock r.** **مُنْعَكْسُ تَشَادُوك.** يؤدي  
تنبيه أسفل الكعب الخارجي إلى انبساط إبهام القدم  
ويحدث ذلك في آفات السبيل الهرمي.
- **chain r.** **مُنْعَكْسُ مُسَلْسَل.** سلسلة من  
المنعكسات ينبه كل واحد منها المنعكس الذي يليه  
لتوليد فعالية منسقة.
- **chin r.** **مُنْعَكْسُ الذَّقْن.** يؤدي نقر الذقن إلى  
غلق الفم.
- **ciliary r.** **الْمُنْعَكْسُ الْهَدْبِيّ.** حركة الحدقة  
عند تكيف العين.
- **cilio-spinal r.** **الْمُنْعَكْسُ الْهَدْبِيّ النُّخَاعِيّ.**  
يؤدي التنبيه المؤلم لجلد الرقبة إلى توسيع الحدقة.
- **clasp-knife r. (= lengthening r.)** **مُنْعَكْسُ**  
**التَّطْوِيل.**
- **cochleo-auricular r. (= cochleopal-**  
**pebral r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْقَوَّعِيّ الدَّوِيرِيّ.** تقلص
- العضلة الدويرية للعين عند توليد صوت حاد مفاجيء  
بالقرب من الأذن ولا يحدث ذلك عند الصمم التام  
بسبب مرض تيهي.
- **cochleopupillary r.** **الْمُنْعَكْسُ الْقَوَّعِيّ**  
**الْحَدَقِيّ.** استجابة القرنية المكونة من تقلص الحدقة  
الذي يتلوها توسعها عند التنبيه بصوت عالٍ.
- **cochleostapedial r.** **الْمُنْعَكْسُ الْقَوَّعِيّ**  
**الرِّكَابِيّ.** التقلص الانعكاسي للعضلة الركايبية عند  
سماع الضوضاء.
- **concealed r.** **مُنْعَكْسٌ مَكْتُومٌ؛ مُنْعَكْسٌ مَخْفِيّ.**  
منعكس يتولد عن أحد المنبهات ولكنه يختفي بسبب  
وجود منعكسات سائدة أقوى منه تتولد عن نفس  
المنبه.
- **conditioned r. (= conditioned response)**  
**مُنْعَكْسٌ شَرْطِيّ.** منعكس مكتسب يتولد عن الإشارات  
بمنبه لم يكن يولد مثل هذا المنعكس قبل ذلك.
- **conjunctival r..** **الْمُنْعَكْسُ الْمُتَّجِمِيّ.** غلق  
العين عند لمس ملتحماتها.
- **consensual light r.** **مُنْعَكْسُ الضَّوءِ الْإِتِّفَاقِيّ.**  
التنبيه الضوئي لإحدى العينين يؤدي إلى تقلص حدقة  
العين الثانية.
- **convergency r.** **الْمُنْعَكْسُ التَّقَارِبِيّ.**  
تقارب المحور البصري وتثبيت العينين على نقطة  
قريبة عند النظر إليها.
- **convulsive r.** **مُنْعَكْسٌ إِخْتِلَاجِيّ.** منعكس تنقلص  
فيه عدة عضلات اختلاجياً ومن دون أي تناسق بين  
تقلصاتهما.
- **coordinated r.** **مُنْعَكْسٌ مُنَسَّقٌ.** منعكس  
تساهم فيه عدة عضلات وتنقلص بطريقة منسقة  
لتوليد عمل نافع.
- **corneal r.** **مُنْعَكْسُ الْقَرْنِيَّةِ.** 1. يؤدي تهيج  
القرنية إلى إغلاق الجفنين 2. انعكاس الضوء من سطح  
القرنية.
- **corneomandibular r. (= corneo-**  
**pterygoid r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْقَرْنِيّ الْفَكِّيّ السُّفْلِيّ.**  
حركة الفك السفلي إلى الجهة المعاكسة للعين التي  
تلمس قرنيتهما مع انفتاح الفم الجزئي.
- **corneomental r.** **الْمُنْعَكْسُ الْقَرْنِيّ الذَّقْنِيّ.**  
تجعد عضلات الذقن على جهة العين التي يضغط عليها.

- **cough r.** مُنْعَكْسُ السُّعَالِ. سلسلة الحوادث التي تبدأ من حساسية بطانة السبل الهوائية للرئة وتتوسط البصلة (النخاع المستطيل) فيها نتيجة النبضات العصبية التي تصلها بواسطة العصب المبهم والتي تؤدي إلى السعال وهو إفراغ السبل الهوائية من الأجسام الغريبة.
- **cranial r.** منعكس قحفي؛ مُنْعَكْسُ دِمَاعِي. أي من المنعكسات التي تمر سبلها إلى الدماغ مباشرة.
- **cremastic r.** مُنْعَكْسُ المُشَمَّرَةِ. يؤدي تنبيه جلد الجهتين الأمامية والداخلية للخصذ إلى انسحاب خصية نفس الجانب للأعلى ويدل وجود هذا المنعكس على سلامة شدة العصب القطني الأول في النخاع الشوكي أو جذوره بينما يدل غيابيه على تلف شدة العصب القطني الأول أو جذره أو آفة السبل القشري النخاعي الشوكي.
- **crossed r.** المُنْعَكْسُ المُتَصَالِب. يؤدي تنبيه إحدى جهتي الجسم عادة إلى استجابة مناسبة في الجهة الأخرى خاصة في العين.
- **cutaneous pupillary r.** المُنْعَكْسُ الجِلْدِيّ. توسع حدقة العين عند قرص جلد العنق أو الوجنة.
- **dartos r. (= serotal r.)** مُنْعَكْسُ السَّلْخِيَّة. يؤدي التنبيه المفاجيء لعجان المريض عند وقوفه مع الانفراج الواسع لساقيه إلى تقلص العضلة السلخية الدودي الشكل.
- **dazzle r.** مُنْعَكْسُ الإنبهار. يؤدي توجيه ضوء ساطع إلى العين إلى غلق الجفنين المباشر الذي يدوم طيلة مدة التنبيه.
- **deep r.** مُنْعَكْسٌ عَمِيق. منعكس يتولد عن النقر الحاد للعضلة أو لوترها الذي يولد تمددها أولاً ومن ثم تقلصها ويسمى أيضاً المنعكس الوتري.
- **defecation r. (= rectal r.)** مُنْعَكْسُ التَّفَوُّط. حركات تقلصية وتعددية في الطرف المشلول يتولد عن ثني أصابع القدم نحو الأخصص.
- **delayed r.** مُنْعَكْسٌ آجِل. منعكس يحدث بعض الوقت بعد التنبيه.
- **depressor r.** مُنْعَكْسٌ خَافِض. منعكس لحد المنبهات يؤدي إلى خفض فعالية المركز الحركي.
- **direct r.** مُنْعَكْسٌ مُبَاشِر. تقلص في نفس الجهة التي يوضع عليها المنبه.
- **direct light r.** مُنْعَكْسُ الضَّوِّ المُبَاشِر. عند توجيه ضوء لشبكية العين خلال حدقتها تتقلص مضيق الحدقة مباشرة وتضيق فتحتها.
- **doll's eye r.** مُنْعَكْسُ عَيْنِ الدُّفِيَّة. عند تدوير رأس الوليد الخديج إلى الجهة الوحشية تنسحب العينان بصورة تآزرية إلى الجهة المعاكسة ثم تعود إلى منتصف الشق الجفني، ويجري ذلك للوليد الخديج وللمريض المصاب بالقيوبية لفحص سلامة العصب المحرك للعين وحيوية جذع الدماغ.
- **dorsal r.** المُنْعَكْسُ الظَّهْرِيّ. تقلص عضلات الظهر استجابة لتنبيه الجلد على طول العضلة الناصبة للفقار.
- **dorsalcuboidal r. (= Mendel Beckhterev r.)** المُنْعَكْسُ الظَّهْرِيّ النَرْدِي. يؤدي قرع ظهر القدم عادة إلى الانثناء الظهري لأصابع القدم الثاني حتى الخامس ويحدث في بعض الحالات المرضية العصبية العضوية بدلاً من ذلك انثناءها نحو الأخصص.
- **elbow r. (= triceps r.)** مُنْعَكْسُ المِرْفَق. تنبيه الوليد المفاجيء مثل قرع المنضدة عند إحدى جهتيه أو بتعدد العنق المفاجيء مثل السماح للرأس بالسقوط نحو الخلف أو سحب الطفل المستلقي من ذراعيه فجأة ثم تركه ليسقط يؤدي كل ذلك إلى انثناء الفخذين والركبتين وتباعد الأصابع وشم أطباقها مع انتشار الذراعين ثم ضمهما في وضع العناق. ويشاهد ذلك في الولدان حتى الشهر الثالث أو الرابع من العمر.
- **emergency light r.** مُنْعَكْسُ الضَّوِّ الطَّارِئ. عند تنبيه الشبكية بضوء شديد تتقلص الحدقة وتغلق الأجفان ويهبط الحاجب.
- **enterogastric r.** المُنْعَكْسُ المَعْوِيّ المَعِدِيّ. تثبيط الحركات المعدية عند دخول مادة مهيجة إلى الإثناعشري.
- **epigastric r.** المنعكس الشرسوفي. تقلص العضلات البطنية عند تنبيه جلد الشرسوف أو تنبيه الجلد فوق الحيزين الأربيين الخامس والسادس قرب الإبط.
- **Erben's r.** مُنْعَكْسٌ إِرْبِن. ببطء النبض عند ثني



- الرأس والجذع بشدة إلى الأمام ويعزى ذلك إلى استئثار المبهم.
- **erector spinae r.** **مُنْعَكْسُ نَاصِبَةِ الْفَقَارِ.**  
تقلص العضلة الناصبة للفقار عند تنبيه الجلد على حافتها.
- **extensor r.** **مُنْعَكْسُ الْبَسْطِ.** تقلص العضلة المضادة للجاذبية عند تنبيهها المناسب.
- **eylid closure r. (= 1. corneal r. 2. conjunctival r.)** **مُنْعَكْسُ غَلْقِ الْأَجْفَانِ.**
- **facial r. (= bulbomimic r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْوَجْهِي.**
- **faucial r.** **الْمُنْعَكْسُ الْخَلْقِي.** قيء انعكاسي عند تهيج الحلق.
- **femoral r. (= Remak's r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْفَخْذِي.** الانثناء الأخمصي لأصابع القدم الثلاثة الأولى وأحياناً القدم أيضاً عند ضرب سطح القسم العلوي الأمامي للفخذ.
- **finger- thumb r.** **مُنْعَكْسُ الإصْبَعِ وَالْإِبْهَامِ.** يؤدي ثني المفصل السنعي السلامي لأحد الأصابع إلى انثناء المفصل القاعدي وبسط المفصل النهائي للإبهام.
- **flexion r.** **مُنْعَكْسُ الْفَنِي.** وهو منعكس السحب عند تنبيه العضو بمبته مؤز والذي يؤدي إلى انثناء الذراع وانسحابه.
- **flexion r. of leg** **مُنْعَكْسُ ثَنِي السَّاقِ.** يؤدي قرع وترى العضلتين الغشائية النصف والوترية النصف إلى ثني الساق.
- **flexor r., paradoxical** **مُنْعَكْسُ الْفَنِي التَّنَاقُضِي.** الانثناء الظهري لإبهام القدم أو لكل الأبخس عند الضغط على عضلات الربلة.
- **fontanel r. (= Grünfelder's r.)** **مُنْعَكْسُ الْيَافُوخِ.** الانثناء الظهري للأبخس الكبير مع انتشار أصابع القدم الأخرى عند الضغط المستمر على زاوية اليافوخ الخلفي الوحشي ويحدث ذلك في مرض الأذن الوسطى عند الأطفال دون سن الخامسة من العمر.
- **front- tap r.** **مُنْعَكْسُ النِّقْرِ الْأَمَامِي.** تقلص عضلة الساق المنبسط عند النقر على جلد الساق.
- **fusion r.** **مُنْعَكْسُ الْإِنْدِغَامِ.** المنعكس الذي يضم صورتين شبكيتين العينين ليولد منهما حساً بصورة واحدة للجسم المنظور.
- **gag r. (= pharyngeal r.)** **مُنْعَكْسُ التَّهَوُّعِ؛ الْمُنْعَكْسُ الْبُلْغُومِي.**

- **gastrocolic r.** **الْمُنْعَكْسُ الْمَعْدِي الْقَوْلُونِي.** زيادة الفعالية التمعجية للأمعاء والقولون بعد دخول الغذاء إلى المعدة الخالية.
- **gastropancreatic r.** **الْمُنْعَكْسُ الْمَعْدِي الْبَنْكْرِيَّاسِي.** زيادة إفراز البنكرياس نتيجة تمدد جسم المعدة وهو منعكس يتم بواسطة العصب المبهم.
- **Geigel's r.** **مُنْعَكْسُ غَيْجِل.** منعكس في الإناث ينظر منعكس المشفرة عند الذكور أي عند ضرب الناحية الداخلية العلوية للقسم العلوي من الفخذ تنقلص الألياف العضلية للحافة العلوية من رباط بوبار (الرباط الأربي).
- **genital r.** **مُنْعَكْسُ تَنَاسُلِي.** أبة هيرجية منعكسية تتولد عن اضطراب الجهاز التناسلي.
- **Gifford's r. (= orbicularis pupillary r.)** **مُنْعَكْسُ غِيْفُورْد؛ الْمُنْعَكْسُ الدَّوِيرِي الْحَدَقِي.**
- **gluteal r.** **الْمُنْعَكْسُ الْأَلْوِي.** يؤدي ضرب جلد الآلية إلى تقلص العضلات الآلوية.
- **Gordon's r. (= paradoxical flexor r.)** **مُنْعَكْسُ غُورْدِن؛ مَنْعَكْسُ الثَّني التَّنَاقُضِي.**
- **grasp r. (= grasping r.)** **مُنْعَكْسُ الْقَبْضِ.** منعكس يتكون من حركة قبضية لأصابع اليد أو أباحس القدم استجابة لتنبيهها.
- **Grünfelder's r. (= fontanel r.)** **مُنْعَكْسُ غُرُونْفيلْدَر.** منعكس اليافوخ.
- **gustolacrima r.** **الْمُنْعَكْسُ الدَّوْقِي الدَّمْعِي.** منعكس شاذ حيث يؤدي تناول الطعام بالفم إلى تنبيه إفراز اللعاب والدموع.
- **H-r.** **مُنْعَكْسُ H.** منعكس أحادي التشابك يظهر عند تنبيه أحد الأعصاب وخصوصاً عند تنبيه العصب الظنبوبي بمبته كهربائي.
- **Haab's r. (= cerebral cortex r.)** **مُنْعَكْسُ هَاب.**
- **heel- tap r.** **مُنْعَكْسُ نَقْرِ الْعَقَبِ.** منعكس يحدث في أمراض السبيل الهرمي ويتكون من انتشار أصابع القدم وانثناءها الأخمصي عند نقر عقب المريض.
- **Hering-Breuer r.** **مُنْعَكْسُ هِيرِنْغ - بَرْوَر.** الآلية العصبية التي تحدد التحركات التنفسية، إذ تمر المنبهات من النهايات الحسية في الرئة ولربما في

- أقسام أخرى إلى العصب المبهم لتحدد الحركات الزفيرية والشهيقية في التنفس الطبيعي.
- **Hirschberg's r.** مُنْعَكْسُ هِرْشبرغ. يؤدي دغدغة أخمص القدم عند قاعدة إبهامها إلى تقاربها وانثناءها الأخصوي.
- **hypochondrial r.** المُنْعَكْسُ المَرَاقِي. يؤدي الضغط السريع على الحافة السفلية للأضلاع إلى شهيق مفاجئ.
- **hypogastric r.** المنعكس الحثلي. يؤدي تخديش جلد السطح الإنسي للخصد إلى تقلص العضلات السفلية للبطن.
- **ileogastric r.** المُنْعَكْسُ اللِّقَائِي المَعِدِي. تثبيط الحركات المعوية عند تمدد اللغائف.
- **Inborn r. (= unconditioned r.)** مُنْعَكْسٌ خَلْقِي. منعكس لا شرطي.
- **indirect r. (= crossed r.)** مُنْعَكْسٌ لا مباشر؛ منعكس متصالب.
- **Infraspinatus r.** مُنْعَكْسُ العضلة تحت الشوكية. عند طرق نقطة معينة على الكتف على خط ينصف الزاوية المكونة من شوكة العظم وحافته الداخلية تدور الذراع للخارج مع استقامة المرفق.
- **inguinal r. (= Geigel's r.)** المُنْعَكْسُ الأَرْبِي. المنعكس بين الكتفين.
- **Interscapular r.** يؤدي التنبيه الموضع بين الكتفين إلى تقلص العضلات الكتفية.
- **intestinointestinal r.** المُنْعَكْسُ المِعْوِي. عند الزيادة المفرطة لتمدد أحد أقسام الأمعاء أو عند تهيج غشائه المخاطي تثبط فعاليات الأقسام الباقية من الأمعاء حتى زوال التمدد المفرط أو العامل المهيج.
- **Inverted radial r.** المُنْعَكْسُ الكُفْبَرِي المُنْقَلِب. انثناء الأصابع من دون حركة الساعد الذي يتولد عند نقر النهاية السفلية للكعبرة ويدل ذلك على مرض الشدفة العنقية الخامسة للنخاع الشوكي والمترافقة مع تخريب السبيل الهرمي تحت ذلك المستوى.
- **Iris contraction r. (= pupillary r.)** مُنْعَكْسُ تَقْلُصُ القَرَجِيَّة. منعكس الحدقة.
- **ischemic r.** مُنْعَكْسُ الإِقْفَار. ارتفاع ضغط الدم الشرياني استجابة لإقفار الدماغ.
- **jaw r. (= jaw jerk r.)** مُنْعَكْسُ نَفْضَةِ الفك. انغلاق الفم الذي يتولد عن ضرب الفك السفلي للأسفل عندما يكون معلقاً وفتوحاً بصورة لا فاعلة ونادراً ما يشاهد ذلك في الحالة الطبيعية ولكنه يظهر بوضوح في آفات السبيل القشري النخاعي.
- **Joffroy's r.** مُنْعَكْسُ جُوفَرُوي. نقصان العضلات الألوية عند الضغط على الأليتين في الشلل التشنجي.
- **Juster r.** مُنْعَكْسُ جِسْتَر. انبساط الأصابع بدلاً من انثناءها عند تنبيه الراحة.
- **Kehrer's r. (= kisch r. = auriculopalpebral r.)** مُنْعَكْسُ كِيرَز. منعكس الركبة؛ منعكس رباعية الرؤوس.
- **knee jerk r. (= quadriceps jerk)** مُنْعَكْسُ كُوخَر. تقلص العضلات البطنية عند الضغط على الخصية.
- **lacrimal r.** المُنْعَكْسُ الدُمْعِي. إفراز الدمع عند مس الملتحمة فوق القرنية.
- **Landau r.** مُنْعَكْسُ لَانْدَاو. عند حمل الوليد في الوضع المكبوب يكون الجسم قوساً مع تحدبه للأعلى وعند الضغط الخفيف على الرأس أو بتأثير الجاذبية تنتهي الرقبة والورك وينعكس اتجاه القوس.
- **laryngeal r.** مُنْعَكْسُ البَلْعُوم. يؤدي تهيج الحلق والحنجرة إلى السعال.
- **laughter r.** مُنْعَكْسُ الضَّحْك. الضحك الذي يتولد عن الدغدغة.
- **Liddell & Sherrington r. (= stretch r.)** مُنْعَكْسُ لِيدِل وشِيرِنغْتُون.
1. مُنْعَكْسُ الضَّوء. 2. مُنْعَكْسُ ضِيَائِي.
1. تضيق الحدقة عند سقوط الضوء على العين  
2. صورة مضيئة تنعكس من غشاء الطبل عند فحص الأذن بالمنظار.  
3. نقطة دائرية ضوئية ترى منعكسة من الشبكية بمرآة منظار الشبكية.
- **Ilp r.** مُنْعَكْسُ الشَّفَّة. حركة انعكاسية للشفتين عند الولدان أثناء نومهم تشاهد عند نقر زاوية الفم.
- **Loven r.** مُنْعَكْسُ لُوفِن. توسع الأوعية العام للعضو عند تنبيه عصبه الوارد.
- **lumbar r. (= dorsal r.)** المُنْعَكْسُ القَطْنِي.

- مُنْعَكْسُ البَسْطِ** myotatic r. (= stretch r.)  
العضلي؛ منعكس التمدد.
- مُنْعَكْسُ أَنْفِيّ** nasal r.  
تجويف الأنف إلى العطاس وإلى تقلص عضلات نفس الجهة من الوجه.
- الْمُنْعَكْسُ الْأَنْفِيُّ الشَّقَوِيُّ** nasolabial  
لمس ذروة الأنف وتحريكها للأعلى بسرعة وبلطف إلى الانقلاب الخلفي للرأس بصورة مفاجئة مع تمدد الظهر وانقلاب خلفي للذراعين والمنكبين وامتداد وانكباب الساعد وانبساط وتقريب الساقين ويحصل ذلك في الولدان الأصحاء ثم يختفي بعد الشهر الخامس من عمرهم.
- الْمُنْعَكْسُ الْأَنْفِيُّ الذَّقْنِيّ** nasomental r.  
العضلة الذقنية عند القرع على جانب الأنف بالمطرقة.
- الْمُنْعَكْسُ الْمُقَوِّمُ لِلرَّقْبَةِ** neck righting r.  
دوران الجذع بالاتجاه الذي يدور فيه رأس الوليد ويختفي أو يقل هذا المنعكس في الولدان المصابين بالتشنج.
- مُنْعَكْسَاتُ الْأَلَمِ** nociceptive r's.  
التي تتولد عن المنبهات المؤلمة.
- مُنْعَكْسُ الْمُنْخَرِ** nostril r.  
المنخر الذي يتم على نفس جهة الرئة المريضة.
- مُنْعَكْسُ الْمَنْحَرِفَةِ** obliquus r.  
الجلد تحت الرباط الأربي إلى تقلص جزء من العضلة المائلة الظاهرة.
- الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ الْقَلْبِيّ** oculocardiac r.  
نظم ضربات القلب عند الضغط على العين أو على الجيب السباتي وعادة ما يبلغ في الحالة السوية من 13-5 ضربة بالدقيقة.
- الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ** oculocephalogyric r.  
الرؤسي الحركي. حركة الرأس والعينين والجسم باتجاه موضع الاهتمام البصري.
- الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ** oculopharyngeal r.  
البلعومي. غلق العينين تلقائياً عند البلع السريع.
- الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ الْحَدَقِيّ** oculopupillary r. (= trigeminus r.)  
المنعكس العيني الحدقي.
- oculosensory cell r. (= trigeminus r.)**  
الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ الْخَلَوِيُّ الْحِسِّيّ.
- مُنْعَكْسُ لِسْت** Lust's r.  
الظهري عند نقر العصب الشظوي الأصلي.
- مُنْعَكْسَاتُ** Magnus & de Kleijn neck r's.  
الرقبة لمأغنوس ودي كلاين. امتداد الطرفين العلوي والسفلي على نفس الجهة مع زيادة التوتر في جهة الجسم التي يدور الشخص نحوها مع انثناء وفقدان التوتر في الجهة المعاكسة التي يتجه القذال نحوها وهذا هو علامة أساسية في صَغَلِ فصل المخ.
- مُنْعَكْسُ الْفَكِّ السُّفْلِيّ** mandibular r. (= jaw r.)  
مُنْعَكْسُ كُتْلِيّ. منعكس يظهر في كل المنطقة التي يتحكم بها الجزء المصاب من النخاع الشوكي.
- مُنْعَكْسُ مَآيِر** Mayer's r.  
الإبهام مع الثاني في المفصل السنعي السلامي وامتداد في المفصل بين السلاميات عند الضغط على إصبع السبابة.
- مُنْعَكْسُ مَكَارِثِي** McCarthy's r.  
العضلة الدويرية العينية عند نقر العصب فوق الحاجبي.
- مُنْعَكْسُ مَآك كُورْمَاك** McCormac's r.  
قرع الوتر الرضفي لأحد الساقين إلى تقريب الساق الثانية.
- مُنْعَكْسُ مِندِل بَخْتَرِيَف** Mendel- Bekhterev r.  
يسبب عادة طرق ظهر القدم انثناءاً ظهرياً لأصابع القدم الثاني حتى الخامس ولكنه يسبب في بعض الأمراض العضوية انثناء الأصابع نحو الأخص.
- مُنْعَكْسُ** Morley's peritoneocutaneous r.  
مُورلي الصِّفَاقِي الْجِلْدِيّ. عند تهيج أي من نهايات الأعصاب الدماغية النخاعية التي تغذي الصفاق أو الأنسجة تحت الصفاقية يتولد ألم يرجع إلى باحة الشدقة الجلدية المناسبة للعصب المنبه.
- Moro's r., Moro embrace r.**  
مُنْعَكْسُ مُورُو؛ مُنْعَكْسُ الْعِنَاق. (= embrace r.)
- مُنْعَكْسُ حَرَكَتِيّ** motor r.  
التهبئة المحيطي للآلية الحركية.
- مُنْعَكْسُ غَضَلِيّ** muscular r.  
حركة انعكاسية تتولد عند تمديد العضلة.
- مُنْعَكْسُ غَضَلِيّ مِعْوِيّ** myenteric r.  
المعي فوق جزئه المهيج أو الموسع وانبساطه تحت هذا الجزء.

- oculovagal r. **الْمُنْعَكْسُ الْعَيْنِيُّ الْعُيُيَّ**

يؤدي الضغط على العين إلى زيادة سرعة ضربات القلب أو النظم الأذيني البطيئ.

- opticofacial winking r. **مُنْعَكْسُ الرَّفِّ**

الْعَيْنِيُّ الْوُجْهِيّ. غلق الأجفان عند ظهور الأجسام بصورة مفاجئة في الساحة البصرية.

- orbicularis r. (= orbicularis pupillary r.)

**الْمُنْعَكْسُ الدَّوِيرِيّ**

- orbicularis oculi r. **مُنْعَكْسُ عضلة العين**

الدويرية. التقلص السوي للعضلة الدويرية العينية التي تؤدي إلى غلق العين عند طرق الناحية الخارجية للحرف فوق الحاجبي فوق المقطب أو حول حافة الحاجب.

- orbicularis pupillary r. **الْمُنْعَكْسُ الدَّوِيرِيّ**

الْحَدَقِيّ. تقبض الحدقة على جهة واحدة ثم اتساعها عند غلق أو محاولة غلق الجفنين اللذين نحاول أن نحافظ على فتحهما بشدة ونقاوم غلقهما.

- palatal r. (= palatine r.) **الْمُنْعَكْسُ الْحَنَكِيّ**

يؤدي تنبيه الحلق إلى البلع.

- palm-chin r. **الْمُنْعَكْسُ الرَّاحِيّ - الدَّقْنِيّ**

نفضان الذقن عند تنبيه الراحة أو حكها.

- palmomentar r. (= palm- chin r.)

**الْمُنْعَكْسُ الرَّاحِيّ الدَّقْنِيّ**

- paradoxical pupillary r. **الْمُنْعَكْسُ الْحَدَقِيّ**

الْمُتَنَاقِض. أي منعكس حدقي شاذ كتوسع الحدقة عند تنبيه الشبكية بالضوء والذي يشاهد أحياناً في الشلل العام والتابس الظهري ويسمى أيضاً منعكس بختريف ومنعكس الحدقة المعكوس.

- patellar r. (= quadriceps jerk) **مُنْعَكْسُ**

**الرَضْفَة؛ نفضة رباعية الرؤوس.**

- patelloadductor r. **مُنْعَكْسُ الرَضْفَة الْمُقَرَّب.**

تقارب الفخذ المتصالب عند قرع وتر العضلة رباعية الرؤوس الفخذية مثلاً في منعكس الرضفة.

- pathologic r. **مُنْعَكْسٌ مَرَضِيّ**

منعكس شاذ ولكنه ناتج عن سبب مرضي ويمكن أن يكون علامة للمرض.

- pectoral r. **الْمُنْعَكْسُ الصَّدْرِيّ**

عند وضع إصبع الفاحص على وتر العضلة الصدرية بالقرب من عظم العضد وطرق الإصبع بشدة على أن يكون الذراع موضوعاً في وضع بين التقريب والتباعد يتولد تقريب الذراع مع دوران بسيط للداخل.

- penile r. (= penis r. = bulbo cavernous r.) **مُنْعَكْسُ الْقَضِيب**

- perianal r. (= anal r.) **مُنْعَكْسُ الشَّرْج**

- peritoneointestinal r. **الْمُنْعَكْسُ الصَّفَاقِيّ**

المَقْوِيّ. تثبيط حركات المعدة والأمعاء نتيجة تهيج خلف الصفاق أو النزف.

- pharyngeal r. **الْمُنْعَكْسُ الْبَلْعُومِيّ**

تقلص العضلة المضيق للبلعوم عند مس جداره الخلفي.

- phasic r. **مُنْعَكْسٌ طَوْرِيّ**

حركة منسقة نشطة تتم استجابة للتنبيه.

- Philippon's r. **مُنْعَكْسُ فِيلِيبْسُون**

يؤدي تنبيه باسطة ركبة أحد الساقين إلى تثبيط باسطة ركبة الساق الثانية.

- pilomotor r. **مُنْعَكْسٌ مُحَرَكَةُ الشَّعْر**

توليد جلد وزعي عند تنبيه أو خدش الجلد.

- Piltz r. (= attention r. of pupil) **مُنْعَكْسٌ**

**بِيلْتز؛ منعكس الانتباه الحدقي.**

- placing r. **مُنْعَكْسُ الْوَضْع**

ثني ساق الوليد الذي يتلوه تمددها عند حمله منتصباً وسحب ظهر قدميه تحت سطح حافة المنضدة ويحصل ذلك في الولدان الأسوياء حتى الأسبوع السادس من عمرهم.

- plantar r. **مُنْعَكْسٌ اخْمَصِيّ**

انثناء أصابع القدم عند تنبيه الأخمص.

- platysmal r. **مُنْعَكْسُ عَضَلَةِ الْعُنُقِ الْجِلْدِيَّة**

تقلص الحدقة عند قرص العضلة الجلدية للعنق.

- postural r. **مُنْعَكْسٌ وَضْعِيّ**

منعكس يؤدي إلى اتخاذ الجسم لوضع معين.

- pressor r. **مُنْعَكْسٌ مَنَشُط**

منعكس لمنبه يؤدي إلى زيادة فعالية المركز الحركي.

- proprioceptive r. **الْمُنْعَكْسُ الْجِسْمِيّ الْعَمِيق**

منعكس يتولد عن تنبيه يصدر من أحد وظائف أو آليات المنعكس نفسه.

- psychic r. **مُنْعَكْسٌ نَفْسِيّ**

منعكس يتولد عن ذاكرة مخزونة مثل إقراز اللعاب عند تذكر طعام جيد ولذيذ.

- psychocardiac r. **مُنْعَكْسٌ نَفْسِيّ قَلْبِيّ**

تسرع ضربات القلب عند تذكر حالة عاطفية مبهجة.

- pulmocoronary r. **مُنْعَكْسٌ رِئَوِيّ قَلْبِيّ**

- تضييق الاوعية التاجية الانعكاسي بتوسط الاعصاب الميمية.
- **pupillary r.** **مُنْعَكْسُ الحَدَقَةِ**. 1. تقلص الحدقة عند تعرض الشبكية للضوء. 2. أي منعكس في القرنية يؤدي إلى تغيير حجم الحدقة استجابة للمنبهات المختلفة مثل تغيير درجة الإضاءة أو نقطة التثبيت أو صوت عالٍ مفاجئ أو تنبيه عاطفي.
- **Puusepp's r.** **مُنْعَكْسُ بُوْسِيْب**. تقريب إصبع القدم الصغير عند تنبيه القسم الوحشي الخارجي لأخص القدم وهو يدل على آفة في السبيلين الهرمي وخارج الهرمي.
- **quadriceps r.** **مُنْعَكْسُ رِبَاعِيَةِ الرُّؤُوس**. تقلص العضلة رباعية الرؤوس وانبطاس الساق عند نقر وتر العضلة بين الرضفة والحدية الظهرية.
- **quadrupedal extensor r. (= Brain's r.)** **مُنْعَكْسُ بَاسِطِ الأَرْجُلِ الأَرْبَعَةِ**.
- **radial r.** **مُنْعَكْسُ الكُفْرِ**. انثناء الساعد والأصابع الذي يتولد عند نقر النهاية السفلية للكعبرة، ويدل ذلك على فرط الانعكاسية.
- **rectal r.** **مُنْعَكْسُ المُسْتَقِيم**. العملية التي يؤدي بها الغائط المتجمع في المستقيم إلى تنبيه عملية التغوط.
- **regional r. (= segmental r.)** **مُنْعَكْسُ تَاجِي**؛ **مُنْعَكْسُ مَقْطَعِي**.
- **Remak's r.** **مُنْعَكْسُ رِيْمَاك**. الانثناء الأخمصي لأصابع القدم الثلاث الأولى وأحياناً القدم أيضاً مع انبطاس الركبة عند طرق السطح الأمامي العلوي للفخذ.
- **renointestinal r.** **مُنْعَكْسُ الكُلَوِيِّ المَعِدِي**. تثبيط الحركات المعوية نتيجة التهيج الكلوي.
- **renorenal r.** **مُنْعَكْسُ الكُلَوِيِّ الكُلَوِيِّ**. ألم انعكاسي أو زرام في كلية سليمة في حالات مرض الكلية الثانية.
- **resistance r. (= Babinski's r.)** **مُنْعَكْسُ المَقَاوِمَة**؛ **مُنْعَكْسُ بَابِسْكِي**.
- **retrobulbar pupillary r.** **مُنْعَكْسُ الحَدَقَةِ** خَلْفَ المَقْلَة. توسع قليل للحدقة المتضيق المنبهة بالضوء ولكنها تعود لتتوسع قليلاً بعد ذلك بينما لا زال المنبه الضوئي موجوداً.
- **reversed pupillary r.** **مُنْعَكْسُ البَصَرِيِّ العَكْسِي**. أي منعكس شاذ يحدث بصورة عكسية للمنعكسات السوية مثل توسع الحدقة عند تنبيهها بالضوء.
- **Riddoch mass r.** **مُنْعَكْسُ رِيْدُوخ الكَتَلِي**. في حالة إصابة النخاع الشوكي الشديدة يؤدي التنبيه تحت مستوى الآفة إلى إفراغ الأمعاء والمثانة وتغرق الجلد تحت مستوى الإصابة.
- **righting r.** **مُنْعَكْسُ مَقُوم**. المقدرة على إعادة الوضع المناسب للجسم عند اختلاله.
- **Roger's r. (= esophagosalarary r.)** **مُنْعَكْسُ رُوَجَر**؛ **مُنْعَكْسُ المريئي اللعابي**. إفراز اللعاب عند تهيج المريء.
- **rooting r.** **مُنْعَكْسُ تَجْدِيرِي**؛ **مُنْعَكْسُ تَوْجِيهِي**. يؤدي تنبيه جانب الخد أو إحدى الشفتين السفلية أو العلوية إلى توجيه الوليد فمه ووجهه إلى جهة المنبه.
- **Rossolimo's r.** **مُنْعَكْسُ رُوسُولِيْمُو**. عند نقر الوجه الأخمصي لأصابع القدم فإنها تنتهي لجهة الأخص عند وجود آفات في السبيل الهرمي.
- **Ruggeri's r.** **مُنْعَكْسُ رُوَجِيرِي**. تسرع النبض عند اقتراب العينين الشديد نحو جسم قريب جداً منهما ويدل ذلك على هيجية الودي.
- **scapular r. (= interscapular r.)** **مُنْعَكْسُ الكَتَفِي**.
- **scapulohumeral r.** **مُنْعَكْسُ الكَتَفِي العَضْدِي**. تقريب العضد مع دورانه للخارج عند طرق الحافة الداخلية للكتف.
- **Schaffer's r.** **مُنْعَكْسُ شِيْفَر**. انثناء القدم وإصابعها عند قرص الثلث الوسطي من الوتر العقبي ويشاهد ذلك في الشلل النصفي العضدي.
- **scrotal r. (= dartos r.)** **مُنْعَكْسُ الصَّفَنِي**. تقلص دودي الشكل بطيء للعضلة السليخة يتولد عند قرع العجان أو تنبيه بمنبه بارد.
- **segmental r.** **مُنْعَكْسُ شَدَقِي**. منعكس تتحكم به شدة واحدة أو منطقة واحدة من النخاع الشوكي.
- **sexual r.** **مُنْعَكْسُ جِنْسِي**. منعكس الانتصاب والقذف الذي يتولد عند تنبيه الأعضاء التناسلية.
- **simple r.** **مُنْعَكْسُ بَسِيط**. منعكس يشمل عضلة واحدة فقط.

- skin r. مُنْعَكْسٌ جِلْدِيّ. منعكس يتولد عند تنبيه الجلد.
- skin pupillary r. مُنْعَكْسٌ جِلْدِيّ حَدَقِيّ. توسع الحدقة عند تنبيه جلد الرقبة.
- sole r. (= plantar r.) المُنْعَكْسُ الْأَخْمَصِيّ. تثبيط الحركات المعوية عند تنبيه الجلد المغطى للبطن.
- somatointestinal r. المُنْعَكْسُ الْجَسَدِيّ. أي منعكس يرتبط قوسه مع مركز في نخاع الشوكي.
- spinal r. مُنْعَكْسٌ نَخَاعِيّ. أي منعكس يرتبط قوسه مع مركز في نخاع الشوكي.
- stapedial r. (= acoustic r.) المُنْعَكْسُ الرِّكَابِيّ. منعكس سمعي.
- static r. مُنْعَكْسٌ رُكُودِيّ. تقويم وضع الجسم وتثبيتته الانعكاسي.
- statotonic r's. (= attitudinal r's.) المُنْعَكْسَاتُ الْوَضْعِيَّة.
- stepping r. مُنْعَكْسُ الْخَطْو. حركات التقدم التي تظهر عند مسك الوليد بوضع قائم ومائل للامام مع لمس أخمصي القدمين لسطح مستو وهو يظهر في الوليد السوي حتى سن الأسبوع السادس من عمره.
- Stookey's r. مُنْعَكْسٌ سَتُوكِيّ. انثناء الساق عند طرق وترتي العضلتين الغشائية النصف والوترية النصف عندما تكون الساق نصف مثنية عند الركبة.
- stretch r. مُنْعَكْسُ التَمْدِيد. التقلص المنعكسي للعضلة استجابة لشدها أو تمديد الطولاني للفاعل.

بعض أنواع المنعكسات النخاعية:



منعكس جدار البطن  
(تقلص عضلات البطن  
عند حك جدارها).



منعكس الثلاثية الرؤوس  
(امتداد الساعد عند طرق وتر  
العضلة الثلاثية الرؤوس).



منعكس الرضفة  
(امتداد الساق عند طرق وتر الرضفة).

reflex.spinal

بعض أنواع المنعكسات النخاعية: منعكس الثلاثية الرؤوس (امتداد الساعد عند طرق وتر العضلة الثلاثية الرؤوس). منعكس جدار البطن (تقلص عضلات البطن عند حك جدارها). منعكس الرضفة (امتداد الساق عند طرق وتر الرضفة).

- مُنْعَكْسُ شَتْرُوفِيل. حركة الساق - striimpell's r. مع تقريب القدم الذي يتولد عن قرع الفخذ أو البطن.
- مُنْعَكْسُ المَص. حركات الفم - sucking r. المَصِيَّة التي تظهر عند لمس شفة المريض لجسم ما.
- مُنْعَكْسُ سَطْحِي. أي منعكس - superficial r. سحب يتولد عن التنبيه المؤذي أو اللعسي للجلد أو للقرنية أو للغشاء المخاطي ويشمل ذلك منعكسات القرنية والمشمرة والبلعوم وما شاكل.
- مُنْعَكْسُ البَاسِطَةِ الطَوِيلَةِ. - supinator longus r. يؤدي نقر النهاية السفلية للكعبرة إلى انثناء الساعد.
- المُنْعَكْسُ (supraorbital r. (= McCarthy's r.)) فوق الحجاجي.
- المُنْعَكْسُ فَوْق الرُضْفِي. عند - suprapatellar r. وضع اصبع الفاحص فوق الرضفة وقرعها عندما تكون الساق ممدودة تتحرك الرضفة للخلف.
- مُنْعَكْسُ فَوْق العانة. يؤدي - suprapubic ضرب البطن فوق الرباط الأربي إلى انحراف الخط الأبيض نحو الجهة المعنية.
- supraumbilical r. (= epigastric r.) المُنْعَكْسُ فَوْق السُرِّي: المُنْعَكْسُ الشَّرْسُوفِي.
- مُنْعَكْسُ البَلْع: - swallowing r. (= palatal r.) المنعكس الحنكي.
- tarsopharyngeal r. (= Mendel Bekhterev r.) المُنْعَكْسُ الرُضْفِي السَّلَامِي.
- مُنْعَكْسُ وَتَرِي. التقلص اللاإرادي - tendon r. للعضلة بعد شدّها البسيط الذي ينتج عن قرع وترها وهي تشمل منعكسات معظم العضلات الكبيرة.
- مُنْعَكْسُ ثروكمورتن. - Throckmorton's r. أحد أنواع منعكس بابنسكي يظهر عند قرع المنطقة الرضفية السالامية في ظهر القدم.
- المُنْعَكْسُ الظَّنْبُوبِي المَقْرَب. - tibioadductor r. يؤدي قرع الجهة الداخلية للظنبوب إما إلى تقريب ساق الجهة نفسها أو تقريب متصالب من جهة أخرى.
- مُنْعَكْسُ إبهام القدم. يؤدي الثني الشديد - toe r. لإبهام القدم إلى انثناء كل عضلات الطرف السفلي ويشاهد ذلك في الحالات المرضية التي تتصف بفرط الانعكاسية.
- مُنْعَكْسُ تَوْتَرِي. 1. مرور وقت طويل - tonic r. نسبياً بعد حدوث المنعكس بين تقلص العضلة وارتخائها وعودتها إلى وضعها المستقر. 2. المنعكس العضلي الذي يديم تقلصها وهو أساس المنعكسات الرضفية والقوام.
- مُنْعَكْسُ الرَقَبَةِ التَوْتَرِي. - tonic neck r. منعكس في الوليد يتكون من امتداد الذراعين وأحياناً الساقين أيضاً على الجهة التي يدور نحوها الرأس بشدة مع انثناء الطرف المعاكس على الجهة الأخرى.
- مُنْعَكْسُ مُدْرَب. (trained r. (= conditioned r.)) منعكس شرطي.
- نفضة المرفق: - triceps r. (= elbow jerk) مُنْعَكْسُ الثَلَاثِيَّةِ الرُّؤُوس. تقلص بطن العضلة ثلاثية الرؤوس مع بسط الذراع البسيط عند قرع وتر العضلة عندما تكون الذراع مثنية ومسنودة تماماً ومرتخية.
- مُنْعَكْسُ الثَلَاثِيَّةِ الرُّؤُوس - triceps surae r. انثناء أخمصي للقدم يظهر عند قرع العرقوب ويجري ذلك عندما يكون المريض منكباً على الفراش أو الكرسي وقدمه معلقة بصورة حرة على حافته ويسمى أيضاً نفضة الكاحل.
- مُنْعَكْسُ (trigeminus r. (= oculopupillary r.)) الثَلَاثِي التَوَاتِي. يؤدي تنبيه قرنية العين أو الاجفان إلى توسع حدقتي العينين ثم تضيقهما.
- مُنْعَكْسُ الرِّزْد. يؤدي قرع النائي - ulnar r. الإبري للزند إلى انكباب اليد.
- مُنْعَكْسُ لا شَرْطِي. - unconditioned r.
- مُنْعَكْسُ بُولِي. - urinary r. (= micturition r.)
- مُنْعَكْسُ المُبْهَم. الحساسية المفرطة - vagus r. لشاذة للعصب المبهم عند الضغط على سبيله.
- مُنْعَكْسُ وَعَائِي. ارتفاع ضغط - vascular r. الدم نتيجة تضيق الأوعية.
- مُنْعَكْسُ الشَّامِخَةِ - vertebra prominens r. الفقاريَّة. يقلل الضغط على الفقرة الرقبية الأخيرة للحيوان من توتر عضلات أرجله الأربع.
- مُنْعَكْسُ المَثَانَةِ. - vesical r. (= bladder r.) يؤدي تمدد المثانة المعتدل إلى الرغبة في التبول.
- المُنْعَكْسُ المَثَانِي المِعْوِي. - vesicointestinal r. يؤدي تهيج المثانة إلى تثبيط حركة الأمعاء.
- المُنْعَكْسَاتُ الدَّهْلِيْزِيَّة. - vestibular r's. المنعكسات المتعلقة بإدامة وضع العينين والجسم

بالنسبة لتغيرات توجهات الرأس والتي لها طرق عصبية معقدة تسير من العصب الدهليزي إلى النوى الدهليزية ومنها إلى العضلات العينية أو الجسمية المتعلقة بالمنعكس.

- **vestibulo-ocular r.** **الْمُنْعَكْسُ الدَّهْلِيْزِيّ**  
العَيْنِيّ. رَأْيَةُ الْعَيْنَيْنِ أَوْ انْحِرَافُهُمَا عِنْدَ تَنْبِيهِ الْجِهَازِ الدَّهْلِيْزِيِّ بِالتَّسْرِيْعِ أَوْ بِالإِبْطَاءِ الزَّائِي أَوْ بِرَيِّ الْأَذْنِ بِمَاءٍ حَارٍّ أَوْ بَارِدٍ أَوْ بِهَوَاءٍ.

- **virile r.** **مُنْعَكْسُ الرُّجُولَةِ**. 1. المنعكس البصلي الكهفي 2. منعكس في القضيب الرخو يتولد عند سحب جلد حشفته للأعلى عندما يؤدي ذلك إلى نفخة القضيب المفاجئة للأسفل.

- **visceral r.** **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ**. منعكس تولده إحدى الحالات بتنبئها أحد الأحشاء.

- **viscerocardiac r.** **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ قَلْبِيّ**. تبدل نظم القلب أو تقلصاته الانعكاسية المولد عن تنبيه حشوي.

- **visceromotor r.** **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ حَرَكِيّ**. تقلص عضلات البطن في المنطقة التي تغطي حشوي مريض.

- **viscerosensory r.** **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ جِسْمِيّ**. استجابة أو منعكس يتولد عند الضغط على أحد الأقسام بسبب مرض أحد أعضائه الباطنية.

- **viscerotrophic r.** **مُنْعَكْسٌ حَشَوِيّ يَمَازِيّ**. تنكس أي من الأنسجة المحيطة نتيجة التهاب أحد الأحشاء.

- **von Mering r.** **مُنْعَكْسٌ قَوْنِ مِيرِينْغ**. ارتخاء العضلات البطنية السطحية بعد تناول الطعام.

- **Westphal's pupillary r. (= orbicularis pupillary r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْحَدَقِيّ الدَّوْزِيّ**؛ **مُنْعَكْسٌ وَيْسْتَفَالِ الْحَدَقِيّ**.

- **Westphal-Piltz r. (= orbicularis pupillary r.)** **الْمُنْعَكْسُ الْحَدَقِيّ الدَّوْزِيّ**؛ **مُنْعَكْسٌ وَيْسْتَفَالِ - بِلْتز**.

- **withdrawl r.** **منعكس السحب**. منعكس مؤلم ينسحب فيه أحد أقسام الجسم بسرعة بعيداً عن المنبه المؤلم له.

- **zygomatic r.** **مُنْعَكْسُ الْوُجْنَةِ**. حركة الفك السفلي الوحشية عند الطرق على منطقة عظم الوجنة.

**reflexogenic** **مَوْلَدُ الْمُنْعَكْسِ**. ما يولد الفعل المنعكسي أو يزيده.

**reflexogenous (= reflexogenic)** **مَوْلَدُ الْمُنْعَكْسِ**.

**reflexograph** **مِخْطَاطُ الْمُنْعَكْسَاتِ**. جهاز يرسم المنعكسات بشكل خطوط بيانية.

**reflexometer** **مِقْيَاسُ الْمُنْعَكْسَاتِ**. جهاز يقيس الشدة اللازمة لتوليد منعكس ممدد للعضل.

**regeneration** **تَجَدُّدٌ**. التجدد الطبيعي لبنية ما مثلاً للنسيج أو للبنية المفقودة.

**regio** **نَاحِيَّةٌ**. منطقة ذات حدود واضحة.

- **r. frontalis** **النَّاحِيَّةُ الْجَبْهِيَّةُ**. ناحية الرأس التي تغطي عظم الجبهة وهي الجبهة أو الجبين.

- **r. hypothalamica anterior** **النَّاحِيَّةُ الْوِطَائِيَّةُ الْأَمَامِيَّةُ**. المنطقة الامامية للوطاء التي تقع بجوار الصفيحة الانتهازية وبأعلى التصالبة البصرية وتشتمل على النوى أمام البصرية الوحشية والإنسية وفوق البصرية وجنيب البطين والنواة الوطائية الامامية.

- **r. hypothalamica dorsalis** **النَّاحِيَّةُ الْوِطَائِيَّةُ الظَّهْرِيَّةُ**. القسم الظهري من الوطاء الذي يحوي النواة داخل السويق ونوى العروة العدسية والناحية الوطائية الامامية والنوى أمام البصرية الوحشية والإنسية والفوق البصرية وجنيب البطين والنواة الوطائية الامامية.

- **r. hypothalamica intermedia** **النَّاحِيَّةُ الْوِطَائِيَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ**. قسم الوطاء الذي يحوي النواتين المقوسة والحديدية والباحة الوطائية الوحشية والنوى الوطائية البطنية الإنسية والظهرية الإنسية والظهرية والنواتين الخلفية حول البطين والقمعية.

- **r. hypothalamica posterior** **النَّاحِيَّةُ الْوِطَائِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ**. القسم الخلفي من الوطاء والمكون من النواتين الإنسية والوحشية للجسم الحلمي والنواة الوطائية الخلفية.

- **r. occipitalis** **النَّاحِيَّةُ الْقَذَالِيَّةُ**. ناحية الرأس التي تغطي العظم القذالي.

**regulation** **تَنْظِيمٌ**؛ **نِظَامٌ**. 1. عملية تنظيم أو حالة منظمة بمقاييس معينة 2. في البيولوجيا



هو تلاؤم الكائن الحي مع تغيّرات الظروف المحيطة المتغيرة.

**reinforcement** تَغْرِيز. زيادة الشدة أو القوة، وفي العلوم السلوكية هو توفير منبه ينشط الاستجابات قبيل حدوثها.

**- r. of reflex** تَغْرِيزُ الْمُنْعَكْس. زيادة استجابة المنعكس بتشجيع المريض على القيام ببعض التركيز العقلي أو الجسدي عند إحداث المنعكس.

**reinnervation** إِعَادَةُ التَّغْصِيب. إعادة الوظائف العصبية إلى قسم من الجسم كانت قد أزيلت منه أعصابه وهي يمكن أن تحدث تلقائياً أو بالتطعيم العصبي.

**relaxant** مُرْخ (ج: مُرْخِيَّات). 1. يقلل أو يزيل التوتر. 2. عامل مزيل للتوتر.

**- muscular r.** مُرْخ عَضَلِيّ. عامل نوعي خاص يقلل أو يزيل التوتر العضلي كالذي يعمل على عضونات الأعصاب الحركية متعددة التشابكات مثل المفروباميت أو عامل يعمل في الاتصال العضلي العصبي مثل الكوراري ومشتقاته.

**relaxation** 1. إِرْخَاء. إِرْخَاءٌ. 2. تَسْكِين. 1. تقليل الشد. 2. تسكين الألم وتلطيفه.

**- Isometric r.** إِرْخَاءٌ إِسْوِيّ الطُّول. ارتخاء العضلة من دون قصرها.

**REM (= rapid eye movements)** الْحَرَكَاتُ الْعَيْنِيَّةُ السَّرِيعَةُ. انظر sleep.

**remission** هَذَاة. خفة أعراض المرض أو نقصها أو الفترة التي يتم فيها كل ذلك.

**remittent** مُتَرَدِّد. حالة أو مرض ذو فترات هداة وسورة.

**remotivation** تَنْشِيطُ الْحَوَافِز. في الأمراض النفسية هي طريقة علاج جماعية تقوم بها هيئة التمريض في مستشفى للأمراض النفسية على تشجيع المرضى المصابين بداء الامتناع على التواصل والاهتمام بمحيطهم. أو تنبيه كفاءة الاتصال بين المرضى واهتماماتهم بمحيطهم.

**remyelination** عَوْدَةُ تَشْكَالِ الْمِيَالِين. عودة الغمد المياليني للعصب أو الأعصاب بعد زواله.

**reserpine** رِيْزَرْپِين. دواء يستعمل كَمَسْكُن ومضاد لارتفاع ضغط الدم.

**response** إِسْتِجَابَةٌ. فعل أو حركة تحدث نتيجة التنبيه بمنبه.

**- conditioned r.** إِسْتِجَابَةٌ شَرْطِيَّة. استجابة يستثيرها منبه شرطي والتي لم يكن بالإمكان توليدها قبل الإشراف.

**- unconditioned r.** إِسْتِجَابَةٌ لَا شَرْطِيَّة. استجابة يستثيرها منبه لا شرطي وهي استجابة غريزية وطبيعية وغير متعلّمة.

**restlessness** تَمَلُّل؛ قَلَق.

**retardation** تَخَلُّف؛ تَغْوِيق. تنام أو تطور متخلف.

**- mental r.** تَخَلُّفٌ عَقْلِيّ. اضطراب عقلي يتصف بوظائف عقلية دون معدلاتها السوية ويطرفق مع تخلف في السلوك التكيفي للمحيط ويظهر خلال فترة التنامي ويصنف إلى معتدل يكون فيه حاصل الذكاء 70-50 ومتوسط 50-35 وشديد 35-20 وعميق اقل من 20 وهناك بعض حالات التخلف العقلي تصنف كحالات حدية يكون فيها حاصل الذكاء 70-85.

**- psychomotor r.** تَخَلُّفٌ عَقْلِيّ حَرَكَيّ. بطء الفعاليات العقلية والجسدية ويشاهد في الكآبة.

**retention** إِخْتِبَاس.

**- r. of urine** إِخْتِبَاسُ الْبَوْل. تجمع البول داخل المثانة لعدم التمكن من التبول.

**retinoscope** مِئْظَارُ الشَّبَكِيَّة. جهاز يستعمل لفحص شبكية العين.

**retinoscopy** تَنْظِيرُ الشَّبَكِيَّة. طريقة عملية لتحري وتشخيص وتقييم الأخطار الانكسارية للعين وكذلك لتنظير القرص البصري والشبكية وأوعيتها الدموية.

1. خَلْفَ الْبَصَلَةِ. 2. خَلْفَ الْمُقَلَّة. **retrobulbar**

صَعَرَ خَلْفِيّ؛ تَشَنُّجُ الرَّقَبَةِ الْمُنْكَفِيَّة. **retrocollis** صعر تشنجي ينسحب فيه الرأس إلى الخلف.

إِنْجِرَافٌ خَلْفِيّ. مصطلح عام يشمل الانقلاب الخلفي والانثناء الخلفي والتوضع الخلفي.

رُجُوعِيّ. 1. الحركة إلى الخلف **retrograde** أو بعكس اتجاه الجريان الطبيعي 2. تنكس تردّي أو تقويضي.

**rabdomyolysis** انحلال الرّيبيدات؛ إنْجِلَالُ العضل. تلاشي العضل مع طرح الميوجلوبيين في البول.

**- exertional r.** إنْجِلَالُ العضل الإجهادي. الانحلال العضلي الذي ينشأ عن الجهد الجسدي الشديد ولمدة طويلة مع أعراض تشابه تلك التي تظهر عند الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الشرياني.

**rabdomyoma** ورم عضلي مُخَطَّط. ورم حميد يتكون من العضل المخطط.

**rabdomyosarcoma** ساركومة العضل المُخَطَّط. ورم شديد الخباثة يصيب العضلات المخططة.

**rheobase** قَرَارَةُ التَّيَّار. القيمة العتبية لتيار غير محدد المدة القادر على تنبيه نسيج قابل للتهيج.

**rhinalgia, rhinodynia** ألم الأنف. ألم أنفي.

**rhinencephalon** الدِّماغُ الشَّمِّي. 1. باحة الدماغ التي تشمل المادة المثقبة الامامية والشريط المائل (لبروكا) والباحة تحت الثقبية والتلفيف حوالي الانتهاءي 2. اصطلاح يطلق على بعض اقسام الدماغ كان يعتقد سابقاً أنها متخصصة بالوظائف الشمية بصورة مطلقة وتشمل الاعصاب الشمية والبصلات الشمية والسبل الشمية وارتباطاتها مع الجهاز الحوفي.

**rhinesthesia** حسُّ الشَّم. حَسَنَةُ.

**rhinolalia** خَنَخَنَة. نغمة أنفية بسبب آفة أو مرض أنفي أو بسبب تشوه في المجاري الأنفية.

**rhinorrhea** نَزْلُ أنْفِي. نجيج مخاطي خفيف من الأنف.

**- cerebrospinal r.** نَزْلُ أنْفِي دِمَاجِي نَخَاعي. نجيج السائل الدماغي النخاعي من الأنف.

**rhizanesthesia** تَخْدِيرُ جَذَرِي. تخدير موضعي بحقن المخدر الموضعي إلى الحيز العنكبوتي النخاعي.

**rhizotomy** بَضْعُ الجُذُور. بضع الجذور العصبية في داخل القناة الشوكية.

**- anterior r.** بَضْعُ الجُذُورِ الأماميَّة. قطع الجذور الحركية الامامية للنخاع الشوكي.

**- dorsal r. (= posterior r.)** بَضْعُ الجُذُورِ الخَلْفِيَّة. قطع الجذور العصبية الحسية الخلفية للنخاع الشوكي وتجري لمعالجة الآلام غير المحتملة.

**- retrogasserian r.** قَطْعُ الجُذُورِ خَلْفَ عُقْدَةِ غَاسِر. قطع جذور العصب الثلاثي التوائم لمعالجة الآلام العصبية لثلاثي التوائم.

**rhythm** نَظْم. تكرر الفعل أو الوظيفة في أوقات منتظمة.

**- alpha r.** نَظْمُ ألفا. نظم منتظم لموجات المخطط الكهربائي للدماغ التي تتراوح سرعتها حوالي 10 موجات في الثانية، ويسمى أيضاً نظم برغر.

**- Berger r. (= alpha r.)** نَظْمُ بَرُغَر.

**- beta r.** نَظْمُ بِيَّتَا. نظم منتظم لموجات المخطط الكهربائي للدماغ الأصغر من موجات نظم ألفا ولكن لها معدل سرعة 25 موجة بالثانية.

**- biological r.** نَظْمُ بِيُولُوجِي. الانتظام الثابت لتكرر بعض الظواهر البيولوجية بفترات زمنية منتظمة.

**- circadian r.** نَظْمُ يَوْمَاوِي. تكرر بعض الدورات الوظيفية بمعدل يقارب الأربع وعشرين ساعة من بداية إحدى الدورات حتى بداية الدورة التالية من دون أي اعتبار للظلام مثلاً أو أية عوامل متغيرة أخرى.

**- delta r.** نَظْمُ دِلْتَا. موجات دلتا الكبيرة والبطيئة نسبياً في المخطط الكهربائي للدماغ وتكرر بمعدل 1/2 3 موجة في الثانية.

**- gamma r.** نَظْمُ غَامَا. نظم موجات في المخطط الكهربائي للدماغ تتكرر بمعدل 50 موجة في الثانية.

**- infradian r.** نَظْمٌ تَحْتَ يَوْمِي. نظم يتكرر في دورات أطول من 24 ساعة من بداية إحدى الدورات إلى بداية الدورة التالية ك بعض الفعاليات البيولوجية دون اعتبار لأية تغييرات في الظروف المحيطة.

**- nyctohemeral r.** نَظْمٌ لَيْلِي نَهَارِي. نظم يتكرر ليلاً ونهاراً.

**- theta r.** نَظْمٌ ثِيَّتَا. موجات تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ وتكرر بمعدل 4-7 موجات في الثانية وتظهر في الأطفال وعند الكبار في حالة الكآبة أو الشدة العاطفية.

**- ultradian r.** نَظْمٌ فَوْقَ يَوْمِي. نظم يتكرر

بدورات أقل من 24 ساعة من بداية إحدى الدورات حتى بداية الدورة التالية.

**rib, cervical (= costa cervicalis)** **ضِلْعُ رَقَبِيَّةٍ**. ضلع إضافي يبدأ من إحدى الفقرات الرقبية وعادة من الفقرة السابعة منها.

**rigidity (= rigor)** **صَلَمٌ**. تيبس أو عدم المرونة (**rigor mortis**) خصوصاً التيبس المرضي أو الشاذ.

**- clasp-knife r.** **صَلَمٌ مُنْقَلَبٌ**. زيادة مقاومة الباسطات تظهر عند محاولة شي المفصل بطريقة منفصلة ثم تزول بصورة مفاجئة عند زيادة المحاولة.

**- cogwheel r.** **صَلَمٌ الدُّوَلَابِ المُسَنَّ**. صل صم العضلة الذي يزول بنفضات تدريجية عند وضع الضغط على العضلة.

**- cold r.** **تَيْبَسٌ إِنْجَمَادِيٌّ**. صل العضلات الشديد عند التعرض للبرودة الشديدة.

**- decerebrate r.** **صَلَمٌ فَصْلِ المُخِّ**. الوضع الذي يولد في الحيوان التجريبي عند فصل مخه والذي يتصف بامتداد صملي للأطراف ويحدث ذلك للإنسان في الآفات التي تصيب القسم العلوي من جذع الدماغ وتتصف بنوم المريض في حالة تمدد صملي وأذرع مدورة للداخل عند المنكبين وممددة ومكبوبة عند المرفق وأصابه منشئية عند المفاصل بين السلااميات وممتدة عند المفاصل السنعية السلاامية وسيقانه ممتدة عند الورك والركبة مع انثناء الكاحل والاباخص.

**- heat r.** **تَيْبَسٌ حَرَارِيٌّ**. صل العضلات عند التعرض للحرارة الشديدة.

**- lead pipe r.** **صَلَمٌ أَنْبُوبِ الرُّصَاصِ؛ صَلَمٌ بَارَكِنْسُونِيٌّ**. الصل الذي يشاهد في داء باركنسون.

**- paratonic r.** **صَلَمٌ خَلَلِ التَّوَتُّرِ**. زيادة متقطعة في مقاومة العضلات للتمديد اللافاعل في المريض المسبوت.

**- parkinsonian r.** **صَلَمٌ بَارَكِنْسُونِيٌّ**. زيادة التوتر العضلي في داء باركنسون وإما أن يكون من نوع صل أنبوب الرصاص أو صل الدوالب المسنن. **- spastic r. (= spasticity)** **شَنَاج**. فرط التوتر التشنجي.

**rigor** 1. رَغْدَةٌ؛ نافض 2. صَلَمٌ.

**- r. mortis** **صَلَمٌ مَوْتِيٌّ**؛ صَلَمٌ رَمِيٌّ؛ تَيْبَسٌ رَمِيٌّ. زيادة توتر عضلات جسم الميت.

**- r. tremens (= parkinsonism)** **الْبَارَكِنْسُونِيَّةُ؛ الصَلَمُ الرَّعَاشُ**.

**risocaine** ريزوكائين. دواء يستعمل كمخدر موضعي أو مضاد للحك.

**risus** تَكْشِيرَةٌ. ضحكة مع انفراج الشفتين.

**- r. sardonicus** تكشيرة سَرْدُونِيَّة. تكشيرة تظهر على الوجه بسبب تشنج عضلاته.

**rod** عَصَا؛ نَبُوتٌ؛ عُود. كتلة صغيرة ورقيقة ومستقيمة من إحدى المواد.

**- muscle r. (= myofibril)** **لُيْفَةٌ عَضَلِيَّةٌ**.

**- retinal r.** **عَصِيَّةٌ شَبَكِيَّةٌ**. نيابيت الشبكية التي تقوم بوظيفة الرؤية الليلية أو الظلامية وتكثر على أطراف الشبكية ولا يوجد منها أية عصية في نقيرتها.

**root** جَذَر. القسم أو البنية السفلية التي تتصل بها بواسطتها بنية أخرى بشدة.

**- r. of ansa cervicales, inferior (= radix inferior ansa cervicalis)** **الجَذَرُ السُّفْلِي لِلْعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّةِ**.

**- r. of ansa cervicalis, superior (= radix superior ansa cervicalis)** **الجَذَرُ الْعُلَوِي لِلْعُرْوَةِ الرَّقَبِيَّةِ**.

**- cranial r's. of accessory nerve (= radices craniales nervi accessori)** **الجُذُورُ الرَّقَبِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْإِضَافِيِّ**.

**- facial r. (= radix nervi facialis)** **جَذَرُ الْعَصَبِ الْوَجْهِيِّ**.

**- motor r. of trigeminal nerve (= radix motoria nervi trigemini)** **الجَذَرُ الْحَرَكَتِيُّ لِلْعَصَبِ ثَلَاثِي التَّوَاتِمِ**.

**- r. of spinal nerve (= radix nervi spinalis)** **جَذَرُ الْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ**.

1. مَنْقَارِي 2. أَمَامِي، بَطْنِي 3. غُلَوِي. **rostral** 1. متعلق بالمنقار أو شبيه به أو يحويه. 2. يقع باتجاه المنقار أو الذروة (فموي أو أنفي) أو يعني علوي (بالنسبة للنخاع الشوكي) أو أمامي أو بطني (بالنسبة لباحات الدماغ ومناطقه).

**rostrum** مَنقَار. زائدة تشبه المنقار.

- r. corporis callosi مَنقَارُ الجِسْمِ الثَّقَنِي.

النهاية الأمامية السفلية للجسم الثقني.

**rubrospinal** حَمْرَآوِيٌّ نُخَاعِي. متعلق بالنواة

الحمراء والنخاع الشوكي.

**rubrothalamic** حَمْرَآوِيٌّ مِهَادِي. متعلق

بالنواة الحمراء والمهاد.

**rumination, obsessive** اجْتِرَارٌ وَسَّوَاسِي.

اهتمام الشخص القسري ببعض الأفكار الملازمة له

والمعاودة دون التمكن من التخلص منها.

# S

**saccade** رَمَشٌ؛ تَتَبُّعٌ. سلسلة الحركات السريعة المفاجئة الصغيرة اللاإرادية أو النفقات الدقيقة والمتزامنة في العينين عند تغيير نقطة التثبيت البصري مثل تتبع كلمات السطر المكتوبة عند القراءة.

**saccadic** رَمَشِيَّةٌ؛ تَتَبُّعِيَّةٌ. حركات تتبعية.  
**sacralgia** أَلَمُ الْعَجْزِ.

**sadism** السَّادِيَّةُ. شذوذ جنسي يتصف بإشباع الرغبات الجنسية عن طريق إيذاء أو إهانة الشريك الجنسي.

**- anal s.** السَّادِيَّةُ الشَّرْجِيَّةُ. السادية الموجهة نحو الشرج

**- oral s.** السَّادِيَّةُ الفَمَوِيَّةُ. السادية التي تتصف بإشباع الرغبة بالعض والعلك وما شاكل.

**sadist** السَّادِيٌّ. الشخص المصاب بالسادية.

**sadomasochism** السَّادِيَّةُ العَاوُجِيَّةُ. حالة تتصف بالسادية والمازوخية معاً.

**sagittal** سَهْمِيٌّ. 1. ما يشبه السهم.  
2. ما يقع في مستوى الدرز السهمي أو موازٍ له، ويقال عن مستوى مقطع أمامي خلفي موازٍ للمستوى الناصف للجسم.

**saltation** قَفْزٌ. 1. داء الرِّقَص أو الحركات الرقصية التي يتصف بها 2. التوصيل القفزي على طول العصب المغمد 3. الطفرة في الوراثة، وهي التغير المفاجيء في النوع أو بعض خواصه.

**saltatory** قَفْزِيٌّ.

**sand, brain (= acervulus)** رَمْلُ الدِّمَاغِ. كتلة المادة الرملية الشكل بالقرب من الجسم

الصنوبري والصفيرة المشيمية وفي أقسام أخرى من الدماغ.

**sane** عَاقِلٌ. ذو عقل سوي.

**sanity** سَلَامَةُ الْعَقْلِ. السلامة وخاصة سلامة العقل.

**sapphism (= lesbianism)** سَحَاقٌ. اشتهاؤ المرأة للمرأة.

**sarcomblast** الأَرْوْمَةُ العَضَلِيَّةُ. الخلية البدائية التي تنمو لتولد الخلية العضلية.

**sarcoglia** دَبْقُ عَضَلِيٍّ. المادة التي تكون ناتئ دوير عند مدخل الخيوط العصبية إلى الليف العضلي.

**sarcoidosis** داء الساركويد. مرض شبكي مزمن ومترق وورامٌ حبيبي جهازى غير معروف السبب يصيب تقريباً أي من الأعضاء والأنسجة في الجسم وبضمنها العضلات والعين.

**- muscular s.** داء الساركويد العَضَلِيُّ. ساركويد يصيب العضلات المخططة بدرنات ساركويدية مع التهاب النسيج الخلالي وتليف وتمزق وضمور الألياف العضلية.

**sarcolemma** غِمدُ اللَّيْفِ العَضَلِيِّ. الغشاء البلازمي الرقيق الذي يحيط بكل ليف عضلي مخطط.

**sarcoma** ساركومة. أحد الأورام التي تتولد من الأنسجة الضامة بالرغم من استعمال المصطلح أحياناً ليضم أوراماً أخرى من أصل ظهاري.

**sarcomere** قُسَمٌ عَضَلِيٌّ. وحدة الخيط العضلي القلوصة التي تكون وحدات تكررية يفصل الواحدة منها عن الأخرى شريط Z على طول الخيط العضلي.

**sarcoplasm** الهَيُولَى العَضَلِيَّة. المادة بين خيوط الألياف العضلية المخططة وهي المادة التي تسجى فيها الألياف العضلية.

**sarcoplast (= myoblast)** أرومة عضلية: سَلَيْقَةُ العَضَلِيَّة. خلية خلالية في العضلة تتمكن من التبدل إلى خلية عضلية.

**sarcostosis** تَعَظُّمُ العَضَل. تعظم النسيج العضلي.

**sarcostyle (= myofibril)** إبرة عضلية: لَيْقَةُ عَضَلِيَّة. 1. ليفة عضلية 2. حزمة ليفات عضلية.

**sardonic** تَكْشِيرَةٌ تَشْنُجِيَّة. تكشيرة تشنجية أو تَكَزُّزِيَّة أو تكشيرة لا إرادية.

**satiety** شَبَع. اكتفاء أو إشباع كإشباع الشهية أو العطش مع تثبيط الرغبة بتناول الطعام أو شرب الماء.

**satyriasis** شَبَق. الرغبة الجنسية المفرطة الشاذة من دون الإشباع في الذكر.

**satyromania (= satyriasis)** شَبَق.

**scala** السِقَالَة. بنية شبيهة بالسلم تستعمل لوصف ممرات القوقعة المختلفة.

**scan (= scintiscan)** تَقْرِيسَة. عرض بصري للأصداء فوق الصوتية الصورية.

**scanning** تَقْرِيس. عملية الفحص البصري لمنطقة محدودة أو عدة مناطق محددة وبالتفصيل.

**- radioisotope s.** تَقْرِيسٌ بِالتَنْظِيرِ المُشْع. توليد صورة ذات بعدين (تقريسة) تمثل إشعاعات عامة تنبعث من نظير مشع ومركزة في نسيج معين من الجسم كالدماع أو الغدة الدرقية.

**scanography** تَصْوِيرٌ تَقْرِيسِي. طريقة تصوير شعاعي باستعمال أنبوب ذي شق ضيق في أسفله يمرر خطأ واحداً أو صفيحة واحدة من أشعة أكس ويتحرك أنبوب الأشعة على الجسم بحيث تمر كل إشعاعات الحزمة المركزية خلال الجسم ويتم تصويرها بنفس الزاوية.

**scaphocephaly** الرُّأْسُ الزُّوْرَقِيّ؛ تَزَوْرُقُ الرُّأْس. حالة تتصف بجمجمة شاذة طويلة وضيقة

نتيجة الفلق المبكر للدرز السهمي مع مراكز تعظم شديدة في خط الدرز وعادة ما تترافق مع التهاب وضمور الحليمات البصرية وبتخلف عقلي.

**scaphohydrocephaly** مَوَّه الرُّأْسُ الزُّوْرَقِيّ. موه الرأس الذي يتصف بشكل زورقي.

**scapulalgia** أَلَمُ الكَتِف. ألم في منطقة الكتف.

**scapulodynia** وَجَعُ المُنْكَب. ألم في منطقة المنكب.

**scar** نَدْبَة. انظر cicatrix.

**scelalgia** أَلَمُ السَّاق. ألم في الساق.

**schizoaffactive** فُصَامِيٌّ عَاطِفِيٌّ؛ مُنْفَصِّمُ العَوَاطِف. مريض تبدو لديه صفات الفصام مع اضطرابات المزاج (هوس واكتئاب).

**schizocephalia** إِنْشِقَاقُ الرُّأْس. عيب تنموي يتصف بوجود شق طولي في الرأس.

**schizogyria** إِنْشِقَاقُ التَّلَافِيف. حالة تتصف بتشقق تلافيف الدماغ وظهور شقوق إسفينية الشكل على سطحه.

**schizokinesis** إِنْفَصَامُ الإِسْتِجَابَات. الحالة التي تزول فيها الاستجابة الشرطية وتستمر الاستجابات المرافقة غير النوعية على الظهور عند التنبيه.

**schizophasia** كَلَامٌ فُصَامِيٌّ. الكلام غير المنسّق الذي يتفوه به المصاب بالفصام.

**schizophrenia** فُصَام. اضطراب عقلي أو مجموعة اضطرابات نفسية تشمل معظم الاضطرابات النفسانية الرئيسية ويتصف باختلالات فكرية (فقدان الارتباطات أو ضعفها وتوهّمات وإهلاس) واختلال المزاج (عواطف بليدة وغير مناسبة) واختلال الحس بالذات وعلاقتها بمحيطها الخارجي (فقدان حدود الأنا والتفكير اللامترابط واللاواقعي وانكماش تهرابي) واختلالات سلوكية (فعاليات غريبة وشاذة وغير متجانسة أو انعدام الفعاليات بتاتا).

**- acute s.** فُصَامٌ حَاد. بداية حادة لأعراض فصامية، ولما كان الوصف للفصام بأنه مرض مزمن فلا بد من إيجاد اسم بديل له مثل اضطراب فصامي الشكل.

- **ambulatory s.** فُصَامٌ سَيَّرِي. فصام معتدل معاوض بصورة كافية تؤهل المريض المحافظة على نفسه من دون إدخاله المستشفى.

- **borderline s. (= latent s.)** فُصَامٌ حَدِّي؛ فُصَامٌ كَامِن.

- **catatonic s.** فُصَامٌ جَامُودِي. نوع من الفصام يتصف باضطرابات نفسية حركية شديدة، كالذهول الجامودي (النقص الكبير في القدرة على الاستجابة للمحيط وللفعاليات التلقائية) أو الصمات والمعادنة الجامودية (مقاومة كل أنواع الإرشادات أو محاولات التحريك) والصمل الجامودي (المحافظة على وضعة صملة) أو الإشارة الجامودية (مستشار ولا يمكن السيطرة عليه مع فعاليات حركية غير مستهدفة) أو الوضعة الجامودية (وضع المريض بوضعة ثابتة غريبة) وهناك صفات مرافقة مثل سلوك نمطي ثابت والتصنع. ويسمى أيضاً الجامود.

- **childhood s.** فُصَامٌ طُفُولِي. فصام يبدأ قبل سن 10 لبلوغ ويتصف بالسلوك الانهزامي التهرابي وعدم تكوين شخصية ذاتية مستقلة عن الأم وعدم النضوج التطوري الواضح وهو نوع كان يشمل سابقاً كل أنواع الذهان.

- **disorganized s.** فُصَامٌ غَيْرُ مُنَسَّقٍ. نمط من الفصام يتصف بعدم الترابط القاضح وقلة التداعي أو سلوك غير منسق وعاطفة ضحلة أو غير مناسبة أبداً ولكنه لا يصل لدرجة النمط الجامودي وتشمل خواصه المرافقة التهراب من العلاقات الاجتماعية والتكشيرة والتصنع والحملقة المرآتية والضحك غير المناسب والعديد من التصرفات الغريبة والشاذة.

- **hebephrenic s. (= disorganised s.)**

الفُصَامُ الْفَنْدِي. فصام غير منسق.

- **latent s.** فُصَامٌ كَامِن. نمط من الفصام يتصف بأعراضه الواضحة من دون تاريخ نوبات فصامية ذهانية وهو يشمل حالات تسمى الحالات الحدية والشبكة وقبل الذهانية والبادرية والعصابية الكاذبة والفصامية الاعتلالية النفسانية الكاذبة.

- **nuclear s. (= process s.)** فُصَامٌ نَوَوِي.

- **paranoid s.** فُصَامٌ زَوْرَانِي. نوع من الفصام يتصف بانشغال المريض بتوهم منظم واحد أو أكثر أو بهلاس سمعي مُعاود والتعلق بموضوع واحد.

- **paraphrenic** فُصَامٌ اَزْوَرَانِي. فصام زوراني يتصف بتوهم العظمة المنظم.

- **prepsychotic s. (= latent s.)** فُصَامٌ قَبْلِي. الذهاني.

- **process s.** فُصَامٌ أَخْدَاثِي. صنف ثانوي من الفصام (مثل الخرف المبسر) والذي يفترض بأن له أصل داخلي المنشأ مع إنذار ضعيف بالمقارنة بالحالات الأخرى التي تسمى الفصام التفاعلي والتي تنتج عن أسباب مؤهبة أو عوامل محيطية مؤثرة ولها عادة إنذار حسن.

- **pseudoneurotic s.** فُصَامٌ عُصَابِيٌّ كَاذِبٍ. مصطلح يطلق على المرضى الذين تنطبق عليهم أوصاف الاضطراب العصابي ولكن لديهم شذوذ فكري وعاطفي شبيه بذلك الذي يوجد في الفصام فهناك القلق العام (قلق منتشر عام) وعصاب عام (مع أعراض العديد من المتلازمات العصبية).

- **pseudopsychopathic s.** فُصَامٌ الْإِغْتِلَالِ النَّفْسَانِي الْكَاذِبِ. مصطلح يطلق على المرضى الذين لهم أعراض لا اجتماعية واضطرابات الشخصية ولكن من دون شذوذ فكري أو عاطفي شبيه بذلك الذي يحصل في الفصام.

- **reactive s.** فُصَامٌ تَفَاعُلِي. نوع ثانوي من الفصام يفترض بأنه ينتج عن عوامل محيطية مؤهبة وله إنذار أحسن من الفصام الإحداثي.

- **residual s.** فُصَامٌ فُعَالِي. نمط من الفصام يتصف بتاريخ نوبة أو نوبات منه مع أعراض ذهانية واضحة وقلة الأعراض الحالية مع الاحتفاظ ببعض الأعراض الفصامية الأخرى كضعف العاطفة أو العاطفة غير المناسبة والتهراب الاجتماعي والسلوك غريب الأطوار والتفكير اللامنطقي وضعف الارتباطات الاجتماعية.

- **simple s.** الفُصَامُ الْبَسِيطُ. فصام من دون خواص أو أعراض ذهانية واضحة.

- **undifferentiated s.** الفُصَامُ الْاَلْمُتَمَايِزُ. نوع من الفصام يتصف بوجود أعراض ذهانية واضحة ولكن لا يمكن تصنيفه كفصام جامودي أو زوراني أو غير منسق.

1. فُصَامِي 2. مَفْصُوم. schizophrenic

1. منسوب أو متصف بالفصام 2. مريض مصاب بالفصام.

شَبِيهُ الْفُصَامِ. ما يشابه schizophreniform الفصام.

**schizotonia** انْفِصَامُ التَوَتُّر. عدم تناسق توتر عضلات الجسم وانقسامه. فمثلاً عندما تكون العضلات المثنية للذراع مفرطة التوتر تكون العضلات الباسطة للساق مفرطة التوتر.

**schwannitis (= schwannosis)** ضَخَامَةُ غُدِّ شِفَان.

**schwannoglioma (= schwannoma)** وَرَمٌ شِفَانِي. ورم يتصل من خلايا شِفَان للغدد النخاعية للعصبونات، وهو يشمل الورم الليفي العصبي وورم غمد الليف العصبي.

**schwannosis** ضَخَامَةُ شِفَانِيَّة. ضخامة غمد شِفَان.

**sciatic** إسْكِي؛ وَرْكِي. 1. متعلق بالورك 2. متعلق بالعصب الوركي أو يقع بالقرب منه أو بالقرب من الوريد الوركي.

**sciatica** النُّسَى؛ عِزْقُ النُّسَا. متلازمة تتصف بالآلم الذي ينتشر من الظهر إلى الالية وعلى طول الجهة الخلفية أو الوحشية للطرف السفلي وينتج غالباً عن انزلاق القرص بين الفقرتين، كما يستعمل المصطلح للدلالة على أي ألم يحدث على طول مجرى العصب الوركي.

**scintiscan (= scintigram)** تَفْرِيسَة ومضائية. تمثيل ثنائي الأبعاد لأشعة غاما تنبعث من نظير مشع يظهر مختلف تراكيزه في أحد أنسجة الجسم أو أعضائه كالدماع مثلاً أو الكلية أو الغدة الوردية.

**sclerosis** تَصَلُّب؛ صُلَاب. تصلب أو جسوء خاصة ذلك الذي يتولد عن الالتهاب وفي أمراض الأنسجة الخلالية ويستعمل بصورة خاصة في تصلبات الجهاز العصبي الناتجة عن فرط تنسج أنسجته الضامة أو تصلب أوعيته الدموية.

**- amyotrophic lateral s.** تَصَلُّبٌ وَخْشِي ضَمُورِي. مرض يتصف بتتكس شديد ومرتو للعصبونات التي تعطي الياف السبيل القشري النخاعي والخلايا الحركية لجذع الدماغ والنخاع الشوكي ويؤدي إلى عيوب في العصبونات الحركية العلوية والسفلية وعادة ما يؤدي إلى الموت خلال سنتين أو ثلاث.

**- annular s.** تَصَلُّبٌ خَلَقِي. تصلب في النخاع الشوكي يولد شريطاً حوله.

**- anterolateral s.** تَصَلُّبٌ أَمَامِي وَخْشِي. تصلب العمودين البطني والوحشي للنخاع الشوكي الذي يؤدي إلى شلل سفلي تشنجي.

**- arterial s. (= arteriocapillary s. = arteriosclerosis)** تَصَلُّبُ الشَّرَائِين.

**- arterioral s. (= arteriolosclerosis)** تصلب الشَّرَائِنَات.

**- combined s.** تَصَلُّبٌ مُشْتَرَك. تنكس مشترك دون الحاد للنخاع الشوكي.

**- diffuse s.** تَصَلُّبٌ مُنْتَشِر. نوع من التصلب يصيب مساحات كبيرة من الدماغ والنخاع الشوكي.

**- disseminated s. (= multiple s.)** تَصَلُّبٌ مُنْتَشِر؛ تصلب متعدد.

**- Erb's s. (= lateral spinal s.)** تَصَلُّبٌ نَخَاعِي جَانِبِي.

**- focal s. (= multiple s.)** تَصَلُّبٌ بُؤْرِي؛ تصلب متعدّد.

**- insular s. (= multiple s.)** تَصَلُّبٌ جُزْرِي؛ تصلب متعدّد.

**- lateral s.** تَصَلُّبٌ وَخْشِي. تنكس الأعمدة الوحشية للنخاع الشوكي ويمكن أن يكون إصابة أولية تولد شللاً سفلياً تشنجياً مع صمل عضلات الأطراف وزيادة المنعكسات الوترية من دون اضطرابات حسية أو تغذوية ويسمى ذلك أيضاً تصلب إيرب. كما من الممكن أن يكون هذا التصلب ثانوياً لالتهاب العضل الذي يولد شللاً سفلياً تشنجياً مع اضطرابات حسية واضطرابات أخرى ويسمى هذا أيضاً الشلل النخاعي التشنجي.

**- lobar s.** تَصَلُّبٌ قَصَبِي. وجود تلافيف ضيقة مصابة بالندبات في ساحة كبيرة من أحد فصوص سطح القشرة المخية، وغالباً ما تشاهد في الشلل المخي.

**- Marie's s. (= hereditary cerebellar ataxia)** رَنْحٌ مُخَيَخِي وَراثِي؛ تَصَلُّبٌ مَارِي.

**- multiple s.** تَصَلُّبٌ مُتَعَدِّد. مرض يتصف بوجود لطخات منزوعة النخاعين منتشرة في المادة البيضاء للجهاز العصبي المركزي وقد تنتشر أحياناً إلى مادته السنجابية أيضاً. وأما الأعراض النمطية لآفات المادة البيضاء فهي الضعف وعدم التناسق والمذل واختلالات النطق واضطرابات البصر وقد



يطول سير المرض مع النكسات والهدأت لفترة عدة سنوات.

- **posterior s. (= posterior spinal s. = tabes dorsalis)** التَّابِسُ الظَّهْرِيّ.

- **posterolateral s. (= subacute combined degeneration of spinal cord)** التَّصَلُّبُ الظَّهْرِيّ الْجَانِبِيّ. التنكس المشترك دون الحاد للنخاع الشوكي.

**scoliosis** جَنْفٌ. انحراف جانبي واضح للخط العمودي المستقيم للعمود الفقاري.



scoliosis

وضعة الانحناء الجانبي (الجنف) للجذع في حالة تدلي القرص الفقاري القطني لغرض التقليل من الألم.

- **myopathic s. (= paralytic s.)** جَنْفُ الاعتلال العضلي؛ جَنْفٌ شَلْلِيّ.

- **paralytic s.** جَنْفٌ شَلْلِيّ. انحناء جانبي للعمود الفقري بسبب شلل العضلات.

**scopolamine (= hyoscine)**

سَكُونُولَامِين. قلواني مضاد للفعل الكولينولي وله تأثير على الجهاز العصبي المركزي شبيه بتأثير الأتروبين.

**scopophilia (= 1.voyeurism**

2. exhibitionism) 1. شَبَقُ النظر

2. الاستعراضية؛ التَّلَذُّذُ الجِنْسِيُّ بالمراقبة.

1. التلذذ الجنسي بمشاهدة الأعضاء التناسلية للآخرين 2. الاستعراء والتلذذ بالتعري ومشاهدة الآخرين له عارياً.

**scopophobia** رُهابُ التَّعَرُّض. الخوف الشاذ من التعرض ومشاهدة الآخرين له عارياً.

**scotodinia** دَوَامٌ عُتْمِيّ. دَوَامٌ مع عتامة البصر والصداع

**scotoma** عُتْمَةٌ. (ج. عُتْمَات).

- **mental s.** عُتْمَةٌ نفسية. في علم النفس نقطة شكلية عمياء في الشعور النفسي العام للشخص وعدم معرفته لمشاكله العقلية والنفسية مع قلة البصيرة.

**scotophilia** الوَلُغُ بِاللَّيْلِ. حب الليل وتفضيله على النهار.

**scotophobia** رُهابُ الظَّلَام. الخوف الشديد من الظلام.

1. قطع 2. تَقْطِيعَةٌ. 1. عملية القطع لعضو ممتلئ أو فتح عضو أجوف 2. مقطع، مصطلح عام للدلالة على مقطع أو جزء ثانوي من العضو.

- **sectiones cerebelli** تَقَاطِيعُ المَخِيخ. الأقسام التشريحية الباطنة المختلفة للمخيخ.

- **sectiones corporum quadrigemnorum** تَقَاطِيعُ الجِسْمِ الرُّبَاعِيّ. الأقسام التشريحية للأجسام الرباعية.

- **sectiones hypothalami** تَقَاطِيعُ الوِطَاء. التقاسيم التشريحية الداخلية للوطاء.

- **sectiones medullae oblongatae** تَقَاطِيعُ البَصْلَةِ. تقاطيع النخاع المستطيل.

- sectiones medullae spinalis تَقَاطِيعُ النُّخَاعِ. تقاطيع النخاع الشوكي.
- sectiones mesencephali تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.
- sectiones pedunculi cerebri (= sectiones mesencephali) تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.
- sectiones pontis تَقَاطِيعُ الجِسْرِ.
- sectiones telencephali تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ الْإِنْتِهَائِيِّ.
- sectiones thalamencephali تَقَاطِيعُ الدِّمَاغِ الْمِهَادِيِّ.
- sectiones thalami et metathalami تَقَاطِيعُ الْمِهَادِ وَالْمِهَادِ التَّالِي.
- sedation تَهْدِئَةٌ: تَرْكِينٌ. عملية توليد حالة مَرَكَّةٌ أو عملية تهدئة وتسكين.
- sedative مُهْدِئٌ: مُرَكِّنٌ. 1. تهدئة الفعالية والإثارة. 2. عامل يهدئ الإثارة.
- cerebral s. مُهْدِئٌ دِمَاعِيٌّ: مُرَكِّنٌ دِمَاعِيٌّ. مهديء يؤثر بصورة رئيسية على الدماغ.
- general s. مُهْدِئٌ عَامٌّ: مُرَكِّنٌ دِمَاعِيٌّ. مهديء يهدئ كل الأعضاء والوظائف.
- nerve trunk s. مُهْدِئٌ الْجَذْعِ الْعَصْبِيِّ: مُرَكِّنٌ الْجَذْعِ الْعَصْبِيِّ. مهديء يعمل على جذع العصب.
- nervous s. مُهْدِئٌ عَصْبِيٌّ: مُرَكِّنٌ عَصْبِيٌّ. مهديء يعمل على الجهاز العصبي ومن خلاله وتنتمي لهذه المجموعة المركبات الدماغية والجذعية العصبية والنخاعية الشوكية.
- spinal s. مُهْدِئٌ نُخَاعِيٌّ: مُرَكِّنٌ نُخَاعِيٌّ. أي دواء يهدئ الفعالية الوظيفية السوية أو الشاذة للنخاع الشوكي.
- sedentary قَعِيدٌ: قَعْدَةٌ. 1. التعمُّد على الجلوس كعادة غير فعالة. 2. نسبة إلى وضعة القعود.
- segment قِطْعَةٌ: (ج: قِطَعٌ). شُدْفَةٌ. (ج: شُدَفٌ). جزء من جسم أو بنية كبيرة معزولة عنه طبيعياً أو اعتبارياً بحدود فاصلة.
- Interannular s. شُدْفَةٌ بَيْنَ الْحَلَقَتَيْنِ. جزء الليف العصبي بين عقدتي رانفيير متجاورتين.
- medullary s. شُدْفَةٌ مِيَالِينِيَّةٌ. قسم من

- الغمد المياليني للليف العصبي والذي يقع بين تلمتي لنترمان.
- neural s. (= neuromere) قُسَيْمٌ عَصْبِيٌّ.
- Ranvier's s.s. شُدْفٌ رَانْفِيَّيْهِ. جزء المادة الميالينية للليف العصبي الذي يقع بين عقد رانفيير.
- Schmidt- Lanterman s. (= medullary s.) شُدْفَةٌ مِيَالِينِيَّةٌ.
- s.s. of spinal cord (= segmenta medullae spinalis) شُدْفُ النُّخَاعِ الشوكِيِّ.
- segmentum (= segment) قِطْعَةٌ. (ج: قِطَعٌ). شُدْفَةٌ. (ج: شُدَفٌ).
- segmenta medullae spinalis قِطَعُ النُّخَاعِ. قطع النخاع الشوكي التي يتصل بكل منها زوج من الجذور الظهرية وزوج من الجذور البطنية من الأعصاب النخاعية الشوكية ويعطى النخاع الشوكي 33 زوجاً من الأعصاب النخاعية العنقية 1-8 والصدريّة 1-12 والظطنية 1-5 والعجزية 1-5 والعصصية 1-3.
- seizure نَوْبَةٌ. 1. هجمة مفاجئة للمرض أو عودته. 2. هجمة صرع.
- absence s. نَوْبَةٌ غِيَابٌ: نوبة صرعية غيبوبية. نوبة صرع تنصف بانقطاع وقتي لتيار التفكير والفعالية وتترافق مع فعالية وتدية موجية للمخطط الكهربائي للدماغ بمعدل 3.5 موجة في الثانية. وتسمى أيضاً الصرع الصغير.
- audlogenic s. نَوْبَةٌ سَمْعِيَّةٌ الْمُنْشَأُ. نوبة صرع تتولد عن التهييج الصوتي.
- cerebral s. نَوْبَةٌ دِمَاعِيَّةٌ. هجمة صرع.
- febrile s. نَوْبَةٌ حُمُوِيَّةٌ. اختلاجات تترافق مع ارتفاع عالٍ لدرجة حرارة الولدان والأطفال.
- jack knife s. (= Infantile massive spasm) تَشَنُّجُ الْمَوْسِ الْكَبَّاسِ: تَشَنُّجٌ طِفْلِيٌّ كُتْلَوِيٌّ. نوبات رمع عضلي شديد تظهر في الشهور الثمانية عشر الأولى للعمر تترافق مع تدهور دماغي عام وتنصف بتشنجات انثنائية شديدة في الراس والرقبة والجذع مع انبساط الذراعين والساقين.
- photogenic s. نَوْبَةٌ ضَوْئِيَّةٌ الْمُنْشَأُ. نوبة صرعية تبدأ بالتهيج الضوئي.
- psychomotor s. (= psychomotor epilepsy) نَوْبَةٌ نَفْسِيَّةٌ حَرَكَيَّةٌ. صرع نفسياني حركي.

صَرْعُ (= uncinat epilepsy) - uncinate s. الشخصية. شرع الفص الصدغي الذي تسببه آفة في المنطقة الشخصية ولذلك يترافق مع اهلاس ذوقية وشمية.

وَعْيُ الذَاتِ. 1. وعي self consciousness الفرد لهويته ولوجوده 2. المبالغة بالحس بالذات والحساسية المفرطة والإحراج للاستجابات السلبية المحتملة من الآخرين لمظهر الشخص أو لسلوكه.

self-suggestion (= autosuggestion) إِيحَاءُ ذَاتِي.

السَّرْجُ التُّرْكِي. حفرة مستعرضة sella turcica تعبر الخط الوسطي على السطح الظهري لجسم العظم الوددي والتي تحوي النخامية.

senescence شَيْخُوخة؛ تَشْيُخ.

senile شَيْخُوخِي. متعلق بالشيخوخة أو يتصف بها.

senilism شَيْخُوخة مبكرة. الشيخوخة المبكرة.

senility شَيْخُوخة. تقدم العمر والتردي الفكري والجسدي المترافق مع تقدم العمر.

senium هَرَم؛ شَيْخُوخة.

sensation حس؛ إَحْسَاس. (ج: إَحْسَاسَات) انطباع تنقله الأعصاب الواردة إلى الجهاز الحسي.

- articular s. إَحْسَاسٌ مَفْصَلِي. الإحساس الذي يتولد عن احتكاك سطوح المفاصل عند حركتها.

- cincture s. (= zonesthesia) حس التَمَنُّطُق.

- common s. الإحساس المشترك؛ الإحساس العام. الحس الشامل الذي يتولد عن تجمع مختلف إحساسات الجسم في وقت واحد.

- concomitant s. حس مُرَافِق. إحساس ثانوي يتولد من دون أي تنبيه خاص به ولكنه يرافق الإحساس الأولي.

- cutaneous s. (= dermal s.) حس جِلْدِي

- delayed s. إَحْسَاسٌ أَجَل. إحساس لا يدرك إلا بعد مرور بعض الوقت بعد التنبيه.

- dermal s. حس جِلْدِي. إحساس يتولد عن تنبيه مستقبلات موجودة في الجلد.

- epigastric s. حس شُرْشُوفِي. إحساس غريب

ضعيف مقلق في المعدة وهو حس حشوي غير معروف السبب.

- external s. حس خَارِجِي. التأثير الذي تولده الأشياء والحوادث الخارجية على العقل والذي ينتقل إليه عن طريق الحواس.

- general s. حس عام. إحساس يحس في سائر أنحاء الجسم.

- girdle s. (= zonesthesia) حس التَمَنُّطُق.

- gnostic s's. الإحساسات الإدراكية. أحاسيس تنتقل عن طريق الحواس الأحداث تطوراً كحس اللمس الرقيق والتحسس الدقيق للعضلات والمفاصل واهتزاز الأوتار، وتسمى أيضاً الأحاسيس الجديدة.

- internal s. حس دَاخِلِي. إحساس يدركه الشخص نفسه ولا يتعلق بأي موضوع من خارج الجسم.

- joint s. (= articular s.) حس مَفْصَلِي.

- light s. حس ضَوْئِي. أحاسيس تتولد عند ورود موجات إشعاعية ذات أطوال 400-760 ملي ميكرون تدخل العين السليمة.

- negative s. حس سَلْبِي. الحالة التي تتولد عندما يكون المنبه دون الحد العتبي.

- new s's. (= gnostic s's) الأحاسيس الجديدة؛ أحاسيس إدراكية.

- objective s. (= external s.) حس خَارِجِي.

- palmethetic s. (= pallesthesia) حس الإِهْتِزَاز.

- primary s. الحس الأولي. الإحساس الذي يتولد كنتيجة مباشرة لإدراك المنبه.

- referred s. حس رَجِيع. إحساس يحس في منطقة غير النقطة المنبهة وأحياناً بعيدة عنها كثيراً وهو حس محوّل.

- reflex s. (= referred s.) حس انْعِكَاسِي.

- skin s. (= dermal s.) حس جِلْدِي.

- strain s. حس الشَّد. إحساس الشدة أو إحساس بالشد.

- subjective s. (= internal s.) حس شَخْصِي. إحساس داخلي.

- transferred s. (= referred s.) حس رَجِيع.

- **vascular s.** جَسَنٌ وَعَائِي. إحساس بحس به عند تغيير التوتر الوعائي مثل حمرة الخجل.

- **s. of warmth** جَسَنُ الدَّفْءِ. الإحساس المريح الذي يحسه الشخص عندما لا يكون الجو بارداً جداً ولا حاراً جداً وهو الإحساس الذي يحس عند توجيه حرارة معتدلة للجسم بالتوصيل أو بالأشعاع.

**sense** حَاسَّةٌ. (ج: وَاس). مَلَكَةٌ يدرك بها الإنسان حالات وخواص الأجسام المحسوسة. فالجوع والعطش والألم والفتور هي أنواع من الحواس، كما يتمكن الإنسان من الحس بالتوازن والشم وحواس أخرى يمكن تمييزها.

- **chemical s.** حَاسَّةٌ كِيمِيائيةٌ. حس عام يولد استجابات اجتنابية في المخلوقات المائية وللمهيجات المختلفة في الإنسان كالبيصل والثوم والامونيا والغازات السامة.

- **color s.** حَاسَّةُ الْأَلْوَانِ. الملكة التي يتمكن بها الإنسان من إدراك الألوان المختلفة والتمييز بينها.

- **equilibrium s. (= static s.)** حَاسَّةُ التَّوَازُنِ.

- **form s.** حَاسَّةُ الشَّكْلِ. مقدرة العين على التعرف على أن الأجسام مجسمة.

- **Internal s.** حَاسَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ. أي من الأحاسيس التي تنبأ عادة من داخل الجسم.

- **kinesthetic s. (= muscle s.)** حَاسَّةٌ عَظْلِيَّةٌ.

- **labyrinthine s. (= static s.)** الحَاسَّةُ التَّيْهِيَّةُ؛ جَسَنُ الثَّبَاتِ.

- **muscle s. (= muscular s.)** الحَاسَّةُ العَظْلِيَّةُ. الملكة التي يحس بها الإنسان حركة عضلاته.

- **pain s.** حَاسَّةُ الْأَلَمِ. الحس الذي يدرك به الإنسان الألم.

- **posture s.** حَاسَّةُ الوَضْعَةِ. نوع من الحس العضلي الذي ندرك بواسطته موضع أو وضعة الجسم أو أقسامه.

- **pressure s.** حَاسَّةُ الضَّغْطِ. الملكة التي يحس بها الشخص الضغط الموضع على سطح جسمه.

- **proprioceptive s.** حَاسَّةُ الإدراك المخصوص.

- **seventh sense (= visceral s.)** الحَاسَّةُ السَّابِعَةُ. الحس الحشوي.

- **sixth sense (= cenesthesia)** الحَاسَّةُ

السَّابِيسَةُ. الحس المشترك وهو الحس العام بالوعي بالجسم كله.

- **space s.** حَاسَّةٌ فِضَائِيَّةٌ. مجموعة من الحواس (خاصة حاستي البصر واللمس) التي توفر المعلومات عن المواضع النسبية للأجسام وعلاقاتها في الفضاء.

- **special s.** حَاسَّةٌ خَاصَّةٌ. أي من الحواس الخمس البصر والسمع والشم والذوق والتوازن.

- **static s. (= equilibrium s.)** حَاسَّةُ التَّوَازُنِ؛ حَاسَّةُ الثَّبَاتِ. الحس الذي يمكن الإنسان من المحافظة على وضعه القائم.

- **stereognostic s.** حَاسَّةٌ مَعْرِفَةُ الأشْكَالِ. الحس الذي ندرك به الشكل والصلابة.

- **temperature s.** حَاسَّةُ الحَرَارَةِ. الحس الذي يتمكن فيه الشخص من معرفة الفروق بين درجات الحرارة.

- **time s.** حَاسَّةُ الوَقْتِ. المقدرة على معرفة الفترات والفواصل الزمنية خصوصاً في الموسيقى والأصوات.

- **tone s.** حَاسَّةُ النَغَمِ. المقدرة على التفريق بين الأنغام.

- **visceral s. (= splanchnesthesia)** حَاسَّةٌ حَشَوِيَّةٌ. الأحاسيس الداخلية والشخصية التي تتولد من الأحشاء، وهي تشكل أحاسيس الألم والضغط والامتلاء وحركة الأحشاء.

**sensibility** الحَسَاسِيَّةُ؛ جَسَنٌ؛ التَحَسُّسُ. المقدرة على الحس أو الشعور أو الإدراك.


- **bone s. (= pallesthesia)** الإحساس العظمي؛ تحسُّس الإِهْتِزَازِ.

**common s. (= cenesthesia)** الإحساس العام؛ الإحساس المُشْتَرَكِ.

- **cortical s.** الإحساس القشري. التحسس الذي تتحكم به قشرة الدماغ والذي يعنى بمعرفة الانطباعات الحسية وتمييزها.

- **deep s.** الإحساس العميق. التحسس للضغط والحركات حتى بعد تخدير سطح الجسم تخديراً كاملاً.

- **electromuscular s.** الإحساس الكهربي. حس العضلات للتنبيه الكهربائي.



sense, special

العين إحدى الحواس الخاصة: (1) وتر العضلة المستقيمة الوحشية (2) الجزء الهدبي من الشبكية (3) الجسم الهدبي والعضلة الهدبية (4) جنب الصلبة الوريدي (قناة شليم) (5) الرباط المعلق للعدسة (6) القزحية (7) العدسة (8) القرنية (9) الغرفة الأمامية (10) الغرفة الخلفية (11) زاوية الغرفة الأمامية (12) الملتحمة (13) الحاشية المشرشرة (14) وتر العضلة المستقيمة الإنسية (15) الجسم الزجاجي (16) القناة الزجاجانية (17) الصفيحة المصفوية للصلبة (18) العصب البصري (19) الشريان والوريد المركزيان للشبكية (20) الحيز بين الغمدين (21) غمد العصب البصري (22) النقرة المركزية (23) لفافة المقلة (محفظة ثنون) (24) الصلبة (25) الحيز فوق المشيمية (26) المشيمية (27) القسم البصري من الشبكية.

- **epicritic s.** الإحساس بالتمييز العميق. التحسس للتنبية الرقيق والذي يوفر الوسيلة للتمييز الدقيق لحسي الحرارة واللمس وهو حس يوجد في الجلد فقط.

- **joint s. (= arthresthesia)** الإحساس بالمفاصل.  
- **mesoblastic s. (= deep s.)** الإحساس العميق.  
- **pallesthetic s. (= palmesthetic s. = pallesthesia)** الإحساس بالإهترزاز.

- **proprioceptive s.** إحساس الإدراك المخصوص. الحس المهمل كثيراً وغير الواعي الذي يوفر لنا المعلومات عن وضع وحالة العضلات والمفاصل والأطراف وأقسام الجسم الأخرى.

- **protopathic s.** الإحساس البدائي. التحسس لتنبيهات الألم والحرارة الضعيف وغير دقيق التوضيح ويوجد مثل هذا الحس في الجلد والأحشاء ويعمل كعامل دفاعي ضد التغييرات المرضية في الأنسجة.

- **recurrent s.** إحساس راجع. حس في القسم الرأسي من جذر العصب عند تنبيه قسمه الطرفي المقطوع.

- **somesthetic s. (= proprioceptive s.)** إحساس الإدراك المخصوص: الإحساس العميق.

- **splanchnesthetic s.** إحساس حشوي. الوعي أو التحسس الذي يعتمد على المستقبلات الحشوية.

- **vibratory s. (= pallesthesia)** الإحساس بالإهترزاز.

**sensibilization** تحسيس. 1. عملية زيادة التحسس. 2. تحسيس.

**sensible** 1. حساس. 2. محسوس. 1. قادر على الحس. 2. محسوس بالحواس.

**sensiferous** ناقل للحس. ما يولد النبضات الحسية.

**sensigenous** مؤلّد الحس. ما يولد النبضات الحسية.

**sensimeter** مقياس الحس. جهاز لقياس درجات الإحساس في باحات الجسم المخدرة أو مفرطة الحس.

**sensitive** حساس. قادر على استلام المنبهات والاستجابة لها. وعادة ما يستعمل الدلالة على فرط الحساسية الشاذ للمنبهات أو الاستجابة لها بسرعة حادة.

**sensitivity** حساسية. حالة أو صفة التحسس وتستعمل عادة للدلالة على الاستجابة الشاذة للمنبهات أو الاستجابة لها بسرعة حادة.

- **proportional s.** الحساسية النسبية. العلامة الجبرية بين شدة الاستجابة وشدة المنبه المولد لها.

**sensorimobility** حركية حسية. قدرة الإنسان أو الحيوان على الحركة استجابة للمنبهات الحسية.

**sensoriglandular** غدية حسية. توليد فعالية غدية نتيجة تنبيه العصب الحسي.

**sensorimetabolism** إستقلاب حسّي. توليد فعالية استقلابية نتيجة تنبيه العصب الحسي.

**sensorimotor** حسّي حركي. حسي وحركي في ذات الوقت.

**sensorimascular** عضلي حسّي. ما يولد فعلاً منعكسياً عضلياً استجابة لتنبيه حسي.

**sensorineural** عصبي حسّي. ما يتعلق بعصب حسي.

**sensorium** مركز حسّي؛ محسّن. (ج: محاسن). 1. مركز عصبي حسي 2. مركز الإحساس الذي يوجد في الدماغ.

**sensorivascular** حسّي وعائي. ما يولد تغييرات وعائية عند تنبيه الأعصاب الحسية.

**sensory** حسّي. متعلق بالحس.

**septum** حاجز. (ج: حواجز). جدار فاصل أو حاجز وعند استعماله بمفرده يدل أحياناً على الحاجز الشفاف أو باحة الحاجز.

- **s. cervicale Intermedium** الحاجز الرقبّي المتوسط. حاجز الدبق والام الجافية الذي يغور إلى الثلم الظهري المتوسط للحبل الظهري للقسمين الرقبّي والقطني العلوي للنخاع الشوكي وهو يفصل الحزمتين الدقيقة والاسفينية عن بعضهما.

الحَاجِزُ  
الشَّافِاف. - s. lucidum (= s. pellucidum)

الحَاجِزُ  
الشَّافِاف. - pellucid s. (= s. pellucidum)

الحَاجِزُ الشَّافِاف. حاجز شثائي - s. pellucidum  
الغشاء ومثلث الشكل يفصل القرنين الاماميين  
للبطنيين الجانبيين للدماغ ويقع في المستوى الناصف  
ويحده الجسم الثثني وجسم القبو وأعمدته.

الحاجز الجسري: - s. pontis (= raphe pontis)  
رَفَاءُ الجِسْرِ.

الحَاجِزُ أَمَامَ الصُّوَار. - s. precommissurale  
حاجز يقع أمام الصوار الامامي للمخ ويناسب جزئياً  
التلفيف المجاور للانتهائي الذي يتكون من المجموعات  
النورية الظهرية والبطنية والوحشية والذنبية.

الحَاجِزُ تَحْتَ العَنَكَبُوتِيَّة. - subarachnoidal s.  
غمد ليفي ناقص يقع في المستوى الناصف ويربط  
العنكبوتية بالحنون على طول التلم الناصف الخلفي  
للاقسام العنقية والصدريّة العلوية للنخاع الشوكي.

الحَاجِزُ - s. verum (= s. precommissurale)  
أَمَامَ الصُّوَار.

سِيرُوتُونِين. مادة تتولد في  
العديد من العصبونات المركزية والمحيطية وتوجد  
بتركيز عالٍ في العديد من أنسجة الجسم وهي مادة  
مضيقّة للأوعية ومثبّطة للإفراز المعدي ومنبهة  
للعضلات الملساء وتعمل كناقلة عصبية مركزية  
وهي سلف مادة الميلاتونين.

سِيرُوتُونِينِي الفِعل. serotoninergic  
1. ما يحوي أو ما ينشط بالسيروتونين كعصبونات  
نواة الرفاء في جذع الدماغ 2. منسوب إلى  
العصبونات التي تفرز السيروتونين والتي بدورها  
تحفز تحرير هرمونات النخامي.

1. نَزْعَة. 2. طَاقَم; مجموعة. 1. استعداد set  
للاستجابة بطريقة مسبقة التنظيم أو التصميم إذ  
يكون الكائن مهياً للاستجابة بأسلوب معين عند  
استلامه إشارة خاصة لهذه العملية من محيطه 2.  
مجموعة متناسقة ومتكاملة.

نَزْعَة. الاستعداد للاستجابة - mental s.

بطريقة معينة نتيجة تعليمات سبق استلامها أو توقعات  
الشخص نتيجة خبراته السابقة.

1. الجِنْسَانِيَّة. 2. اشتهاة الجنس. sexuality  
1. الصفة المميزة الخاصة للذكورة أو الأنوثة.  
2. ميلان الشخص للعلاقات والفعاليات الجنسية.

غَمْد. (ج: أَعْمَاد). بنية sheath  
أنبوبية تغلف أو تحيط بأحد الأعضاء أو جزء منه.

الغَمْدُ العَنَكَبُوتِي. الغشاء - arachnoid s.  
الرقيق بين الغمدين الحنون والجافي اللذين يحيطان  
بالعصب البصري.

غَمْدُ الجَافِيَّة. الغلاف الخارجي للعصب - dural s.  
البصري فوق الغمد العنكبوتي.

الغَمْدُ - medullary s. (= myelin s.)  
النَّخَاعِيْنِي.

الغَمْدُ العِيَالِيْنِي. الغمد الذي يحيط - myelin s.  
بمحوار الخلايا العصبية المغمدة والمكون من طبقات  
متراكمة من الميلين ويكون في الياف الجهاز العصبي  
المحيطي الغشاء البلازمي لخلايا شفان وتكون في  
الجهاز العصبي المركزي الخلايا الدبقية القليلة  
التغصن ويتقطع على مسافات على طول المحاور  
بهوات تسمى عقد رانفير وهو غلاف عازل كهربائي  
للاعصاب ويزيد من سرعة انتقال النبضات خلالها.

غَمْدُ شَفَان: - s. of Schwann (= neurilemma)  
غمد الليف العصبي.

قُشَعْرِيْرَة; رَغْدَة. ارتعاش بسيط مثل shiver  
الذي يحدث عند التعرض للبرد.

صَدْمَة. (ج: صَدَمَات). 1. فقدان التوازن shock  
العقلي المفاجيء 2. حالة تتولد عن اضطرابات  
دموية ديناميكية واستقلابية وتتصف بعجز جهاز  
الدوران من إدامة تجهيز الأعضاء الحيوية من  
الجسم بالدم وتتصف بالتوهان العقلي.

صَدْمَة التَّخْدِير. حالة شبيهة - anesthesia s.  
بالصدمة تنتج عن فرط جرعة المخدر.

صَدْمَة عَصْبِيَّة العَنَشَا. صدمة - neurogenic s.  
تنشأ عن توسع وعائي عصبي المنشأ والتي يمكن أن  
تتولد عن رضع أو نزف دماغي أو إصابة النخاع  
الشوكي أو تخدير نخاعي أو عام عميق أو خمود  
الجهاز العصبي المركزي.

- **spinal s.** صَدْمَةٌ نُخَاعِيَّةٌ. فقدان المنعكسات النخاعية الشوكية بعد رضخ النخاع الشوكي والذي يؤثر على العضلات التي تغذيها شُدْفَه تحت مستوى الإصابة.

**sickness** دَاءٌ؛ مَرَضٌ؛ سَقَامٌ. حالة أو عارضة انحراف عن الحالة الصحية السوية.

- **aerial s. (= air s.)** دَاءُ الطَيْرَانِ. داء يتولد عن تغير الضغط المحيط بالجسم وعن الحركات التي تؤثر على الشخص في الطائرة ويتصف بالغثيان والإعجاب والتعرق البارد.

- **aviation s. (= air s.)** دَاءُ الطَيْرَانِ.

- **falling s. (= epilepsy)** داء السَّقُوطِ؛ الصَّرْعُ.

- **talking s.** داء هذري؛ دَاءُ الْفَرْتَرَةِ. التهاب الدماغ الوبائي الذي يتصف بالتهيج الشديد والنفضان العضلي وكثرة الكلام.

**sign** عَلَامَةٌ. دلالة على وجود شيء ما أو دليل موضوعي واضح عن المرض يمكن أن يجدها الطبيب الفاحص بالنظر أو الفحص المباشر، وهي غير الأعراض التي يشعر بها المريض.

- **Abadie's s.** عَلَامَةُ أَبَايَ. 1. عدم حس وتر العرقوب للضغط ويشاهد في التابس الظهري 2. تشنج رافعة الجفن العلوي كعلامة لداء غريفز.

- **Babinski's s's.** عَلَامَاتُ بَابِنْسْكِ. 1. فقدان أو ضعف منعكس العرقوب في عرق النسا وهذه علامة تفرقه عن عرق النسا الهستيري 2. منعكس بابنسكي 3. تقلص العضلة الجذبية العنقية في الشلل النصفي (الفالج) ويكون ذلك أكثر شدة في الجهة السليمة منه في الجهة المشلولة كما يشاهد ذلك عند الصغير أو النفخ أو ما شاكل. 4. يطلب من المريض الاستلقاء على الأرض مع ذراعيه متصالبتين على صدره ويتم محاول أن يجلس من تلك الوضعة فيبثني الفخذ في الجهة المشلولة على الورك ويرتفع العقب عن الأرض أما في الجهة السليمة فلا يتحرك الطرف وتعود هذه الظاهرة عندما يعاود المريض وضع الاستلقاء ويشاهد ذلك في الفالج العضوي ولا يشاهد في الفالج الهستيري 5. عند وضع الساعد المشلول في وضع البسط يدور إلى وضع الكعب ويشاهد ذلك في الشلل العضوي ويسمى ذلك علامة الكَبِّ.

- **Babinski's toe s. (= Babinski's reflex)** عَلَامَةُ إصبع القدم البابِنْسْكِ؛ مُنْعَكْسُ بَابِنْسْكِ.

- **Barre's pyramidal s.** عَلَامَةُ بَارِيَه الهرميّة. يستلقي المريض ووجهه للأسفل وتثنى الساقان عند الركبتين فلا يتمكن أن يحافظ عليها في هذا الوضع إذا كان مصاباً بداء السبيل الهرمي.

- **Bekhterev's s.** عَلَامَةُ بَخْتِيرِيَف. 1. خدر في الحيز المابضي في التابس الظهري 2 منعكس بختيريف.

- **Biernacki's s.** عَلَامَةُ بِيَرْنَاكِ. خدر في العصب الزندي في الخزل العام والتابس الظهري.

- **Binda's s.** عَلَامَةُ بِنْدَا. حركة المنكب المفاجيء عند تحريك الرأس بصورة لا فاعلة نحو الجهة الأخرى وهي علامة مبكرة لالتهاب السحايا السلي.

- **Bonnet's s.** عَلَامَةُ بُونِيَه. ألم عند تقريب الفخذ وهي علامة عرق النسا.

- **Bragard's s.** عَلَامَةُ بَرَاغَارْد. مع بسط الساق ووضعها بوضع التيبس يثنى الطرف السفلي عند الورك إلى أن يشعر المريض بالألم ثم يثنى القدم نحو الظهر فتدل زيادة الألم عند ذاك على وجود مرض في الجذور العصبية.

- **Brudzinski's s.** عَلَامَةُ بَرُودِيْنْسْكِ. 1. يؤدي ثني الرقبة في التهاب السحايا إلى ثني الورك والركبة 2. عند ثني أحد الأطراف السفلية بصورة لفاعلة في التهاب السحايا تشاهد حركة مشابهة في الطرف المقابل.

- **cardinal s's.** الْعَلَامَاتُ الرَّئِيسِيَّةُ. علامات التهاب الرئيسية وهي الألم والاحمرار والحرارة والورم وقصور الوظيفة.

- **Charcot's s.** عَلَامَةُ شَارْكُوت. 1. ارتفاع الحاجب في الشلل المحيطي للعصب الوجهي وانخفاضه في التقصص الوجهي 2. العرج المتقطع في تصلب شرايين الساق والقدم.

- **Chvostek's s.** عَلَامَةُ شَفُوسْتِك. تشنج عضلات الوجه عند نقر العصب الوجهي في منطقة الغدة النكفية ويشاهد ذلك في التكرز.

- **Claude's hyperkinesis s.** عَلَامَةُ كَلَاوُد



- مُفَرِّطَةُ الحَرَكَاتِ.** الحركات الانعكاسية للعضلات الخزلاء التي تظهر عند التنبيه بالمنبهات المؤلمة.
- Erb's s.** **عَلَامَةُ إِرْب.** 1. زيادة الاستثارية الكهربائية للأعصاب الحركية في التكرز 2. الأصعية عند الطرق على قبضة القص في داء ضخامة النهايات.
- Escherich's s.** **عَلَامَةُ إِيْشِيرِيْش.** يؤدي طرق السطح الداخلي للشفاه أو اللسان في التكرز إلى تقلصهما وتقلص العضلة الماضغة.
- facial s. (= Chvostek's s.)** **العَلَامَةُ الوَجْهِيَّة.**
- Fajersztajn's crossed sciatic s.** **عَلَامَةُ فَيْرْسْتَيْنِ للوَرِكِي المُنْصَالِب.** من الممكن في عرق النسا ثني الورك عند ثني الساق ولكن لا يمكن ذلك عند تمديد الساق كما يؤدي ثني الفخذ عند تمديد الساق في الطرف السليم إلى زيادة ألم عرق النسا في الجهة المصابة.
- fan s.** **عَلَامَةُ المِرْوَحَة.** انفراج أصابع القدم وتباعدها عند ضرب أخمص القدم وهو جزء من منعكس بابنسكي.
- Frankel's s.** **عَلَامَةُ فَرَانْكِيل.** زيادة مدى وسعة حركات مفصل الورك اللافاعلة تدل على نقص توتر العضلات المحيطة به في التابس الظهري.
- Froment's paper s.** **عَلَامَةُ فَرُومَة الوَرَقِيَّة.** انثناء السلامى القصوي للإبهام عند مسك صفحة ورقية بين الإبهام والسبابة ويشاهد ذلك في إصابات عصب الزند.
- Guillard's s.** **عَلَامَةُ غِيلَان.** انثناء حاد للورك والركبة عند قرص العضلة رباعية الرؤوس على الجهة المقابلة وهي علامة على التهيج السحائي.
- Hahn's s** **عَلَامَةُ هَان.** دوران الرأس المستمر من طرف لآخر في المرض المخيخي عند الأطفال.
- Helbing's s.** **عَلَامَةُ هِلْبِنْغ.** تقوس العرقوب للاتجاه الإنسي عند مشاهدته من الخلف وذلك في حالة القدم الرحاء.
- Hirschberg's s. (= adductor reflex of foot)** **عَلَامَةُ هِيرْشْبِرْغ؛ المنعكس التقاربي للقدم.** تقارب وانعكاس وانثناء أخمصي جزئي للقدم عند تنبيه حافتها الداخلية (من دون الأخمص) من إبهام القدم حتى العقب، ويسمى أيضاً المنعكس التقاربي للقدم.
- Hoffmann's s.** **عَلَامَةُ هُوفْمَان.** 1. زيادة الاستثارية الآلية للأعصاب الحسية في التكرز وعادة ما يفحص العصب الزندي لذلك 2. يؤدي القرص المفاجيء لأظافر السبابة والوسطى والبنصر إلى انثناء السلامية الانتهازية للإبهام والسلاميتين الثانية والثالثة لأحد الأصابع الأخرى.
- Holmes's s. (= rebound phenomenon)** **عَلَامَةُ هُولْمَنْ.** ظاهرة الارتداد.
- Hoover's s.** **عَلَامَةُ هُوْفَر.** في الحالة الطبيعية أو في الشلل الحقيقي إذا طلب من المريض المستلقي أن يضغط بإحدى ساقيه على السرير تشاهد حركة رفع الساق الثانية ولا تشاهد هذه الظاهرة في الهستيريا أو عند المتمارضين.
- Hoyne's s.** **عَلَامَةُ هُوَيْن.** علامة تظهر في التهاب سنجابية النخاع الشللي أو اللاشللي فعندما يكون المريض في وضع الاستلقاء يسقط رأسه إلى الخلف عند رفع منكبیه.
- Huntington's s.** **عَلَامَةُ هُنْتِنْغْتُون.** 1. يوضع المريض بوضع الاستلقاء مع تدلي ساقيه على حافة المنضدة ويطلب منه السعال فإذا أدى ذلك إلى ثني الفخذ وانبساط ساق الطرف المشلول فإن ذلك يدل على أن الشلل ناتج عن آفة العصبون الحركي العلوي.
- Kashida's s.** **عَلَامَةُ كَشِيدَا.** تشنج العضلات وفرط الحس للذنان يتولدان عند التنبيه بالحرارة أو البرودة في حالة التكرز.
- Kernig's s.** **عَلَامَةُ كَرْنِيْغ.** يتمكن المريض في وضع الاستلقاء من بسط ساقه كاملاً بكل سهولة أما عند الجلوس أو الاستلقاء مع ثني الفخذ على البطن فلا يمكنه بسط ساقه بصورة كاملة وهذه علامة التهاب السحايا.
- Kerr's s.** **عَلَامَةُ كِر.** تغير بنيات الجلد تحت المستوى الجسدي في آفات النخاع الشوكي.
- Kleist's s.** **عَلَامَةُ كَلَايسْت.** تنثني أصابع المريض عندما يرفعها الفاحص برفق بأصابعه نحو أصابع الفاحص مما يدل على الإصابات الجبهية والمهادية.
- Klippel-Feil s.** **عَلَامَةُ كَلِيْبِل فَايْل.** ثني وتقريب إبهام المريض عند بسط أصابعه المثنية بسرعة بواسطة الفاحص وهي علامة تدل على مرض السبيل الهرمي.

- Lasague's s.** عَلَامَةُ لَازِيك. ثني الورك في عرق النسا يؤلم كثيراً عندما تكون الركبة منبسطة ولكنه لا يؤلم عندما تكون الركبة منثنية وبهذا يفرق هذا المرض عن اضطرابات مفصل الورك.
- Leichtenstern's s.** عَلَامَةُ لَيْشْتَنْشْتَرْن. يؤدي قرع أي عظم بصورة خفيفة في التهاب السحايا الدماغية النخاعية إلى أن يجفل المريض بصورة مفاجئة.
- Leri's s.** عَلَامَةُ لُري. لا يؤدي ثني اليد والرسغ في الجهة المصابة بالفالج (الشلل النصفي) إلى الانثناء الطبيعي في الساعد.
- Lhermitte's s.** علامة لِهرْمِيْت. ظهور صدمات قجائية عابرة كهربائية النوع تنتشر إلى كل الجسم عند ثني المريض رأسه للأمام ويشاهد ذلك خاصة في التصلب المتعدد وكذلك في انضغاط النخاع الرقبي واضطراباته الأخرى.
- Lichtheim's s.** عَلَامَةُ لَيْشْتَم. بالرغم من عدم تمكن المريض من الكلام في الحبسة تحت القشرية لكنه يتمكن من الإشارة بأصابعه إلى عدد المقاطع في الكلمة التي يفكر فيها.
- Linder's s.** عَلَامَةُ لِندَر. يؤدي ثني الرأس للأفعل في المريض المستلقي أو الجالس مع امتداد ساقيه إلى ألم فيهما أو في المنطقة القطنية وذلك في عرق النسا.
- Macewen's s.** عَلَامَةُ مَكيُون. يصدر نغم رنيني أشد مما يتولد في الحالة الطبيعية عند قرع منطقة الخحف خلف اتصال العظام الجبهية والصغوية والجدارية في حالة موه الرأس الباطن وخراج الدماغ.
- Marie-Foix s.** علامة ماري - فُوا. سحب الساق السفلية عند الضغط المستعرض للرصغ أو الثني المشدد لأصابع القدم حتى عندما لا تتمكن الساق من الحركة الإرادية.
- Mayo's s.** عَلَامَةُ مَأيُو. ارتخاء عضلات الفك السفلي الذي يدل على الخدر الشديد.
- Minor's s.** عَلَامَةُ مَينُور. طريقة قيام الشخص المصاب بعرق النسا من وضع الجلوس فهو يسند نفسه على الجهة السليمة ثم يضع إحدى يديه على ظهره ويثني الساق المصابة ويوازن نفسه على الساق السليمة.
- Morquilo's s.** علامة موركووا. مقاومة المريض
- المستلقي كل محاولات رفع جذعه لوضع الجلوس إلى أن تثني ساقاه بصورة لا فاعلة ويشاهد ذلك في التهاب سنجابية النخاع الوبائي.
- Myerson's s.** عَلَامَةُ مَأيَرْسون. تشنج الأضفار عند طرق العضلة الجبهية علامة داء باركنسون.
- Negro's s. (= cogwheel phenomenon)** عَلَامَةُ نِيغَرُو. ظاهرة الدولاب المسنن.
- Nerl's s.** عَلَامَةُ نِيرِي. 1. إحدى علامات الفالج العضوي وتتكون من انثناء ركبة الطرف المصاب تلقائياً عند رفع الساق بطريقة لفاعلة وذلك عندما يكون المريض مستلقياً على ظهره 2. يولد انثناء الجذع إلى الامام عندما يكون الشخص واقفاً انثناء ركبة الجهة المصابة في الإصابات القطنية العجزية والوركية العجزية.
- objective s. (= physical s.)** مَوْضُوعِيَّة. علامة يمكن سماعها أو حسها من قبل الطبيب.
- Oppenheim's s.** عَلَامَةُ أوبِنْهَإيم. انثناء إبهام القدم للجهة الظهرية عند طرق الجهة الإنسية للظنوب للأسفل والذي يشاهد في مرض السبيل الهرمي.
- orbicularis s.** عَلَامَةُ الدَّوِيرِيَّة. لا يمكن غلق العين على الجهة المشلولة في الفالج (الشلل النصفي) من دون غلق العين الثانية.
- Parrot's s.** عَلَامَةُ بَارُو. توسع الحدقة عند قرص جلد الرقبة في التهاب السحايا.
- peroneal s.** عَلَامَةُ الشَّطْلُوي. انثناء ظهري وتقريب القدم كعلامة للتكزز الكامن وتظهر عند نقر العصب الشظوي تحت رأس الشظية مباشرة عندما تكون الركبة مرتخية ومنثنية قليلاً.
- physical s. (= objective s.)** مَوْضُوعِيَّة.
- Plotrowski's s.** عَلَامَةُ بِلوتروفسكي. يؤدي قرع العضلة الظنبوبية الأمامية إلى ثني القدم ظهرياً وبسطها وعندما يكون هذا المنعكس مفرطاً فإنه يدل على وجود مرض عضوي للجهاز العصبي المركزي.
- Pitre's s.** عَلَامَةُ بِيْتَرْن. فرط حساسية الصفن والخصيتين في التابس الظهري.
- Prevost's s.** عَلَامَةُ بْرِيفوست. الانحراف المتقارن للعينين والرأس في الفالج بحيث تنظر العين إلى جهة

- نصف كرة المخ المصاب وبعيداً عن جهة الاطراف المشلولة.
- **pronation s. (= Babinski's s.)** علامة بابينسكي.
- **pseudo-Babinski's s.** علامة بابينسكي الكاذبة. تحوير منعكس بابينسكي في التهاب سنجابية النخاع بحيث ينسبط إبهام القدم فقط بسبب شلل كل عضلات القدم ما عدا العضلات المثنية الظهرية لإبهام القدم.
- **Queckenstedt's s.** علامة كوكسنستيت. عند الضغط على أوردة الرقبة على الجهتين أو على جهة واحدة يرتفع ضغط السائل الدماغي النخاعي عند الأشخاص الأصحاء ولكنه سرعان ما يزول عند رفع الضغط عنها، أما عند وجود انسداد في القناة الشوكية فلا يتأثر ضغط السائل الدماغي النخاعي بهذه العملية أبداً.
- **Raimiste's s.** علامة ريميسنت. يرفع الفاحص يد المريض وساعده عالياً فإذا كانت اليد سليمة تبقى مرفوعة عندما يتركها الفاحص وإذا ما كانت مشلولة فإنها تنثني مباشرة عند المعصم.
- **Revilliod's s. (= orbicularis s.)** علامة الدويرية. علامة ريفيلود.
- **Romberg's s.** علامة رومبرغ. تمايل الجسم أو سقوطه عند الوقوف مع ضم القدمين وغلق العينين في التابيس الظهري.
- **rope s.** علامة الحبل. تكوين الزاوية الحادة بين الذقن والحجرة بسبب ضعف العضلات اللامية ويشاهد ذلك في التهاب سنجابية البصلة.
- **Rosenbach's s.** علامة روزنباخ. غياب المنعكس البطني الجلدي عند قرص جلد البطن على الجهة المشلولة في الفالج.
- **Roser's s. (= Roser-Braun s.)** علامة رُوزر. غياب نبضات الجافية كعلامة لورم الدماغ أو لخراجه.
- **Saenger's s.** علامة سينغر. عودة منعكس الضوء الحدقي المتوقف بعد البقاء لفترة قصيرة في الظلام ويشاهد ذلك في أفرنجي الدماغ ولكنه لا يحدث في التابيس الظهري.
- **Sarbo's s.** علامة سارو. شلل العصب الشظوي الذي يلاحظ أحياناً في التابيس الظهري.
- **Saunders's s.** علامة سوندر. يترافق فتح الفم كثيراً في الأطفال مع حركات اليد التي تتكون من فتح اليد وبسطها وانفراج أصابعها.
- **Schlesinger's s.** علامة شليسinger. عند مسك الساق في التكرز من مفصل الركبة وثني مفصل الورك بشدة تشاهد بعد فترة وجيزة تشنجا انبساطياً في مفصل الركبة مع بسط القدم.
- **Schultze's s. (= 1.Chvostek's s. 2.tongue phenomenon)** ظاهرة اللسان؛ علامة شولتز.
- **Schultze Chvostek s. (= Chvostek's s.)** علامة شولتز شفوسيتك؛ علامة شفوسيتك.
- **Seeligmuller's s.** علامة سيلينغمولر. توسع الحدقة على الجهة المصابة بالآلم العصبي.
- **setting sun s. (= rising sun s.)** علامة غيَاب الشَّمْس. انحراف العينين للأسفل بحيث تبدو القرحتان كأنما «غائبتان» تحت الجفن السفلي مع انكشاف الصلبة البيضاء بين حافة الجفنين مما يدل على زيادة ضغط داخل القحف (كالنزيف أو التهاب السحايا والبطانة العصبية) أو تهيج جذع الدماغ (مثلاً في اليرقان النووي).
- **Signorelli's s.** علامة سينيورلي. الآلم الشديد عند الضغط على النقطة خلف الفك السفلي في التهاب السحايا.
- **Simon's s.** علامة سيمون. فقدان التزامن السوي بين حركات الحجاب الحاجز والصدر الذي يشاهد عند ابتداء التهاب السحايا.
- **spine s.** علامة السِنِيَاء. عدم رغبة المريض على ثني العمود الفقري للأمام في التهاب سنجابية النخاع.
- **Squire's s.** علامة سكواير. توسع وتضيق حدقة العين المتناوبين في التهاب السحايا القاعدية.
- **stairs s.** علامة السلالم. صعوبة نزول السلم في التابيس الظهري.
- **Strumpell's s.** علامة شترومبل. 1. انثناء القدم للجهة الظهرية عند سحب الفخذ للأعلى باتجاه الجسم ويشاهد في الشلل التشنجي للطرف السفلي ويسمى علامة الظنبوبية 2. عدم المقدرة على غلق الكف من دون البسط الشديد للمعصم ويسمى علامة الكعبرية 3. الانثناء المنفصل للساعد الذي يتولد عن الكب

- ويشاهد في الفالج (الشلل النصفي) ويسمى علامة الكب.
- **Tinel's s.** علامة تِنل. حس نخزي في النهاية القصوية من الطرف عند نقر موقع العصب المقطوع وهي علامة تدل على آفة جزئية للعصب أو على بدء تجرده.
- **toe s. (= Babinski's s.)** علامة أصبع القدم
- **trepidation s. (= patellar clonus)** علامة الإهتزاز.
- **Turyn's s.** علامة تورين. عند ثني إبهام القدم للأعلى في عرق النسا يشعر المريض بال ألم في المنطقة الالوية.
- **Uththoff's s.** علامة أوتثوف. رارة العينين التي تحدث في التصلب الدماغي النخاعي المتعدد.
- **Vanzetti's s.** علامة فانزيتي. يكون الحوض في عرق النسا أفقياً دائماً بالرغم من الجنف ولكن في الأمراض الأخرى المترافقة مع الجنف يكون الحوض مائلاً.
- **vital s's.** العلامات الحيوية. النبض والتنفس والحرارة.
- **Wartenberg's s.** علامة وارتنبيرغ. 1. علامة شلل الزندي وتتكون من ابتعاد وضع الخنصر 2. قلة أو غياب الحركات النواسية للذراعين عند السير بسبب مرض المخيخ.
- **Weber's s.** علامة ويبر. شلل العصب محرك العين على جهة واحدة وفالج (شلل نصفي) على الجهة الأخرى.
- **Westphal's s.** علامة وستفال. فقدان النفخة الركبية في التابس الظهرى.
- **Wood's s.** علامة وود. ارتشاء العضلة الدويرية وتثبتت مقلة العين وحول وحشي للدلالة على التخدير العميق.
- simesthesia (= osseous sensibility)**  
الحس العظمي.
- simultagnosia (= simultanagnosia)**  
عمه التكامل.
- simultanagnosia** عمه التكامل البصري. عدم المقدرة على فهم أكثر من عنصر واحد من منظر بصري في وقت واحد أو عدم المقدرة على فهم كل مكونات أية صورة لتكوين مفهوم شامل لها.

1. يساري 2. أغسر. 1. متعلق **sinistral**  
بجهة الجسم اليسرى 2. شخص يفضل استعمال أعضاء جهته اليسرى في الوظائف الإرادية.
- sinistrality** عسر؛ عسروية. تفضيل استعمال أعضاء الجهة اليسرى من الجسم في أداء الحركات والوظائف الإرادية كاستعمال العين والأذن واليد والساق اليسرى.
- sinistrocerebral** مخي يساري. متعلق بنصف كرة المخ اليسرى أو يقع فيها.
- sinistromanual (= left handed)** أغسر.
- sinistropedal (= left footed)** أغسر القدم.
- sinus** جَنِب. (ج: جُيُوب). كهف أو قناة، وهو مصطلح لأحياء متوسعة أو أقنية للدم الوريدي في القحف أو الكبد أو للهواء في العظام القحفية 2. قناة شاذة أو ناسور يسمح بمرور القيح.
- **s. cavernosus (= cavernous s.)** الجَنِب الكهفي. حيز وريدي غير منتظم الشكل في الأم الجافية على جانبي جسم العظم الوندي ويمتد من النهاية الإنسية للشق الحجاجي العلوي في الأمام حتى قمة العظم الصخري الصدغي في الخلف ويستلم الوريد العيني والوريد المخي السطحي الوسطي والجيب الوندي الجداري ويتصل مع الجيب الكهفي المقابل ومع الجيب المستعرض والوريد الوداجي الباطن عن طريق الجيوب الصخرية. وهو يضم عادة قناة وريدية واحدة أو أكثر ويحوي أيضاً الشريان السباتي الباطن والعصب المبعد.
- **cerebral s.** جَنِب دِمَاجِي. أي من بطينات الدماغ.
- **circular s.** الجَنِب الدَائِرِي. حلقة وريدية حول النخامية تتكون من الجيبين الكهفيين والجيبين بين الكهفيين الأمامي والخلفي، ويسمى أيضاً جيب ريدي.
- **cranial s's. (= s. durae matris)** الجُيُوب القَحْفِيَّة: جيوب الأم الجافية.
- **s's. of dura mater (= s. durae matris)** جُيُوب الأم الجافية. أقنية وريدية كبيرة تكون جهازاً تفاغرياً كبيراً بين طبقات الأم الحنون في الرأس وهي خالية من الصمامات ولا تتخمس أو تنخفق عندما تنزح وهي تحتوي على تراكيب في بعض أقسامها وتقوم بنزح الأوردة الدماغية وبعض الأوردة بين

اللوحتين والسحائية إلى الأوردة الرقبية كما تنزح الجيوب الموجودة في قاعدة القحف معظم الدم من الحجاج وتتصل في بعض المراكز مع الأوردة السطحية بواسطة أوردة مشبرية، وتسمى أيضاً الجيوب القحفية.

- **s. intercavernous** الجَيْبَانُ بَيْنَ الكَهْفَيْنِ. جيبان وريديان يربطان الجيبين الكهفيين. أحدهما يمر أمام قمع النخامية ويمر الثاني خلفها.

- **lateral s. (= s. transversus durae matris)** الجيب المستعرض للأم الجافية: الجَيْبُ الجَانِبِيّ.

- **longitudinal s. inferior (= inferior sagittal s.)** الجَيْبُ السَّهْمِيّ السُّفْلِيّ: الجَيْبُ الطُّوْلَانِيّ السُّفْلِيّ.

- **longitudinal s., superior (= superior sagittal s.)** الجَيْبُ الطُّوْلَانِيّ الْعُلَوِيّ.

- **occipital s. (= s. occipitalis)** الجَيْبُ الْقَذَالِيّ. جيب وريدي مفرد يبدأ بالفرعين الأيمن والأيسر والجيوب الهامشية ويمر إلى الأعلى على طول الحافة الملتصقة لمنجل المخيخ لينتهي عند مقرون الجيوب.

- **parasinoidal s. parasinoidal's (= lacunae laterales)** الجُيُوبُ المحيطة بالجَيْبِ: الجُوبَاتُ الوحشية. أحد الأحياز العديدة في الأم الجافية التي تفتح في أحد جيوب الجافية وتسمى هذه الأحياز عادة الجُوبَاتُ الوحشية.

- **s. petrosus inferior (= inferior petrosal s.)** الجَيْبُ الصَّخْرِيّ السُّفْلِيّ. جيب وريدي ينبع من الجيب الكهفي ويجري على طول خط الالتحام الغضروفي الصخري القذالي إلى البصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن.

- **s. petrosus superior** الجَيْبُ الصَّخْرِيّ الْعُلَوِيّ. جيب ينبع عند الجيب الكهفي ويمر على طول خط التصاق حافة الخيمة المخيخية وينزح إلى الجيب المستعرض.

- **s. rectus** الجَيْبُ الْمُسْتَقِيم. جيب وريدي للأم الجافية يقع في خط التحام شراع الدماغ وخيمة المخيخ ويتكون من اتصال الوريد الدماغى الكبير

والجيب السهمي السفلي وعادة ما ينتهي في الجيب المستعرض المقابل عند مقرون الجيوب.

- **rhomboid s. of Henle (= ventriculus terminalis medullae spinalis)** الجَيْبُ الْمُعْبِئِيّ لِهَنْلِيّ: البطين الانتهازي للنخاع.

- **s. sagittalis inferior** الجَيْبُ السَّهْمِيّ السُّفْلِيّ. جيب وريدي صغير في الأم الجافية يقع في القسم السفلي من الحافة المقعرة لمنجل المخ وعند الفتحة في النهاية العلوية للجيب المستقيم.

- **s. sagittalis superior** الجَيْبُ السَّهْمِيّ الْعُلَوِيّ. جيب وريدي مفرد في الأم الحنون يبدأ أمام عرف الديك ويمتد إلى الخلف في الحافة المحدبة لمنجل المخ وينتهي بالقرب من الناشزة القذالية الباطنة في مقرون الجيوب وهو يستلم الأوردة المخية العلوية ويتصل مع الجُوبَاتُ الوحشية للجافية المحاورة وهو عادة ما ينفلف جزئياً بالتحجب العنكبوتي.

- **sigmoid s.** الجَيْبُ السِّينِيّ. أحد الجيبين الوريديين في الأم الجافية وهما استمرارية للجيبين المستعرضين ويدور كل منهما للأسفل من خيمة المخيخ ليصبح مستمراً مع البصلة العلوية للوريد الوداجي الباطن.

- **s. sphenoparietalis** الجَيْبُ الْوَتْدِيّ الْجِدَارِيّ. جيب وريدي في الجافية يبدأ من وريد سحائي بجوار قمة الجناح الصغير للعظم الوتدي ثم ينزح إلى القسم الأمامي من الجيب الكهفي.

- **subarachnoidal s. (= cisternae subarachnoidales)** الجُيُوبُ تَحْتَ الْعَنْكَبُوتِيَّة.

- **subpetrosal s. (= s. petrosus inferior)** الجَيْبُ الصَّخْرِيّ السُّفْلِيّ.

- **superpetrosal s. (= s. petrosus superior)** الجَيْبُ الصَّخْرِيّ الْعُلَوِيّ.

- **tentorial s. (= s. rectus)** الجيب المستقيم: الجَيْبُ الْخَيْمِيّ.

- **s. transversus durae matris** جَيْبُ الْأُمِ الْجَافِيَّةِ الْمُسْتَقْرَض. أحد الجيبين الوريديين الكبيرين في الأم الجافية وهو يبدأ بطرق مختلفة عند مقرون الجيوب بالقرب من الناشزة القذالية الباطنة، ويتبع كل جيب الحافة الملتصقة لخيمة المخيخ بالعظم الصدغي الصخري حيث يصبح الجيب السيني. ويتصل الجيبان الأيمن والأيسر عند بدايتهما مع بعضهما

البعض ومع الجيب السهمي العلوي ومع الجيب المستقيم.

**sitomania** هَوَسُ الأَكْل. 1. الجوع المفرط والرغبة الملحة في الأكل 2. نهام دوري.

**sitophobia** رُهابُ الأَكْل. الخوف الشاذ من تناول الطعام.

**skelalgia** أَلَمُ السَّاق. ألم في الساق.

**skelasthenia** وَهْنُ السَّاق. ضعف الساقين.

**skull (= cranium)** القحف؛ الجُفْجَمَة. الصَّنْدُوقُ العَظْمِيُّ للرأس المكون من عظام القحف والوجه.

**sleep** نَوْمٌ. فترة راحة للجسم والفكر تغيب فيه الإرادة والوعي جزئياً أو كلياً وتتعلل فيه وظائف الجسم جزئياً وهو يوصف على أنه حالة سلوكية تتصف بالوضعية السكونية الخاصة للجسم وقلة الحساسية للمنبهات الخارجية وهي حالة عكوسة. وينقسم النوم إلى مرحلتين: النوم معدوم الحركات العينية السريعة ونوم الحركات العينية السريعة.

**- active s. (= REM s.)** النوم الفاعل؛ النَوْمُ الفَعَّالُ؛ نوم الريم.

**- deep s. (= NREM s.)** النَوْمُ العميق؛ نوم لا ريمي.

**- desynchronized s. (= REM s.)** النَوْمُ اللأَمْتَرَامِن.

**- dreaming s. (= REM s.)** النَوْمُ الإخْلَامِي.

**- electric s.** نَوْمٌ كَهْرَبَائِي. فقدان الحركات الإرادية مع تخدير عام يتولد عند تطبيق رأس تيار كهربائي سريع التقطع.

**- electrotherapeutic s. (= cerebral electrotherapy)** نَوْمٌ عِلَاجِيٌّ كَهْرَبَائِي.

**- fast wave s. (= REM s.)** نَوْمُ المَوْجَات السريعة. نوم الحركات العينية السريعة.

**- non-rapid eye movement s. (= NREM s.)** نَوْمٌ بِدُونِ الحَرَكَاتِ العَيْنِيَّةِ السريعة.

**- NREM s.** نَوْمٌ بِدُونِ الحَرَكَاتِ العَيْنِيَّةِ السريعة. نوم لا ريمي. فترة النوم الخالية من الاحلام وتتكون من أربع مراحل من درجات عمق النوم

تكون خلالها الموجات الدماغية بطيئة وذات فولتية عالية وتبطأ خلالها الفعاليات المستقلة كضربات القلب التي تكون بطيئة ومنتظمة ويهبط ضغط الدم وتتخلل ذلك فترات من نوم حركات العين السريعة ويكون النوم بدون حركات العين السريعة حوالي 80% من وقت النوم الكلي.

**- orthodox s. (= NREM s.)** النَوْمُ التَقْلِيدِي؛ نَوْمٌ قَوِيم. نوم بدون حركات العين السريعة.

**- paradoxical s. (= REM s.)** نَوْمٌ مُتَنَاقِض. نوم الحركات العينية السريعة.

**- paroxysmal s. (= narcolepsy)** نَوْمٌ إِنْتِبَاطِي. سبخ.

**- prolonged s.** نَوْمٌ مَطْوَل. معالجة الاضطرابات العقلية بالنوم المستمر لمدة عدة أيام تحت تأثير العقاقير المنومة.

**- quiet s. (= NREM s.)** نَوْمٌ هَادِيء. نوم بدون الحركات العينية السريعة.

**- rapid eye movement s. (= REM s.)** نَوْمُ الحَرَكَاتِ العَيْنِيَّةِ السريعة، نوم الريم.


**- REM s. (= rapid eye movement s.)** نَوْمُ الحَرَكَاتِ العَيْنِيَّةِ السريعة؛ نوم الريم. فترة النوم التي تكون فيها موجات الدماغ سريعة ومنخفضة الفولتية والفعاليات الذاتية كالتنفس وضربات القلب غير منتظمة. وترافق الاحلام هذا النوع من النوم كما تحدث فيها انقباضات عضلية لا إرادية بسيطة وحركات عينية سريعة وتحدث نوبات هذا النوم حوالي 3-4 مرات في الليلة الواحدة بفترات تتراوح بين 80-120 دقيقة تدوم كل نوبة منها خمس دقائق إلى أكثر من ساعة وتكون نسبة هذا النوع من النوم حوالي 20% من مجموع وقت النوم الكلي.

**- slow wave s. (= NREM s.)** نَوْمٌ بَطِيء المَوْجَات؛ نوم لا ريمي.

**- synchronized s. (= NREM s.)** نَوْمٌ مُتَرَامِن.


**- twilight s.** نَوْمٌ غَلَسِي. حالة تسكين ونساعة تتولد عن حقن المورفين والسكوبولامين تحت الجلد، وبالرغم من أن المريض يستجيب في هذه الحالة للالام لكنه لا يحفظه في ذاكرته.

**sleep talking (= somniloquism)** كلامٌ نومي؛ تَكَلُّمٌ نومي.



skull

منظر جانبي ايسر للجمجمة: (1) العظم الجبهي (2) الدرز التاجي (3) العظم الأنفي (4) الفقم (5) الفك العلوي (6) الفك السفلي (7) القوس الوجني (8) الصماخ السمعي الظاهر (9) النتوء الخشائي (10) الدرز القفوي الصدغي (11) العظم الصدغي (12) العظم القفوي (13) الدرز اللامي (14) العظم الجداري.



skull

منظر أمامي للجمجمة: (1) الدرز الجبهي الأنفي (2) الدرز بين المنخرين (3) تجويف الأنف (4) الدرز الوجني الفلجي (6) الثقب الذقني (7) الفك السفلي (8) الفك العلوي (9) العظم الوجني (10) العظم الأنفي (11) الحاجاج (12) العظم الصدغي (13) العظم الجداري (14) العظم الجبهي.



**sleep walking (= somnambulism)**

سِنَر نَوْمِي.

**slows (= trembles)**

إِرْتَعَاش.

**sociopathy** اِغْتِلَالُ اِجْتِمَاعِي. اضطرابات

سلوكية لا اجتماعية أو معادية للمجتمع.

**sodomist** سَنَه؛ سَدُومِي. ممارس السدومية.

أو ممارس الاتصالات الجنسية الشاذة.

**sodomy** سَنَه؛ سَدُومِيَّة. نوع من الشذوذ

الجنسي يصفه القانون ليشمل الاتصال الجنسي بين الإنسان والحيوانات من أنواع مختلفة وكذلك الممارسة الجنسية الفموية أو الشرجية بين الأفراد ويقتصر استعمال المصطلح طبياً على الاتصال الجنسي بين الإنسان والحيوان واللوواط.

**softening** تَلْيُنُ بِقَفَرِ الدَّم. عملية تلين النسيج

أو العضو مرضياً مثل تلين الدماغ أو النخاع الشوكي.

**- anemic s.** تَلْيُنُ قَفَرَدَمِي. تلين نسيج الدماغ وانحلاله بسبب نقص الدم المجهز له.

**- s. of the brain** تَلْيُنُ الدِّمَاغ. 1. استعمال شائع للخرف الشللي 2. تلين الدماغ.

**somasthenia** وَهْنٌ جَسَدِي. ضعف

جسمي عام مع ضعف الشهية للطعام وقلة النوم وعدم المقدرة على القيام بالحياة العادية السوية من دون إنهاك عام.

**somatalgia** أَلَمٌ جَسَدِي. ألم بدني.

**somatasthenia (= somasthenia)** وَهْنٌ جَسَدِي.

**somatesthesia (= somatognosis)** حِسُّ

الجَسَد. الحس بوجود الجسد.

**somatic** جَسَدِي. 1. متعلق بالجسد أو ما

يتصف به 2. متعلق بجدار الجسم وغير متعلق بالأحشاء.

**somaticovisceral** جَسَدِي حَشَوِي. متعلق

بالجسد والأحشاء.

**somatoceptor** مُسْتَقْبِلٌ جَسَدِي. مستقبل

يستلم المنبهات من العضلات الهيكلية والجسدية.

**somatopsychic** جَسَدِي نَفْسَانِي. متعلق

بالجسد والعقل وهو يدل على اضطراب جسدي يولد أعراضاً نفسية.

**somatopsychosis** دُهَانٌ جَسَدِي. مرض

نفسي يترافق مع داء جسدي.

**somesthesia (= somatesthesia)** حِسُّ

الجَسَد.

**somnambulance (= somnambulism)**

سِنَر نَوْمِي.

**somnambulation (= somnambulism)**

سِنَر نَوْمِي.

**somnambulism** سِنَر نَوْمِي. القيام من

الفرش والسير أثناء حالة النوم وعادة ما يحدث ذلك في الثلث الأول من الليل ويدوم من بضع دقائق لنصف ساعة.

**somnambulist** السَّائِرُ النَّوْمِي. المصاب

بالسير النومي.

**somniloquism** تَكَلُّمٌ نَوْمِي. التكلم أثناء

النوم.

**somnolence** نَيْمُومَة؛ وَسَنٌ. النعاس الطبيعي

أو الشعور غير الطبيعي به.

**somnolentia** نَيْمُومَة؛ وَسَنٌ. 1. نعاس

2. حالة نوم غير كامل تتصف بفقدان الاهتمام وبلوك هياجي أو استثنائي.

**sophomania** هَوَسٌ إِدْعَاءُ الْحِكْمَةِ. اعتقاد

المصاب غير المسبب برجاجة عقله وحكمته.

**soporiferous** مُنَوِّمٌ. ما يولد نوماً عميقاً.

**soporific** مُنَوِّمٌ. 1. يولد نوماً عميقاً

2. دواء أو أي عامل آخر يولد النوم.

**soporous** مَسْنُوتٌ. مترافق مع أو مصاب

بالوسن أو السبات.

**space** حَيْزٌ. (ج: أَخْيَاز)؛ فَضَاءٌ (ج: أَفْضِيَّة)

1. باحة محددة 2. تجويف حقيقي أو كامن في الجسم 3. اتساع الكون خارج الأرض والجو.

**- epicerebral s.** الْحَيْزُ فَوْقَ الدِّمَاغ. الحيز الكامن

بين الدماغ والام الحنون.

**- epidural s. (= cavitas epiduralls)** الْحَيْزُ

فَوْقَ الْجَافِيَّة.

**- epispinal s.** الْحَيْزُ فَوْقَ النُّخَاع. الحيز الكامن

بين النخاع الشوكي والام الحنون.

- الحَيْرُ تَحْتَ العَنَكِيوتية.** - subarachnoid s. **تَشْنُجٌ** (ج: تَشْنُجَات) 1. تقلص مفاجيء وشديد ولا إرادي لإحدى العضلات أو لعدة عضلات مع المها وتوقف وظيفتها وقد يولد حركات لا إرادية أو انفتال العضو 2. تضيق مفاجيء ولكنه عابر للممر أو قناة أو فتحة.
- تَشْنُجُ التَّكْيُف.** تشنج - s. of accommodation العضلات الهدبية مولداً فرط تكيف البصر للجسام القريبة.
- تَشْنُجُ كَنَعَانِي.** تشنج يتحرك فيه - athetoid s. العضو المصاب حركات تشبه حركات الكنع.
- تَشْنُجُ بِل:** Bell's s. (= convulsive tic) تشنج الوجه. عرة اختلاجية (وجهية).
- تَشْنُج** canine s. (= risus sardonius) كلبى: تَكْشِيرَةٌ سَرْدُونِيَّة.
- تَشْنُجُ اليَدِ والقَدَم.** تشنج - carpopedal s. عضلات اليدين والقدمين أو الإبهامين والأبخرسين الكبيرين ويشاهد في التكرز.
- تَشْنُجُ مُخِّي.** تشنج بسبب آفة مخية - cerebral s.
- تَشْنُجُ رَمَعِي.** تشنج ترتخي فيه - clonic s. العضلات مباشرة بعد صملمها.
- تَشْنُج** cynic s. (= risus sardonius) كلبى: تَكْشِيرَةٌ سَرْدُونِيَّة.
- تَشْنُج رَقْصِي.** dancing s. (= saltatory s.) تشنج مَرِيئِي مُنْتَشِر. - diffuse esophageal s. تقلصات شديدة غير منسقة وغير دافعة للمريء يهيجها البلع وخصوصاً عند الشيوخ ويشاهد جوف المريء بالأشعة مع الباريوم بشكل سلسلة تضيقات متراكزة أو ملف لولبي.
- تَشْنُجٌ وَجْهِي.** تشنج عضلات الوجه - facial s. الذي يغذيها العصب الوجهي ويمكن أن يشمل كل جهة الوجه أو المنطقة التي تحيط بالعين.
- تَشْنُجٌ ثَابِت.** تشنج دائم في إحدى العضلات أو في مجموعة منها. - fixed s.
- تَشْنُج** glottic s. (= laryngospasm) مزماري: تَشْنُجُ الحَنَجْرَةِ.
- تَشْنُجُ العَادَةِ؛ عُرَّة.** habit s. (= tic)
- تَشْنُجٌ متكلف:** histrionic s. (= facial s.)

**تَشْنُجُ الوَجْهِ التَّمْيِيلِي.** اختلاج عضلات الوجه الشبيه بمعص الكتاب.

- infantile massive s. (= jackknife seizure)** تشنج طِفْلِي كُتْلِي. متلازمة رمع عضلي شديد يظهر في الشهور الثمانية عشرة الأولى من حياة الطفل ويترافق ذلك مع اضطراب دماغي شديد ويتصف بتشنج انثنائي شديد للرقبة والراس والجذع وانبساط الأطراف العلوية والسفلية.
- تَشْنُجٌ قَصْدِي.** تشنج عضلي - intention s. يحدث عند محاولة القيام بحركة إرادية.
- تَشْنُجٌ قَافِل.** تشنج توتري يظهر - lock s. وكأنه يقلل الأصابع مع بعضها كما يحصل في معص الكتاب وفي الإصابات المماثلة.
- تَشْنُجٌ طَرَقِي:** malleatory s. (= malleation) نَقْضَانُ اليَدِ.
- تَشْنُجٌ كُتْلِي.** نوبة تنصف بتقلص معظم عضلات الجسم. - massive s.
- تَشْنُجٌ مُخْتَلِط.** تشنج تظهر فيه حركات تشنجية انثنائية وانبساطية. - mixed s.
- تَشْنُجٌ حَرَكِي؛ كَنَع.** mobile s. (= athetosis)
- تَشْنُجُ الإِعْتِلَالِ العَضَلِي.** myopathic s. تشنج يرافق الاعتلال العضلي.
- تَشْنُجٌ رَفِي؛** nictating s. (= winking s.) تَشْنُجٌ غَمَزِي.
- تَشْنُجٌ إِيْمَانِي.** تشنج رمعي في العضلات القصية الخشائية يولد حركات إيمائية ويترافق ذلك مع الرأرة، ويسمى أيضاً اختلاج سلامي.
- perineal s. (= penneal vaginismus)** تَشْنُجٌ عَجَانِي. تشنج المهبل العجاني.
- تَشْنُجٌ تَصَوُّيْتِي.** تشنج موترات - phonatory s. الحبال الصوتية.
- progressive torsion s. (= dystonia musculorum deformans)** تَشْنُجٌ التَوَانِي مُزْرَقٌ؛ خلل التوتر العضلي المشوه.
- تَشْنُجٌ تَنَفُّسِي.** تشنج عضلات التنفس. - respiratory s.
- تَشْنُجُ الرَّقَبَةِ الخَلْفِي.** انثناء - retrocollic s. الراس التشنجي للخلف.

- **Romberg's s.** تَشْنُجُ رُومْبِرْغ. تشنج مضفي للعضلات التي يغذيها العصب الخامس.
- **rotatory s.** تَشْنُجُ دَوْرَانِي. تشنج منقطع للعضلة الخشائية فيسبب دوران الرأس.
- **salaam s. (= nodding s.)** تَشْنُجُ سَلَامِي. تشنج قَفْزِي. تشنج رمعي لعضلات الساق يولد حركة قفزية غريبة عند وقوف المريض.
- **synclonic s.** تَشْنُجُ رَمْعِي مُتْرَافِن. تشنج رمعي لاكثر من عضلة واحدة في وقت واحد.
- **tetanlc s. (= tonic s. = tetanus)** تَشْنُجُ كَزَازِي؛ تَكَزَّرُ فَيْرِيُولُوجِي. حالة تقلص عضلي مستمر من دون فترات ارتخاء تنتج عن التنبيه المستمر للعصب الحركي بنبضات سريعة وتندمج الاستجابات العضلية لكل منها مع بعضها.
- **tonoclonic s.** تَشْنُجُ نَفْضَانِي؛ تَشْنُجُ تَوْتَرِي. نَفْضَان اختلاجي للعضلات.
- **torsion s.** تَشْنُجُ التَوَانِي. تشنج يتصف بانفعال أو دوران الجسم وخصوصاً الحوض كالذي يحصل في خلل التوتر العضلي المشوه.
- **toxic s.** تَشْنُجُ سُمِّي. تشنج يتولد عن التسمم بأحد السموم.
- **winking s.** تَشْنُجُ رَفِي؛ تَشْنُجُ غَفْزِي. نَفْضَان تشنجي للعضلة الجفنية الدويرية وللجفن.
- **writer's (= writer's cramp)** تَشْنُجُ الْكَتَّاب. معص الكُتَّاب.
- spasmodic** تَشْنُجِي. يتصف بالتشنج أو ذو خاصية تشنجية.
- spasmogen** مُشْنُج. مادة تولد التشنج.
- spasmolygmus (= hiccup)** فُوق. مُزِيل التَشْنُج؛ حَالُ التَشْنُج.
- spasmolysant** مُزِيل التَشْنُج؛ حَالُ التَشْنُج. مادة تحل أو تفرج عن التشنج.
- spasmolysis** إِزَالَةُ التَشْنُج؛ حَلُّ التَشْنُج. التفريج عن التشنج.
- spasmolytic (= antispasmodic)** مُزِيل التَشْنُج؛ حَالُ التَشْنُج. مضاد التشنج.
- spasmophilla** شَنْج؛ أَهْبَةٌ تَشْنُجِيَّة؛ سُرْعَةُ التَشْنُج. حالة تظهر فيها الأعصاب الحركية

حساسية مفرطة شاذة للمنبهات الآلية أو الكهربائية ويظهر المريض استعداداً للتكرز والاختلاج والتشنج.

**spasmophilic** شَنْج؛ سَرِيعُ التَشْنُج. ما يظهر أهبة تشنجية.

**spasmus (= spasm)** تَشْنُج.

- **s. nutans (= nodding spasm)** تَشْنُجُ إِيْمَانِي.

**spastic** تَشْنُجِي؛ شَنْجِي. 1. يتصف بالتشنج 2. مفرط التوتر ولذلك تكون العضلة متيبسة وحركاتها غير منتظمة 3. شخص مصاب بالشَّنَج كما يحصل في الشلل التشنجي أو الشلل الدماغي.

**spasticity** شَنْج. حالة فرط التوترية التشنجية أو زيادة التوتر في العضلة أعلى من الحد السوي مع زيادة منعكساتها الوترية.

- **clasp-knife s.** شَنْج مُنْفَلَت؛ شَنْجَ الْمَوْس. الْكَبَّاس. الظاهرة التي تحدث عندما تمدد عضلة مفرطة التوتر بطريقة متفعلة إذ يحدث ارتخاء مفاجئ بعد مقاومة شديدة في الابتداء.

**spatium subdurale** الْحَيَرُ تَحْتَ الْجَافِيَّة. حيز ضيق تحت الجافية يحوي السائل النخاعي الشوكي وأحياناً مجرد حيز كامن بين الجافية والعنكبوتية.

**speech** كَلَام. تكوين أصوات تنقل بعض الأفكار.

- **alaryngeal s. (= esophageal s.)** كَلَامٌ لَا حَنْجَرِي.

- **clipped s.** كَلَامٌ مُتَدَاخِل. كلام تتداخل فيه الكلمات وتكون ناقصة ويحدث ذلك أحياناً كأحد أعراض الخرف الشللي.

- **echo s. (= echolalia)** كَلَامٌ صَدْوِي؛ لَفْظٌ صَدْوِي.

- **esophageal s.** كَلَامٌ مَرِيئِي. طريقة كلامية تشاهد بعد استئصال الحنجرة مع توليد الكلام باهتزاز عمود الصوت الموجود في الحنجرة قابل المصرة الحلقي البلعومية.

- **explosive s.** كَلَامٌ انفجاري. نطق عال فجائي يولده المريض في بعض أمراض الدماغ.

- **incoherent s.** كَلَامٌ لَا مُتْرَابِط. كلام لا يوجد ترابط بين الأفكار التي يعبر عنها بسبب اضطراب سلسلة أفكار المريض.

- jumbled s. (= anarthria) كَلَامٌ مَشْوُشٌ: عَقْلَةٌ.
- mirror s. كَلَامٌ مِرَاتِيّ. اضطراب كلامي يعكس فيها ترتيب مقاطع الكلمات في الجملة الكلامية.
- plateau s. كَلَامٌ هَضْبِيّ. كلام يتصف بالمحافظة على وتيرة واحدة من دون أي تغيير في نغمة الصوت فيه.
- pressured s. كَلَامٌ مُنْضَغَطٌ. كلام سريع أو متسارع شديد الهياج بحيث يصعب على العضلات الصوتية ربط كلماته فلا يصبح مفهوماً للسامع.
- scamping s. (= clipped s.) كَلَامٌ مُتَدَاخِلٌ.
- scanning s. كَلَامٌ تَقْرَسِيّ. كلام تكون فيه المقاطع مفصولة بفواصل.
- slurred s. (= clipped s.) كَلَامٌ مُتَدَاخِلٌ.
- staccato s. نَطْقٌ مُفَكَّكٌ. كلام ينطق فيه كل مقطع بصورة منفصلة ويشاهد ذلك في التصلب المتعدد.
- sphenocephalus مُسَقَّنُ الرَّأْسِ. جنين ذو رأسٍ إسفيني الشكل.
- sphenocephaly تَسَقُّنُ الرَّأْسِ. شذوذ تنموي يتصف برأس ذي مظهر إسفيني الشكل.
- sphincter مَصْرَّةٌ. (ج: مَصْرَاتٌ). شريط عضلي حلقي الشكل يضيق أحد الممرات أو يغلق إحدى الفتحات.

sphingomyelin سَفِنْغُوْمِيلِين. مجموعة من الشحومات الفسفورية التي تولد عند تحليلها حمض الفسفوريك والكولين والسفنجوزين وأحد الحموض الدهنية وتوجد عادة في الأنسجة العصبية وعادة في أغشيتها.

spina شَوْكَةٌ؛ سِنْسِنَةٌ. نتوء أو بارزة شوكية الشكل.

- s. bifida السِنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ. عيب تنموي يتصف بانغلاق معيب للمحفظة العظمية للنخاع الشوكي تبرز من خلاله السحايا والنخاع وقد لا تبرز منه.

- s. bifida anterior السِنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الْأَمَامِيَّةُ. عيب في انغلاق السطح الامامي للقناة الشوكية العظمية وعادة ما يترافق مع تنامٍ معيب في الاحشاء الصدرية والبطنية.

- s. bifida aperta (= s. bifida cystica) السِنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الْكِيسِيَّةُ.

- s. bifida cystica السِنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الْكِيسِيَّةُ. سنسنة مشقوقة يبرز من خلالها ورم كيسبي يحوي السحايا (قيلة سحائية) أو النخاع الشوكي (قيلة نخاعية) أو كليهما (قيلة سحائية نخاعية).



spina bifida

السِنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ مع ظهور لمة من الشعر في نهاية العمود الفقري.

- s. bifida manifesta (= s. b. cystica)  
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الظَّاهِرَةُ.

- s. bifida occulta  
سِّنْسِنَةُ مَشْقُوقَةٍ فِيهَا عَيْبٌ فِي الْقَنَاةِ الشُّوكِيَّةِ مِنْ دُونِ بَرُوزِ النُّخَاعِ أَوْ السَّحَايَا.

- s. bifida posterior  
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ الْخَلْفِيَّةُ. سِّنْسِنَةُ مَشْقُوقَةٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ فِي انْغِلَاقِ سَطْحِهَا الْخَلْفِيِّ.

spinalgia  
أَلَمُ السِّنْسِنَاءِ. أَلَمٌ فِي مَنطَقَةِ السِّنْسِنَاءِ.

spindle  
مِغْزَلٌ. 1. مِغْزَلُ نَوَاةِ الْخَلِيَّةِ عِنْدَ انْقِسَامِهَا. 2. مِغْزَلُ مَوَاجَتِ الْمَخْطَطِ الْكَهْرِبَايِّ لِلدَّمَاعِ. 3. مِغْزَلُ الْعَضَلَةِ.

- muscle s.  
مِغْزَلُ الْعَضَلَةِ. مُسْتَقْبَلَةُ آيَةِ انْتِهَائِيَّةٍ تَوْجِدُ بَيْنَ أَلْيَافِ الْعَضَلَاتِ الْهَيْكَلِيَّةِ وَمُرْتَبَةِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِيَةٍ مَعَهَا وَتُسْتَجِيبُ لِلتَّمْدِيدِ الْإِلَافَاعِلِ لِلْعَضَلَةِ وَلَكِنِهَا تَتَوَقَّفُ عَنِ الاسْتِجَابَةِ عِنْدَ تَقْلُصِ الْعَضَلَةِ الْمَتَسَارِي الشَّدِّ وَبِهَذَا فَهِيَ تُؤْشِرُ طَوْلَ الْعَضَلَةِ وَلِذَا فَهِيَ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي تَسْتَجِيبُ لِلتَّمْدِيدِ الْعَضَلِيِّ أَوْ لِمُنْعَكْسِ تَمْدِيدِ الْعَضَلِ.

- neuromuscular s. (= muscle s.)  
الْمِغْزَلُ الْعَصْبِي الْعَضَلِي.

- tendon s. (= Golgi tendon organ)  
مِغْزَلُ الْوَتَرِ.

- tigroid s's. (= Nissl bodies)  
أَجْسَامُ نَيْسِلٍ. مَغَازِلُ غَرِيْبَةِ الشَّكْلِ.

spine  
1. شَوْكَةٌ. 2. السِّنْسِنَاءُ؛ الصُّلْبُ؛ الْعَمُودُ الْفَقْرِي. 1. نَتَوءٌ أَوْ بَارِزَةٌ شَوْكِيَّةٌ الشَّكْلِ. 2. الْعَمُودُ الْفَقَارِيُّ.

- cleft s. (= spinal bifida)  
السِّنْسِنَةُ الْمَشْقُوقَةُ.

spinibulbar  
نُخَاعِيٌّ بَصَلِّيٌّ. مُتَعَلِّقٌ بِالنُّخَاعِ الشُّوكِيِّ وَالْبَصَلَةِ (النُّخَاعِ الْمُسْتَطِيلِ).

spinocerebellar  
نُخَاعِيٌّ مَخِيخِيٌّ. مُتَعَلِّقٌ بِالنُّخَاعِ الشُّوكِيِّ وَالْمَخِيخِ.

spinocerebellum (= paleocerebellum)  
الْمَخِيخُ الْقَدِيمُ.

spinocollicular (= spinotectal)  
نُخَاعِيٌّ أَكِيمِيٌّ.

spinocortical (= corticospinal)  
قَشْرِيٌّ نُخَاعِيٌّ. نُخَاعِيٌّ قَشْرِيٌّ.

spinotectal (= tectospinal)  
سَقْفِيٌّ نُخَاعِيٌّ. نُخَاعِيٌّ سَقْفِيٌّ.

spiral, tendon  
حَلَزُونَةُ الْوَتَرِ؛ لَوْلَبِيَّةُ الْوَتَرِ. مُسْتَقْبَلَةُ حَلَزُونِيَّةٍ لَوْلَبِيَّةٍ فِي وَتَرِ الْعَضَلَاتِ الْهَيْكَلِيَّةِ.

splanchnesthesia (= visceral sense)  
الْحِسُّ الْحَشْوِيُّ.

splanchnicectomy (= splanchnic neurectomy)  
قَطْعُ الْعَصَبِ الْحَشْوِيِّ.

splanchnicotomy  
بَضْعُ الْعَصَبِ الْحَشْوِيِّ. قَطْعُ أَحَدِ الْأَعْصَابِ الْحَشْوِيَّةِ.

splenalgia  
أَلَمُ الطَّحَالِ. أَلَمٌ عَصَبِيٌّ فِي الطَّحَالِ.

splenium of corpus callosum  
ضِمَادَةُ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ؛ شَرِيطُ الْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ. النِّهَايَةُ الْخَلْفِيَّةُ الْمَدَوْرَةُ لِلْجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.

splenodynia  
وَجَعُ الطَّحَالِ. وَجَعٌ فِي الطَّحَالِ.

spodiomyelitis (= acute anterior poliomyelitis)  
إِلْتِهَابٌ سِنْجَابِيَّةُ الدَّمَاعِ الْأَمَامِيَّةِ الْحَادَّةِ.

spondylalgia  
أَلَمُ الْفَقْرَةِ. أَلَمٌ فِي إِحْدَى الْفَقَرَاتِ.


spondylexarthrosis (= dislocation of a vertebra)  
خَلْعُ الْفَقْرَةِ.

spondylitis  
إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ.

- ankylosing s. (= rheumatoid s.)  
النَّهَابُ الْفَقَارِ الْجَاسِيءُ؛ إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ الرُّوماتُويْدِيِّ.

- muscular s.  
إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ الْعَضَلِيِّ. حَالَةٌ مَرَضِيَّةٌ لِلْفَقَارِ تَنْتُجُ عَنْ ضَعْفِ الْعَضَلَاتِ وَلَيْسَ عَنِ النَّهَابِ حَقِيقِيٍّ فِيهَا.

- rheumatoid s.  
إِلْتِهَابُ الْفَقَارِ الرُّوماتُويْدِيِّ. نَوْعٌ مِنَ النَّهَابِ الْمَفَاصِلِ الرُّوماتُويْدِيِّ الَّذِي يَصِيبُ الْفَقَارَ وَخَاصَّةً الذِّكُورَ الْإِحْدَاثَ وَيُؤْدِي إِلَى الْأَلَمِ وَالتَّيْبَسِ نَتِيجَةً لِلنَّهَابِ الْمَفَاصِلِ الْعِزْجِيَّةِ الْوَرَكِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَقَارِيَّةِ وَالضِّلْعِيَّةِ الْفَقَارِيَّةِ مَعَ تَكَلسُّهَا وَقَسْطِهَا وَالتَّصَاقِهَا فَيُؤْدِي إِلَى الصِّمْلِ الْكَامِلِ لِلْعَمُودِ الْفَقَارِيِّ وَالصَّدْرِ.



#### spindle, muscle

الإتصال العصبي العضلي: (1) المنطقة الاستوائية (2) مغزل عضلي (3) ليف عضلي (4) مفصل (5) ليف عصبي حركي (6) جذع العصب الحركي (7) حزمة عصبية للمغزل العضلي (8) عصب حسي من العضو الحسي للوتر (10) نهاية حركية (11) ليف عضلي داخل المغزل (12) نهاية أولية (13) محفظة (14) ليف حسي من المغزل العضلي (15) ليف عصبي حركي إلى العضلة داخل المغزل.

- spondylodynia** وَجَعُ الْفَقَارِ. وجع في الفقرات.
- spondylolisthesis** انْزِلَاقُ الْفَقَارِ. انزلاق إحدى الفقرات للأمام فوق الفقرة الأخرى وعادة ما تكون القطنية الخامسة فوق جسم العجز أو القطنية الرابعة فوق جسم القطنية الخامسة وعادة ما يكون بسبب عيب تنموي في القسم بين المفاصل الفقارية.
- spondylolysis** انْحِلَالُ الْفَقْرَةِ. انحلال أو تخرب الفقرات بسبب عدم تنسج القوس الفقاري وانفصال الجسم بين المفاصل.
- spondylomalacia** تَلَيُّنُ الْفَقَارِ.
- spondyloptosis (= spondylo-listhesis)** تَدَلِّيُ الْفَقَارِ.
- spondylopyosis** تَفْقِيعُ الْفَقَارِ.
- spondyloschisis** انْشِقَاقُ الْفَقَارِ. انشقاق خلقي للقوس الفقاري.
- spondylosis** 1. قَسَطُ فَقَارِي 2. فقار. 1. قسط المفصل الفقاري 2. اصطلاح عام للتغيرات التنكسية المولدة عن الفصال العظمي.
- cervical s.** فَقَارٌ رَقَبِيّ. مرض مفصلي تنكسي يصيب الفقرات العنقية والألواح بين الفقرات والاربطة والأنسجة الضامة المحيطة بها وأحياناً مع الألم والمذل المنتشر للأسفل حتى الساعد بسبب الضغط على الجذور العصبية.
- s. chronica ankylopoietica (= ankylosing spondylitis)** داء الفقار الجاسي المزمّن؛ التَّهَابُ الْفَقَارِ الرُّوماتويدي.
- lumbar s.** فَقَارٌ قَطْنِيّ. مرض مفصلي تنكسي يصيب الفقرات القطنية والألواح بين الفقرات ويسبب الألم والتيبس وأحياناً مع الانتشار الوركي بسبب الضغط على الجذور الذي تولده الألواح المنزقة أو النابتات العظمية.
- s. uncovertebralis** فَقَارٌ شِصِّي فَقَارِيّ. فقار رقبتي يصيب الناتئ الشِصِّي لإحدى الفقرات.
- spondylosyndesis** التَّحَامُ الْفَقَارِ.
- spondylotomy (= rachitomy)** بَضْعُ السَّيْسَاءِ.
- spondylous (= vertebral)** فَقَارِيّ.
- spongioblast** 1. إِحْدَى الزُّوْمَةِ الإسْفَنْجِيَّةِ. 2. الخلايا الظهارية التي تتطور حول الأنبوب العصبي والتي يتحول بعضها بعد ذلك إلى خلايا دبقية عصبية وبعضها الآخر إلى خلايا البطانة العصبية 2. خلايا لا محوارية.
- spongioblastoma (= gliosarcoma, glioblastoma)** وَرَمٌ أرومي إسفنجي؛ ساركومة دبقية. ورم يحوي أرومات الاسفنجية.
- s. multiforme** ورم أرومي إسفنجي عديد الأشكال؛ ساركومة دبقية عديدة الأشكال. ساركومة دبقية تكون خلاياها متعددة الأشكال في ترتيبها.
- s. unipolar** ورم أرومي إسفنجي أحادي القطب؛ ساركومة دبقية أحادية القطب. ساركومة دبقية تكون خلاياها الأرومات الإسفنجية أحادية الاقطاب غالباً.
- spongiocyte** خَلِيَّةٌ دَبْقِيَّةٌ؛ خَلِيَّةٌ إسْفَنْجِيَّةٌ 1. خلية دبقية عصبية 2. إحدى خلايا قشرة الغدة الكظرية ذات الجبلية الإسفنجية المفجأة.
- spongiocytoma (= spongioblastoma)** ورم أرومي إسفنجي؛ ساركومة دبقية جبلة إسفنجية.
- spongioplasm** 1. المادّة الحبيبية للمحوار 2. الخيوط الموجودة في المادّة الخلوية والمكوّنة لشبكته.
- spontaneous** عَفْوِيّ؛ تَلَفَاقِيّ. 1. إرادي، غريزي 2. يحدث من دون تأثير خارجي.
- spot** بُقْعَةٌ. مساحة محدّدة وصغيرة ومميّزة بلونها أو بموضعها.
- acoustic s's.** البَقْعُ الصَّوْتِيَّةُ. البقع الكيسية والقريبة.
- blind s. (= discus nervi optici)** البُقْعَةُ الْعَمْيَاءُ؛ قرص العصب البصري.
- cribriform s's. (= maculae cribrosae)** البَقْعُ المِصْفُوفِيَّةُ.
- pain s's.** بُقْعُ الأَلَمِ. نقاط على الجلد من الممكن عندها فقط تنبيه حس الألم.
- temperature s's.** بُقْعُ الحَرَارَةِ. بقع البرودة أو الحرارة عادة ما تكون غير حساسة للألم والضغط وحساسة للبرودة والحرارة على التوالي وهي مرتبة بخطوط عادة ما تكون مقوسة.
- vital s.** بُقْعَةُ حَيَوِيَّةٌ. اسم يطلق أحياناً على

- أحد المراكز المستقلة الرئيسية في البصلة (النخاع المستطيل) والضرورية للحياة.
- staccato (= staccato speech)** نُطْقٌ مُفَكَّكٌ.
- staggers** تَرْتُّجٌ. 1. دُوار، سدر 2. نوع من الدوار يحدث في داء الفواص.
- blind s.** تَرْتُّجٌ أَعْمَى. 1. دوار 2. التسمم الحاد بالسلينيوم في الحيوانات.
1. مُلَوَّن 2. تَلَوَّن؛ لَوَّن. 1. مادة أو صبغة تستعمل لتلوين مقاطع الأنسجة وتهيئتها للفحص المجهرى. 2. عملية تلوّن الأنسجة.
- staining** تَلَوْنٌ. عملية تلوين الأنسجة.
- Golgi mixed method s.** طَرِيقَةُ تَلَوْنٍ غُولْجِي المُمْتَطِطَةِ. طريقة لتلوين الخلايا العصبية وفروعها.
- Nissl s.** تَلَوْنٌ نِيْسِل. عملية تلوين خاصة لدراسة أجسام الخلايا العصبية.
- Weigert's myelin sheath s.** طَرِيقَةُ تَلَوْنٍ وَيغَرْت لِلفُغْد المِيَالِينِي. طريقة لتلوين الغمد المياليني لفروع الخلايا العصبية.
- Weigert's neuroglia fiber's.** طَرِيقَةُ تَلَوْنٍ وَيغَرْت لِالْأَيَافِ الدَبَقِيَّةِ. طريقة معقدة لإظهار الألياف الدبقية وتعمل بصورة جيدة في أنسجة الإنسان.
- stalk** سَوَيْقَةٌ. بنية رفيعة وطويلة تشبه سويق الشجرة.
- cerebellar s.** سَوَيْقَةُ المَخِيخ. أي من سويقات المخيخ الثلاث على كل من جهتيه.
- hypophesial s.** سَوَيْقَةُ النُخَامِي. 1. قمع الوطاء 2. جزء النخامية الحديبي.
- Infundibular s.** قِمْعُ الوِطَاء.
- neural s. (= infundibulum hypothalami)** قِمْعُ الوِطَاء.
- optic s.** السَوَيْقَةُ البَصَرِيَّةُ. بنية رفيعة تربط الحويصلة البصرية بجدار الدماغ في الجنين.
- pituitary s.** السَوَيْقَةُ النُخَامِيَّةُ. 1. قمع الوطاء 2. جزء النخامية الحديبي.
- s's. of thalamus (= thalamic peduncles)** سَوَيْقَاتُ المِهَاد.

- state** حَالَةٌ. (ج: حَالَات). 1. حالة أو مقام 2. نقطة تحول أو تبدل نوبة أحد الأمراض.
- acute confusional s. (= delirium)** حَالَةٌ تَخْلِيطِيَّةٌ حَادَّةٌ؛ هذيان.
- alpha s.** حَالَةٌ أَلْفَا. حالة الارتخاء واليقظة الهادئة المترافقة مع موجات ألفا الدماغية السائدة في الفعالية الكهربائية للدماغ.
- anelectrotonic s.** حَالَةُ التَّوَثُّرِ الكَهْرَبَائِي المَصْغِدِي. الحالة التي تحدث في العصب بالقرب من المصدر خلال مرور تيار مستمر فيه.
- anxiety s. (= anxiety neurosis)** حَالَةُ قَلَقٍ. عصاب قلقي.
- anxiety tension s. (= neuromuscular hypertension)** حالة التوتر القلبي؛ قَرْطُ الضَّغْطِ العَصَبِيِّ العَضَلِيِّ. حالة زيادة الاستثارية والهيجونية للاستجابة الانعكاسية.
- borderline s.** حَالَةٌ حَدِّيَّةٌ. مصطلح تشخيصي يستعمل عند وجود صعوبة لمعرفة الأعراض فيما إذا كانت عصابية أو نفسية.
- catelectrotonic s.** حَالَةُ التَّوَثُّرِ الكَهْرَبَائِي المَهْبِطِي. حالة العصب بالقرب من المهبط عند مرور تيار مستمر فيه.
- central excitatory s.** حَالَةُ الإِسْتِثَارَةِ المَرْكَزِيَّةِ. حالة يختزن فيها في مركز انعكاسي في النخاع الشوكي عدد من المنبهات التي لا تعبّر عن نفسها في الاستجابة الانعكاسية.
- dreamy s.** حَالَةٌ أَحْلَامِيَّةٌ. حالة تغيير في الوعي تدوم لبضعة دقائق وتترافق مع الأهلاس وتشاهد في أوقات الفص الصدغي.
- epileptic s. (= status epilepticus)** حالة صرعية؛ حَالَةٌ صَرْع مُسْتَمِر.
- hypnagogic s.** حَالَةٌ مُنَوِّمة. حالة نصف الوعي التي تسبق النوم مباشرة.
- hypnoid s.** حَالَةٌ نَعَاسِيَّةٌ. في نظرية فرويد هي التغيير في حالة الوعي والتي تتصف بارتفاع حالة الإيحاء التي تحصل في الهستيريا أثناء الكرب العاطفي والتي تكون الأساس لتكوين الأعراض الهستيرية الجسدية.
- hypnopompic s.** حالة غيبوبة سطحية تالية



- للنوم؛ **حَالَةٌ** بعد **النَّوْمِ**. حالة نصف الوعي التي تسبق مباشرة الاستيقاظ الكامل من النوم وتستمر لفترة قصيرة بعد ذلك.
- **local excitatory s.** **حَالَةُ الإِسْتِثَارَةِ المَوْضِعِيَّةِ**. حالة العصب التي يولدها منه غير كاف.
- **persistent vegetative s.** **الحَالَةُ الإِنْبَاتِيَّةِ المُسْتَدِيمَةِ**. حالة عدم الاستجابة الكاملة أثناء حالة اليقظة الناتجة عن إصابة الدماغ بأي مستوى كان ويتصف بقشرة دماغية غير عاملة وغياب الاستجابة التمييزية الموائمة للمنبهات الخارجية وللمحيط وعدم الحركة والصمات ويكون المخطط الكهربائي للدماغ متساوي التكهرب أو يظهر فعالية شاذة.
- **twilight s.** **حَالَةُ الغَلَسِ**. حالة وقتية من فقدان الوعي يمكن أن يقوم المرء خلالها ببعض الفعاليات بصورة لا إرادية ومن دون أن يتذكرها بعد ذلك.
- status (= state)** **حَالَةٌ**. (ج: خَالَاتٌ).
- **absence s.** **حَالَةُ غِيَابِ**. تغييم الوعي المستمر لعدة ساعات من دون فترات فعاليات دماغية طبيعية والقليل من الحركات النمطية ولكن من دون فعالية حركية شاذة.
- **s. choreicus** **حَالَةُ رَقْصِيَّةٍ**. نوع شديد ومستمر من الرَقْصِ.
- **s. convulsivus (= s. epilepticus)** **حَالَةُ إَخْتِلَاجِيَّةٍ**. حالة صرعية مستمرة.
- **s. cribalis (= s. cribrosus)** **حَالَةُ مِصْفُويَّةٍ**. حالة الدماغ الشبيهة بالغربال بسبب توسع الأحياز الملمية حول الأوعية.
- **s. criticus** **حَالَةُ حَرْجَةٍ**. حالة من النوبات التابسية الشديدة والمستمرة.
- **s. dysraphicus** **حَالَةُ سَوْءِ الرَّفْوِ**. الانفلاق المغلوط للأنبوب العصبي الجنيني الذي يولد تكويناً مغلوط لبنيات الخط الوسطي عند البالغين كالذي يحدث في العماد الفقري وعظم القص والشديين والحنك.
- **s. epilepticus** **حَالَةُ الصَّرَعِ المُسْتَمِرِّ**. سلسلة من الاختلاجات الصرعية المتلاحقة بسرعة من دون أية فترة وعي بين النوبة والأخرى.
- **s. hemicranicus (= migrainicus s.)** **حَالَةُ شَقِيقِيَّةٍ**. حالة تتصف بنوبات معاودة ومستمرة لداء الشقيقة.
- **s. lacunaris (= s. lacunosus)** **حَالَةٌ جَوْبِيَّةٍ**. حالة دماغية تتصف بتكون عدد من الاحتشاءات أو من فقدان مادة الدماغ.
- **s. marmoratus** **حَالَةٌ رُخَامِيَّةٍ**. حالة تتصف بفطر تنزع الألياف العصبية للجسم المخطط كما يحصل في متلازمة فوغت.
- **petit mal s.** **حَالَةُ الصَّرَعِ الصَّغِيرِ**. حالة تخليط فكري تدوم لعدة دقائق أو ساعات وتترافق بموجات دماغية مستمرة من نوع الموجة والسفافة تشاهد في التخطيط الكهربائي للدماغ بمعدل 3 دورات بالثانية.
- **s. raptus** **حَالَةُ شَطَطٍ**. حالة ذهول.
- **s. spongiosus** **الحَالَةُ الإسْفَنْجِيَّةِ**. تنفج منتشر وغزير في قشرة الدماغ.
- **s. verrucosus** **حَالَةُ بروقِيَّةٍ**. مظهر قشرة الدماغ الشبيهة بالتؤلولي يتكون من سوء ترتيب الأرومات العصبية مما يولد عدم انتظام شقوق القشرة واتلافها بصورة غير متوقعة.
- **s. vertiginosus** **حَالَةُ دَوَارِيَّةٍ**. حالة دوار طويلة.
- staxis (= hemorrhage)** **نَزْفٌ**.
- stelletomy** **إِسْتِنْصَالُ العُقْدَةِ النَّجْمِيَّةِ**. استئصال العقدة النجمية للتفريغ عن الألم.
- stellreflex (= postural reflex)** **مُنْعَكَسٌ وَضْعِيٌّ**.
- stenobregmatic** **ضَيْقُ الهَامَةِ**. ضيق القسم الأمامي العلوي من الرأس.
- stenocephalous** **مُسْنَمُ الرَّأْسِ**. ضيق الرأس.
- stenocephaly** **تَسْنَمُ الرَّأْسِ**. تضيق الرأس الشديد.
- stenocortaphia, stenocortaphy** **تَضْيِيقُ الصَّنْغِ**. تضيق المنطقة الصدغية من الرأس.
- stereoanesthesia (= asteriognosis)** **عَمَةُ التَّجَسُّيمِ**. نقص القدرة على معرفة نوع الأجسام بتحسس حجمها ووزنها وبنياتها.
- stereoencephalotomy** **بَضْعُ الدماغِ**. **المَجْسَمُ؛ بَضْعُ الرَّأْسِ المَجْسَمِ**. الجراحة المجسمة للرأس.

**stereognosis** مَعْرِفَةُ التَّجْسِيمِ. 1. قابلية تحسس وإدراك شكل وطبيعة الأجسام والمواد عند لمسها. 2. إدراك الحواس لجسامة المواد.

**stereotaxis (= thigmotaxis)** التوجّه باللمس؛ انْجِدَابٌ لِمَسِّي. توجّه الكائن استجابةً لِمُنْبَهٍ لِمَسِّي.

**stereotaxy (= stereotaxic surgery)** جِرَاحَةٌ تَوْضُعيَّة. الجراحة التي تستعمل جهازاً محدداً لثلاثة أبعاد ليعين موضع القسم الذي تجري الجراحة فيه.

**stereotropism (= thigmotropism)** توجّه باللمس؛ تَوَجُّهٌ لِمَسِّي.

**stereotypy** نَمَطِيَّة. التكرار المستمر لأعمال أو كلمات تافهة لا معنى لها.

**- s. of attitude** نَمَطِيَّةٌ وَضُعيَّة. التكرار المستمر لوضعية معينة.

**- s. of movement (= echopraxia)** نَمَطِيَّة حَرَكيَّة. التكرار المستمر لحركة معينة.

**- s. of speech (= echolalia, verbi-geration)** نَمَطِيَّةٌ كَلَامِيَّة. التكرار المستمر لبعض الكلمات أو المقاطع.

**stethomyositis** إلتِهَابُ عَضَلَاتِ الصَّدْرِ.

**stethoparalysis** شَلْلُ عَضَلَاتِ الصَّدْرِ.

**sthenia** نَشَاطٌ؛ بَاسٌ. حالة قوة ونشاط.

**sthenometer** مِقْيَاسُ النَشَاط. آلة لقياس النشاط العضلي لأحد أقسام الجسم.

**sthenometry** قِيَاسُ النَشَاط. قياس نشاط الجسم.

**stigma** سِمَة. (ج: سِمَات). علامة عقلية أو جسدية أو خاصة تساعد على التعرف على إحدى الحالات أو تشخيصها.

**stimulant** مُنْبَه. (ج: مُنْبَهَات). 1. ما يولد التنبيه خصوصاً تنبيه العضلات خلال عصبها الحركي وزيادة توترها. 2. عامل أو علاج يولد التنبيه.

**- central s.** مُنْبَهٌ مَرْكَزِي. منبه الجهاز العصبي المركزي.

**- cerebral s.** مُنْبَهٌ دِمَاجِي. منبه يُنشط كل فعاليات الدماغ.

**- diffusible s.** مُنْبَهٌ غَاطِر. منبه يعمل بصورة عاجلة وشديدة ولكن بصورة عابرة أو زائلة.

**- general s.** مُنْبَهٌ عَام. منبه يعمل على كل أقسام الجسم.

**- genital s. (= aphrodisiac)** بَاهِي. منبه جنسي.

**- local s.** مُنْبَهٌ مَوْضِعي. منبه يؤثر بصورة رئيسية على القسم الموضوع عليه فقط.

**- nervous s.** مُنْبَهٌ عَصَبِي. منبه يؤثر بصورة رئيسية على المراكز العصبية مثل المنبهات الدماغية أو النخاعية.

**- spinal s.** مُنْبَهٌ نَخَاعي. منبه يعمل على النخاع الشوكي أو من خلاله.

**- topical s. (= local s.)** مُنْبَهٌ مَوْضِعي.

**stimulate** يُنْبِهُ. يثير إحدى الفعاليات الوظيفية.

**stimulation** تَنْبِيهِ. عملية التنبيه أو حالة التنبيه.

**- areal s.** تَنْبِيهِ بَاحِي. تنبيه جزء واسع من أحد أعضاء الحس.

**- audio-visual- tactile s.** تَنْبِيهِ سَمْعِي - بَصَرِي - لِمَسِّي. التنبيه النظامي المتزامن لمستقبلات السمع والبصر واللمس.

**- nonspecific s.** تَنْبِيهِ لَا نَوْعي. تنبيه أحد أعضاء الحس بمنبه غير المنبه النوعي الخاص به.


**- paradoxical s.** تَنْبِيهِ تَنَاقُضِي. تنبيه نقطة حس برودة بمنبه ساخن فيولد حساً بالبرودة بدلاً من حس السخونة.

**- paraspecific s. (= nonspecific s.)** تَنْبِيهِ لَا نَوْعي.

**- punctual s.** تَنْبِيهِ نُقْطِي. تنبيه أحد أعضاء الحس بتنبيه نقطة واحدة فيه فقط.

**stimulator** مُنْبِهُ. أي عامل أو آلة تنبه إحدى الفعاليات الوظيفية.

**stimulus** مُنْبَه. (ج: مُنْبَهَات). أي عامل أو فعل أو تأثير يولد استجابة وظيفية أو نمائية من إحدى المستقبلات أو من نسيج هيوج.



stimulatio

ديد للجلد يؤدي إلى انبعاث جسم باسيفي وتنبيه حس اللمس. كما انه يؤدي إلى تخريب النهايات العصبية الحرة  
الألم.

- **adequate s.** مُنَبِّةٌ وَافٍ. منه ذو طاقة نوعية مناسبة للتأثير على المستقبل.

- **aversive s.** مُنَبِّةٌ مُنْبِطٌ. منه يؤدي عند وضعه بعد استجابة العضو لأحد المنبهات إلى تقليل شدة استجابات ذلك العضو للمنبهات التالية له.

- **chemical s.** مُنَبِّةٌ كِيمِيَاءِيَّةٌ. مادة كيميائية تتمكن من توليد استجابة في أحد الكائنات خلال تنبيه مستقبلاته الكيميائية.

- **conditioned s.** مُنَبِّةٌ شَرْطِيَّةٌ. منه يكتسب القدرة على توليد استجابة معينة إذا كرر بالاشتراك مع منه نوعي خاص يولد تلك الاستجابة طبيعياً.

- **discriminative s.** مُنَبِّةٌ تَمَيِّزِيَّةٌ. منه يترافق مع آخر معزز له ويؤثر على نوع معين من السلوك ويمكن الشخص من التمييز بين مختلف المنبهات المشابهة له ولكنه لا يستجيب إيجابياً إلا عند وجود المنبه المعزز معه.

- **electric s.** مُنَبِّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ. منه تيار كهربائي غلفاني أو غيره يولد استجابة من نسيج حيوي.

- **eliciting s.** مُنَبِّةٌ مُثِيرٌ. منه شرطي أو غير شرطي يستثير استجابة من النسيج الهويج.

- **homologous s. (= adequate s.)** مُنَبِّةٌ وَافٍ. منه قريب من الحد العتبي.

- **liminal s.** مُنَبِّةٌ عَتَبِيَّةٌ. منه قريب من الحد العتبي.

- **reinforcing s.** مُنَبِّةٌ مُعَزِّزَةٌ. أي منه يتلو الاستجابة ويزيد من احتمال ظهورها.

- **subliminal s.** مُنَبِّةٌ تَحْتَ الْعَتَبِيَّةِ. منه تحت الحد العتبي.

- **supraliminal s.** مُنَبِّةٌ فَوْقَ الْعَتَبِيَّةِ. منه فوق الحد العتبي.

- **threshold s.** مَنَبَّةٌ عَتَبِيَّةٌ. منه له أقل درجة من الشدة الكافية لتوليد الاستجابة.

- **unconditioned s.** مُنَبِّةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ. منه يولد استجابة لا شرطية.

**stomalgia (= stomatalgia)** أَلَمُ الْفَمِ. ألم في الفم.

**stomatodynia** أَلَمُ الْفَمِ. ألم في الفم أو التهاب الحلق.

**strain** إِجْهَادٌ. فرط النشاط والتمارين الجسدية لحد مضر.

**stratum** طَبَقَةٌ. (ج: طَبَقَاتٌ). كتلة من

مادة صفيحية الشكل متساوية السمك تقريباً وقد تكون واحدة من عدة طبقات.

- **s. album profundum corporis quadri-gemini** الطَبَقَةُ الْبَيْضَاءُ الْعَمِيقَةُ لِلْجِسْمِ الرَّبَاعِيِّ. طبقة من المادة البيضاء بين الجسم الرباعي

والطبقة السنجابية المركزية لمسال الدماغ.

- **s. cerebrale retinae (= pars nervosa retinae)** الْجُزْءُ الْعَصَبِيُّ لِلشَّبَكِيَّةِ.

- **s. ganglionare nervi optici** الطَبَقَةُ الْعُقْدِيَّةُ لِلْعَصَبِ الْبَصَرِيِّ.

- **s. gangliosum cerebelli** الطَبَقَةُ الْعُقْدِيَّةُ لِلْمُخِيخِ. الطبقة السنجابية الرقيقة من قشرة المخيخ والمكونة من طبقة واحدة من خلايا بركنجي، وتسمى أيضاً حلقة بركنجي.

- **s. granulosum cerebelli** الطَبَقَةُ الْحَبَبِيَّةُ لِلْمُخِيخِ. الطبقة العميقة من قشرة المخيخ وهي تحتوي على العديد من العصبونات الصغيرة (خلايا حبيبية) وتفصلها طبقة بركنجي عن الطبقة الجزيئية.

- **strata (grisea et alba) colliculi superioris** الطَبَقَاتُ (السَّنْجَابِيَّةُ وَالْبَيْضَاءُ) لِلسُّوَيْقِ الْعُلَوِيِّ.

السنجابيتان والبيضاويتان وتتكون من خلايا عصبية مختلفة الأنواع. وتكون الطبقتان السنجابية والبيضاء المتوسطتان من الباحة الواردة الرئيسية للسويق وتكون الطبقتان السنجابية والبيضاء العميقتان الباحة الصادرة الرئيسية للسويق.

- **s. griseum centrale cerebri (= substantia grisea centralis cerebri)** الْمَادَّةُ السَّنْجَابِيَّةُ الْمَخِيَّةُ الْمَرْكَزِيَّةُ.

- **s. Interolivare lemnisci** طَبَقَةُ الْفَتِيلِ بَيْنَ الزَيْتُونَتَيْنِ.

الزيتونيتين. الياف من النواتين الزيتونيتين والاسفينية التي تصعد بين النواتين لتكون الفتيل الإنسي.

- **s. lacunosum** الطَبَقَةُ الْجَوِيَّةُ. الطبقة الليفية التي تقع بين الطبقة الشعية والطبقة الجزيئية

للوطاء وتتكون بصورة رئيسية من طبقة الياف كثيفة مترافقة مع الياف محاور شيفر الجانبية الصاعدة من الشكوة والمحاور والفروع الجانبية الصاعدة من الطبقة الموجهة.

- s. lemnisci (= s. interolivare lemnisci)  
طَبَقَةُ الْفَتِيلِ بَيْنَ الزَيْتُونَتَيْنِ.
- s. lucidum hippocampi الطَبَقَةُ الصَّافِيَّةُ  
لِلْحُصَيْنَيْنِ. الجزء الخلوي (غير الليفي) من طبقة الخلايا الهرمية للحصين.
- s. moleculare cerebelli الطَبَقَةُ الْجَزْيِيَّةُ  
لِلْمُخِيخِ. الطبقة السطحية لقشرة المخيخ والتي تحوي نسبياً عدداً قليلاً من العصبونات النجمية ومفصلة عن الطبقة الحبيبية بطبقة بركنجي.
- s. moleculare hippocampi الطبقة  
الْجَزْيِيَّةُ الْحُصِينِيَّةُ. الطبقة السطحية للحصين حيث تنتهي النهايات القمية لتغضنات الخلايا الهرمية.
- s. neuronorum piriformium طَبَقَةُ  
الْعَصْبُونَاتِ الْكُفْثَرِيَّةِ الشَّكْلِ. طبقة عصبونات بركنجي تقع بين الطبقة الجزيئية الظاهرة والطبقة الحبيبية الباطنة لقشرة المخيخ ويعتبرها البعض الطبقة العميقة للطبقة الجزيئية.
- s. nucleare medullae oblongatae الطَبَقَةُ  
النُّوَوِيَّةُ لِلْبَصْلَةِ. عمود المادة السنجابية الذي يوجد في النخاع المستطيل (البصلة) والذي يحوي نوى الأعصاب القحفية.
- s. opticum الطَبَقَةُ الْبَصَرِيَّةُ. طبقة من الألياف  
البيضاء في الأكمة العلوية تحت الطبقة السنجابية مباشرة.
- s. oriens الطَبَقَةُ الْمَتَّجِهَةُ. إحدى طبقات الحصين  
التي تتكون من عصبونات ومحاور صاعدة (خلايا ذات سلة) وتفرعات التغضنات القاعدية للخلايا الهرمية والفروع الجانبية للمحاور والواقعة بين الشكوة والطبقة الهرمية للوطاء.
- s. plexiforme cerebelli (= s.  
moleculare cerebelli) الطَبَقَةُ الضَّفِيرِيَّةُ  
لِلْمُخِيخِ؛ الطبقة الجزيئية للمخيخ.
- s. pyramidale الطَبَقَةُ الْهَرْمِيَّةُ. طبقة مزدوجة  
واضحة الحدود من الخلايا الهرمية التي تمتد تغضناتها من الطبقة الموجهة حتى الطبقة الجزيئية للحصين.
- s. radiatum الطَبَقَةُ الشُّعْبِيَّةُ. الجزء السطحي  
من طبقة الخلايا الهرمية للحصين والتي يتكون

معظمها من التغضنات القمية مع المحاور وبعض الخلايا الهرمية.

- white s. of quadrigeminal body, deep  
(= s. album profundum corporis  
quadrigemini) الطَبَقَةُ الْبَيْضَاءُ الْعَمِيقَةُ  
لِلْجِسْمِ الرَّبَاعِيِّ.
- s. zonale corporis quadrigemini الطَبَقَةُ  
الْمَنْطَقِيَّةُ لِلْجِسْمِ الرَّبَاعِيِّ. طبقة سطحية من الألياف البيضاء للجسم الرباعي.
- s. zonale thalami الطَبَقَةُ الْمَنْطَقِيَّةُ لِلْمَهَادِ.  
طبقة من الألياف نخاعية تغطي الناحية الظهرية من ظهر المهاد.
- تَلَمَّ. (ج: أَتْلَامٌ). خط أو سطر.
- medullary s. (= neural groove) الْأَخْدُودُ  
الْعَصْبِي.
- meningeal s. (= tache cerebrale) التَلَمُّ  
السِّحَاشِي؛ اللطخة الدماغية.

إِبْصَارٌ مَقْلُوبٌ. 1. خلل  
إدراكي تتراءى فيه الأجسام للشخص بصورة مقلوبة. 2. نوع من صعوبة القراءة لدى الأطفال وخصوصاً للحروف المراتبة مثل الحروف (b-d) و (p-q)، وقد يغلط في تلفظها أو كتابتها.

1. إجهاد. 2. كَرْبٌ. (ج: كُرُوبٌ).

1. ضغط أو تأثير يفرض بالقوة. 2. مجموع الاستجابات البيولوجية لأي منه معاكس أو مؤز سواء كان فيزيائياً أو كيميائياً أو فكرياً أو عاطفياً داخلياً كان أو خارجياً والذي يمكن أن يؤدي إلى أي اضطراب لاستتباب الكائن، وإذا لم تكن هذه الاستجابات كافية لمعالجة هذه المنبهات فيؤدي ذلك إلى الاضطراب والكرب.

سَطْرٌ. خط أو بنية ضيقة شريطية الشكل،  
وهو اصطلاح يستعمل لمجموعة ضيقة طولانية من الألياف العصبية في الدماغ.

- acoustic striae (striae medullaris  
ventriculi quarti) السُّطُورُ السَّمْعِيَّةُ،  
السُّطُورُ النِّخَاعِيَّةُ لِلْبَطْنِ الرَّابِعِ.
- auditory striae (= striae medullaris  
ventriculi quarti) السُّطُورُ السَّمْعِيَّةُ؛
- s. diagonalis (= diagonal band of  
Broca) السَطْرُ الْمَائِلُ. شريط من الألياف

العصبية التي تطوق المنطقة الذنبية للمادة المثقبة الامامية حيث يلاصق السبيل البصري المتواصل على جهته الذنبية الوحشية مع الباحة حول اللوزية ويمر للجهة الراسية الانسية فوق التصالبة البصرية ليندمج مع التلفيف جنب الانتهاءي.

#### - s. laminae granularis externa corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الحَبِيبِيَّةِ الظَّاهِرَةِ  
لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية المنحرفة الاتجاه في الطبقة الحبيبية الظاهرة لقشرة المخ.

#### - s. laminae granularis interna corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الحَبِيبِيَّةِ البَاطِنَةِ  
لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية البيضاء المنحرفة الاتجاه في الطبقة الحبيبية الباطنة لقشرة المخ. ويكون هذا الخط سميكا في التلم المهمازي ويشاهد بسهولة ويسمى خط غيناري.

#### - s. laminae molecularis corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الحَبِيبِيَّةِ لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية المغمدة المنحرفة الاتجاه في الطبقة الجزئية لقشرة المخ.

#### - s. laminae plexiformis corticis cerebri

(= laminae molecularis corticis cerebri)  
سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الضَّفِيرِيَّةِ لِقَشْرَةِ المَخ.

#### - s. laminae pyramidalis interna corticis cerebri

سَطْرُ الصَّفِيحَةِ الهرَمِيَّةِ البَاطِنَةِ لِقَشْرَةِ المَخ. شريط من الالياف العصبية المنحرفة الاتجاه في الطبقة الهرمية الباطنة لقشرة المخ.

#### - s. lanciaii (= s. of Lanci = s.

longitudinalis medialis corporis callosi)  
سَطْر لانسي؛ السَطْرُ الطُولَانِي الإنْسِي للجِسْمِ الثَّقْنِي.

#### - s. longitudinalis lateralis corporis callosi

السَطْرُ الطُولَانِي الوَحْشِي للجِسْمِ الثَّقْنِي. أحد الشريطين الدقيقين من الالياف المغمدة التي تكون الحرف الطولاني للستر السنجابي على الناحية العلوية الانسية من كل من نصفي الجسم الثقني.

#### - s. longitudinalis medialis corporis callosi

السَطْرُ الطُولَانِي الإنْسِي للجِسْمِ الثَّقْنِي. أحد الشريطين الرقيقين من الالياف المغمدة التي تكون الحرف الطولاني للستر السنجابي على الناحية العلوية من كل من نصفي الجسم الثقني.

#### - s. medullaris thalami السَطْرُ الثَّلَاجِي

للمهاد. حزمة ليفية تبدأ من التلفيفين تحت الثقني وجنوب الانتهاءي ومن الباحتين امام البصرية واللوزية وتجري للخلف على طول اتصال السطحين الظهري والإنسي للمهاد لتصل نواة العنان.

#### - striae medullares ventriculi quarti

السُطُورُ الثَّلَاجِيَّةُ لِلْبَطْنِ الرَّابِع. حزم الياف بيضاء تسير بصورة مستعرضة عبر قاع البطين الرابع وهي تبدأ من النوى المقوسة وتمر ظهرياً بالقرب من خط الوسط وبعد وصولها للبطين الرابع تدخل أخيراً السويقة المخيخية السفلية.

#### - meningitic s. (= tache cerebrale) السطر

السحائي؛ لطفة المخ.

#### - striae olfactoriae medialis et lateralis

السُطُورُ الشَّمِّيَّةُ الإنْسِيَّةُ والوَحْشِيَّة. الياف السبيل الشمي المتشعبة التي تنفرج إلى الشريطين الإنسي والوحشي عند المثلث الشمي لتحد المادة المثقبة الامامية. ويغطي التلفيفان الشيمان الوحشي والإنسي هذين الشريطين على التوالي.

#### - s. olfactory, intermediate السَطْرُ الشَّمِّي

الْمُتَوَسِّط. شريط صغير من الالياف يمر من مركز المثلث الشمي ليثقب المادة المثقبة الامامية وهو غير موجود دائماً.

#### - s. terminalls السَطْرُ الإنْتِهَائِي. شريط من

الالياف على طول الحافة الوحشية للسطح البطني للمهاد يغطي الوريد المهادي المخططى ويتبع خط الوريد مؤشراً خط انفصال المهاد عن النواة الذنبية وهو يمتد من منطقة الثقبية بين البطينين إلى القرن الصدغي للبطين الجانبى حاملاً اليافاً من النواة اللوزية إلى الباحت الحاجزية والوطائية والمهادية.

#### - striae transversae corporis callosi

السُطُورُ المُسْتَعْرِضَةُ للجِسْمِ الثَّقْنِي. اشربة مستعرضة من الياف عصبية على السطح العلوي للجسم الثقني.

#### مُخَطَّطِي striatonigral (= strionigral)

أسودى. ساقط من الجسم المخطط إلى المادة السوداء.

#### striatum (= 1. striped 2. corpus

1. مُخَطَّط striatum 3. neostriatum)

2. الجِسْمُ المُخَطَّط 3. المُخَطَّطُ الجَدِيد.

**stroke** سَكَّة؛ ضَرْبَةٌ. نوبة شديدة حادة ومباغة. **stroke** سَكَّة. - apoplectic s. (= apoplexy)

- heat s. ضَرْبَةُ الْحَرَارَةِ. حالة تتولد عن التعرض الطويل للحرارة المفرطة وتتصف بتبيس الجلد والدوار والصداع والعطش والغثيان والمغص العضلي وقد ترتفع درجة الحرارة لدرجة خطرة بعكس الإنهاك الحراري حيث يمكن أن تكون درجة الحرارة دون الحد السوي.

- paralytic s. سَكَّة شَلَلِيَّة. نوبة شلل فجائية تنتج عن إصابة دماغية أو نخاعية.

stroma سَدَى. النسيج السائد أو مطرس العضو بالمقارنة مع نسيجه الوظيفي أو المتن.

strychnine سترِكْنِين. قلواني سام جداً يولد استثارة كل أقسام الجهاز العصبي المركزي يقوم بذلك بحصر كل النبضات المثبطة بعد التشابكية. وكان يستعمل كمنبه مركزي مع الأدوية الهرورة.

stun إَغْمَاء. إصابة الشخص بفقدان الوعي نتيجة صدمة أو ضربة شديدة.

stupefacient مخدِّر؛ مُذهِّل. ما يولد الذهول أو عامل يولد الذهول.

stupefactive مُخدِّر؛ مُذهِّل. ما يولد الخدر أو الذهول.

stupor ذُهول. فقدان الوعي الجزئي أو الكامل تقريباً يظهر في الأشخاص الذين يستجيبون فقط للمنبهات الشديدة. وفي الأمراض النفسية هو ضعف قابلية الاستجابة للمنبهات.

- anergic s. ذُهولٌ وَهْنِي. ذهول مع ضعف الحركة.

- benign s. ذُهولٌ حَمِيد. حالة ذهول تشاهد أحياناً في الطور الاكتئابي للذهان الهوسي الاكتئابي.

- epileptic s. ذُهولٌ صَرْعِي. ذهول يتلو نوبة اختلاج الصرع.

- postconvulsive s. (= epileptic s.) ذُهولٌ تَالِي لِإِخْتِلَاج. ذهول يتلو النوبة الصرعية.

stuttering تَأَنُّة. مشكلة كلامية تشمل ثلاثة عوامل (أ) عدم انسيابية الكلام وخصوصاً إعادة بعض أقسام الكلمات أو كل الكلمات وإطالة بعض الأصوات بين الكلمات أو تضمين بعض الكلمات أو الأصوات مع فترات طويلة، (ب) رد فعل السامعين لعدم انسيابية نطق المتكلم وحكمهم عليه بأنه غير

مقبول وشاذ، (ج) رد فعل المتكلم لردود فعل المستمعين له ورفضهم كلامه ورد فعله هو لنفسه واعترافه بأنه متأثر.

- labiochoreic s. (= labiochorea) تَاتَاة الرقص الشفوي؛ الرقص الشفوي.

1. غير مُكتمل الوعي 2. دُونُ subconscious الشُعُور. حالة كون الشخص واعٍ جزئياً.

subconsciousness عَدَمُ اكتمالِ الوَعْي. حالة وعي جزئي.

subdelirium هَذْيَانٌ بَسِيط. هذيان جزئي.

subdural تَحْتَ الْجَافِيَّة. ما يقع بين الجافية والعنكبوتية.

subjective شَخْصَانِي. متعلق بالشخص أو يدركه الشخص المصاب نفسه ولا تدركه حواس الأشخاص الآخرين.

subparalytic مَشْلُولٌ جُزْئِيًّا. مُصابٌ بشكل غير كامل.

subpial تَحْتَ الْحَنُون. ما يقع تحت الأم الحنون.

substance مَادَّة. (ج: مَوَاد). المادة التي يتكون منها الجسم أو العضو.

- neurosecretory s. مَادَّةُ الْإِفْرَازِ الْعَصَبِي.

- s. of nissl (= Nissl's bodies) أَجْسَامُ نَيْسِل.

- receptive s. مَادَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ. مادة فرضية من المفروض أنها موجودة في النسيج العضلي بالقرب من الصفيحة الانتهاثية الحركية للأعصاب وتقوم بوظيفة نقل الدفعات العصبية.

- reticular s. of medulla oblongata (= reticular formation of medulla oblongata) المَادَّةُ الشَبَكِيَّةُ لِلْبَصَلَةِ.

- Rolando's gelatinous s. (= substantia gelatinosa) مَادَّةُ رُولَانْدِ الْهَلَامِيَّة؛ المَادَّةُ الْهَلَامِيَّة.

- tigroid s. (= Nissl's bodies) مَادَّةُ نَمْرَاء؛ أَجْسَامُ نَيْسِل.

- transmitter s. (= neurosubstance) مَادَّةُ نَاقِلَةٍ؛ النَاقِلَةُ الْعَصَبِيَّة.

- white s. (= substantia alba) المَادَّةُ البَيْضَاءُ.
- white s. of Schwann (= myelin) مادة شوان (مِيلِين) البيضاء: مِيلِين.

- white s. of spinal cord المَادَّةُ البَيْضَاءُ لِلنُّخَاعِ.

substantia (= substance) مَادَّةٌ.

- s. alba المَادَّةُ البَيْضَاءُ. النسيج العصبي الأبيض الذي يكون الجزء الناقل للدماغ والنخاع ويتكون بصورة رئيسية من الألياف العصبية النخاعية والمرتبطة في ثلاثة حبال الظهرية والبطنية والجانبية.

- s. alba medullae spinalis المَادَّةُ البَيْضَاءُ لِلنُّخَاعِ. وتتكون من الألياف عصبية مِيلينية مرتبة بحزم طولانية متوازية.

- s. cinerea (= s. grisea) المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ.

- s. corticollis cerebelli (= cortex cerebelli) مَادَّةُ القَشْرَةِ المخيخية.

- s. ferruginea (= locus ceruleus) المَادَّةُ الحَدِيدِيَّةُ: المَوْضِعُ الأزرق.

- s. gelatinosa centralis المَادَّةُ الهَلَامِيَّةُ المَرْكَزِيَّةُ. منطقة المادة الهلامية الشكل المكونة أساساً من الدبق العصبي ولكنها تحتوي أيضاً بعض الألياف والخلايا العصبية والتي تحيط بالقناة المركزية للنخاع الشوكي والتي تحيط بها المادة السنجابية المركزية المتوسطة.

- s. gelatinosa collimnae posterioris (= Rolando's gelatinous substance) المَادَّةُ الهَلَامِيَّةُ لِلنُّخَاعِ: المادة الهلامية لرولاندا. الغطاء الهلامي الشكل الذي يكون القسم الظهري من العمود الظهري للنخاع والذي يتكون من عصبونات من نوع غولجي نمط 2 وطبقة من الخلايا العصبية.

- s. grisea المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ. نسيج المادة السنجابية المكون من أجسام الخلايا العصبية والألياف عصبية غير نخاعية ونسيج ضام.

- s. grisea centralis cerebri المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلدِّمَاغِ. المادة السنجابية التي تحيط بمسال الدماغ.

- s. grisea intermedia centralis medullae spinalis (= s. intermedia

centralis medullae spinalis) المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ المَتَوَسِّطَةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلنُّخَاعِ.

- s. grisea intermedia lateralis medullae spinalis (= s. intermedia lateralis medullae spinalis) المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ المَتَوَسِّطَةُ الوَحْشِيَّةُ لِلنُّخَاعِ.

- s. grisea medullae spinalis المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّةُ لِلنُّخَاعِ. مادة تحتوي القليل من الألياف النخاعية ولكنها تحوي الكثير من أجسام الخلايا العصبية والألياف عصبية عديمة المِيلِين وأوعية دموية أكثر مما توجد في المادة البيضاء.

- s. innominata المَادَّةُ اللَّامُسَمَّاةُ. نسيج عصبي خلف المادة المثقبة الأمامية مباشرة وبالجبهة البطنية من الكرة الشاحبة والعروة العدسية.

- s. intermedia centralis medullae spinalis المَادَّةُ المَتَوَسِّطَةُ المَرْكَزِيَّةُ لِلنُّخَاعِ. الشريط المستعرض للمادة السنجابية التي تحيط بالقناة المركزية للنخاع الشوكي وخارج المادة الهلامية المركزية والذي يربط الكتلتين اليسرى واليمنى للمادة السنجابية.

- s. intermedia lateralis medullae spinalis المَادَّةُ المَتَوَسِّطَةُ الوَحْشِيَّةُ لِلنُّخَاعِ. المادة السنجابية للنخاع التي تتوسط بين المادة المركزية المتوسطة والعمود الوحشي والعمودين البطني والظهري.

- s. nigra المَادَّةُ السَّوَدَاءُ. طبقة المادة السوداء التي تفصل الأقسام الظهرية من السويقتين المخيتين (سقيفة الدماغ المتوسط) عن الأقسام البطنية منهما وتتكون من القسم الظهري المكتنز الذي يحوي العديد من الخلايا الصباغية ومن القسم الشبكي البطني الذي تحوي خلاياه القليل من الصباغ.

- s. perforata anterior (= s. perforata rostralis) المَادَّةُ المَثْقَبَةُ الأَمَامِيَّةُ.

- s. perforata interpeduncularis المَادَّةُ المَثْقَبَةُ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ. قاع الحفرة بين السويقتين المخيتين التي تثقبها الفروع المركزية للشريان المخي الخلفي، وتسمى أيضاً المادة المثقبة الخلفية.

- s. perforata posterior (= s. perforata interpeduncularis) المَادَّةُ المَثْقَبَةُ الخَلْفِيَّةُ.



- **s. perforata rostralis (= s. perforata anterior)** المَادَّةُ الْمُثَقَّبَةُ الأَمَامِيَّةُ. باحة على

قاع الدماغ أمام السبيلين البصريين تحوي العديد من الثغوب التي تمر خلالها الفروع الصغيرة من الشريائين الدماغيين المتوسط الامامي إلى البنيات العميقة.

- **s. reticularis alba of Arnold (= formatio reticularis pontis)** مادة أرنولد الشبكية (البياض: التَشَكُّلُ الشَّبَكِيُّ الجِسْرِيِّ).

- **s. reticularis medullae oblongata (= formatio reticularis medullae oblongatae)** المادة الشبكية للنخاع المستطيل: التَشَكُّلُ الشَّبَكِيُّ لِلْبَصْلَةِ.

- **s. Rolandi (= s. gelatinosa)** المَادَّةُ الهَلَامِيَّةُ. **subthalamus (= thalamus ventralis)** تحت المهاد: المِهَادُ البَطْنِيُّ.

**subwaking** يَفْظَةٌ جُزْئِيَّةٌ. وسط بين اليقظة والسبات.

**succinylcholine chloride** كلُورِيدُ السكسينيلكولين. مادة ترخي العضلات الهيكلية بالحصص عند التوصيل العصبي العضلي ويستعمل لهذه الخاصية عند التنظير الداخلي وكمساعدة عند التخدير العام لإرخاء العضلات.

**sufentanil** سَفَانْتَنِيل. دواء يستعمل كمسكن.

**suggestibility** قَابِلِيَّةُ الإِيحَاءِ. حالة الاستعداد للإيحاء.

**suggestible** قَابِلُ الإِيحَاءِ. شخص عظيم الاستعداد للإيحاء.

**suggestion** إِيحَاءٌ؛ إِقْتِرَاحٌ. 1. تمرير فكرة إلى أحد الأشخاص من الخارج 2. فكرة تمرر من الخارج.

- **hypnotic s.** إِيحَاءٌ تَنْوِيمِي. إيحاء يمرر إلى أحد الأشخاص في حالة التنويم يرحى إليه به بتغيير أحد مداركه أو ذكرياته أو ليقوم ببعض الأفعال.

- **posthypnotic s.** إِيحَاءٌ بَعْدَ التَّنْوِيمِ. غرز إيحاء في دماغ أحد الأشخاص أثناء التنويم ليقوم بعمل ما بعد زوال حالة التنويم منه.

**sulcus** تَلَمٌّ. (ج: أَثْلَامٌ). أخدود أو خندق

أو وهدة خاصة تلك التي توجد على سطح المخ والتي تفصل التلافيف عن بعضها.

- **anterolateral s. of medulla oblongata (= s. ventrolateralis medullae oblongatae)** التَلَمُّ الأَمَامِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلْبَصْلَةِ.

- **anterolateral s. of spinal cord (= s. ventrolateralis medullae spinalis)** التَلَمُّ الأَمَامِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلنَّخَاعِ.

- **s. basilaris pontis** التَلَمُّ القَاعَدِيُّ لِلْجِسْرِ. الأخدود الأمامي الناصفي في الجسر الذي يحوي الشريان القاعدي.

- **s. bulbopontinus** التَلَمُّ البَصْلِيُّ الْجِسْرِيِّ. أخدود مستعرض أمام وعلى جهتي الجسر والذي يحده عن النخاع المستطيل.

- **s. calcarinus** التَلَمُّ المِهْمَازِيُّ. تلم على السطح الإنسي للفص القذالي يفصل الإسفين عن التلفيف اللساني.

- **callosal s. (= s. corporis callosi)** تَلَمُّ الجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.

- **callosomarginal s (= s. cinguli)** التَلَمُّ الثَّقَنِيِّ الخَافِي.

- **s. callosus (= s. corporis callosi)** تَلَمُّ الجِسْمِ الثَّقَنِيِّ.

- **s. canalis innominatus (= s. nervi petrosi minoris)** تَلَمُّ القَنَاةِ اللامُسَمَّاةِ.

- **s. centralis cerebri** التَلَمُّ المَرْكَزِيُّ لِلْمُخِّ. تلم عميق نسبياً وعمودي تقريباً على سطح نصف كرة المخ وهو يفصل الفص الجبهي عن الفص الجداري.

- **s. centralis insulae** التَلَمُّ المَرْكَزِيُّ لِلْجَزِيرَةِ. خندق عميق مائل يقسم الجزيرة إلى قسم أمامي كبير وآخر خلفي صغير.

- **cerebral s., lateral (= s. lateralis cerebri)** التَلَمُّ الْوُخْشِيُّ لِلْمُخِّ.

- **sulci cerebri** أَثْلَامُ الْمُخِّ. الأخاديد بين تلافيف المخ.

- **s. chiasmatis (= s. prechiasmaticus)** التَلَمُّ التَّصَالِبِيِّ.

- **s. cinguli** التَلَمُّ الحِزَامِيُّ. تلم طويل غير منتظم الشكل على السطح الإنسي لنصف كرة المخ والذي

- يفصل التلفيف الحزامي إلى الأسفل عن التلفيف الجبهي الإنسي والفصيص جنيب المركزي إلى الأعلى ومن الممكن تقسيمه إلى القسمين الجبهي والهامشي.
- **s. cingulatus (= s. cinguli)** **التَلَمُّ الحِزَامِيّ.**
- **s. circularis insulae** **التَلَمُّ الدَائِرِيّ لِلْجَزِيرَةِ.** شق يحيط تقريباً بالجزيرة ويفصلها عن الوصاد.
- **s. collateralis** **التَلَمُّ الجَانِبِيّ.** تلم طولاني على السطح السفلي لنصف كرة المخ بين التلفيفين المغزلي المجاور للحصين.
- **s. corporis callosi** **تَلَمُّ الجِسْمِ الثَّقَنِيّ.** تلم يحيط بالناحية المحبة للجسم الثقني في قاع الشق المخي الطولاني.
- **s. dorsolateralis medullae oblongatae** **التَلَمُّ الظَهْرِيّ الوَحْشِيّ لِلْبَصَلَةِ.** امتداد علوي للثلم الظهري الوحشي للنخاع الشوكي وهو يوفر مرتكزاً لألياف الأعصاب اللساني البلعومي والمبهم والإضافي.
- **s. dorsolateralis medullae spinalis** **التَلَمُّ الظَهْرِيّ الوَحْشِيّ لِلنَّخَاعِ.** تلم طولاني على السطح الظهري الوحشي للنخاع يوفر مدخلاً للجذور النخاعية الظهرية ويفصل الحبلين الظهري والوحشي عن بعضهما.
- **s. frontalis inferior** **التَلَمُّ الجَبْهِيّ السُّفْلِيّ.** تلم طولاني قصير يفصل التلفيفين الجبهيين السفلي والوسطي عن بعضهما.
- **s. frontalis superior** **التَلَمُّ الجَبْهِيّ العُلَوِيّ.** تلم طولاني يفصل التلفيفين الجبهيين الوسطي والعلوي عن بعضهما.
- **s. habenulae** **التَلَمُّ العِنَانِيّ.** أخدود يفصل مثلث العنان عن السطح العلوي للمهاد.
- **s. hippocampi** **التَلَمُّ الحُصِينِيّ.** التلم الذي يمتد من ضمادة الجسم الثقني حتى قمة الفص الصدغي تقريباً ويكوّن الحدود الانسية للتلفيف المجاور للحصين.
- **s. horizontalis cerebelli (= fissura horizontalis cerebelli)** **الشَّقُّ الأفقي المُخَيخيّ.**
- **s. hypothalamicus** **التَلَمُّ الوِطَائِيّ.** تلم ضحل مدور على جدار البطين الثالث يمتد من الثقبية بين البطينين حتى مسال الدماغ.
- **s. Intermedius dorsalis medullae spinalis** **التَلَمُّ الْمُتَوَسِّطُ الظَهْرِيّ لِلنَّخَاعِ.** تلم طولاني في القسمين الرقبتي والصدرى من النخاع الشوكي بين الحزمتين الإسفينية والدقيقة للنخاع.
- **s. intermedius posterior medullae spinalis (= s. Intermedius dorsalis medullae spinalis)** **التَلَمُّ الْمُتَوَسِّطُ الْخَلْفِيّ لِلنَّخَاعِ.**
- **s. Intraparietalis** **التَلَمُّ دَاخِلُ الجِدَارِيّ.** تلم غير منتظم الشكل على السطح المحدب للفص الجداري وبين الفصيصين الجداريين السفلي والعلوي.
- **lateral s. of medulla oblongata, anterior (= s. ventrolateralis medullae oblongatae)** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ الأَمَامِيّ لِلْبَصَلَةِ:** التلم البطناني الوحشي للبصلة.
- **lateral s. of medulla oblongata, posterior (= s. dorsolateralis medullae oblongatae)** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ الْخَلْفِيّ لِلْبَصَلَةِ:** التلم الظهري الوحشي للبصلة.
- **lateral s. of spinal cord, anterior (= s. ventrolateralis medullae spinalis)** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ الأَمَامِيّ لِلنَّخَاعِ:** التلم البطناني الوحشي للنخاع.
- **lateral s. of spinal cord, posterior (= s. dorsolateralis medullae spinalis)** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ الْخَلْفِيّ لِلنَّخَاعِ:** التلم الظهري الوحشي للنخاع.
- **s. lateralis cerebri** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ لِلْمَخِّ.** شق عميق يبدأ من المادة المنقبة الامامية ويمتد وحشياً بين الفصين الصدغي والجبهي ثم يدور إلى الخلف بين الفصين الصدغي والجداري وهو ينقسم إلى الفروع الامامي والصاعد والخلفي ويسمى أيضاً شق سيلفيس.
- **s. lateralis mesencephali** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ لِلدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.** أخدود طولاني على جانب الدماغ المتوسط يفصل ساق المخ عن السقيفة.
- **s. lateralis pedunculi cerebri (= s. lateralis mesencephali)** **التَلَمُّ الوَحْشِيّ لِسَاقِ الْمَخِّ.**

- s. lateralis posterior medullae oblongata (= s. dorsolateralis medullae oblongatae) التَلَمُّ الْوَحْشِيُّ الْخَلْفِيُّ لِلْبَصَلَةِ.
- s. lateralis posterior medullae spinalis (= s. dorsolateralis medullae spinalis) التَلَمُّ الْوَحْشِيُّ الْخَلْفِيُّ لِلنُّخَاعِ.
- s. limitans التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ. أخدود في منتصف المسافة على السطح الداخلي لكل من الجدارين الداخليين للقناة العصبية والذي يفصله إلى الصفحة الجانحية الظهرية والصفحة القاعدية البطنية.
- s. limitans fossae rhomboideae التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ لِلْحَفْرَةِ الْمَعْيِنَةِ. أخدود طولاني على الجهة الوحشية للبارزة الانسية يمتد على طول قاع البطن الرابع.
- s. limitans Insulae (= s. circularis Insulae) التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ لِلْجَزِيرَةِ: التَلَمُّ الدائري للجزيرة.
- s. limitans ventriculorum cerebri (= s. limitans) التَلَمُّ الْمُحَدَّدُ لِطُيْنِ الدِّمَاغِ.
- s. lunatus التَلَمُّ الْهَلَالِي. وحدة صغيرة هلالية الشكل تشاهد أحياناً على السطح الوحشي للفص القذالي للدماغ.
- s. medialis cruris cerebri (= s. oculomotorius) التَلَمُّ الْإِنْسِيُّ لِسَاقِ الْمُخ؛ تلم محرك المقلة.
- s. medianus dorsalis medullae oblongatae التَلَمُّ النَّاصِفُ الظَّهْرِيُّ لِلْبَصَلَةِ. أخدود ضيق يوجد فقط في القسم المغلق من البصلة (النخاع المستطيل) والذي يمثل امتداداً للتلم الناصف الظهري للنخاع الشوكي وهو يفصل الحزمتين الدقيقتين عن بعضهما.
- s. medianus dorsalis medullae spinalis التَلَمُّ النَّاصِفُ الظَّهْرِيُّ لِلنُّخَاعِ. أخدود عمودي ضحل على السطح الظهري للنخاع الشوكي في المستوى الناصف والذي يمتد منه الحاجز الناصف الظهري وهو يفصل الحبلين الظهرين عن بعضهما.
- s. medianus posterior medullae oblongatae (= s. medianus dorsalis medullae oblongata) التَلَمُّ النَّاصِفُ الْخَلْفِيُّ لِلْبَصَلَةِ.
- s. medianus posterior medullae spinalis (= s. medianus dorsalis medullae spinalis) التَلَمُّ النَّاصِفُ الْخَلْفِيُّ لِلنُّخَاعِ.
- s. medianus ventriculi quarti للْبَطْنِ الرَّابِعِ. أخدود ناصف في قاع البطن الرابع.
- s. mesencephali medialis (= s. medialis cruris cerebri) التَلَمُّ الْإِنْسِيُّ لِلدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّطِ.
- s. of Monro (= s. hypothalamicus) تَلَمُّ مُونَرُو. التلم الوطائي.
- s. nervi oculomotorii (= s. oculomotorius) تَلَمُّ الْعَصَبِ مُحَرِّكِ الْمُقْلَةِ.
- s. nervi petrosi majoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الْكَبِيرِ. أخدود صغير في قاع الحفرة القحفية الوسطية يجري إلى الأمام وإلى الجهة الإنسية من فرجة قناة الوجهي حتى الثقب الممزقة وهو يضم العصب الصخري الكبير.
- s. nervi petrosi minoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ الصَّغِيرِ. أخدود صغير في قاع الحفرة القحفية الوسطية يجري إلى الأمام وإلى الجهة الإنسية بالجهة الوحشية من تلم العصب الصخري الكبير ويؤوي العصب الصخري الصغير.
- s. nervi petrosi superficialis majoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ السَّطْحِيِّ الْكَبِيرِ (= s. nervi petrosi majoris).
- s. nervi petrosi superficialis minoris تَلَمُّ الْعَصَبِ الصَّخْرِيِّ السَّطْحِيِّ الصَّغِيرِ (= s. nervi petrosi minoris).
- s. nervi radialis تَلَمُّ الْعَصَبِ الْكُعْبُرِيِّ. أخدود عريض مائل على السطح الخلفي للعضد لمرور العصب الكعبري والشريان العضدي العميق.
- s. nervi spinalis تَلَمُّ الْعَصَبِ النُّخَاعِيِّ. الأخدود على السطح العلوي لكل من الفقرات الرقبية الذي يمتد من الثقب الأفقية إلى الجهة الوحشية ويفصل الدورتين الامامية والخلفية عن بعضهما وهو يضم الفرع البطني من العصب الرقبى.
- s. nervi ulnaris تَلَمُّ الْعَصَبِ الزُّنْدِيِّ. أخدود ضحل عمودي على السطح الخلفي للْقَيْمَةِ الْعُضْدِ الإنسية وهو يضم العصب الزندي.

- s. obturatorius ossis pubis** التَلَمُّ السِّدَادِيُّ  
لِعَظْمِ الْعَانَةِ. أخدود يعبر السطح السفلي للجناح العلوي لعظم العانة ويوفر ممراً للعصب السدادي وللأوعية الدموية السدادية.
- s. occipitalis anterior** التَلَمُّ الْقَذَالِيُّ الْأَمَامِيُّ  
أخدود عمودي متغير على السطح المحدب للمخ والذي يعتبره البعض الخط الفاصل بين الفصين الجداري والقذالي.
- sulci occipitales laterales** الْإِتْلَامُ الْقَذَالِيَّةُ الْوُخْشِيَّةُ  
أخاديد مستعرضة تقسم التلافيف القذالية الوحشية إلى قسمين علوي وسفلي.
- sulci occipitales superiores** الْإِتْلَامُ الْقَذَالِيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ  
أتلام غير منتظمة متعلقة بالتلافيف القذالية العلوية.
- s. occipitalis transversus** التَلَمُّ الْقَذَالِيُّ  
الْمُسْتَعْرِض. تلم عمودي خلف التلافيف الزاوي والذي يساعد في تكوين الحدود الأمامية للفص القذالي أو قد يكون أحياناً من ضمنه.
- s. occipitotemporalis** التَلَمُّ الْقَذَالِيُّ الصُّدْغِيُّ  
تلم طولاني على السطح السفلي للفص الصدغي ويفصل التلافيف الصدغي السفلي عن التلافيف القذالي الصدغي الوحشي.
- s. oculomotorius** تَلَمُّ مُحَرِّكِ الْعَيْنِ  
أخدود طولاني على السطح الإنسي من القسم البطني من سويقة المخ الذي يؤدي العصب محرك العين.
- s. olfactorius lobi frontalis** التَلَمُّ الشَّمِّي  
لِلْفَصِّ الْجَبْهِيِّ. تلم مستقيم جنب السهمي على السطح السفلي للفص الجبهي والذي يضم البصلة الشمية والسبيل الشمي ويفصل التلافيف المستقيم والحجائي عن بعضهما.
- optic s. (= s. prechiasmaticus)** التَلَمُّ الْبَصْرِيُّ  
التلم أمام التصلب.
- sulci orbitales lobi frontalis** الْإِتْلَامُ الْحَاجِيَّةُ لِلْفَصِّ الْجَبْهِيِّ  
أتلام غير منتظمة بين اتلام الحجاجية للفص الجبهي.
- s. parieto-occipitalis** التَلَمُّ الْجِدَارِيُّ الْقَذَالِيُّ  
تلم في السطح الإنسي من كل من نصفي كرة المخ يجري من التلم المهادي إلى الأعلى ويؤشر الحدود بين الإسفين والطلل (أمام الاسفين) وكذلك بين الفصين الجداري والقذالي.
- s. paraolfactorius anterior** التَلَمُّ الْأَمَامِيُّ  
المجاور لِلْفَصِّ الشَّمِّي الْأَمَامِيِّ. تلم على السطح الإنسي لنصف كرة المخ بين الباحة المجاورة للشمية إلى الخلف والتلم الجبهي الأمامي من الأمام.
- s. paraolfactorius posterior** التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ  
المجاور لِلْفَصِّ الشَّمِّي. تلم مخي على السطح الإنسي لنصف كرة المخ تحت ضمادة الجسم التقني وبين التلافيفين المجاور للأنتهائي المجاور للشمي.
- polar s.** تَلَمُّ قُطْبِي  
أي من الشقوق الصغيرة التي تحيط النهاية الخلفية للتلم المهادي.
- pontobulbar s.** التَلَمُّ الْجِسْرِيُّ الْبَصْلِيُّ  
التلم الذي يفصل الجسر عن البصلة.
- pontopeduncular s.** التَلَمُّ الْجِسْرِيُّ السُّوَيْقِيُّ  
التلم الذي يفصل الجسر عن الدماغ المتوسط (الذي يمثل سويق المخ).
- s. postcentralis** التَلَمُّ خَلْفَ الْمَرْكَزِيِّ  
على السطح العلوي الوحشي للمخ يفصل التلافيف خلف المركزي عن باقي أقسام الفص الجداري.
- postclival s.** التَلَمُّ خَلْفَ الْمَحْدَرِ  
شق في المخيخ بين المحدر وورقة الدودة.
- posterointermediate s. of spinal cord (= s. intermedius dorsalis medullae spinalis)** التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ الْمُتَوَسِّطُ لِلنُّخَاعِ  
التلم الخلفي المتوسط للنخاع.
- posterolateral s. of medulla oblongata (= s. dorsolateralis medullae oblongatae)** التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلْبَصْلَةِ  
التلم الخلفي الوحشي للبصلة.
- posterolateral s. of spinal cord (= s. dorsolateralis medullae spinalis)** التَلَمُّ الْخَلْفِيُّ الْوُخْشِيُّ لِلنُّخَاعِ  
التلم الخلفي الوحشي للنخاع.
- postnodular s.** التَلَمُّ خَلْفَ الْعُقْدَةِ  
تلم على الجهة السفلية من المخيخ بين العقيدة ولهة الدودة.
- postpyramidal s.** التَلَمُّ خَلْفَ الْهَرَمِيِّ  
تلم على الجهة السفلية من المخيخ بين الهرم وحدة الدودة.
- s. precentralis** التَلَمُّ أَمَامَ الْمَرْكَزِيِّ  
تلم عمودي على السطح المحدب من نصف كرة المخ يفصل التلافيف أمام المركزي عن باقي الفص الجبهي.
- s. prechiasmaticus** التَلَمُّ أَمَامَ التَّصَالِبَةِ  
أخدود على السطح العلوي للعظم الوتدي إلى الأمام مباشرة من حديبة السرج وهو يضم التصلب البصرية.

- **preclival s.** التَلَمُّ أَمَامَ المَخْدَر. شق في المخيخ بين القنة والمحدَر.

- **prepyramidal s.** التَلَمُّ أَمَامَ الهرَمي. تلم على السطح السفلي للمخيخ بين لهاة الدودة والهرم.

- **prerolandic s. (= s. precentralis)** التَلَمُّ أَمَامَ الرُّولَانْدِي: التلم أمام المركزي.

- **retrocentral s. (= s. postcentralis)** التَلَمُّ وَرَاءَ المَرْكَزِي.

- **s. rhinalis** التَلَمُّ الأنْفِي. شق على السطح السفلي لنصف كرة المخ يفصل القسم الامامي من التليف المجاور للحصين عن باقي الفص الصدغي.

- **s. subparietalis** التَلَمُّ تَحْتَ الجِدَارِي. تلم على الوجه الإنسي لنصف كرة المخ فوق ضمادة الجسم الثفني ويفصل الطلل عن التليف الحزامي.

- **s. Sylvii (= fossa lateralis cerebri)** تَلَمُّ سلفيوس: الخُفْرَةُ المخِيَّةُ الوَحْشِيَّة.

- **s. temporalis inferior** التَلَمُّ الصُّدْغِي السُّفْلِي. 1. تلم طولاني على السطح الوحشي للفص الصدغي يفصل التليفين الصدغيين الوسطي والسفلي عن بعضهما البعض.

- **s. temporalis medius (= s. temporalis inferior)** التَلَمُّ الصُّدْغِي الوُسْطِي.

- **s. temporalis superior** التَلَمُّ الصُّدْغِي العُلَوِي. تلم طولاني على السطح الوحشي من نصف كرة المخ يمر إلى الأسفل وإلى الامام من التليف الزاوي حتى القطب الصدغي ويفصل التليفين الصدغيين العلوي والسفلي.

- **sulci temporalis transversi** الإِتْلَامُ الصُّدْغِيَّةُ المُسْتَعْرِضَةُ. اتلام عمودية غير منتظمة في قسم الفص الصدغي الذي يقع داخل التلم الوحشي.

- **Turner's s. (= s. intraparietalis)** تَلَمُّ تُوْنَر: التلم داخل الجداري.

- **s. ventralis medullae spinalis (= ventral median fissure of spinal cord)** التَلَمُّ النَّاصِفِ البَطْنَانِي لِلنُّخَاع: التلم البطناني للنخاع. انظر fissure.

- **s. ventrolateralis medullae oblongata** التَلَمُّ البَطْنَانِي الوَحْشِي لِلْبَصَلَةِ. تلم طولاني على السطح البطني للبصلة (النخاع المستطيل) بالجهة

الوحشية من الهرم تمر فيه الياف العصب تحت اللساني.

- **s. ventrolateralis medullae spinalis**

التَلَمُّ البَطْنَانِي الوَحْشِي لِلنُّخَاع. الحدود طولاني على السطح البطني الوحشي للنخاع الشوكي من حيث تظهر الجذور العصبية البطنية وهو يفصل الحبلين البطني والوحشي.

- **vermicular s.** التَلَمُّ الدُّوْدِي الشَّكْل: تَلَمُّ الدودة. شق بين الدودة ونصف كرة المخيخ.

- **vertical s. (= s. precentralis)** التَلَمُّ أَمَامَ المَرْكَزِي.

**summation** تَرَاكُم: جَمْع. التأثير التراكمي لعدد من المنبهات التي توضع على العضلة أو العصب أو قوس المنعكس.

- **central s.** تَرَاكُمٌ مَرْكَزِي. حالة تجمع منبهات متتالية دون العتبوية في مركز منعكسي حتى تتجمع وتولد استجابة منعكسية.

- **spatial s.** تَرَاكُمٌ حَيَازِي. تراكم يتولد من تجمع منبهات دون العتبوية أو دفعات عصبية مترامنة وقريبة في حيز محدد تولد استجابة منعكسية.

- **temporal s.** تَرَاكُمٌ زَمَنِي. تراكم يتولد من تجمع منبهات دون عتبوية أو دفعات عصبية متشابهة في النوع ولكنها مترامنة أو قد تكون متتالية ضمن فترة معينة.

**sunstroke** ضَرْبَةُ الشَّمْس؛ الرَّعَن. حمى حرارية تتولد عن التعرض للشمس وتتصف بالاختلاج والسبات والحرارة العالية وخصوصاً في الجلد.

**superego** الأَنَا العُلْيَا. في التحليل النفسي هي الحالة الشخصية التي تعمل كمراقب على فعاليات الأنا ومقارنتها بالمعايير المثالية وتشمل الوظائف النفسية التي تظهر في المواقف الاجتماعية ونقد الذات ومفهوم الصحيح والغلط والضمير والقيم الخلقية.

**supersensitivity** فَرَطُ الحَسَاسِيَّة. فرط التحسس الشاذ.

- **disuse s.** فَرَطُ الحَسَاسِيَّة بِعَدَمِ الإِسْتِغْمَال. زيادة فعالية سبيل عصبي بعد تعرضه المزمّن الطويل

إلى دواء مضاد ويتولد ذلك من تغير في حساسية المستقبلات بعد التشابكية.

**مُسْتَقْلِق**. مستلق على ظهره ووجهه **supine** للأعلى.

**كَبَت**. 1. التوقف المفاجيء **suppression** للإفراز أو الإبراز أو التفريغ الطبيعي 2. في الطب النفساني هو التثبيط الواعي لفكرة أو منبه غير مرغوب فيهما وهو غير الكظم غير الواعي.

**فَرْطُ الإِسْتِثَارَةِ**. **surexcitation**.

**جِرَاحَةٌ نَفْسِيَّةٌ**. **surgery, psychiatric** جراحة دماغية تجري لمعالجة بعض الاضطرابات النفسية.

**جِرَاحَةٌ تَجْسِيمِيَّةٌ**؛ **surgery, stereotaxic** جراحة التوضيع بالفراغ. تقنية إجراء تخريبات محددة في مجموعة من باحات الأنسجة المريضة الصغيرة المعينة في أعماق البنية الدماغية المصابة بعد تعيين حدود المنطقة بدقة بواسطة ثلاثة إحداثيات. وتجرى التخريبات بالحرارة أو بالبرودة أو بأشعة اكس أو بالأشعة فوق الصوتية.

**دَرْزٌ**. نوع من المفاصل الليفية حيث **sutura** يتحد السطحان المتقابلان من العظمين بطبقة ليفية رقيقة جداً ولا يمكن تحريكهما على بعضهما أبداً وهي توجد في الجمجمة.

**الدَرْزُ الإِطْلَاقِي**. خط اتصال العظم **s. coronalis** الجبهي مع العظمين الجداريين.

**الأدراز** **suturæ cranialis (= s. cranii)** القَحْفِيَّة. الأدراز بين مختلف عظام الجمجمة.

**الدَرْزُ المُشْرِشِرُ**؛ **s. dentata (= s. serrata)** **الدَرْزُ المَسْنَنُ**.

**الدَرْزُ الْغَرْبَالِي** **s. ethmoidolacrimalis** الدَّمْعِي. الدرز العمودي عند الاتصال بين العظم الدمعي والصفیحة الحاجبية للعظم الغربالي على الجدار الإنسي للحجاج.

**الدَرْزُ الْغَرْبَالِي الْفَكِّي** **s. ethmoidomaxillaris** الْغُلُوي. خط الاتصال بين الصفیحة الحاجبية للعظم الغربالي والوجه الحاجبي للفك العلوي.

**الدَرْزُ الْجَبْهِي**. الدرز العابر عادة **s. frontalis** للاتصال بين النصفين الأيمن والأيسر للعظم الجبهي وقد يدوم قسمه السفلي في البالغين.

**الدَرْزُ الْجَبْهِي** **s. fronto-ethmoidalis** الْغَرْبَالِي. خط الاتصال في الحفرة القحفية الأمامية بين العظم الجبهي واللوحة المصفوية للعظم الغربالي.

**الدَرْزُ الْجَبْهِي الدَّمْعِي**. **s. frontolacrimalis** خط الاتصال بين الحافة العلوية للعظم الدمعي والجزء الحاجبي من العظم الجبهي.

**الدَرْزُ الْجَبْهِي الْفَكِّي** **s. frontomaxillaris** الْغُلُوي. خط الاتصال بين العظم الجبهي والناثيء الجبهي للفك العلوي.

**الدَرْزُ الْجَبْهِي الأنْفِي**. **s. frontonasalis** خط الاتصال بين النهاية الجبهية للعظمين الأنفيين.

**الدَرْزُ الْجَبْهِي الْوُجْنِي**. **s. frontozygomatica** خط الاتصال بين العظم الوجني والناثيء الوجني للعظم الجبهي.

**دَرْزٌ مُسَطَّحٌ**؛ **دَرْزٌ s. harmonia (= s. plana)** مُنَشَقٌ.

**الدَرْزُ الْقَاطِعِي**. درز غير واضح **s. incisiva** يشاهد أحياناً ممتداً إلى الجهة الوحشية من الحفرة القاطعية إلى الحيز بين السن النابي والقاطع الوحشي وهو يؤشر خط التحام العظمين الفكي العلوي ومقدم الفكي العلوي.

**الدَرْزُ تَحْتَ الْحَجَّاج**. درز **s. infraorbitalis** يشاهد أحياناً ممتداً من الثقب تحت الحجاج إلى الأخدود تحت الحجاج.

**الدَرْزُ بَيْنَ عَظْمِي الْفَكِّ** **s. intermaxillaris** الْغُلُوي. خط الاتصال بين العظمين الفكيين العلويين للجهتين تحت الشوكية الأنفية السفلية.

**الدَرْزُ بَيْنَ عَظْمِي الأنْفِ**. خط **s. Internasalis** الاتصال بين عظمي الأنف.

**الدَرْزُ الدَّمْعِي الْقَرِينِي**. **s. lacrimoconchalis** خط الاتصال بين العظم الدمعي والقرين السفلي للأنف.

**الدَرْزُ الدَّمْعِي الْفَكِّي** **s. lacrimomaxillaris** الْغُلُوي. درز على الجدار الداخلي للحجاج بين العظم الدمعي والفك العلوي.

**الدَرْزُ اللَّامِي**. خط الاتصال **s. lambdoidea** بين العظمين القذالي والجداري.

**دَرْزٌ مُتَدَاخِلُ الْحَوَافِ**. طرز من **s. limbosa** الأدراز يشاهد فيه تتشابح الحواف المائلة المشطوفة.

- **s. metopica** الدَّرَزُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ.  
درز جبهى باقى فى البالْفَيْنِ.
- **s. nasofrontalis (= s. frontonasalis)** الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ الْأَنْفِيّ.  
الدَّرَزُ الْأَنْفِيّ الْفَكِّيّ الْغُلْوِيّ. خط الاتصال بين الحافة الوحشية للعظم الأنفى والناتئ الجبهى للفك العلوى.
- **s. nasomaxillaris** الدَّرَزُ الْأَنْفِيّ الْفَكِّيّ الْغُلْوِيّ. خط الاتصال بين الحافة الوحشية للعظم الأنفى والناتئ الجبهى للفك العلوى.
- **s. notha** دَرَزٌ مُتَلَصِّقُ الْحَوَافِ؛ دَرَزٌ مُصَاقِبٌ. نمط من الأدرار يتكون من تلاصق السطوح الخشنة لحواف العظام المشتركة فى الدرز.
- **s. occipitomastoidea** الدَّرَزُ الْقَذَالِيّ الْخُشَائِيّ. امتداد للدرز اللامى بين العظم القذالى والحافة الخلفية للجزء الخشائى للعظم الصدغى.
- **s. palatina mediana** الدَّرَزُ الْخَنَكِيّ النَّاصِفِ. خط الاتصال بين الجزء المستعرض للعظمين الحنكيين للجهتين.
- **s. palatina transversa** الدَّرَزُ الْخَنَكِيّ الْمُسْتَقَرِّضِ. خط الاتصال بين نواتئ الفك العلوى والأقسام المستعرضة للعظمين الحنكيين للجهتين.
- **s. palato-ethmoidalis** الدَّرَزُ الْخَنَكِيّ الْغُرْبَالِيّ. خط الاتصال بين الناتئ الحجاجى للعظم الحنكى والصفحة الحجاجية للعظم الغربالى.
- **s. palatomaxillaris** الدَّرَزُ الْخَنَكِيّ الْفَكِّيّ الْغُلْوِيّ. درز فى قاع الحجاج بين الناتئ الحجاجى للعظم الحنكى والجزء الحجاجى للفك العلوى.
- **s. parietomastoidea** الدَّرَزُ الْجِدَارِيّ الْخُشَائِيّ. خط الاتصال بين الزاوية السفلية الخلفية للعظم الجدارى والناتئ الخشائى للعظم الصدغى.
- **s. plana** دَرَزٌ مُسَطَّحٌ. نمط من الأدرار يتكون من مصاقبة بسيطة للسطوح المتجاورة المتناشبة من حواف العظام المشتركة.
- **s. sagittalis** الدَّرَزُ السُّهُمِيّ. خط الاتصال بين العظمين الجداريين.
- **s. serrata** دَرَزٌ مُسَرَّشَرٌ. نمط من الأدرار تتصل فيه العظام بحواف متناشبة تشبه حافة المنشار.
- **s. spheno-ethmoidalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْغُرْبَالِيّ. خط الاتصال بين جسم العظم الوددى والصفحة الحجاجية للعظم الغربالى.
- **s. sphenofrontalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْجَبْهِيّ. درز طويل يوصل الجزء الحجاجى للعظم الجبهى إلى الجناحين الكبير والصغير للعظم الوددى على جهتي الجمجمة.
- **s. sphenomaxillaris** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْفَكِّيّ الْغُلْوِيّ. درز يشاهد أحياناً بين الناتئ الجناحي للعظم الوددى والفك العلوى.
- **s. sphenoorbitalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْحَجَاجِيّ. خط الاتصال بين الناتئ الحجاجى للعظم الحنكى وجسم العظم الوددى.
- **s. sphenoparietalis** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْجِدَارِيّ. خط الاتصال بين الجناح الكبير للعظم الوددى والعظم الجدارى.
- **s. sphenosquamosa** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الصَّدْفِيّ. خط الاتصال بين الجناح الكبير للعظم الوددى والجزء الصدغى من العظم الصدغى.
- **s. sphenovomeriana** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْمِيَكَعِيّ. خط الاتصال بين النواتئ القمعية للصفائح الجناحية للعظم الوددى وجناح الميكة.
- **s. sphenozygomatice** الدَّرَزُ الْوَتْدِيّ الْوُجْنِيّ. خط الاتصال بين الجناح الكبير للعظم الوددى والعظم الوجنى.
- **s. squamosa** دَرَزٌ حَرَشَفِيّ. نمط من الأدرار يتكون من تراكب الحواف المائلة للعظام المشتركة.
- **s. squamosa cranii** الدَّرَزُ الصَّدْفِيّ الْقَحْفِيّ. الدرز بين الجزء الصدغى للعظم الصدغى والعظم الجدارى.
- **s. squamomastoidea** الدَّرَزُ الصَّدْفِيّ الْخُشَائِيّ. درز يوجد بين الجزئين الصدغى والخشائى للعظم الصدغى.
- **s. temporozygomatice** الدَّرَزُ الْوُجْنِيّ الصَّدْغِيّ. خط الاتصال بين الناتئ الوجنى للعظم الصدغى والناتئ الصدغى للعظم الوجنى.
- **s. vera** دَرَزٌ حَقِيقِيّ. درز حقيقى لا تتولد أية حركة فيه.
- **s. zygomaticofrontalis (= s. frontozygomatice)** الدَّرَزُ الْجَبْهِيّ الْوُجْنِيّ.
- **s. zygomaticomaxillaris** الدَّرَزُ الْوُجْنِيّ

الْفَكِّي العُلْوِيّ. خط الاتصال بين العظم الوجني والناتئ الوجني للفك العلوي.

- s. zygomaticotemporalis (= s.

temporozygomatica) الدَّرَزُ الصَّدْغِيّ الْوَجْنِيّ.

1. دَرَز 2. خِيَاطَة 3. خَيْط 4. غُرْزَة suture

symbolia الإدْرَاكُ اللَّفْسيّ. إدراك طبيعة الأجسام بواسطة حاسة اللمس فقط.

symbolism الرّمزيّة. 1. حالة عقلية شاذة تمثل فيها مدارك الشخص وحاجياته برموز أو بأجسام أخرى 2. في التحليل النفسي هي عملية التفكير اللاواعي وعادة ما تكون ذات طبيعة جنسية حيث تحول معانيها الحقيقية بحيث لا تدرك بأنها أفكاراً جنسية من قبل الأنا العلوية.

sympathectomy قَطْعُ الْوُدِيّ. قطع أو فصل أو استئصال جزء من السبيل العصبي الودي. قَطْعُ الْوُدِيّ الْكِيْمِيَاثِيّ. كبت فعالية chemical s. الجهاز العصبي الودي بواسطة الادوية الخاصة المناسبة لذلك.

sympathetic وُدِيّ. 1. منسوب إلى التواد أو مسبب به أو يظهره 2. عصب ودي أو الجهاز العصبي الودي.

sympatheticomimetic (= sympathomimetic) مُحَاكِي الْوُدِيّ.

sympatheticoparalytic شَلَلِيّ وُدِيّ. مسبب عن أو مصاب بشلل الجهاز العصبي الودي.

sympatheticotonia تَغْلِبُ الْوُدِيّ. حالة يسود فيها الجهاز العصبي الودي على الوظائف العامة لأعضاء الجسم وتتصف بالتشنج الوعائي وارتفاع ضغط الدم وتكون جلد الوز والمنعكس الهدابوي النخاعي.

sympathic (= sympathetic) وُدِيّ.

sympathicectomy (= sympathectomy) قَطْعُ الْوُدِيّ.

sympathicoblastoma وَرَمُ أَرْوَمَة الْوُدِيّة. ورم خبيث يحوي أرومات الودية.

sympathicogonioma (= sympathicoblastoma) وَرَمُ أَرْوَمَة الْوُدِيّة.

sympathicolytic (= sympatholytic)

حَالُ الْوُدِيّ.

sympathicomimetic (= sympathomimetic) مُحَاكِي الْوُدِيّ.

sympathicopathy إغْتِلَالُ وُدِيّ. أي مرض يتولد عن اضطراب الجهاز العصبي الودي.

sympathicotonia (= sympathetictotonia) تَغْلِبُ الْوُدِيّ.

sympathicotripsy هَرْسُ الْوُدِيّ. الهرس الجراحي للعصب أو للعقدة أو للصفيرة العصبية الودية.

1. أَلْفُ الْوُدِيّ sympathicotropic 2. مُوجِبَة لِلْوُدِيّ. 1. ماله ألفة للجهاز العصبي الودي 2. عامل له ألفة للجهاز الودي أو يؤثر على الجهاز العصبي الودي.

sympathicus (= sympathetic الجهازُ الْعَصْبِيّ الْوُدِيّ.

sympathin سِمْبَاثِين. وسيط عصبي هرموني للدفعات العصبية عند التشابكات العصبية الودية وأهم أنواعه هما الأبينيفرين والنورأبينيفرين ويستعمل المصطلح سمبائين فقط عند عدم معرفة طبيعة الوسيط.

sympathism الإِبْحَائِيّة: الْوُدِيّة. الاستعداد للتأثر بالتنويم أو بالإيحاء أو نقل الاحاسيس من شخص لآخر.

sympathoadrenal وُدِيّ كُظْرِيّ. منسوب إلى الجهاز العصبي الودي ولب الغدة الكظرية.

sympathoblastoma (= sympathicoblastoma) وَرَمُ أَرْوَمَة الْوُدِيّة.

sympathogonia سُلَيْفَات الْوُدِيّة. خلية جنينية غير مميزة تنامي لتولد الخلية الودية.

sympathogonioma (= sympathoblastoma) وَرَمُ أَرْوَمَة الْوُدِيّة.

sympatholytic حَالُ الْوُدِيّ. عامل مضاد لتأثير الدفعات التي تنقلها الألياف العصبية البعد التشابكية الأدرينالية الفعل للجهاز العصبي الودي.

sympathomimetic مُحَاكِي الْوُدِيّ. عامل



يولد تأثيراً مشابهاً لتأثير الدفعات العصبية التي تنقلها الألياف الودية بعد التشابكية.

**تَوَادٌ**. 1. مشاركة عاطفية لأفكار **sympathy** الأشخاص الآخرين وأحاسيسهم وخبراتهم 2. تأثير يحدث في أحد الأعضاء نتيجة إصابة أو مرض في عضو آخر من الجسم 3. العلاقة الموجودة بين الدماغ والجسم والتي تؤدي إلى تأثر أحدهما بالآخر 4. التأثير الذي يحدثه أحد الأفراد على فرد آخر كما يحدث في التنويم أو عند التثاؤب أو عند انتقال الأعراض الهستيرية.

**عَرَضٌ** - (ج: أَعْرَاضٌ). أي من **symptom** الدلائل الشخصية للمرض أو حالة المريض كالدلائل التي يدركها المريض أو بعض الحالات التي تدل على تغير حالة المريض الجسدية أو العقلية.

**عَرَضٌ** - (**abstinence s. (= withdrawal s.)**) الإِمْتِنَاعُ. عرض نفسي يظهر عند توقف المدمن عن تناول المخدر.

**عَرَضٌ بَارَانِي**. عند اضطرابات **Barany's s.** التوازن الناتجة عن مرض الجهاز الدهليزي يتأثر اتجاه السقوط بتغيير وضع الرأس.

**عَرَضٌ بِخَتَرِيَف**. شلل عضلات **Bekhterev's s.** الوجه للحركات الذاتية في مرض التابس الظهري.

**عَرَضٌ بُونِهُوِيَفَر**. فقدان **Bonhoeffer's s.** التوتر العضلي في داء الرقص.

**عَرَضٌ كُولِيَفَر**. حركات نفضانية **colliver's s.** أو رعشية أو اختلاجية غريبة في الأطراف والوجه والفك وأحياناً في كل الجسم تشاهد في المرحلة قبل الشللية في التهاب سنجابية النخاع.

**عَرَضٌ تَفَارَقِي**. خدر للآلم **dissociation s.** والحرارة والبرودة من دون فقدان حس اللمس ويشاهد ذلك في كهف النخاع.

**عَرَضٌ إِبْشَتَايْن**. عرض يشاهد في **Epstein's s.** الأطفال العصبيين يتكون من عدم حركة الجفن العلوي للأسفل فيعطي ذلك المريض سحنة مرعبة.

**عَرَضٌ هَيْنِل**. قلة التحسس عند الضغط **Haenel's s.** على المقلتين في التابس الظهري.

**عَرَضٌ مُنْعَكِس**. عرض يحدث في **reflex s.** منطقة بعيدة عن تلك المصابة بالمرض.

**عَرَضٌ رِيَمَاك**. تعدد مواقع الإحساس **Remak's s.**

أو مرور وقت طويل قبل إدراك حس الآلم وهما من علامات التابس الظهري.

**عَرَضٌ إِشَارَةٌ سِيَقُوِيْن**. **Seguin's signal s.** التقلص الإرادي للعضلات قبل نوبة الصرع.

**عَرَضٌ تِرِنْدِلِنْبِرْغ**. مشية **Trendelenburg's s.** منهادية بسبب شلل العضلات الألوية.

**عَرَضٌ فَارْتِنْبِرْغ**. 1. انثناء **Wartenberg's s.** الإبهام عند ثني الأصابع الأخرى بوجه المقاومة ويشاهد ذلك في آفات الهرمي 2. الشعور بالحك في المناخر وفي قمة الأنف في أورام الدماغ.

**اعراضٌ** - (**withdrawal s. (= withdrawal)**) الإِمْتِنَاعُ. العزل.

**أَلَمٌ مُحَوَّلٌ**. ألم يحس به في إحدى **synalgia** المناطق نتيجة آفة في موضع آخر من الجسم.

**مَشْبِكٌ**. (ج: مَشَابِكٌ). موقع تقارب **synapse** العصبونات الوظيفي حيث تنتقل الدفعات العصبية من عصبون لآخر بطريقة كيميائية أو كهربائية وفي المشبك النمطي تنتقل الدفعات بواسطة الناقل العصبي (كالأستيل كولين أو النورأبينفرين... الخ) الذي تطلقه نهايات الأعصاب قبل المشبكية المثارة الذي ينتشر عبر الأخدود المشبكي ليتحد مع المستقبلات على الغشاء بعد المشبكي والذي يولد تغييراً كهربائياً فيه يؤدي إلى توليد الدفعات العصبية فيه.


**مَشْبِكٌ أَدْرِينَالِينِي الْفِعْل**. مشبك **adrenergic s.** يكون الأدرينالين الناقل العصبي فيه.

**مَشْبِكٌ مُحَوَارِي مُحَوَارِي**. **axoaxonic s.** مشبك بين محوار أحد العصبونات ومحوار عصبون آخر.

**مَشْبِكٌ مُحَوَارِي تَغْصُنِي**. **axodendritic s.** مشبك بين محوار أحد العصبونات وتغصن عصبون آخر.


**مَشْبِكٌ مُحَوَارِي** **axodendrosomatic s.** مشبك بين محوار أحد العصبونات وتغصنات وجسم عصبون آخر كما هو الحال في العصبونات الحركية.

**مَشْبِكٌ مُحَوَارِي جَسَدِي**. **axosomatic s.** مشبك بين محوار أحد العصبونات وجسم عصبون آخر.



#### synapse

رسم تخطيطي لعصبون يبين اتصالاته والمشبك: أ - عصبون (باللون الأحمر) واتصالاته الشبكية مع ألياف عصبية واردة إليه وصادرة منه (باللون الأسود): (1) تغصن (2) زر (3) جسم العصبون (4) الغدة الميليني (5) المحوار (6) تغصن. ب - مشبك: (7) زر (8) حويصلة (9) الفلج المشبكي (10) المحوار (11) متقدرة (12) الغشاء قبل المشبكي (13) الغشاء بعد المشبكي.



#### synapse

أ - تخطيط أحد العصبونات وبعض نتوءاته. وتظهر بعض نهايات العصبونات الأخرى المنتهية عليه بلون أسود غامق. ب - تخطيط لمشبك إحدى النهايات: ج - نهايات عصبية على سطح العصبون. (1) الغشاء بعد المشبك (2) حويصلات مشبكية (3) الغشاء قبل المشبك.

- **catacholaminergic s.** مَشْبَكٌ كَاتَاكُول **أَمِينِي الْفُغْل.** مشبك يكون فيه الكاتاكول أمين هو الناقل العصبي.

- **cholinergic s.** مَشْبَكٌ كُولِينِي الْفُغْل. مشبك يكون الأسيتيل كولين هو الناقل العصبي فيه.

- **dendrodendritic s.** مَشْبَكٌ غَصْبِي تَفْصِي. مشبك من تفصن أحد العصبونات إلى تفصن عصبون آخر.

- **en passant s.** مَشْبَكٌ عُيُورِي. تماس مشبكي يتصف بتعابر وتماس أغشية الياف العصبونات المتجاورة على طول أحدهما الآخر.

- **excitatory s.** مَشْبَكٌ إِسْتِفَارِي. مشبك يستثار لتقل الدفعات عبره.

- **Inhibitory s.** مَشْبَكٌ تَغْبِيْطِي. مشبك يثبط نقل النبضات عبره.

- **loop s.** مَشْبَكٌ عُزُوي. مشبك فيه باحة تلامس كبيرة بين أغشية اليافها.

- **neuromuscular s.** مَشْبَكٌ عَصْبِي عَضَلِي. الاتصال العصبي العضلي.

**synapsis** تَشَابُك. تلامس النهايات العصبية مع جسد أو محوار أو تفصن عصبون آخر.

**synchiria** حِسٌّ عُيُورِي. حالة يؤدي فيها تنبيه منطقة في إحدى جهتي الجسم إلى حس مماثل في جهتيه.

**synchronism** تَرَافُض. حدوث حدثين أو فعاليتين أو أكثر في نفس الوقت.

**synchronous** مُزَامِن. يحدث في نفس الوقت مع حدث آخر أو أحداث أخرى.

**syncope** غَشْي. فقدان الوعي الوقتي بسبب إقفار الدماغ العام.

- **postural s.** غَشْيٌ وَضْعِي؛ غَشْيٌ الْوَضْعَة. فقدان الوعي الذي ينتج عن تغيير الوضع.

- **stretching s.** غَشْيٌ التَّمَدُّد؛ غَشْيٌ بَسْطِي. الغشي الذي يحدث عند تمديد الذراعين للأعلى مع تمديد العمود الفقري.

- **tussive s.** غَشْيٌ سَعَالِي. فقدان الوعي العارض المترافق مع نوبة سعال شديدة.

**syncytium** مَخْلَى. كتلة جبلية عديدة النوى تتولد عن اندغام عدد من الخلايا.

**syndrome** مُتَلَاَزِمَة. مجموعة أعراض تحدث سوية أو مجموعة علامات حالة مرضية أو معقد علامات مرضية.

- **abstinence s. (= withdrawal s.)** مُتَلَاَزِمَة الإِمْتِنَاع. الانعزال.

- **acute brain s. (= organic brain s.)** متلازمة الدُماغ الحادة.

- **Adie's s.** مُتَلَاَزِمَة أَدِي. متلازمة تتكون من استجابة حدقية مرضية (حدقة متوترة) وأهم صفاتها هي التوتّر العضلي عند التكيف فتتقلص الحدقة على الجهة المصابة عند الرؤية القريبة أبطأ من تقلص الحدقة على الجهة المعاكسة وكذلك فإنها تتوسع أبطأ من العين على الجهة السليمة ولا تستجيب الحدقة المصابة للضوء المباشر أو غير المباشر بطريقة طبيعية ولكنها قد تستجيب بطريقة شاذة. وتكون بعض المنعكسات الوترية مفقودة أو ضعيفة ولكن لا توجد أية اضطرابات حركية أو حسية وليست هناك أية تغيرات ظاهرة تدل على وجود مرض في الجهاز العصبي.

- **adiposogenital s. (= adiposogenital dystrophy)** مُتَلَاَزِمَة شُحَامِيَّة تَنَاسُلِيَّة؛ خَثَلٌ شُحَامِي تَنَاسُلِي.

- **Alajouanine's s.** مُتَلَاَزِمَة الْأَجَوَانِين. آفات متناظرة للعصبين السادس والسابع القحفيين مع شلل وجهي بالجانبين وفي العضلة المستقيمة الوحشية في العين مع حنف القدم بالجهتين.

- **«Alice in Wonderland» s.** مُتَلَاَزِمَة «اليس في أرض العجائب». حالة توهم تظهر بنكران الذات واضطراب صورة الجسم واختلال حس مرور الوقت وتوهمات وانخداعات عديدة أخرى ومن الممكن أن ترافق مع الفصام أو الصرع أو الشقيقة أو أمراض الفص الجداري أو الحالات المنومة أو العقاقير المولدة للهلوس.

- **amnesic s.** متلازمة فقد الذاكرة. اضطراب عقلي عضوي يتصف بضعف الذاكرة سواء اللاحقة أو السابقة ويحدث مع حالة وعي طبيعي، ولا تشمل هذه المتلازمة ضعف الذاكرة الذي يشاهد في الخرف أو الهذيان. ومن الممكن أن ترافق هذه الأعراض مع

التوهان والتخريف وقلة التبصر وضعف الذاكرة ولكنها ليست اعراضاً دائمية. ومن أهم أسبابها عوز الثيامين المترافق مع تعاطي الكحول ولكنها يمكن أن تتولد عن أية آفة مرضية تؤدي إلى تخريب بعض بنيات الدماغ البيني والفص الصدغي (كالتكوين الحصيني والأجسام الحليمية والنوى الظهرية الإنسية للمهاد) كما تشمل الأسباب رضح الرأس وأورام الدماغ والاحتشاء ونقص الأكسجين والتسمم بأول أكسيد الكربون والتهاب الدماغ بالهربس البسيط.

#### - anterior cord s. مُتَلَازِمَةُ النُّخَاعِ الأَمَامِيِّ.

إصابة موضعية للقسم الامامي للنخاع الشوكي تتصف بالشلل التام ونقص حس الألم والخدر حتى مستوى الإصابة مع الاحتفاظ النسبي بإحساسات العمود الخلفي وهي إحساسات اللمس والوضع والاهتزاز.

#### - anterior cornual s. مُتَلَازِمَةُ الْقَرْنِ الأَمَامِيِّ.

ضمور عضلي بسبب إصابة القرن الامامي للنخاع الشوكي.

#### - anticholinergic s. مُتَلَازِمَةُ مُضَادِّ الْفِعْلِ.

الكولينيني. التأثير المركزي والمحيطي الناتج عن فرط جرعة الادوية المضادة للفعل الكولينيني أو سوء الاستجابة لها (مثل الاتروبين والفينوتازين ومضاد الهستامين ومضادات الكآبة ثلاثية الدورات) وتشمل أعراضها وعلاماتها القلق والهذيان والتوهان والاهلاس والنوبات وتسرع القلب وارتفاع حرارة الجسم وتوسع الحدقة وتوسع الاوعية واحتباس البول والمعدة ونقص الافرازات اللعابية والعرقية والقصبية والانفية البلعومية.

#### - anxiety s. مُتَلَازِمَةُ الْقَلْقِ. الاعراض الجسدية

التي ترافق القلق مثل خفقان القلب والتنفس السريع الضحل والتعرق والشحوب والشعور بالهلع.

#### - Apert's s. (= acrocephalosyndactyly)

مُتَلَازِمَةُ اِبْرَتْ. تسنم الرأس مع ارتفاع الاصابع.

#### - auriculotemporal s. المُتَلَازِمَةُ الأُذُنِيَّةُ

الصدغية. ظهور منطقة تعرق حمراء على الوجنة عند تناول الطعام ويشاهد ذلك في آفات الغدة النكفية، وهي تنشأ عن بعض إصابات العصب الأذني الصدغي.

#### - Avellis's. مُتَلَازِمَةُ أَفِيلِيْس.

شلل الحبال الصوتية والحقاف (شراع الحنك) على نفس الجانب

مع فقدان حسي الحرارة والألم من ساق وجذع وذراع ورقبة الجهة المعاكسة من جلد فروة الرأس.

#### - Babinski's s. مُتَلَازِمَةُ بَابِنْسْكِي. ترافق

اضطرابات القلب والشرابين مع التهاب السحايا الزهري المزمن والتابس الظهري والخرف الشللي والاعراض الزهرية المتأخرة الأخرى.

#### - s. of Babinski- Nageotte مُتَلَازِمَةُ

بَابِنْسْكِي - نَاغِيُوت. متلازمة تنتج عن آفات متعددة تصيب الهرم البصلي والسبل الحسية والسويقات المخيخية والتكوين الشبكي وتتصف بالفالج (الشلل النصفي) والخدر بالجهة المعاكسة (ويكون الخدر فقط في حسي الألم والحرارة عادة) مع تعذر التأزر النصفي والرنح النصفي ومتلازمة هورنر في نفس الجهة.

#### - Babinski-Vaquez s. (= Babinski's s.)

مُتَلَازِمَةُ بَابِنْسْكِي فَاقُوز.

#### - Balint's s. مُتَلَازِمَةُ بَالَنْت. شلل التثبيت

البصري القشري مع رنح بصري واضطراب الانتباه البصري مع الاحتفاظ بالحركات العينية المنعكسية المستقلة وتتولد عن الآفة الجدارية القذالية بالجهتين.

#### - Bannworth's s. مُتَلَازِمَةُ بَانُورْث. التهاب

السحايا والأعصاب في مرض لايم.

#### - Barré- Guillain s. (= acute febrile polyn- euritis)

مُتَلَازِمَةُ بَارِيه - غِيلَان؛

التهاب الأعصاب الحموي الحاد.

#### - Benedikt's s. مُتَلَازِمَةُ بَنِيْدِكْت. متلازمة

تتصف بشلل محرك العين على نفس الجهة مع فرط الحركية والرعاش وخزل الذراع والساق على الجهة المعاكسة والرنح على نفس الجهة. وتنتج هذه المتلازمة عن آفات تخرب العصب محرك العين (القحفي الثالث) والنواة الحمراء والسبل القشري النخاعي.

#### - Bernard's s. (= Horner's s.) مُتَلَازِمَةُ

بِرْنَارْد.

#### - Bernhardt-Roth s. (= meralgia

paresthetica) مُتَلَازِمَةُ بَرْنِهَارْت - رُوث.

آلم الفخذ المذلي.

#### - Bertolotti's s. مُتَلَازِمَةُ بَرْتُولُوتِي. تعجز الفقرة

القطنية الخامسة مع عرق النسا والجنف ويحدث ذلك

باندغام الفقرة مع عظم العجز.

**- body of Luys's. (= hemiballismus)**

مُتَلَاَزِمَةٌ جِسْمٌ لُوزِيٌّ: زَفَقٌ شَقِيٌّ. قَدَائِفِيَّةٌ شَبَقِيَّةٌ.

**- Borjeson's s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بُورْجيسُون. متلازمة.

مرتبطة بالصبغي اكس تتصف بتخلف عقلي شديد والصرع وقصور القندية وقصور الاستقلاب والسمعة المفرطة مع تورم الأنسجة تحت الجلدية للوجه وأذنين كبيرتين.

**- brachial s.** مُتَلَاَزِمَةٌ عَضُدِيَّة. حالة مرضية.

تنتج عن انضغاط أو تهيج أعصاب الضفيرة العضدية.

**- Briquet's s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بَرِيكَّة. هستيريا خاصة.

تتصف بأعراض متعددة وتدفع المريض لمراجعة الأطباء المستمرة ولاستعمال أدوية كثيرة من دون داع.

**- Brissaud-Marie s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بَريسُو - ماري.

تشنج نصفي لسان شغوي هستيري.

**- Brissaud-Sicard s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بَريسُو - سِيكَار.

فالج تشنجي ينتج عن آفات الجسر.

**- Bristowe's s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بَريستُو. سلسلة من

الأعراض الشديدة الخاصة بورم الجسم الثفني وهي  
1 - بداية تدريجية للشلل النصفي الفالج ب - تفاق  
الفالج في إحدى الجهتين مع أعراض فالجية على الجهة  
الأخرى، ج - ذهول ونعاس وصعوبة في البلع وعدم  
المقدرة على الكلام، د - من دون ظهور أية إصابة في  
الأعصاب القحفية، هـ - الموت بالسبات أو الغيبوبة.

**- Brown-Sequard s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بَرَاون - سِيكُور.

متلازمة تنتج عن تخريب أحد نصفي النخاع الشوكي مما يولد شللاً مع فقدان الحس المميز وحس المفاصل على نفس الجهة وفقدان حس الألم والحرارة على الجهة الأخرى من الجسم.

**- Bruns's s.** مُتَلَاَزِمَةٌ بَرُونز. صداع متقطع مع

الدوار والقيء والاضطرابات البصرية وهي أعراض خاصة بعدوى في البطين الرابع بالكيمة المذنبية أو آفاته الأخرى أو أورام الخط الوسطي للمخيخ والبطين الثالث أو البطين الجانبي.

**- bulbar s. (= Dejerine's s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الْبَصَلَةِ.

متلازمة ديجيرين.

**- callosal s.** مُتَلَاَزِمَةُ الثَّقَنِي.

مجموعة من الأعراض كان يعتقد بأنها ناتجة عن آفة الجسم الثفني.

**- Capgras' s.** مُتَلَاَزِمَةُ كِبْغِرَاس. التوهم بأن

الأشخاص الآخرين في محيط المريض هم ليسوا أنفسهم الحقيقيين بل إنهم غيرهم أو أشباههم.

**- capsular thrombosis s.** مُتَلَاَزِمَةُ خُثَارِ

المَحْفَظَةِ. فالج ينتج عن خثار وعاء دموي يجهز المحفظة الداخلية.

**- capsulothalamic s.** الْمُتَلَاَزِمَةُ الْمُحْفَظَتِيَّة

المِهَادِيَّة. فالج وعمى شقي وإدراك الألم المنحرف بسبب آفة المهاد والمحفظة الباطنة.

**- carotid sinus s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْجَيْبِ السِّيَّاتِي.

غشي يترافق أحياناً مع نوبات اختلاجية تنتج عن فرط فعالية منعكس الجيب السباتي عند تنبيه أحد الجيبين السباتيين أو كليهما.

**- carpal tunnel s.** مُتَلَاَزِمَةُ الثَّقَفِ الرَّسْغِي.

مجموعة أعراض تتولد من انضغاط العصب الناصف مع ألم ومذل حراري أو محرق في الأصابع واليد ويمتد أحياناً حتى المرفق.

**- cauda equina s.** مُتَلَاَزِمَةُ ذَنَبِ الْفَرَس. ألم كلي.

في العجان والمثانة والعجز وينتشر بصورة عامة على طريقة عرق النسا ويترافق مع مذل وشلل لا انعكاسي بسبب انضغاط جذور الأعصاب النخاعية الشوكية.

**- caudal dysplasia s.** مُتَلَاَزِمَةُ خَلَلِ تَنْسُجِ

السَّدَس. عدم تكون جزء أو كل وحدات الفقرات العصبية والعجزية وأحياناً القطنية وشذافات النخاع الشوكي الذنبية المناسبة لها مما ينتج خلل وظائف الأمعاء والمثانة.

**- caudal regression s (= caudal**

**dysplasia s.)** مُتَلَاَزِمَةُ خَلَلِ تَنْسُجِ الذَّنْب.

**- cavernous sinus s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْجَيْبِ الْكَهْفِي.

وذمة الملتحمة والجفن العادي وجذر الأنف وجحوظ العين مع شلل الأعصاب القحفية الثالث والرابع والسادس بسبب خثار الجيب الكهفي.

**- central cord s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْحَبْلِ الْمَرْكَزِي. إصابة

الجزء المركزي من النخاع الشوكي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل أكثر في الأطراف العليا عما هو في الأطراف السفلى وتنتج هذه التغيرات المرضية إما عن وذمة النخاع أو النزف.

**- centroposterior s.** مُتَلَاَزِمَةُ مَرْكَزِيَّة خَلْفِيَّة.

تفارق تكهفي نخاعي للاضطرابات التحسسية والحركية الوعائية بسبب آفات الأجزاء المركزية الخلفية للمادة السنجابية للنخاع الشوكي.

- cerebellar s. مُتَلَاَزِمَةُ المَخِيخ. رنح مخيخي وراثي.
- cerebrohepatorenal s. مُتَلَاَزِمَةُ دِمَاغِيَّة كَبِدِيَّة كُلَوِيَّة. اضطراب جسدي متنح يتصف بشواذ قحفية وجهية ونقص التوتر وضخامة الكبد واليرقان وكلية متعددة الأكياس والموت أثناء الطفولة المبكرة والذي يترافق مع فقدان البيروكسيروم من الكبد والكلية.
- cervical s. مُتَلَاَزِمَةُ رَقَبِيَّة. حالة تنتج عن تهيج أو انضغاط جذور الاعصاب الرقبية وتتصف بالم في الرقبة ينتشر إلى المنكبين والذراعين والساعدين ويعتمد ذلك على أي من الاعصاب الرقبية هو المصاب.
- cervical rib s. (= cervicobrachial s. = scalenus s.) مُتَلَاَزِمَةُ الضِّلَع الرَقَبِيَّة.
- Cestan's s. (= s. of Cestan- Chenais) مُتَلَاَزِمَةُ سِيَسْتَان. ترافق الشلل النصفي (الفالج) والخدر الشقي في الجهة المقابلة مع الانسياق الجانبي واللاتأزرية الشقية ومتلازمة هورنر وشلل الحنجرة بنفس الجهة ويتولد كل ذلك عن آفات منتشرة في السبيلين الهرمي والحسي وفي السويقة المخيخية السفلية والنواة الملتبسة والمركز العيني الحدي.
- Charcot's s. مُتَلَاَزِمَةُ شَارْكَوت. 1. تصلب وحشي ضموري عضلي 2. عرج متقطع 3. حمى كبدية متقطعة تنتج عن التهاب الاوعية الصفراوية.
- chiasma s. (= chiasmatic s.) مُتَلَاَزِمَةُ التَّصَالِبَة. متلازمة تدل على إصابة التصالبة البصرية التي تؤدي إلى خلل البصر وتحديده وتضييق الساحة البصرية وعتمة مركزية وصداغ ودوار وغشي.
- Citelli's s. مُتَلَاَزِمَةُ شِيَتَلِي. تخلف عقلي وفقدان المقدرة على التركيز والنعاس أو الارق الذي يشاهد في الاشخاص المصابين بالغدانيات أو التهاب الجيوب.
- Claude's s. مُتَلَاَزِمَةُ كَلَاوُد. شلل العصب القحفي الثالث على جهة واحدة وتعدُّر التأزر على الجهة المعاكسة مع الرتبة.
- Claude Bernard- Horner s. (= Horner's s.) مُتَلَاَزِمَةُ كَلَاوُد بَرْنَارْد - هُورْنَر.
- closed head s. مُتَلَاَزِمَةُ الرَأْسِ المُغْلَق. معقد الاعراض الخاصة بإصابة الرأس من دون انتقاب القحف.
- Cockayne's s. مُتَلَاَزِمَةُ كُوكَيْن. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية متنحية ويتصف بالقزامة وضمور الشبكية والصمم مع الشياخ والفقم والتخلف العقلي والحساسية للضوء.
- Collets s. (= Collet-Sicard s.) مُتَلَاَزِمَةُ كُوليه. شلل نصفي لسانى حنجري بلعومي كتفي ينتج عن آفة الاعصاب القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.
- compression s. مُتَلَاَزِمَةُ الإِنْضِغَاط. صدمة مع تبؤل دموي وقلة البول بعد الانضغاط الطويل المستمر لأحد الأطراف كالذي يحدث عند سقوط بناء على المصاب.
- concussion s. مُتَلَاَزِمَةُ الإِزْتِجَاج. اعتلال دماغي ينتج عن رَضَح الرأس.
- s. of corpus striatum (= Vogt's s.) مُتَلَاَزِمَةُ الجِسْم المُخَطَّط.
- Cotard's s. مُتَلَاَزِمَةُ كُوتَارْد. زور مع توفهم الإهمال مع النزعة للانتحار واضطرابات حسية نفسية.
- Creutzfeldt-Jakob s. مُتَلَاَزِمَةُ كَرُوتْزْفيلْد - جَاكُوب. انظر disease.
- cri du chat s. مُتَلَاَزِمَةُ المِوَاء. مرض وراثي خلقي يتصف بوسع الأبعاد وصغر الرأس والتخلف العقلي الشديد وصراخ شبيه بمواء القطط بسبب خبن الذراع القصير للصبغي 5.
- s. of crocodile tears مُتَلَاَزِمَةُ دُمُوع التَّمَاسِيح. تدمع تلقائي يحدث موازياً للإلعاب الطبيعي عند الأكل وهو يتلو شلل الوجهي ويظهر أنه ينتج عن ضلال بعض الألياف العصبية المتجددة التي تذهب إلى الغدد الدمعية بدلاً من الغدد اللعابية.
- Crouzon s. (= craniofacial s.) مُتَلَاَزِمَةُ كُرُوزُون: متلازمة قحفية وجهية.
- crush s. مُتَلَاَزِمَةُ الهُزَس. ودمة وقلة البول وأعراض الفشل الكلوي الأخرى التي تتلو هرس جزء من الجسم وخصوصاً جزء كبير منه خصوصاً كتلة عضلية كبيرة.
- cubital tunnel s. مُتَلَاَزِمَةُ النُّفَق المِرْفَقِي. معقد من الاعراض التي تتولد من إصابة أو انضغاط العصب الزندي عند المرفق مع الالم والخدر على طول الناحية الزندية لليد والساعد مع ضعف اليد.

**مُتَلَاَزِمَةُ كُوشِنْغ.** 1. حالة تصيب **Cushing's s.** - الإناث غالباً تنتج عن فرط الغدية القشرية لقشرة الكظر بسبب أورامها وقد تنتج عن أورام النخامية الغدية أو عن كثرة استعمال القشرانيات السكرية لأسباب علاجية 2. أعراض تتولد في أورام الزاوية المخيخية الجسرية والأورام السمعية وتؤدي إلى سماع الأصوات الشخصاني وتردي السمع والرنح الدماغي على نفس الجهة وأخيراً خلل وظائف العصبين السادس والسابع على نفس الجهة مع ارتفاع ضغط داخل القحف.

**مُتَلَاَزِمَةُ سِيرِيَاكْس.** متلازمة تنتج **Cyriax's s.** - عن أنزلاق غضاريف الاضلاع التي تضغط على الأعصاب عند المفصل بين الغضاريف مما يسبب ألماً في منطقة الغضروف ينتشر إلى المئب والذراع أو بالم شبيه بالذبحة الصدرية.

**مُتَلَاَزِمَةُ دَاكُوسْتَا.** وهن عصبي **Da Costa's s.** - دوراني.

**مُتَلَاَزِمَةُ دَانْدِي - وُوكِر.** **Dandy-Walker s.** - موه الرأس الخلفي بسبب انسداد ثقبتي ماجندي ولوشكا.

**مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين.** 1. متلازمة **Dejerine's s.** - اضطرابات القشرة الحسية تتصف بضعف التمييز الحسي (عمه التجسيم) وضعف معرفة حسن الضغط 2. الآفات البصلية العلوية التي تولد شلل العصب الثاني عشر على نفس جهته والفالج (الشلل النصفي) على الجهة المعاكسة. وتولد الآفات في القسم السفلي من البصلة شلل الحنجرة وشرع الحنك (الحقاف) 3. أعراض التهاب الجذور أي انتشار حس الألم والعيوب الحسية والحركية في منطقة توزيع الجذور أو الشدقات وليس على طول مجرى العصب المحيطي 4. متلازمة تشبه التابس الظهري مع ضعف الحس العميق ويبقى حس اللمس سليماً، وتنتج عن آفة الياف الجذور الطويلة في العمود الخلفي.

**مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين كلُومْبَكَة.** **Dejerine- Klumpke s. (= Klumpke's paralysis)**

**مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين رُوسِي.** المتلازمة المهادية. **s. of Dejerine- Roussy (= thalamic s.)**

**مُتَلَاَزِمَةُ دِيَجِيرِين** **Dejerine-Scottas s.** - سكوتاز. اعتلال عصبي خلالي ضخامي مترق.

**مُتَلَاَزِمَةُ دِي لَانْغَة.** متلازمة **de Lange's s.**

خلقية يترافق فيها التخلف العقلي الشديد مع شواذ عديدة تشمل القزامة وقصر الرأس وتوضع الأذن السفلي ووتر الرقبة وتشوه الفم المصيب وانخساف جسر الأنف مع انثناء قمته للأعلى وتكون المناخر متجهة للأمام وحواجب كثة وملتقبة عند خط الوسط وشعر خشن وغير منتظم ينمو إلى الأسفل على الجبين وإلى الرقبة مع يد مسطحة ذات أصابع مستدقة تدريجياً.

**مُتَلَاَزِمَةُ دِنِي - مَارْفَان.** **Dennie - Marfan s.** - شلل تشنجي وتخلف عقلي يترافق مع الزهري الخلقي.

**مُتَلَاَزِمَةُ دِي** **De Sanctis Cacchione s.** - **سانكتيس كاشيون.** متلازمة وراثية تنتقل كصفة جسدية متنحية تتكون من جفاف الجلد المنصبغ والمترافق مع التخلف العقلي وتخلف النمو ونقص تنسج الغدد التناسلية وأحياناً مع مضاعفات عصبية وحساسية للضوء.

**مُتَلَاَزِمَةُ الدِّمَاغِ الدِّينِي.** **diencephalic s.** - عدم المقدرة على البقاء حياً مع الهزال الشديد وأحياناً مع تخلف الالتئام.

**مُتَلَاَزِمَةُ دَاون:** ثلاثية الصبغي 21. **Down's s.** - اضطراب صبغي يتصف بجمجمة صغيرة مسطحة أمامية خلفية وجسر أنف مسطح وطية غضنية وسلاميات قصيرة واتساع المسافة بين إبهام اليد والقدم وسبابتها مع تخلف عقلي شديد أو معتدل ويصاب المريض بداء الزهايمر في العقد الرابع أو الخامس من عمره.

**Duchenne-Erb s. (= Duchenne- Erb disease)** **مُتَلَاَزِمَةُ دُوشِين إِرْب.**

**مُتَلَاَزِمَةُ دُوبرِيَة:** **Dupré's s. (= meningism)** - التشنج السحائي المنشأ

**مُتَلَاَزِمَةُ دَايك - دَايفِيدُوف.** **Dyke- Davidoff s.** - متلازمة يحتمل أن تنتج عن إصابة شديدة أو مرض شديد يصيب إحدى جهتي الدماغ خلال الفترة الوليدية وتتصف بالتخلف العقلي وعدم تناظر الوجه ومختلف درجات الشلل النصفي (الفالج) وتردي الوظائف العصبية في الجهة المقابلة للإصابة مع ضمورها.

**مُتَلَاَزِمَةُ** **dysmnestic s. (= amnesic s.)** - **نَسَاوِيَّة:** متلازمة خلل الذاكرة.

**مُتَلَاَزِمَةُ إِيْتِن - لَامْبَرْت.** **Eaton- Lambert s.** - متلازمة شبيهة بالوهن العضلي الذي يصيب عضلات

الأطراف ولا تصاب فيه عضلات العين. كما يظهر نقص في جهد الفعل فيها عند تنبيه أعصابها ولكنه يعزز عند تنبيهها المتكرر وهو يترافق عادة مع سرطان الرئة الشوفاني الخلايا.

**- effort s. (= neurocirculatory asthenia)**

مُتَلَاَزِمَةُ الجُهد. وهن عصبي دوراني.

**- empty sella s.**

مُتَلَاَزِمَةُ السَّرْجِ الفَارِغ.

متلازمة تشخص بالأشعة وتنصف بحاجز أثري للسرج ويكون السرج التركي امتداداً للحيز تحت العنكبوتية ويمتلأ بالسائل الدماغي النخاعي وتبدو الحفرة النخامية خالية بالرغم من وجود الغدة النخامية فيه بشكل مسطح وقد يكون إفرازها سوياً أو مفراطاً أو ناقصاً.

**- encephalotrigeminal vascular s.**

المُتَلَاَزِمَةُ الوَعَائِيَّةُ الدُّمَاغِيَّةُ الثَّلَاثِيَّةُ التَّوَائِم. ترافق الأورام الوعائية المتعددة في الدماغ والوحمات الوعائية في منطقة انتشار العصب ثلاثي التوائم.

**- epiphyseal s.**

المُتَلَاَزِمَةُ العَظْمِيَّة. التطور

المبكر للأعضاء التناسلية الظاهرة وللوظائف الجنسية والتنامي المبكر للشاذ للعظام الطويلة وظهور علامات موه الدماغ في غياب كل الأعراض الحركية والحسية الأخرى مما يدل على آفة الجسم الصنوبري.

**- Erb's s.**

مُتَلَاَزِمَةُ إِرَب. مجموعة علامات

الوهن العضلي الوبيل.

**- extrapyramidal s.**

مُتَلَاَزِمَةُ خَارِجِ الهَرَمِيَّة.

أي من مجموع الاضطرابات السريرية التي تنصف بحركات لا إرادية شاذة والتي تشمل الباركنسونية والكنع والرقص.

**- floppy infant s.**

مُتَلَاَزِمَةُ الطِّفْلِ الرِّخْو.

اعتلال عضلي خلقي في الأطفال يتصف سريرياً بنقص التوتر وضعف العضلات. وتشمل التغيرات المرضية في العضلات الهيكلية وجود العديد من البلورات الحمضية (اليوزينية) في داخل الخلايا مع شكلياء بلورية مميزة وتشدد ليفي عضلي وبلورات هيولية عضلية وتوسع شريط Z فيها.

**- Foster- Kennedy s. (= Kennedy's s.)**

مُتَلَاَزِمَةُ فُوسْتَر كَنْدِي.

**- Foville's s.**

مُتَلَاَزِمَةُ فُوفِيل. متلازمة تشبه

متلازمة ميلارد - غوبلر ما عدا وجود شلل إضافي لحركات العين للداخل بالإضافة لشلل حركاتها للخارج.

**- fragile X s.**

متلازمة

مرتبطة بالصبغي اكس بوجود موقع هش على ذراعه الطويل عند الموقع 27-28. ويترافق مع التخلف العقلي وضخامة الخصيتين وارتفاع الجبهة وضخامة الفك السفلي وطول الأذنين في معظم الذكور المصابين مع تخلف عقلي بسيط في معظم الإناث متبايني الزيجوت. وقد ينجو بعض الذكور في بعض العائلات من هذه المتلازمة الوبائية.

**- Frey's s. (= auriculotemporal s.)**

قوي؛ المتلازمة الأذنية الصدغية.

**- Froin's s.**

مُتَلَاَزِمَةُ فُروَان. حالة في السائل

النخاعي القطني تنصف بتلونه بلون أصفر شفاف صافي (اصفرار) مع وجود كمية كبيرة من البروتين فيه، وهو سريع التخرثر مع عدم وجود زيادة في عدد الكريات فيه. وهو يشاهد في بعض الأمراض العصبية العضوية التي ينقطع فيها اتصال السائل النخاعي القطني مع السائل في البطينات.

**- frontal lobe s.**

مُتَلَاَزِمَةُ الفَصِّ الجَبْهِي.

الظواهر السريرية التي تتولد من آفة في أحد الفصين الجبهيين فقد تؤدي آفة القشرة الحركية إلى صرع جاكسوني أو خزل شقي أو فالج (شلل شقي) في الجهة المقابلة. أما الآفة التي تقع أمام المنطقة الحركية فإنها تؤدي إلى النسابة والعمول وضعف التركيز والانتباه مع الهيجوية والتصرف غير المناسب وقلة الكبت وإذا ما أصيبت الجهة السائدة فإنها تؤدي أيضاً إلى حبسة بروكا. وإذا ما أصيبت الباحة الجبهية البصرية فيؤدي ذلك إلى انحراف العين إلى الجهة المعاكسة. كما قد يحدث رنح جبهي وتعدُّر الأداء وخشام بجهة واحدة مع بعض الاضطرابات الشرطية والمستقلية وكل ذلك يعتمد على منطقة الفص الجبهي المصابة.

**- Ganser's s.**

مُتَلَاَزِمَةُ غَانَسَر. إعطاء أجوبة

تقريبية أو غير صحيحة تماماً للإشارة في حالات النسابة والتوهان واضطرابات الإدراك والشراد والانقلاب.

**- Gellineau's s. (= narcolepsy)**

غِيلِينَاو. نوم انتبائي، أو سبخ.

**- gender dysphonia s.**

مُتَلَاَزِمَةُ قَلَقِ الجِنْس. مجموعة من المشاكل النفسية التي ترافق مع التناقض بين تعيين الجنس العضوي وشخصية الجنس النفسية.



- **general adaptation s.** مُتَلَاذِمَةُ الْقَلَاوُم. الغَام. مجموع الاستجابات الجهازية اللاوعوية المنظمة للجسم عند التعرض الطويل للكره المزمن.
- **Gerstmann's s.** مُتَلَاذِمَةُ غَرَسْتَمَان. مجموعة. عمه الأصابع وتوهان اليمين واليسار وتعذر الحساب وتعذر الكتابة وغالباً تعذر الاداء البنائي بسبب آفة في التلفيف الزاوي لنصف كرة المخ السائد.
- **Gilles de la Tourette's s.** مُتَلَاذِمَةُ غِيلَة دي. لَأُتُورِيْت. متلازمة عرة وجهية وصوتية تبدأ في الطفولة وتتطور إلى حركات نفضية في أي قسم من أقسام الجسم مع صداء لفظي وبذاء وقد كان المعتقد بأنه مرض سيء الإنذار ولكنه وجد اليوم بأنه يستجيب للمعالجة بالبيوتيروفينون.
- **Gower's s. (= vasovagal attack)** مُتَلَاذِمَةُ. كَاوَر. نوبة وعائية مبهمية.
- **Gradenigo's s.** مُتَلَاذِمَةُ غَرَادِينِيكُو. شلل العصب السادس وصداع شقي في مرض الآن الوسطى التقيحي ينتج عن إصابة العصبين المبعد وثلاثي التوائم لانتشار العدوى المباشر إليهما.
- **gray spinal s.** مُتَلَاذِمَةُ سِنْجَابِيَّةِ الشَّخَاع. ضمور عضلي واضطراب حسي تكهفي نخاعي وحركي وعائي بسبب آفة المادة السنجابية للنخاع الشوكي.
- **Guillan- Barré s. (= acute febrile polyneuritis)** مُتَلَاذِمَةُ غِيلَان - بَارِيه. التهاب الاعصاب الحموي الحاد.
- **gustatory s. (= auriculotemporal s.)** مُتَلَاذِمَةُ ذَوْقِيَّة.
- **Hakim's s.** مُتَلَاذِمَةُ حَكِيم. موه الرأس. إسوي الضغط.
- **Hallervorden- Spatz s.** مُتَلَاذِمَةُ هَالِرْفُورْدِن - سِبَاتَز. اضطراب وراثي يتصف بنقص شديد في عدد الاغمد الميالينية للكرة الشاحبة والمادة السوداء مع تراكم صباغ الحديد وحمل مترقي يبدأ في الساقين وحركات رقصية كنعية والرتة (عسر التلطف) وترد عقلي مترقي. وهو ينتقل كصفة جسدية متنحية ويبدأ عادة في العقد الاول أو الثاني من العمر وينتهي بالموت قبل سن الثلاثين.
- **hand- shoulder s.** مُتَلَاذِمَةُ الْيَد - الْكَتِف. حثل ودي انعكاسي في الطرف العلوي. انظر hand- shoulder dystrophy.
- **Heidenhain's s.** مُتَلَاذِمَةُ هَيْدِنْهَيْز. مرض يتطور بسرعة كبيرة ويظهر كحصى قشري وخرف قبل الشيخوخي والرتة (عسر التلطف) والرنح والحركات الكنعية والصمل العام.
- **Hoffmann-Werdnig s. (= Werdnig-Hoffmann)** مُتَلَاذِمَةُ هُوفْمَان - فِرْدْنِيغ.
- **Holmes- Adie s. (= Adie's s.)** مُتَلَاذِمَةُ هُولْمَز - أَدِي.
- **Homen's s. (= postconcussional s.)** المتلازمة التالية للارتجاج؛ مُتَلَاذِمَةُ هُومِن. مرض يتصف بالدوار والرنح والرتة (عسر التلطف) والخرف المتزايد تدريجياً مع صمل الجسم وخاصة الساقين ويتولد من الرضح المتتالي للرأس كالذي يحدث للملاكمين.
- **Horner's s. (= Horner- Bernard s.)** مُتَلَاذِمَةُ هُورْنَر. انكماش العين وغزورها وتدلي الجفن العلوي وارتفاع الجفن السفلي الجزئي وتضيق الشق الجفني وعدم التعرق واحمرار الجهة المصابة من الوجه والذي ينتج عن شلل الاعصاب الودية الرقبية.
- **Horton's s.** متلازمة هُورْتَن. 1. ألم الاعصاب الشقيقي 2. التهاب الشريان الصدغي.
- **Hunt's. (= Ramsay-Hunt s.)** مُتَلَاذِمَةُ هُنْت.
- **Hutchinson- Gilford s. (= progeria)** مُتَلَاذِمَةُ هِتْشِنْسُون - غِلْفُورْد؛ شياخ.
- **hyperabduction s.** مُتَلَاذِمَةُ فَرْطِ التَّبَعِيد. متلازمة مخرج الصدر التي تسبب انضغاط جذور جذع الضفيرة العضدية والاعوية الإبطية بالعضلة الصدرية الصغيرة والناتئ الغرابي عند تمديد الذراع فوق الرأس كما يحصل أثناء النوم مثلاً.
- **hyperactive child s.** مُتَلَاذِمَةُ الطِّفْلِ مُفْرِط. النشاط. اضطراب نقص الانتباه عند الطفل مفرط الفعالية.
- **hyperkinetic s. (= hyperactive child s.)** مُتَلَاذِمَةُ فَرْطِ الْحَرَكَة.
- **hypertelorism- hypospadias s. (= Opliz s.)** مُتَلَاذِمَةُ فَرْطِ التَّبَاعَد - مَبَالِ تَحْتَانِي. متلازمة وراثية سائدة مع فتوق وتنصف في الذكور بمبال تحتاني واختفاء الخصية وانشقاق الصفن مع عيوب قلبية وتشوهات قصبية مريئية وعدم انفتاح

- الشرج وعيوب كلوية وفرط تنسج الرئة وتضييق الشق الجفني.
- **hypothalamic s.** **مُتَلَاَزِمَةٌ وَطَائِيَّةٌ.** أي من الأمراض أو المتلازمات العديدة التي تنتج عن آفة الوطاء وسبله الصادرة وتتصف باضطرابات النوم والقهم والهزال أو فرط الشهية واضطرابات تنظيم درجات حرارة الجسم والعيوب التنفسية والقلبية الوعائية واضطرابات الاستقلاب الرئيسية مثل الدراق الجحوظي والبولية التفهة أو البيلة السكرية وشذوذ النمو مثل القزامة. كما تحصل اضطرابات جنسية ونفسية وفكرية وعاطفية وذاكرية.
- **hypothalamic commissural s.** **مُتَلَاَزِمَةٌ وَطَائِيَّةٌ صَوَائِيَّةٌ.** متلازمة تتولد من إصابة في منطقة بين المهاد والدماغ المتوسط، وهي تشمل فقدان الحس العميق في أحد الأطراف وخزل شقي في الجهة المقابلة مع عَمَى شقي مماثل وحركات رقضية كتعية وعيوب مخيخية بجهة واحدة.
- **inferior s. of red nucleus (= Claude's s.)** **الْمُتَلَاَزِمَةُ السُّفْلِيَّةُ لِلْفَوَاةِ الْحَمْرَاءِ.**
- **Jakson's s.** **مُتَلَاَزِمَةٌ جَاكْسُون.** شلل الاعصاب العاشر والحادي عشر والثاني عشر القحفية مع شلل الحَقَاف (شرع الحنك) والحنجرة ونصف اللسان والعضلتين القصية الخشائية وشبه المنحرفة.
- **jaw-winking s. (= Gunn's s.)** **مُتَلَاَزِمَةُ رَفَّةٍ.** تدلي الجفن على جهة واحدة مع ترافق حركات الجفن المصاحب مع حركات الفك السفلي.
- **Jugular foramen s. (= Vernet's s.)** **مُتَلَاَزِمَةُ الْفَقْبَةِ الْوُدَاجِيَّةِ.**
- **Kearns-Sayre s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كِيرْنِس - سَايِر.** شلل عيني مترقي مع تنكس الشبكية الصباغي والاعتلال العضلي والرنج وغيب التوصيل القلبي، وهو مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة ويبدأ قبل سن الخامسة عشر.
- **Kennedy's s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كَنْدِي.** التهاب العصب البصري خلف العقلة والعنمة المركزية والضمور البصري على جهة الآفة ووذمة الحليمة البصرية على الجهة المعاكسة ويحدث ذلك في أورام الفص الجبهي التي تضغط الأسفل.
- **Kiloh-Nevin s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كِيلُو - نِيْفِن.** اعتلال عضلي عيني مع تدلي الجفن وشلل العين الخارجي المترقي.
- **kinsbourne s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كِينْزْبُورْن.** اعتلال دماغي رمعي عضلي في الأطفال.
- **Klein-Levin s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كَلَايْن - لِيْفِن.** فترات عارضة من النوم المفرط وكثرة الأكل تدوم لعدة أسابيع وعادة ما تحدث في الأولاد البالغين.
- **Klippel-Feil s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كَلِيل - فَايِل.** حالة تتصف بقصر الرقبة لسبب نقص عدد الفقرات الرقبية أو اندغام عدد من انصاف الفقرات بكتلة عظمية واحدة مما يحدد حركة الرقبة مع انخفاض خط الشعر عليها.
- **Klumpke-Dejerine s. (= klumpke's paralysis)** **مُتَلَاَزِمَةُ كُلُومِبَكَة - دِيْجِيرِين:** شلل كلومبكية.
- **klüver-Bucy s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كُلْفَر - بُوْسِي.** اضطرابات سلوكية غريبة تظهر في القرود بعد استئصال الفصين الصدغيين التجريبي الذي يتلف بنيات خوفية مهمة. كما يمكن أن تحدث المتلازمة في الإنسان بسبب إصابة قاعدة الدماغ بالرضح الذي يخرب السطح السفلي للفصين الصدغيين. وتتصف المتلازمة برغبة المريض بفحص الأشياء بواسطة الفم وضعف الإرادة والانفعالات العاطفية وفرط التحول وضعف الكبت الجنسي.
- **Korsakoff's s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كُورْسَاكُوف.** متلازمة فقد الذاكرة السابقة واللاحقة مع تخريف يترافق مع التهاب الاعصاب الكحولي أو اللاكحولي وتوصف هذه المتلازمة ضمن متلازمة فقد الذاكرة وقد تنتج عن عوز الثيامين.
- **Krause's s.** **مُتَلَاَزِمَةُ كَرَاوُزَة.** خلل التنسج في الشبكية والدماغ الذي يشاهد في الولدان الخدج عدة أشهر بعد ولادتهم ويتصف بسوء تكون المشيمية والشبكية والعصب البصري والعنى المحتمل والساد والزرق والثلامة وصغر العين ويشمل سوء التنسج الدماغي أو عدم تنسجه أو فرط تنسجه أو ضخامته مع موه الدماغ وصغر الرأس والتخلف العقلي.
- **Kugelberg-Welander s. (= juvenile familial muscular atrophy)** **مُتَلَاَزِمَةُ كُوكُلْبِرْغ - فِلَانْدَر.** الضمور العضلي الحداثي العائلي.
- **Landry's s. (= acute febrile polyneuritis)** **مُتَلَاَزِمَةُ لَانْدْرِي.** التهاب الاعصاب الحموي الحاد.

- **Laurence- Moon s.** مُتَلَاَزِمَةُ لُورَنْس - مُون. اضطراب جسدي متنحٍ يتصف بالتخلف العقلي والاعتلال الشبكي الانصبغي وقصور الغدد التناسلية والشلل النصفي التشنجي.
- **Launois s.** مُتَلَاَزِمَةُ لُونُوا. عملاقة بسبب فرط إفراز الغدة النخامية تظهر قبل البلوغ وقبل التحام المشاشات.
- **Leigh s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِي. اعتلال دماغي نخاعي.
- **Lennox s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِينُوكْس. اعتلال دماغي صرعي طفولي يتصف بظهور موجات وتدبة بطيئة منتشرة في المخطط الكهربائي لدماغ الأطفال المصابين.
- **Lermoyez's s.** متلازمة ليرمويز. طنين وفقدان السمع اللذان يسبقان نوبة الدوار ثم يختفيان بعد ظهور الدوار ودوامه.
- **Lesch-Nyhan s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِيَش - نِيهان. اضطراب نادر مرتبط بالصيفي أكس لاستقلاب البورين يتصف بالتخلف الجسدي والعقلي والخلل الدماغي التشنجي واضطراب الوظائف الكلوية.
- **levator s.** مُتَلَاَزِمَةُ الرَّافِعَةِ. ألم عارض مع الشعور بالامتلاء والضغط في المستقيم والمنطقة العجزية العصبية بسبب تشنج العضلة رافعة الشرج.
- **Leyden-Moebius s.** مُتَلَاَزِمَةُ لِيدِن - مُوبيو. حثل عضلي في حزام الذراع. انظر limb girdle muscular dystrophy.
- **Lichtheim's s. (= subacute combined degeneration of the spinal cord)** مُتَلَاَزِمَةُ لِيخْتِهَيْم. انظر degeneration.
- **«locked in» s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْمُنْحَبِس. حالة الشلل التام ما عدا بعض أنواع حركات العين الإرادية بسبب آفة الطرق الحركية للأعصاب القحفية السفلية والأعصاب الحركية للأطراف بالجهتين.
- **Louls Bar s. (= ataxia- telangiectasia)** مُتَلَاَزِمَةُ لُويس بَار. متلازمة توسع الشعيرات الرنحي.
- **lower radicular s. (= Klumpke's s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الْجَذُورِ السُّفْلِيَّة.
- **Lowe's s. (= oculocerebrorenal s.)** مُتَلَاَزِمَةُ لُفِي. المتلازمة العينية المخية الكلوية.
- **Mackenzie's s. (= Jakison's s.)** مُتَلَاَزِمَةُ مَكَنْزِي. مَكَنْزِي.
- **manic s. (= manic episode)** مُتَلَاَزِمَةُ هُوسِيَّة. نوبة هُوسِيَّة.
- **maternal deprivation s.** مُتَلَاَزِمَةُ جُزْمَان. تأخر النمو وسلوك انطوائي وتخلف عقلي ينتج عن الحرمان من الأم أو عن الأمومة المحبة.
- **Menier's s. (= Menier's disease)** مُتَلَاَزِمَةُ مَنِيير. مَنِيير.
- **Millard-Gubler s.** مُتَلَاَزِمَةُ مِيلَارِد - غُوبِلَر. شلل متصالب يصيب إحدى جهتي الجسم ونصف الوجه على الجهة المعاكسة مع شلل حركة العين للخارج وينتج ذلك عن احتشاء الجسر الذي يصيب العصبين القحفيين السادس والسابع والياف السبيل القشري النخاعي.
- **Mobius's s.** متلازمة موبْيوس. عدم تكون أو عدم تنسج النوى الحركية للأعصاب القحفية والذي يتصف بشلل الوجه الخلقي بالجانبين بمختلف الصور مع شلل مبعدة العين على جهة واحدة أو على الجهتين والذي يترافق أحياناً مع إصابة بعض الأعصاب القحفية الأخرى خصوصاً محرك العين وثلاثي التوائم وتحت اللساني مع تشوهات الأطراف.
- **Monakow's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُونَاكُوف. فالج (شلل شقي) على الجهة المعاكسة على آفة انسداد الشريان المشيمي الأمامي والذي يترافق أحياناً مع الخدر الشقي والعمى الشقي.
- **Moore's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُور. صرع بطني.
- **Morquio's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُورْكِيُو. مرض كيميائي حيوي يتصف بطرح سلفات الكريتان بالبول ويؤثر المرض سريرياً في البداية على العضلات الهيكلية وشم على الجهاز العصبي ومن أعراضه قصر الرقبة والجذع وسحنة واسعة الفم مع صمم مترق وتغيم القرنية الجزئي ومن دون تأثير على ذكاء المريض أو على قواه العقلية.
- **Morvan's s.** مُتَلَاَزِمَةُ مُورفَان. 1. تكهف النخاع 2. أعراض تكهف النخاع مع تثخن النسيج تحت الجلدي للبدن التي تصبح وذمية ولينة ومتورمة

وزراقية وباردة مع تقرح غير مؤلم لنهايات الاصابع ومذل وضمور الساعدين واليدين.

**- myasthenia gravis s. (= Erb's s.)**

**مُتَلَاَزِمَةُ الْوَهْنِ الْعَضَلِيِّ الْوَيْبِل.**

**- neocerebellar s.** **مُتَلَاَزِمَةُ الْمُخَيِّخِ الْحَدِيثِ.**  
مجموعة من المظاهر تنتج عن آفات نصف كرة المخيخ التي تشمل نقص التوتر واندفاع جانبي نحو جهة الإصابة وعدم التناسق الحركي وخلل القياس والرعاش القصدي وخصوصاً في الذراعين وقد تظهر في الساقين أيضاً. وتزداد هذه الاضطرابات سوءاً عندما تصيب الآفة النواة المسننة أيضاً.

**- neuroleptic malignant s.** **الْمُتَلَاَزِمَةُ الْوَيْبِلَةُ.**  
لِمُضَادَّاتِ الدُّهَانِ. رد فعل نادر وأحياناً مميت لبعض مضادات الدهان والذي يتصف بارتفاع درجة الحرارة والصلل والسبات (الغيبوبة).

**- Nonne's s. (= hereditary cerebellar ataxia)** **مُتَلَاَزِمَةُ نُؤْنَةِ.** رنح مخيخي وراثي.

**- Nothnagel's s.** **مُتَلَاَزِمَةُ نُوفَنَاجِل.** شلل محرك العين على جهة واحدة مع رنح مخيخي يحدث في آفات السويقتين المخيخيتين.

**- oculocerebrorenal s.** **مُتَلَاَزِمَةُ عَيْنِيَّة.**  
بِمَاغِيَّةٍ كَلَوِيَّةٍ. اضطراب مرتبط بالصبغي اكس يتصف برخد فيتامين D المستعصي على المعالجة وموه العين والزرق الخلقي والساد والتخلف العقلي وسوء وظيفة إعادة الامتصاص الكبيبي مما يؤدي إلى نقص الفسفورتيمة والحمض وبيلة الحمض الاميني.

**- oral-facial-digital s.** **مُتَلَاَزِمَةُ فَمَوِيَّة -**  
**وَجْهِيَّة - إصْبَعِيَّة.** مجموعة اضطرابات وراثية تنتقل كصفات جسدية متنحية وتؤدي إلى تشوهات الاصابع وعيوب قحفية ووجهية ولسانية وسنية وتخلف عقلي ورعاش عائلي والحاصة والمث الوجهيين.

**- organic anxiety s.** **مُتَلَاَزِمَةُ الْقَلْقِ الْعَضْوِي.**  
متلازمة عقلية عضوية تتصف بنوبات هلع شديدة معاودة أو قلق عام ينتج عن عامل عضوي معين وغير مترافق مع الهذيان، ومن اسبابها الاضطرابات الصماوية كقرط الدرقية وورم القواتم وقلة سكر الدم وفرط الكورتيزول أو استعمال الادوية المؤثرة نفسياً.

**- organic brain s. (= organic mental s.)** **مُتَلَاَزِمَةُ الدُّمَاغِ الْعَضْوِيَّة.**

**- organic delusional s.** **مُتَلَاَزِمَةُ الْوُهَامِ**

**الْعَضْوِي.** متلازمة دماغية عضوية تتصف بالوهام الذي ينتج عن عامل عضوي معين وغير مترافق مع الهذيان ومن المواد المسببة لها الامفيتامين والقنب والمهلسات والأمراض العضوية كصرع الفص الصدغي ورضح الرأس أو آفات الدماغ أو رقص هنتنغتون. وتسمى المتلازمات التي تولدها الادوية اضطرابات فيقال مثلاً اضطراب التوهم الكتابسي.

**- organic mental s.** **الْمُتَلَاَزِمَةُ النَّفْسِيَّةُ الْعَضْوِيَّة.**  
مجموعة من الاعراض والعلامات النفسية أو السلوكية التي تترافق مع واحد أو أكثر من العوامل العضوية النوعية المسببة للأمراض النفسية وهي تشمل ست متلازمات دماغية نوعية عضوية وهي الهذيان مع الخرف ومتلازمة النساء أو الهلوسة العضوية ومتلازمة التوهم العضوي ومتلازمة المزاج العضوية ومتلازمة القلق العضوي ومتلازمة الشخصية العضوية والتسمم والانعزال، وهناك بعض المتلازمات النفسية العضوية التي لم تصنف بعد وعندما يكون السبب أحد المواد أو الادوية تسمى المتلازمة «اضطراب». فيقال اضطراب الوهام الناتج عن الحشيش أو القنب مثلاً.

**- organic mood s.** **مُتَلَاَزِمَةُ الْمَزَاجِ الْعَضْوِيَّة.**  
متلازمة دماغية عضوية تتصف بالمزاج الهوسي أو الاكتئابي وتنتج عن عامل عضوي معين وغير مترافق مع الهذيان ومن اسبابها الرئيسية العقاقير والمواد المؤثرة نفسياً مثل الريفزبين والمثيل دوبا وبعض الادوية المثيرة للهلوسة والاضطرابات الصماوية مثل متلازمة كوشينغ وداء اديسون وفرط الدرقية وفرط الدرقية والاخماج الفيروسية.

**- organic personality s.** **مُتَلَاَزِمَةُ الشَّخْصِيَّةِ الْعَضْوِيَّة.** متلازمة دماغية عضوية تتصف بالتغير الكبير في سلوك المصاب وشخصيته مثل التقلقل العاطفي الذي يتصف بالخمول وعدم السيطرة على الإدارة أو التفكير الزوراني ويتولد كل ذلك عن عامل عضوي ولا يرافق هذه المتلازمة اي هذيان أو خرف ومن أهم اسبابها آفة حيزية في الدماغ أو رضح الرأس أو الامراض الدماغية الوعائية.

**- painful arc s.** **مُتَلَاَزِمَةُ الْقَوْسِ الْوَلِيم.**  
الم المنكب الذي يصيب جزءاً من القوس الذي يتكون عند تباعد الذراع من جنب الجسم إلى الوضع المرتفع العالي والذي يحدث عند التهاب اوتار العضلة فوق الشوكة.

- **paleocerebellar s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْمُخَيِّخِ الْقَدِيمِ. المتلازمة السريرية التي تترافق مع أمراض المخخ القديم (وخاصة الدودة ونوى السقف) وتتصف بصعوبة سير المريض الذي يترنح من جهة لأخرى في سيره والذي يجد صعوبة في الوقوف أو الدوران ولكن هناك القليل أو عدم وجود أية علامات للرنح أو عدم تناسق الحركات عند فحص الأطراف بصورة مفردة.
- **paleostriatal s. (= juvenile paralysis agitans)** مُتَلَاَزِمَةُ الْجِسْمِ الْمُخَطَّطِ الْقَدِيمِ. الشلل الرعاشي اليغفي.
- **pallidal s. (= juvenile paralysis agitans)** مُتَلَاَزِمَةُ الشَّاحِبَةِ. الشلل الرعاشي الحداثي.
- **pallidomesencephalic s.** مُتَلَاَزِمَةُ الدُّمَاغِ العتوسط والكرة الشاحبة. متلازمة تتصف بالصمّل وضعف الحركة وبطنها وقد تصل إلى حد حالة الباركنسونية.
- **Pancoast's s.** مُتَلَاَزِمَةُ بَانْكُوسْت. متلازمة تتصف بوجود ظل صورة شعاعية في قمة الرئة مع ألم عصبي في الذراع وضُمور عضلاته وعضلات اليد ومتلازمة هورنر وتشاهد في الأورام القريبة من قمة الرئة والتي تؤثر على الضفيرة العضدية أيضاً.
- **paratrigeminal s.** مُتَلَاَزِمَةُ نَظِيرَةِ الثَّلَاثِيّ التَوَائِمِ. ألم عصبي انتيابي في الوجه يترافق مع شلل الودي (متلازمة هورنر).
- **Parinaud's s.** مُتَلَاَزِمَةُ بَارِينَو. شلل حركات العينين المترافقة للأعلى من دون شلل التقارب ويترافق ذلك مع آفات الدماغ المتوسط مثل ورم الغدة الصنوبرية.
- **parkinsonian s.** المُتَلَاَزِمَةُ الْبَارِكِنْسُونِيَّة. نوع من الباركنسونية ينتج عن التنكس المجهول السبب للجسم المخطط أو المادة السوداء وغالباً ما يحدث كعقبول لالتهاب الدماغ الوسني كما يمكن أن ينتج عن التصلب الشرياني الدماغية والسموم والزهرى العصبي والرضح. ويتصف المرض بالصمّل والسحنة الجامدة (السحنة الباركنسونية) والرعاش اللاإرادي البطيء (الذي يظهر عند الراحة ولكنه يختفي أثناء النوم وعند القيام بالحركات الإرادية) وانعدام الحركات الذاتية المرافقة والمشيّة المهرولة والوضعية المنحنية والإلعب.
- **Parry-Romberg s. (= facial hemiatrophy)** مُتَلَاَزِمَةُ بَارِي - رُومْبِرْغ. ضُمور شقي وجهي.
- **pineal s. (= epiphyseal s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الصَّنُوبَرِيَّة.
- **postconcussional s.** المُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةِ لِلاَزْتِجَاج. النساوة والصداع والدوام والطنين والهبوجية والتعبية والتعرق وخفقان القلب والأرق وصعوبة التركيز وهي الأعراض التي تحدث بعد ارتجاج الدماغ.
- **posterior cord s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْخَبَلِ الْخَلْفِي. ظواهر حسية ورنحية تنتج عن آفة الحبال الخلفية للنخاع الشوكي كالرنح التحركي.
- **posterolateral s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْخَلْفِي الْوُخْشِيّ. حالة رنحية وتشنجية تنتج عن آفات الأقسام الخلفية الوحشية للنخاع الشوكي.
- **post-lumbar puncture s.** المُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةِ لِلْبَزَلِ الْقَطْنِيّ. صداع عند الوقوف وأحياناً ألم قفوي وغثيان وقياء وتعرق غزير وفطور وهي أعراض تزول كلها عند الاستلقاء وتحدث بعد عدة ساعات من البزل القطني وتدوم لعدة أيام وهي تنتج عن انخفاض الضغط داخل القحف لتسرب السائل النخاعي الشوكي خلال إبرة البزل.
- **post-traumatic brain s.** المُتَلَاَزِمَةُ التَّالِيَةِ لَوُضْخِ الدُّمَاغِ. مصطلح عام يدل على كل الأعراض التي تحدث بعد إصابة الرأس.
- **prefrontal s.** مُتَلَاَزِمَةُ أَمَامِ الْجَبْهِيّ. مجموعة اضطرابات تنتج عن آفات الفص أمام الجبهي وتشمل قصور التنسيق الحركي وتعذر الأداء والاضطرابات النفسية (الشمق وعدم الكبت والثرثرة غير المناسبة وأحياناً الكآبة) مع انحطاط الذكاء والذاكرة وعدم المقدرة على التركيز، وقلما توجد كل هذه الاضطرابات مجتمعة مرة واحدة.
- **premotor s.** مُتَلَاَزِمَةُ أَمَامِ الْحَرَكِيَّة. تترافق الفالغ التشنجي مع فرط المنعكسات واضطرابات الحركات الحذقة والقبضة الشديدة والاضطراب الوعائي الحركي العابر وكلها تحدث في إصابات الباحة أمام الحركية.
- **pseudoclaudication s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْعَرَجِ الْكَاذِبِ. حالة تتصف بأعراض شبيهة بأعراض العرج

- المتقطع وتتولد عن انضغاط ذنب الفرس بسبب ضخامة أحرف الفقرات وانزلاق القرص القطني.
- **radicular s.** مُتَلَاَزِمَةٌ جَذَرِيَّة. متلازمة تتسبب عن آفات جذور الأعصاب النخاعية وتتكون من تحديد حركات العمود الفقري وآلام جذرية.
- **Ramsay Hunt s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رَمَزِي هَنْت. 1. هربس. 2. متلازمة يصيب الوجه والأعصاب السمعية ويترافق مع شلل وجهي على نفس الجانب وعادة ما يكون عابراً مع حويصلات هربسية في الأذن الخارجية أو غشاء الطبل وقد يترافق أو لا يترافق مع الطنين والدوار واضطرابات السمع. 3. تَعْدُرُ التَّأَرُّرُ المَخِيخِي المَتَرَقِي.
- **restless leg s.** مُتَلَاَزِمَةٌ تَعْلُلُ السَّاقَيْن. الإنزعاج الشديد العميق في ريلة الساق عند الجلوس أو الاستلقاء وخصوصاً قبل النوم مما تسبب الرغبة التي لا تقاوم في تحريك الساق.
- **Rett s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رَت. اضطراب مترق يصيب المادة السنجابية للدماغ ويصيب الإناث فقط منذ الولادة. ويتصف بالسلوك التلقائي والرنج والخرف والاختلاجات وفقدان المقدرة على استعمال اليدين لأغراض نافعة مع ضمور دماغي وفقرت أمونيا الدم ونقص مستويات الحموض الأمينية الضرورية.
- **Rey's s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رِي. داء نادر حاد ومميت أحياناً في الأطفال وغالباً ما يحدث كعقبول للحماق أو الخمج الفيروسي التنفسي العلوي ومن أعراضه القيء المتكرر مع تغيرات في الكبد والأحشاء الأخرى وله طور اعتلال دماغي يتصف بتورم الدماغ الحاد واضطرابات الوعي والنوبات التي تتلو ذلك.
- **rib-tilt s.** مُتَلَاَزِمَةٌ زَبْوَةُ الضِّلْع. اعتلال عصبي وربي ينتج عن شذوذ حركة النهايات الأمامية للأضلاع السفلية.
- **Riley-Day s. (= dysautonomia)** مُتَلَاَزِمَةٌ رَايْلِي - دَاي. خلل الفعل الذاتي.
- **Riley-Smith s.** مُتَلَاَزِمَةٌ رَايْلِي - سَمِيث. ضخامة الرأس من دون موهه والعديد من الاورام الوعائية الدموية ووذمة الحليمة البصرية الكاذبة.
- **rolandic vein s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْوَرِيدِ الزُّوْلَانْدِي. فالج ينتج عن اضطراب الدورة الوريدية.
- **Roth's s. (= meralgia paresthetica)** مُتَلَاَزِمَةُ رُوْث؛ ألم الفخذ المذلي.

- **Roussy-Dejerine s. (thalamic s.)** مُتَلَاَزِمَةُ رُوسِي - ديجيرين؛ المتلازمة المهادية.
- **Roussy-Levy s.** مُتَلَاَزِمَةُ رُوسِي - لِيْفِي. اضطراب وراثي بطيء الترقى ينتقل كصفة جسمية سائدة يترافق فيه الرنج الحسي مع انعدام المنعكسات وضُمُور عضلات الأطراف السفلية خصوصاً العضلات الشظوية مع رعاش سكوني (رعاش الوضعة) في اليد مع قدم خمصاء وقدم مخرلية وأحياناً جنف حدابي.
- **Rubinstein's s.** مُتَلَاَزِمَةُ رُوبِنْشْتَاين. حالة خلقية تنصف بخلف عقلي وحركي وأصابع غليظة وأصابع قدم كبيرة وبنية قصيرة وسحنة مميزة وتشمل الحنك العالي التقوس والأنف المنقاري وشذوذات عينية مختلفة وتكون الجدرات في الندبات الجراحية وثقبة عظمى واسعة وشذوذ الفقرات والقص.
- **rubrospinal cerebellar peduncle s.** مُتَلَاَزِمَةُ الرُّبُوفَةِ والنَّوَاة الحَمْوَاء النَخَاعِيَّة المَخِيخِيَّة.
- **Sanfilippo's s.** مُتَلَاَزِمَةُ سَانَ فِيلِيْبُو. أربعة أنواع من أشكال داء عديد السكريدات المخاطية المتباينة كيميائياً حيويّاً ولكن لا يمكن تفريقها سريريّاً والتي تنصف ببيلة سلفات الهباران وبالتردي العقلي السريع مع أعراض جسمية بسيطة ورأس كبير وتبدأ في سن 2-6 من العمر وتؤدي إلى الوفاة قبل سن العشرين.
- **scalenus s. (= scalenus anticus s.)** مُتَلَاَزِمَةُ الْأَخْمَعِيَّة. ألم فوق المنكب غالباً ما يمتد إلى الذراع (المتلازمة الرقبية العضدية) أو ينتشر إلى الأعلى خلف الرقبة وينتج عن انضغاط الأعصاب والأوعية بين الضلع الرقبى والعضلة الأخمعية الأمامية وتسمى أيضاً متلازمة الضلع الرقبى.
- **scapulocostal s.** المُتَلَاَزِمَةُ الْكَتِفِيَّةُ الصُّدْرِيَّة. ألم في الناحية العلوية أو الخلفية من حزام الكتف وينتشر إلى المناطق المجاورة نتيجة التغيير الطويل الأمد في العلاقة بين الكتف والجدار الظهري للصدر.
- **Schafer's s.** مُتَلَاَزِمَةُ شَيْفَر. ثخن الأظفار الخلقي المترافق مع تخلف التطور الجسدي والعقلي.
- **Schmidt's s.** مُتَلَاَزِمَةُ شَمِيْت. شلل في جهة واحدة يصيب الحبال الصوتية وشراع الحنك والعضلتين شبه المنحرفة والقصبة الترقوية الخشائية بسبب آفة النواتين الملتبسة والإضافية.

- segmentary s.** متلازمة القطعية. متلازمة تتولد من أفة المادة السنجابية للنخاع وتتصف بالضعف الشديد وضمور الشدافات المصابة.
- shoulder-hand s.** متلازمة الكتف واليد. متلازمة تتصف بالم المنكب وتيسه مع تورم اليد والمها بنفس الجهة ويحصل ذلك أحياناً بعد احتشاء العضلة القلبية ولكنه قد يحدث لأسباب أخرى غير معروفة.
- Shy-Drager s.** متلازمة شاي - دراغر. اضطراب مترق مجهول السبب يولد عجزاً شديداً أو الموت. ويبدأ بأعراض عدم كفاءة الجهاز المستقل ويشمل العناية (في الذكور) والإمساك والحاجة التبول أو انحباس البول وانقطاع التعرق ونقص الضغط القياسي والذي تتلوه علامات خلل الوظائف العصبية العام مثل الاضطرابات الشبيهة بالباركنسونية وعدم التناسق الدماغي وضمور العضلات وتنكسها والرعاش الغليظ للساقين.
- sleep apnea s.** متلازمة انقطاع النفس النومي. أعراض توقف التنفس التي تحدث عند التحول من النوم بدون الحركات العينية السريعة إلى نوم الحركات العينية السريعة أو عند تكرار اليقظة والنعاس أثناء النهار ويحدث غالباً عند الأشخاص السمان متوسطي العمر ويعتقد أن لذلك عدة أسباب منها تقبض المجاري الهوائية بسبب تضييق التوتر العضلي أثناء نوم الحركات العينية السريعة.
- Sly's s.** متلازمة سلاي. متلازمة تنتج عن داء عديد السكريات المخاطية وتتصف كيميائياً ببيلة سلفات الدرماتان ومن أعراضه السريرية التخلف العقلي.
- Smith-Lemli-Opitz s.** متلازمة سميث - ليلي - أوبتز. متلازمة وراثية تنتقل كصفة جسدية متنحية تتصف بعيوب خلقية عديدة ومنها صغر الرأس والتخلف العقلي ونقص التوتر وعدم اكتمال تطور الأعضاء التناسلية الذكرية وتشوهات الأنف وأصابع اليدين والقدمين.
- social breakdown s.** متلازمة انقطاع العلاقات الاجتماعية. أعراض المرضى النفسيين الذين ينقطعون عن مجتمعاتهم في مستشفياتهم وهي أعراض إضافية لمرضهم العقلي وتشمل الأعراض السلبيه المفرطة وتمثيل دور المرضى المزمنين وضمور القابلية على العمل وعلى التصرف الاجتماعي السوي.
- Sohval-Soffer s.** متلازمة سوفال سوفر. متلازمة خلقية تتصف بقصور الغدد التناسلية الذكرية المترافقة مع التشوهات العضلية الفقارية والرقبية المتعددة والتخلف العقلي.
- somnolence s.** متلازمة الوسن. حالة عابرة من النعاس والوسن والقهم (نقص الشهية) والهيجية والتغيرات في المخطط الكهربائي للدماغ ويحدث ذلك في الأطفال بعد تشيعهم في ابيضاض الدم أو الورم اللعني غير الهدجكن.
- Sorsby's s.** متلازمة سوزسي. حالة خلقية تتصف بالثلاثة البقية بالجهتين المترافقة مع الحثل القمي لليدين والقدمين وغالباً مع قصر الاصابع خصوصاً في السلاميتين الانتهايتين.
- Sotos's s. (= cerebral gigantism)** متلازمة سوتو. العمقة الدماغية.
- split-brain s.** متلازمة الدماغ المشطور. مجموعة أعراض تتولد عن قطع الاتصال بين نصفي كرة الدماغ.
- Steele-Richardson-Olszewski s.** متلازمة ستيل - ريشاردسون - أولزفسكي. اضطراب عصبي مترق يبدأ خلال العقد السادس من العمر ويتصف بالشلل العيني فوق النووي وخصوصاً شلل الحلقة السفلية والشلل شبه البصلي وخلل التلفظ وصل التوتر المختل في الرقبة والذراع والخرف.
- Steinbrocker's s. (= shoulder-hand s.)** متلازمة شتاينبروكر. متلازمة الكتف - اليد.
- stiff-man s.** متلازمة الرجل المتيبس. حالة مجهولة السبب تتصف بصمل متذبذب مترق للعضلات المحورية والظرافية في حالة غياب أي مرض دماغي أو نخاعي ولكن مع فعالية كهربائية عضلية مستمرة.
- stroke s.** متلازمة السكتة. حالة تبدأ ببداية مفاجئة تتسبب عن آفات الدماغ الوعائية مثل النزف أو الانصمام أو الخثار أو انفجار أم الدم وتبدأ الحالة كفالج أو خزل شقي والدوار والتأمل والحيرة والرتة وعادة ما يتبع ذلك تلف عصبي دائم.
- Sturge-Weber s.** متلازمة سترج - ويبر. متلازمة خلقية مجهولة السبب تتكون من باحات من الوحات احلوردية اللون منتشرة فوق منطقة العصب

الثلاثي التوائم مترافقة مع اضطراب وعائي في السحايا الكائنة تحتها وعلى قشرة المخ وهي عادة ما تحدث بجهة واحدة.

**subclavian steal s.** مُتَلَاَزِمَةٌ سَرِقَةٌ تَحْتَ التَّرْقُوة. إقفار دماغي أو جذعي دماغي ينتج عن انحراف جريان الدم من الشريان القاعدي إلى الشريان تحت الترقوي عند وجود مرض انسداد في الجزء العلوي من الشريان تحت الترقوي.

**tarsal tunnel s.** مُتَلَاَزِمَةُ النَّقْرِ الرَّصْغِيِّ. مجموعة من الأعراض التي تتولد من انضغاط العصب الظنبوبي الخلفي أو الأعصاب الاخصية في النفق الرصغي الذي يولد الألم والتئمل والمذل النخري في أخمص القدم.

**tegmental s.** المُتَلَاَزِمَةُ السَّقِيفِيَّة. فالج يترافق مع حركات عينية مضطربة ورنح يتولد عن آفة السقيفة والنواة الحمراء والسبيل القشري النخاعي.

**temporomandibular s.** المُتَلَاَزِمَةُ الصَّدْغِيَّة. صمم جزئي مع حس انسداد الأذن والطنين وقرقرة المفصل الصدغي الفكي السفلي وصداغ وحراق وآلم في الأذن والبلعوم والأنف واللسان.

**tethered cord s.** مُتَلَاَزِمَةُ الْحَبْلِ الْمُطْوَل. شذوذ خلقي يتصف بمخروط نخاعي واطيء شاذ مطول بأحد أشكال الشذوذ داخل الجافية مثل خيط انتهائي قصير وسميك أو أشرطة ليفية أو التصاقات أو ورم شحمي داخل الجافية.

**thalamic s. (= thalamic pain s.)** المُتَلَاَزِمَةُ المِهادِيَّة. مجموعة من الأعراض التالية 1. خدر نصفي سطحي مستقيم 2. فالج معتدل 3. رنح شقي معتدل وغمه التجسيم التام تقريباً 4. ألم شديد ومستديم في الجهة المشلولة 5. حركات رقصية كنعانية في الأقسام المشلولة.

**Thiele's s.** مُتَلَاَزِمَةُ تَيْلَة. ألم وإيلام في منطقة القسم السفلي من العجز والعصعص أو في الأنسجة الرخوة والعضلات المجاورة لهما.

**thoracic outlet s.** مُتَلَاَزِمَةُ مَخْرَجِ الصَّدْر. انضغاط الجذوع العصبية للضغيرة العضدية الذي يتصف بالآلم الذراع ومذل الأصابع وبأعراض حركية وعائية (الشحوب وزراق النهايات وأعراض رينو الثانوية..الخ) مع ضعف وضمور العضلات الصغيرة لليد. ومن الممكن أن تنتج عن سقوط حزام الكتف أو

الضلع الرقبي أو اليد الليفية أو الضلع الأول الشاذ أو فرط تباعد الذراع المستمر أو انضغاط حافة العضلة الاخصية الامامية.

**trisomy 8 s.** مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 8. متلازمة تترافق مع وجود صبغي 8 إضافي ويتصف بتخلف عقلي بسيط إلى شديد مع بروز الجبهة وانخساف العينين وثخن الشفاه وبروز الأذن.

**trisomy 13 s.** مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 13. زيغ صبغي يسبب فيه صبغي 13 الإضافي عيوباً في الجهاز العصبي المركزي وتخلفاً عقلياً مع فلق الحنك والشفة والعنث (زيادة الأصابع) وعيوباً جلدية وشذوذات في القلب والأحشاء والأعضاء التناسلية.

**trisomy 18 s.** مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 18. حالة تتصف بالتخلف العقلي والرأس الزورقي وشواند القحف الأخرى وعيوب الرأس والأحشاء وتنتج عن وجود صبغي 18 إضافي.

**trisomy 22 s.** مُتَلَاَزِمَةُ تَثَلُّث الصِبْغِي 22. متلازمة تتولد عن وجود صبغي 22 إضافي وتتصف بتخلف عقلي وتنموي وصغر الرأس وتشوه الأذن ومرض قلبي خلقي وفي الذكور يكون القضيب صغيراً مع عدم نزول الخصيتين.

**vagoaccessory s. (= Schmidt's s.)** مُتَلَاَزِمَةُ المُبْهَم والإضافي. متلازمة شملت.

**Vernet's s.** مُتَلَاَزِمَةُ فِرْنَة. شلل الأعصاب القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر بسبب آفة في منطقة الثقب الوداجية وتتصف بشلل المضيق العلوية للبلعوم وصعوبة بلع المواد الصلبة وشلل شراع الحنك (الحقّاف) والحنك مع خدر هذه الأقسام والبلعوم وفقدان الذوق في الثلث الخلفي من اللسان وشلل الحبال الصوتية وخدر الحنجرة وشلل العضلتين القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة. وتسمى أيضاً متلازمة الثقب الوداجية.

**Villaret's s.** مُتَلَاَزِمَةُ فِيلَارِيَّة. شلل الأعصاب القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر وأحياناً السابع على جهة واحدة بسبب آفة في الحيز خلف النكفية ويتصف بشلل التضيق البلعومي العلوي وصعوبة بلع المواد الصلبة وشلل الحقّاف (شراع الحنك) والحنك مع خدر كل هذه الأقسام والبلعوم وفقدان الذوق في الثلث الخلفي من اللسان وشلل الحبال الصوتية وخدر الحنجرة وشلل العضلتين القصية الترقوية الخشائية والأعصاب الودية الرقبية (متلازمة هورنر).



**- Volkman's s.** مُتَلَاَزِمَةُ فُولْكَمَان. فرط التوتر العضلي التالي للرضح والتهاب الاعصاب التنكسي.

**- Wallenberg's s.** مُتَلَاَزِمَةُ فَالِنْبِرْغ. متلازمة تنتج عن انسداد الشريان الفقري وأحياناً قليلة فرعه الشريان المخيخي السفلي العلوي الخلفي وتتصف بفقدان حسي الألم والحرارة على نفس الجهة من الوجه وعلى الجهة المعاكسة من الأطراف والجذع مع رنج بنفس الجهة ومع صعوبة البلع والرتة والارارة.

**- Waterhouse-Friderichsen s.** مُتَلَاَزِمَةُ ووترهاوس - فريدرسن. الشكل الخبيث أو الخاطف من التهاب السحايا الدماغية النخاعية الوبائي الذي يتصف ببداية مفاجئة وفترة قصيرة مع الحمى والسبات (الغيبوبة) والوهط والزراق والنزف الحبري في الجلد والأغشية المخاطية ونزف الكظريتين بالجانبين.

**- s. of Weber** مُتَلَاَزِمَةُ وِيبَر. شلل العصب محرك العين على نفس جهة الآفة مولداً التدلي والحوّل وفقدان منعكس الضوء والتكيف مع الفالج (الشلل الشقي) التشنجي في الجهة المعاكسة للآفة وزيادة المنعكسات وفقدان المنعكسات السطحية.

**- Wernicke- Korsakoff s.** متلازمة فرنيكة - كورساكوف. اضطراب عصبي نفسي ينتج عن نقص الثيامين وغالباً ما يكون بسبب الإدمان على الكحول والمترافق مع الاعتلالات العصبية التغذوية الأخرى. ويحدث الاعتلال الدماغى الفرنيكى (التخليط والرنج والارارة وشلل العين) كنوبة حادة من الممكن الشفاء منها بالمعالجة بالثيامين، ما عدا بعض الرنج والارارة. وقد تحصل متلازمة كورساكوف (النسابة السابقة واللاحقة الشديدة) بالترافق مع الاعتلال الدماغى الفرنيكى أو قد تظهر بعده. ولا يشفى من النسابة أكثر من 20% من المصابين.

**- whiplash shake s.** مُتَلَاَزِمَةُ هَزِّ السَّوْط. مجموعة من إصابات الدماغ والعين التي قد تحدث عندما يكون الطفل أقل من ثلاث سنوات من العمر وغالباً أقل من العام الواحد عند هز الطفل بعنف لدى مسكه من الجذع أو الأطراف من دون إسناد للرأس، إذ يسبب ذلك تعدد أوعية الدماغ وتمزق أنسجته مما يؤدي إلى أورام دموية تحت الجافية ونزف في الشبكية مع رض الدماغ أحياناً ومن الممكن أن يؤدي

ذلك إلى شلل أو عمى أو اختلالات بصرية أخرى أو اختلاجات أو الموت.

**- withdrawl s.** مُتَلَاَزِمَةُ الإِمْتِنَاع: متلازمة withdrawal. انظر withdrawal.

**- Zellweger s. (= cerebrohepatorenal s.)** مُتَلَاَزِمَةُ زَلْوِيغَر: المتلازمة الدماغية الكبدية الكلوية.

**synencephalocoe** قَبْلَةُ دِمَاعِيَّةُ الْتِصَاقِيَّة. قبلة دماغية مع التصاقها بالأقسام المجاورة.

**synergetic** مُتَآزِر؛ تَآزِرِي. يعمل بالتعاون مع الآخرين كالعضلات التي تعمل سوياً لتوليد وظيفة أو حركة منسقة.

**synergism** تَآزُر. العمل المشترك للعوامل ليكون تأثيرها أكبر من المجموع الجبري لأعمالها الفردية.

**synergy** تَآزُرِيَّة. العمل المنسق أو التعاون بين عاملين أو دوائين أو بنيتين أو أكثر ويتم ذلك في وظائف الجهاز العصبي بتعاون مختلف أقسامه لتوليد وظيفة أو حركة منسقة.

**synesthesia** الحِسُّ المُوَاقِب. حس ثانوي يرافق الإدراك الحقيقي أو الإحساس الذي يحسه الشخص في محل ما من جسمه نتيجة التنبيه الموضوع في محل آخر من الجسم أو حالة توليد أحد المنبهات الحسية حساً مخالفاً لطبيعته كتوليد حس الضوء عند التنبيه بالصوت.

**- s.algica** الحِسُّ المُشْتَرَكُ المُؤَلِم.

**synesthesialgia** الحِسُّ المُشْتَرَكُ المُؤَلِم. حالة توليد أحد المنبهات حساً مؤلماً في الجهة المصابة من الجسم بينما لا يولد أي حس في الجهة السليمة أو يولد حساً بهيجاً فيها.

**synkinseia (= synkinesis)** حَرَكَة مُتَرَابِطَة.

**synkinesis** حَرَكَة مُتَرَابِطَة. حركة مترافقة، حركة لا إرادية وغير مقصودة ترافق الحركة الإرادية.

**- imitative s.** حَرَكَة مُتَرَابِطَة مُحَاكِة. حركة لا إرادية في الجهة السليمة ترافق محاولة تحريك قسم في الجهة المشلولة.

- mouth and hand s. حَرَكََةُ الْفَمِ وَالْيَدِ  
المُتَرَابِطَةُ. انظر Saunder's sign.

- spasmodic s. حَرَكََةُ مُتَرَابِطَةٍ تَشْنُجِيَّةٍ. حركة تشنجية في الجهة المشلولة عند حركة قسم إرادي في الجهة السليمة.

synreflexia تَرَابُطُ الْمُنْعَكَسَاتِ. الترابط الموجود بين المنعكسات المختلفة.

syphilis الزهري. مرض منقول جنسياً دون الحاد أو مزمن تولده الملتوية اللولبية الشاحبة والذي ينتقل عادة بالاتصال الجنسي أو ينتقل في الرحم من الأم للجنين ويصيب كل أقسام الجسم ومنها الجهاز العصبي.

- cerebrospinal s. الزهري الدماغي النخاعي.  
انظر Erb's spastic paraplegia.

- meningovascular s. الزهري السخائي  
الوعائي. انظر neurosyphilis.

syphilomania (= syphilophobia) هَوَسُ الزهري؛ رهاب الزهري.

syphilophobia رُهابُ الزهري. 1. الخوف من الإصابة بالزهري 2. توهم الشخص بأنه مصاب بالزهري.

syringobulbia تَكَهَفُ الْبَصَلَةِ. تكهف الدماغ الذي تمتد فيه الكهوف إلى النخاع المستطيل.

syringocele (= myelocele) قَيْلَةُ نَخَاعِيَّةٍ. قَيْلَةُ النخاع الشوكي خلال عيب عظمي في السنسنة المشقوقة والذي يحوي كهفاً في داخله.

syringocele قَنَاةُ النُّخَاعِ الْمَرْكَزِيَّةِ. النفق المركزي للنخاع الشوكي.

syringoencephalia تَكَهَفُ الدِّمَاغِ. توليد كهوف شاذة في مادة الدماغ.

syringoencephalomyelia تَكَهَفُ الدِّمَاغِ والنخاع. وجود كهوف في داخل مادة النخاع والدماغ.

syringomenigocele قَيْلَةُ سَخَائِيَّةٍ تَكَهَفِيَّةٍ. قَيْلَةُ سَخَائِيَّةٍ شَبِيهَةٍ بِالْقَيْلَةِ النَخَاعِيَّةِ التَكَهَفِيَّةِ.

syringomyelia تَكَهَفُ النُّخَاعِ. متلازمة متروية بطيئة يحدث التكهف فيها في الشدافات

المركزية من النخاع الشوكي وعادة ما تصيب المنطقة الرقبية ولكنها قد تمتد إلى النخاع المستطيل (تكهف البصلة) أو إلى المنطقة الصدرية وقد يكون التكهف تنموي الأصل أو ثانوي للأورام أو نتيجة رضح أو احتشاء أو نزيف أو غير معروف السبب ويؤدي في المرض إلى عيوب عصبية تتكون بصورة عامة من ضعف عضلي شديدي وضمر يترافق مع فقدان حسي متفارق (فقدان حسي الألم والحرارة والاحتفاظ بحس اللمس) كما يظهر عادة الجنف الصدري.

- traumatic s. تَكَهَفُ النُّخَاعِ الرُّضْجِيِّ. تكهف النخاع الذي ينتج عن رضح النخاع الشوكي.

syringomyelitis إِنْتِهَابُ النُّخَاعِ التَكَهَفِيِّ. التهاب النخاع الشوكي مع تكوين كهوف فيه.

syringomyelocele قَيْلَةُ النُّخَاعِ التَكَهَفِيَّةِ. انفتاق النخاع الذي يحوي كهوفاً مرتبطة بقناته المركزية خلال عيب عظمي في السنسنة المشقوقة.

syringomyelus (= syringomyelia) تَكَهَفُ قَنَاةِ النُّخَاعِ. توسع القناة المركزية للنخاع وتكهفها وتحول المادة السنجابية إلى نسيج ليفي.

syringopontia تَكَهَفُ الْجِسْرِ. حالة تكون كهوف في الجسر.

1. جُمْلَةٌ 2. جَهَازٌ 3. مَجْمُوعٌ 4. نظام. system 1. مجموعة أو سلسلة من أقسام مترابطة ومتعاونة (كالأجسام والأعضاء والكائنات) التي تعمل سوية لتحقيق هدف مشترك أو لتحقيق وظائف لا يمكن لأي واحد منها تحقيقه بمفرده 2. مدرسة فكرية أو أسلوب عمل يستند على أسس ومبادئ معينة.


- ascending reticular activating s. الْجَهَازُ الشَّبَكِيُّ (= reticular activating s.) الصَّاعِدُ الْمُنَبِّطُ.

- association s. الْجَهَازُ التَّرَابُطِيُّ. سبل الاليف العصبية في الدماغ التي تترابط عن طريقها الإدراكات مما يجعل عملية التفكير ممكنة.

- autonomic nervous s. الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْمَسْتَقِلُّ. قسم الجهاز العصبي الذي ينظم عمليات العضلة القلبية والعضلات الملساء والغدد وينتظم في مجموعتين القسم الصدري القطني أو الجهاز العصبي الودي والقسم القحفي العجزي أو الجهاز العصبي اللاودي.


- **brain-cooling s.** جَهَازُ تَبْرِيدِ الدُّمَاغِ. جهاز آلي منظم حرارياً لتنظيم وقياس درجة حرارة الدماغ ويستعمل في التجارب والتطبيقات الفيزيولوجية العصبية والنفسية العصبية.
- **central nervous s.** الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْمَرْكَزِيُّ. قسم الجهاز العصبي الذي يشتمل على الدماغ والنخاع الشوكي والذي يوجد داخل القحف والعمود الفقري.
- **centrencephalic s.** الْجَهَازُ الْمَرْكَزِيُّ لِلدُّمَاغِ. جهاز العصبونات الموجود في اللب المركزي للنخاع العلوي من جذع الدماغ من المهاد حتى النخاع المستطيل وهو يربط نصفي كرة المخ.
- **cerebrospinal s. (= central nervous s.)** الْجَهَازُ الدُّمَاغِيُّ.
- **craniosacral s. (= parasympathetic nervous s.)** الْجَهَازُ الْقِحْفِيُّ الْقَطَنِيُّ؛ الجهاز العصبي اللاودي.
- **exteroceptive nervous s.** جَهَازُ الْإِسْتِقْبَالِ الْعَصْبِيِّ الْخَارِجِيِّ. قسم الجهاز العصبي الجسدي الوارد الذي يستقبل المنبهات التي ترد الجسم من خارجه.
- **extracortical s. (= extrapyramidal s.)** الْجَهَازُ خَارِجُ الْقَشْرِيِّ النُّخَاعِيِّ؛ الجهاز خارج الهرمي.
- **extrapyramidal s.** الْجَهَازُ خَارِجُ الْهَرَمِيِّ. قسم من الجهاز العصبي الحركي خارج الجهاز الهرمي يشمل النوى القاعدية والعديد من نوى جذع الدماغ المتعلقة بها كالنواة تحت المهادية والمادة السوداء والنواة الحمراء والتكوين الشبكي مع اتصالاتها بالمخ والمخيخ والتي تعتبر كلها كوحدة واحدة تنظم مجموعة الوظائف الحركية غير تلك التي ينظمها الجهاز الهرمي كوظائف التوازن ووضع الجسم وتثبيته. ومن الامراض التي تتولد عن إصابة الجهاز خارج الهرمي داء باركنسون.
- **fusimotor s.** الْجَهَازُ الْمِفْرَئِيُّ الْحَرَكِيُّ. مجموعة من العصبونات الحركية (تسمى عصبونات غاما الحركية) توجد في المادة السنجابية البطنية للنخاع الشوكي والتي تخرج محاورها مع الجذور البطنية للنخاع وتذهب لتغذي ألياف داخل المغازل في العضلات الهيكلية.
- **interoceptive nervous s.** جَهَازُ الْإِسْتِقْبَالِ الْعَصْبِيِّ الْبَاطِنِيِّ. الجهاز الذي ينقل الدفعات العصبية الواردة من الأحشاء والتي تسير في ألياف عصبية مستقلة أو جسدية تنجّه نحو المركز.
- **involuntary nervous s. (= autonomic nervous s.)** الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْإِلْرَادِي؛ الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْمَسْتَقْلِل.
- **labyrinthine s.** الْجَهَازُ التَّيْهِي. قسم العضو الدهليزي القوقعي الذي يعنى بالمحافظة على توازن الجسم.
- **limbic s.** الْجَهَازُ الْخَوْفِيُّ. مصطلح يستعمل للدلالة على مجموعة من بنيات الدماغ (التي تشمل الحصين والتلفيف المسنن مع قشرتهما القديمة والتلفيف الحزامي والباحات الحاجزية واللوزة) والمرتبطة بوظيفتها مع الشم ولكن لدرجة أكبر مع فعاليات أخرى كالوظائف المستقلة وبعض نواحي العاطفة والسلوك.
- **muscular s.** الْجَهَازُ الْعَضَلِيُّ. مجموع العضلات التي تعتبر كجهاز واحد.
- **nervous s.** الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ. الجهاز العضوي الكبير الذي ينظم وينسق بالاشتراك مع الجهاز الصماوي كل استجابات الكائن للحالات الداخلية والمحيطية وهو يتكون من القسمين المركزي والمحيطي.
- **parasympathetic nervous s.** الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْأَوْدِي. القسم القحفي العجزي من الجهاز العصبي المستقل.
- **peripheral nervous s.** الْجَهَازُ الْعَصْبِيُّ الْمُحِيطِيُّ. قسم الجهاز العصبي المكون من الأعصاب والعقد العصبية والذي يوجد خارج الدماغ والنخاع الشوكي.
- **periventricular s.** الْجَهَازُ حَوْلَ الْبُطَيْنِ. اسم جماعي للسائل الصادرة من الوطاء التي تنبع أساساً من النوى فوق البصرية والخلفية والحديدية والتي تنزل في المادة السنجابية حول البطين.
- **proprioceptive nervous s.** جَهَازُ الْإِسْتِقْبَالِ الْعَصْبِيِّ الْعَمِيقِ. قسم الألياف العصبية الجسدية الواردة التي تنقل الإحساسات الواردة من داخل الجسم.

- pyramidal s. (= fasciculus pyramidalis medullae oblongatae) **الجهاز الهرمي:** الخزمة الهرمية للبصلة.
- reticular activating s. **الجهاز الشبكي:** المنشط. جهاز خلايا التكوين الشبكي في النخاع المستطيل (البصلة) الذي يستلم فروعا جانبية من الطرق الحسية الصاعدة والذي يسقطها إلى المراكز العصبية العليا. وهي تسيطر على درجة النشاط العام لفعاليات الجهاز العصبي المركزي ومنها اليقظة والانتباه والنوم.
- sensory storage s. **جهاز الذاكرة الحسية:** جهاز خزن الإحساسات. اقصر أنواع الذاكرة الذي يخزن المعلومات المدركة لفترة تقل عن الثانية وتترك لفترة قصيرة.
- somatic nervous s. **الجهاز العصبي الجسدي:** أقسام الجهاز العصبي التي تقوم بتوصيل الدفعات العصبية من وإلى أقسام الجسم اللاشعوية كالعضلات الهيكلية والعظام والمفاصل والأوتار والجلد والعين والأنف والأذن واللسان وبعض الأغشية المخاطية.
- sympathetic nervous s. **الجهاز العصبي الودي:** القسم الصدري القطني من الجهاز العصبي المستقل.
- thoracolumbar nervous s. (= sympathetic nervous s.) **الجهاز العصبي الصدري القطني:** الجهاز العصبي الودي.
- vasomotor s. **الجهاز المحرك الوعائي:** قسم الجهاز العصبي الذي ينظم سعة الأوعية الدموية.
- vegetative nervous s. (= autonomic nervous system) **الجهاز العصبي الإنبائاتي:** الجهاز العصبي المستقل.
- vestibular s. (= labyrinthine s.) **الجهاز الدهليزي:**
- visceral nervous s. (= autonomic nervous s.) **الجهاز العصبي الحشوي:** الجهاز العصبي المستقل.
- جُملة: جهاز.** systema (= system)
- s. nervosum (= nervous s.) **الجهاز العصبي:**
- s. n. autonomicum (= autonomic nervous s.) **الجهاز العصبي المستقل.**
- s. n. centrale (= central nervous s.) **الجهاز العصبي المركزي.**
- s. n. periphericum (= peripheral nervous s.) **الجهاز العصبي المحيطي.**
- s. n. sympatheticum (= sympathetic nervous s.) **الجهاز العصبي المستقل.**




system, autonomic nervous

الأعصاب المستقلة والسلسلة الودية في الصدر: (1) العقدة الودية الرقبية السفلية (2) العقدة الصدرية الأولى (3) الفروع الودية القلبية (4) الفروع الاتصالية (5) العصب المبهم الأيمن (مقطوع) (6) عصب وربي (7) العقدة الودية الصدرية السادسة (8) العصب الحشوي الكبير (9) العقدة الودية الصدرية التاسعة (10) العصب الحشوي الصغير (11) العصب الحشوي الأدنى (12) الحبل المعدي الأمامي للمبهم (13) الضفيرة العريضة (14) المريء (15) الضفيرة الرئوية الأمامية (16) الباف مبهمية للضفيرة الرئوية الخلفية (17) العصب الحنجري الراجع (18) الضفيرة القلبية (19) العصب المبهم الأيسر (مقطوع) (20) الرغامى (21) العروة تحت الترقوية.




system, autonomic nervous

الأعصاب المستقلة للحوض: (1) الفرعان الاتصاليان الأبيض والسنجابي (2) الفرع الاتصالي السنجابي (3) الضفيرة القطنية العجزية (4) أعصاب حوضية (العصب الناظر اللاودي العجزية) (5) العصب الفرجي (عصب جسدي) (6) جسم القضيب (7) الضفيرة الكهفية (8) الضفيرة البروستاتية (9) الضفيرة المستقيمة (10) الضفيرة المثانية (11) الضفيرة الحوضية اليمنى (12) الشريان والصفيرة الباسورية العلوية (13) الضفيرة الخلفية (14) الشريان والصفيرة المساريقية السفلية (15) العقدة المساريقية السفلية (16) الضفيرة الأبهريّة (17) العقدة الودية القطنية الثانية.



system, autonomic nervous


الجهاز العصبي الذاتي (المستقل) يبين الأعصاب والعقد الودية باللون الأحمر والأعصاب والعقد اللاودية باللون الأزرق. (1) العقدة الهدابوية (2) العقدة الودية الحنكية (3) العقدة الأنسية (4) حبل الطبل (5) العصب اللساني (6) العقدة تحت اللسان (7) العصب المبهم (8) الضفيرة القلبية العميقة (9) الضفيرة القلبية السطحية (10) الضفيرة المريئية (11) العقدة البطنية (12) الشريان البطني مع الأعصاب البطنية (13) العقدة المساريقية العلوية (14) الشريان المساريقي العلوي والأعصاب المساريقية (15) الضفيرة الأبهري (16) العقدة المساريقية السفلية (17) الشريان المساريقي السفلي (الباسوري العلوي) والأعصاب المساريقية السفلية (18) الضفيرة الخلفية (19) الضفيرة المثانية (20) الضفيرة البروستاتية (21) الضفيرة الحوضية (22) العصب الحوضي (23) العصب الحشوي الأصفر (24) العصب الحشوي الصغير (25) العصب الحشوي الكبير (26) الفروع الاتصالية (27) العقدة الودية الصدرية السابعة (28) العصب الصدري (الوربي) السادس (29) السلسلة الودية (30) العقدة الرقبية (31) العقدة الرقبية الودية الوسطية (32) العصب الرقبى الرابع (33) العقدة الرقبية الودية العلوية (34) العصب والصفيرة السباتيان (35) العصب المبهم (36) العصب اللساني البلعومي (37) العصب الوجهي (38) العصب المحرك للعين.



#### system, autonomic nervous


الأعصاب المستقلة في البطن: (1 و 3) العصب الحشوي الكبير (2 و 4) العصب الحشوي الصغير (5) العصب الحشوي الأدنى (6) العقدة الودية القطنية الخامسة (7) أعصاب للضفيرة الحوضية اليمنى (8) السلسلة الودية الحوضية (9) أعصاب للضفيرة الحوضية اليسرى (10) الشريان والضفيرة الباسورية العلوية (11) الضفيرة الخلفية (12) الشريان والأعصاب القولونية اليسرى للجهة اليسرى من القولون (13) العقدة والضفيرة المساريقية السفلية (14) الشريان والضفيرة المنوية الداخلية (15) الضفيرة الأبهريّة (16) العقدة الودية القطنية الأولى (17) الضفيرة الكلوية (18) العصب الحشوي الأدنى (19) العقدة المساريقية العلوية (20) العصب الحشوي الصغير (21) العقدة البطنية (22) العصب الحشوي الكبير (23) العصب المبهم المعدي الخلفي (24) العصب المبهم المعدي الأمامي.






#### system, central nervous

مقطع ناصفي للدماغ مبيّن (1) الجسم الصنوبري (2) خيمة المخيخ (3) الأجسام الرباعية (4) المسال المخي (5) البطين الرابع (6) القناة المركزية (7) المحور (8) الفهقة (9) العظم الوددي (10) النخامي (11) القبو (12) الحاجز الشفاف (13) الجسم النخفي (14) الكتلة المتوسطة (15) البطين الثالث




system, central nervous

الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) لمولود حديث: (1) البصلة (النخاع المستطيل) (2) الدماغ (3) العظم القذالي (4) الجذور الخلفية للأعصاب الشوكية الصدرية (5) الحبل الشوكي (النخاع الشوكي) (6) الأضلاع (7) الضخامة القطنية (8) ذنب الفرس (9) العقد الشوكية العجزية (10) المخروط النخاعي (11) جناح عظام الحرقفة (12) الكتلة اليمنى (13) العقد الشوكية العجزية (14) الأعصاب الجلدية الوحشية (15) الأقسام العصبية الأولية للأعصاب الصدرية (16) الأقسام الأولية للأعصاب الوربية (17) العقد الشوكية الرقبية (18) الضخامة الرقبية للحبل الشوكي (19) العقد الشوكية الرقبية الثانية (20) المخيخ (21) نصف الكرة المخية.



system, central nervous

رسم تخطيطي عام لأقسام الجهاز العصبي المركزي I - المخ II - جذع الدماغ الذي يشمل: (1) الدماغ البيني (2) الدماغ المتوسط (3) الجسر (4) النخاع المستطيل (المنخع). III - النخاع الشوكي وتظهر فيه (5) التضخم الرقبى (6) التضخم القطني. IV - المخيخ



system, sensory nervous

أحد السبل الحسية التي تبدأ من المستقبلات الحسية الجلدية ويمر خلال الأعصاب الشوكية صاعداً إلى المناطق الحسية المركزية: (1) الدماغ المتوسط (2) الفصيلة الإنسية (3) النخاع المستطيل السفلي (4) السبيل الشوكي المهادي الوحشي (5) السبيل الشوكي البطني (6) النخاع الرقبي (7) النواة الناحلة (8) النواة الإسفينية (9) حبل الناحلة (10) حبل الإسفينية (11) المادة الهلامية (12) ألياف عديمة الميالين (للالام والحرارة والبرودة) (13) ألياف مغمدة (للحس العميق) (14) ألياف مغمدة (للحس اللمس) (15) النواة البطنية الوحشية المهاد (16) المحفظة الداخلية (17) التلم خلف المركزي. (F.E) نهايات عصبية حرة (H) نهايات عصبية في الجريب الشعري (M) جسيم ميسنر (MS) مغزل عضلي (VP) جسيم باسيني.

# T

**tabes** التَّابِس. 1. أي ضمور في الجسم، الضمور المترقي للجسم أو لجزء أو لعضو فيه. 2. التابِس الظهرِي.

- **diabetic t.** التَّابِسُ السُّكْرِي. اعتلال عصبي محيطي يحدث عند الأشخاص المصابين بالبول السكري ويتصف بأعراض شبيهة بالتابِس الظهرِي.

- **t. dorsales** التَّابِسُ الظَّهْرِي. زهري عصبي متني يتصف بتنكس بسيط في الأعمدة الخلفية والجذور والعقد الخلفية للنخاع الشوكي ويتم ذلك بعد 15-20 سنة بعد الإصابة الأولية بالزهري ويتصف بالآلام برقية راحة ولس البول والرنح وفقدان حسي الوضع والاهتزاز والضمور البصري ونقص التوتر وفراط الانعكاسية والتتنكس المفصلي النمائي (مفاصل شاركوت).

- **t. ergotica** التَّابِسُ الإِرْغُوتِي. حالة تشبه التابِس الظهرِي تنتج عن التسمم بالارغوت.

- **Friedreich t. (= Fredreich ataxia)** تَابِس فْرِيدْرَايْخ. رنح فريدرايخ.

- **t. Infantum** تَابِسٌ وَلِيدِي. تابِس يشاهد في الولدان المصابين بالزهري الولادي.

- **t. mesenterica (= t. mesaralca)** تَابِسٌ مَسَارِيْقِي. سل الغدد المساريقية في الاطفال يؤدي إلى اختلالات هضمية وضمور الجسم.

- **peripheral t. (= pseudotabes)** تَابِسٌ مُحِيطِي. نظير التابِس.

- **t. spinalis (= t. dorsalis)** التَّابِسُ النُّخَاعِي. التابِس الظهرِي.

**tabescent** إِضْمَحْلَال. ذُبُول.

**tabetic** 1. تَابِسِي 2. مَتَبُوس. منسوب للتَابِس أو مصاب به.

**tabetiform** شَبِيهُ التَّابِس. تابسي الشكل.

**tabification** إِضْمَحْلَال؛ ذُبُول. نحولٌ شديد.

**taboparalysis (= taboparesis)** التَّابِسُ الشَّلَلِي؛ تَابِسٌ خَزَلِي. ترافق الخزل العام مع التابِس الظهرِي.

**tache (= spot)** بُقْعَةٌ؛ لُطْخَةٌ. بقعة أو لطخة مسطحة.

- **t. cerebrale** البُقْعَةُ الدُّمَاغِيَّة. تلم محتقن يتولد في الجلد عند خدشه بالأظفر ويحدث ذلك في بعض الأمراض العصبية أو الدماغية.

- **t. meningeale (= t. cerebrale)** البُقْعَةُ السَّحَائِيَّة.

- **t. motrice** البُقْعَةُ الحَرَكِيَّة. نوع من النهايات العصبية تمر فيه اللييفات العصبية إلى الخلايا العضلية حيث تنتهي فيها بتضخمات صغيرة.

- **t. spinale** البُقْعَةُ النُّخَاعِيَّة. فقاعة تشبه الحرق في الجلد تتسبب عن مرض النخاع الشوكي.

**tachistoscope** المِنْظَارُ التَّوْقُضِي. آلة تستعمل في الدراسات النفسية الفيزيولوجية حيث تمتحن الذاكرة البصرية بعرض الصور أمام الشخص لفترة محددة وعادة ما تكون أقل من عشر الثانية ثم يمتحن المريض فيما إذا يتذكرها.

**tachylalia** تَسْرُوعُ الكَلَام. تسرّع الكلام.

**tachyphagia** تَسْرُوعُ الأكل. تسرّع ازدراد الطعام.

**tachyphrasia** تَسْرُوعُ النُّطْق. النطق السريع.

**tachyphrenia** تَسْرُوعُ التَّفْكِير. التفكير السريع.

**tachypragia** تَسْرُوعُ العَمَل. العمل السريع.

**tactile** لَمَسِيّ. منسوب أو متعلق باللمس.

**taction (= touch)** اللمس. 1. عملية أو فعل اللمس. 2. حسّ اللمس أو الإدراك باللمس.

**tactometer** مَقْيَاسُ اللمس. آلة لقياس حدة حسّ اللمس.

**tactor** لَمَاس؛ نِهَآيَةُ حِسِّيَّة لَمَسِيَّة.

**tactual** لَمَسِيّ. منسوب إلى اللمس أو ما ينفذ بحسّ اللمس.

**tactus** اللمس.

**- t. eruditus** اللمس الخبير: اللمسُ الحَذَق. حسّ اللمس الدقيق الذي يكتسب بالخبرة والمران.

**- t. expertus (= t. eruditus)** اللمسُ الحَذَق

**talalgia** ألم الكاحل: ألمُ العَقَب. ألم في العقب أو الكاحل.

**talantropia (= nystagmus)** رَأْرَأَة.

**talipes** حَنَف. شوه خلقي في القدم التي تدور وتحرف عن وضعها السوي.

**- t. calcaneus** حَنَف عَقَبِيّ. شوه يتصف بانثناء القدم للأعلى.

**- t. equinovalgus** حَنَف قَعْدِيّ أروحي: حَنَف أبخسِيّ. شوه يتصف بانثناء القدم نحو الأخص مما يؤدي إلى مشية المصاب على أصابعه.

**- t. valgus** حَنَف رَوَحِيّ. شوه يتصف بدوران العقب للخارج بعيداً عن الخط الوسطي.

**- t. varus** حَنَف فَحَجِيّ. شوه يتصف بدوران العقب للداخل نحو الخط الوسطي.

**tangle** حَبِيكَة؛ عُقْدَة.

**- neurofibrillary t.** حَبِيكَة لِئَبْفَنَة عَصَبِيَّة؛ عُقْدَة لِئَبْفَنَة عَصَبِيَّة. عقد أو كتلة من ليفات عصبية تشاهد في داخل خلايا قشرة المخ في داء ألزهايمر.

**tangoceptor** مُسْتَقْبِل تَلَامُسِيّ. عضو حسي يستجيب للتماس الفيزيائي فقط كاللمس مثلاً.

**tapeinocephaly** تَسَطُّحُ الرَّأْس. قحف واطىء ومستطح في الأمام وله معامل عمودي أقل من 72.

**tapetum** بَسَاط. 1. بنية غطاء أو طبقة من الخلايا. 2. بساط الجسم الثفني.

**- t. corporis callosi** بَسَاطُ الجِسْمِ الثَّفَنِيّ.

طبقة من الياف صوارية في الجسم الثفني على الناحية العلوية الوحشية للقرن القذالي للبطين الجانبي.

**taste** مَذَاق؛ ذَوْق؛ طَعْم. الحس الخاص الذي يتولد عند ملامسة المواد الذوقية للسان، فهو الحس الذي يتولد عند تنبيه المستقبلات الذوقية في اللسان وحوله ويدرك في المراكز الذوقية. وهناك أربعة أنواع رئيسية منه الحلو والمر والحامض والمالح.

**- color t.** ذَوْق لَوْنِيّ. حس ذوقي كاذب يترافق مع حس إبصار الألوان.

**- franklinic t.** ذَوْقُ فَرَانْكَلِينِيّ. حس ذوق حمض يتولد عند تنبيه اللسان بكمبرائية ستاتية.

**taste blindness** عَمَة الذَّوْق. عدم المقدرة على تذوق بعض المواد مثل الفينيل ثايويوريا.

**tectocephaly (= scaphocephaly)** تَزَوُّقُ الرَّأْس؛ الرَّأْسُ الزَّوَرَقِيّ.

**tectospinal** سَقْفِيّ نَخَاعِيّ. يمتد من سقف الدماغ المتوسط حتى النخاع الشوكي.

**tectum** سَقْف. بنية سطحية الشكل.

**- t. mesencephali** سَقْفُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. جزء سقيفة الدماغ المتوسط الذي يحتوي الصفحة السفلية والاكيمات القحفية والذنبية.

**tegmen** سَقْفِيّ. غطاء أو سقف.

**- t. ventriculi quarti** سَقْفِيّ البُطَيْنِ الرَّابِع. سقف البطين الرابع الذي يتكون من الشرايين العلوي والسفلي.

**tegmentum** السَّقْفِيَّة. 1. غطاء. 2. سقيفة الدماغ المتوسط. 3. القسم الظهري لكل من سويقتي المخ.

**- t. auris (= membrana tympani)** السَّقْفِيَّة السَّمْعِيَّة؛ غِشَاءُ الطَّبَل.

**- hypothalamic t. (= subthalamie t.)** سَقْفِيَّةُ الوِطَاء.

**- t. mesencephali** سَقْفِيَّةُ الدِّمَاغِ الْمُتَوَسِّط. الجزء الظهري من الدماغ المتوسط الذي يتكون من استمرارية القسم الظهري من سويقتي المخ عبر المستوى الناصف ويمتد على جهتيه من المادة السوداء حتى مستوى مسال الدماغ المتوسط.

- t. of pons (= t. pontis) سَقِيْفَةُ الجِسْرِ. الجزء الظهري من الجسر.

- t. rhomboencephali (= pars posterior pontis) سَقِيْفَةُ الدُّمَاغِ الْمُؤَخَّرِ؛ القسم الخلفي من الجسر.

- subthalamie t. سَقِيْفَةُ تَحْتَ المِهَاد. جزء سَقِيْفَةُ السُوَيْفَةِ المَخِيَةِ الذي يمتد تحت المهاد.

teinodynia (= tenodynia) أَلَمُ الوَتَر.

tela نَسِجَةٌ. غشاء رقيق شبيه بالشبكة.

- t. choroidea ventriculi laterali النَسِجَةُ العَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيِّ. الامتداد الوحشي للنسجة المشيمية للبطين الثالث إلى الشق المشيمي للبطين الجانبي من الدماغ ومنه تغلف الطيات الوعائية بطانة عصبية لتكون الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي.

- t. choroidea ventriculi quarti النَسِجَةُ العَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الرابع. طية أو طيَّتان من الأم الحنون بين المخيخ والقسم السفلي من سطح البطين الرابع وتحوي الطبقة الامامية من الطية بالاشتراك مع البطانة العصبية للبطين فروعا وعائية تكون الضفيرة المشيمية.

- t. choroidea ventriculi tertii النَسِجَةُ العَشِيمِيَّةُ لِلْبُطَيْنِ الثالث. طبقتان أو طيَّتان من الأم الحنون تكونان بالاشتراك مع البطانة العصبية للبطين سطح البطين الثالث والذي سطحه فروعا وعائية لتكون الضفيرة المشيمية.

telalgia (= referred pain) أَلَمٌ مُحَوَّل؛ أَلَمٌ رَجِيع.

teleceptor مُسْتَقْبِلٌ بُعَادِي. نهاية عصبية حسية حساسة للمنبهات التي تصدر من مسافة بعيدة عن الجسم مثل تلك التي توجد في العين أو في الأذن.

telencephalon الدُّمَاغُ الإِنْتِهَائِي.

1. الحويصلتان الدماغيتان المزدوجتان المكونتان من الانزلاق الامامي الوحشي للدماغ المقدم وبالإشتراك مع الجزء الناصفي غير المزدوج والصفحة الانتهازية تكون الاقسام التي تشتق منهم جميعاً نصفاً كرة المخ 2. الحويصلة الامامية من الحويصلتين اللتين تتكونان من تمايز الدماغ المقدم في الجنين المتنامي.

teleneuron (= nerve ending) نِهَآةٌ عَصَبِيَّة.

telepathy تَخَاطُر. إدراك فرق حسي للفعاليات الذهنية لشخص آخر.

telergy 1. تَلْقَائِيَّة 2. التَّفْعِيلُ البُعَادِي. 1. تلقائية العمل أو المساعدة 2. الفعل الفرضي لدماغ أحد الأفراد في التأثير على فعالية دماغ شخص آخر.

telesthesia حِسٌّ بُعَادِي. إدراك فوق حسي بطبيعة الأشياء أو الحالات.

teloglia يَبْقُ إِنْتِهَائِي. خلية شفاء الانتهازية التي توجد عند النهاية العصبية الحركية.

telolemma غَمْدُ النِّهَآةِ؛ غَمْدُ إِنْتِهَائِي. الغطاء أو ثنائي الطيات الذي يغطي القرص الحركي الانتهازي والمكون من غمد الليف العضلي وامتداد غمد هنلي.

teloreceptor (= teleceptor) مُسْتَقْبِلٌ بُعَادِي.

temperament مَزَاج. (ج. أَمْزِجَة). الاستعداد الفريزي البنيوي للاستجابة للمنبهات بصورة معينة.

- atrabilious t. (= melancholic t.) مَزَاجٌ سَوْدَاوِي.

- billous t. (= choleric t.) مَزَاجٌ صَفْرَاوِي.

- choleric t. مَزَاجٌ صَفْرَاوِي. مزاج يعزى إلى سيادة الصفراء الصفراء (الفاتحة) ويتصف بالفضب السريع أو المستمر.

- lymphatic t. (= phlegmatic t.) مَزَاجٌ لَمْفِي.

- melancholic t. مَزَاجٌ سَوْدَاوِي. مزاج يعزى إلى سيادة الصفراء السوداء (القانية) ويتصف بالخمول والجمود.

- sanguine t. مَزَاجٌ دَمَوِي. المزاج الذي يعزى إلى سيادة الدم ويتصف بالبهجة والتفاؤل.

temperantia (= sedatives) مُهْدِّنَات؛ مَرَكِّنَات.

temporal 1. صُدْغِي 2. زَمَنِي. 1. منسوب إلى المنطقة الوحشية من الرأس فوق القوس الوجني 2. متعلق أو منسوب للزمن.

**tenalgia** أَلَمُ الْوَتَرِ. ألم في أحد الأوتار.

**tenderness** إِيْلَامٌ. الحساسية الشاذة أو المؤلمة للمس أو للضغط.

**- pencil t.** إِيْلَامٌ قَلَمِيٌّ. الإيلام الموضعي عند الضغط على الموضع برأس القلم المطاطي.

**- rebound t.** إِيْلَامٌ رِيْثَادِيٌّ. حس الألم الذي يدرك بعد رفع الضغط.

**tenodynia** وَجَعُ الْوَتَرِ. وجع في أحد الأوتار.

**tension** تَوْتِيرٌ؛ تَوْتِيرٌ. عملية التمديد والشد.

**- muscular t.** تَوْتِيرُ الْعَضَلِ. حالة التقلص المعتدل للعضلة عند تمديدها.

**tentorium** خَيْفَةٌ. قسم تشريحي يشبه الغطاء أو الخيمة.

**- t. cerebelli** خَيْفَةُ الْمُخَيِّخِ. امتداد الجافية الذي يسند الفصين القذاليين ويغطي المخيخ وله حافة حرة فيها ثلمات الخيمة وتلتصق حافته الخارجية بالقحف ويضم الجيب المستعرض في الخلف.

**- t. of hypophysis (= diaphragma sellae)** خَيْفَةُ النُّخَامِيَّةِ. الْحِجَابُ السَّرْجِيّ.

**tentum (= the penis)** الْقَضِيْبُ.

**tephromalacia** تَلَيُّنُ السِّنْجَابِيَّةِ. تلين سنجابية الدماغ أو النخاع.

**tephromyelitis** الْتِهَابُ سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاعِ. التهاب المادة السنجابية للنخاع الشوكي.

**terminatio** نِهَائِيَّةٌ. منطقة انقطاع البنية أو نهايتها.

**- terminationes nervorum liberae** النِّهَائِيَّاتُ الْعَصْبِيَّةُ الْحُرَّةُ. المستقبلات العصبية التي لها أبسط الأشكال حيث ينقسم الليف المحيطي إلى فروع دقيقة تنتهي بصورة حرة في نسج ضام أو في ظهارة أو بطانة.

**terror** رُعبٌ؛ قَرَعٌ؛ دُغْرٌ. الخوف الشديد.

**- day t. (= pavor diurnus)** قَرَعٌ نَهَارِيٌّ. الخوف الشديد أثناء النهار.

**- night t. (= pavor nocturnus)** قَرَعٌ لَيْلِيٌّ. الخوف الشديد أثناء الليل.

**test** اخْتِبَارٌ. فحص أو تجربة.

**- Babinski's t. (= Babinski's sign)** اخْتِبَارُ بَابِنْسْكِي. اختبار لتحزّي وجود إصابة عصبية هرمية.

**- Babinski-Weil t.** اخْتِبَارُ بَابِنْسْكِي - فايل. يطلب من المريض السير إلى الأمام وإلى الخلف في ساحة خالية مع إغلاق عينيه، فينحرف المصاب بمرض التيه عن الخط المستقيم وينثني إلى إحدى الجهتين عند سيره للأمام وإلى الجهة المعاكسة عند سيره للخلف.

**- Barany's pointing t.** اخْتِبَارُ بَارَانِي لِلتَّأْشِيرِ. يطلب من المريض التأشير إلى نقطة ثابتة وعينيه مفتوحتين ومغلوقتين على التوالي ويدل الغلط الدائم في التأشير بالعين المغلقة على وجود آفة دماغية.

**- Bekhterev's t.** اخْتِبَارُ بَخْتِيرِيف. عند الطلب من المريض الجالس في فراشه تمديد ساقيه سوياً لن يتمكن من ذلك عندما يكون مصاباً بقرق النسا ولكنه يتمكن من تمديد كل من الساقين على انفراد.

**- Bender gestalt t. (= Bender visual-Motor gestalt t.)** اخْتِبَارُ بَنْدَرٍ لِلْإِدْرَاكِ الْكُلِّيِّ. اختبار نفسي يستعمل لتعيين التنسيق الإدراكي الحركي لتقييم ديناميات شخصية الفرد كفحص لاختلال الدماغ الحركي أو لقياس النضوج العصبي لديه. إذ يطلب من الشخص استنساخ تسعة أشكال هندسية بسيطة تعطى له بصورة منفصلة كل واحدة منها على بطاقة خاصة أو يطلب منه أحياناً عمل رسوم لهذه الأشكال من ذاكرته ثم تقيّم رسومه.

**- Binet's t.** اخْتِبَارُ بِيْنَت. اختبار لفحص القدرة الفكرية للأطفال والأحداث بتوجيه سلسلة من الأسئلة الموضوعة لتلائم مستوى الأطفال الأسوياء في الأعمار المختلفة ويعين السن العقلي للأطفال حسب مستوى أجوبتهم.

**- Craft's t.** اخْتِبَارُ كْرَافْت. يؤدي ضرب السطح الظهري للكاحل بنقطة كلية وإلى الأعلى على السطح الظهري للكاحل عند بسط الساق وإرخاء العضلات إلى الانثناء الظهري لإبهام القدم شبيه بمنعكس بابنسكي وذلك في الأمراض العضوية للسبيل الهرمي.

**- Elsberg's t.** اخْتِبَارُ الزَّبَرْغ. طريقة اختبار حس الشم لتعيين وجود ورم دماغي وتستعمل الاختلافات في أنواعه أو في سرعة تعبته للتفريق بين الأورام خارج الدماغ أو داخله.



- يطلب من الشخص فيه إجراء بعض الأعمال بدلاً من إجابة الأسئلة فقط.
- **femoral nerve stretch t.** إختِبَارُ تَمْدِيدِ الْعَصَبِ الْفَخْذِيِّ. يؤدي شني مفصل الركبة للافعال في وضع الانكباب إلى ألم في الظهر أو في الآلية ويستعمل الاختبار في آفات القرص القطني الثالث أو الرابع.
- **finger-to-finger t.** إختِبَارُ الإصْبَعِ لِلإصْبَعِ. عند تمديد الذراعين يطلب من المريض تقريب نهايات أصابع اليد إلى نظائرها في اليد الثانية لفحص تنسيق حركات الأطراف.
- **finger-nose t.** إختِبَارُ الإصْبَعِ لِلأنْفِ. مع تمديد الذراع إلى الخارج يطلب من المريض لمس ذروة أنفه ببطء بنهاية سبابه وذلك لفحص الحركات المنسقة للأطراف.
- **Fournier's t.** إختِبَارُ فُورْنِيَه. يطلب من المريض القيام من وضع الجلوس والسير إلى الأمام ثم التوقف بسرعة عندما يطلب ذلك منه ثم السير ثانية والدوران للخلف عندما يطلب ذلك منه ومن الممكن بهذه الطريقة إظهار المشية الرنحية.
- **heel-knee t.** إختِبَارُ الْعَقَبِ - الرُّكْبَةِ. اختبار تنسيق حركات الأطراف حيث يطلب من المريض المستلقي على ظهره لمس ركبة إحدى ساقيه بعقب الساق الثانية ومن ثم إمراره ببطء على مقدمة حرف الظنوب حتى الكاحل عندما تكون عينه مغلقة.
- **intelligence t.** إختِبَارُ الذِّكَاءِ. مجموعة اختبارات أو وظائف لتقييم مقدرة الشخص وقابلياته الذاتية في التحكم والفهم والتسبب بصورة عامة بها أو فهمها أو معرفة أسبابها.
- **Lichtheim t.** إختِبَارُ لِيخْتَهَايم. إذا تمكن المريض من معرفة عدد المقاطع اللفظية في الكلمات التي لا يتمكن من تلفظها فإن ذلك يدل على أن قشرة دماغه غير مصابة بقدر إصابة الألياف الترابطية في الدماغ.
- **Naffziger's t.** إختِبَارُ نَافْزِيْجَر. فحص لانضغاط الجذور العصبية حيث يؤدي الضغط باليد على الوريدين الوداجيين إلى زيادة الألم أو الاضطراب الحسي في منطقة انتشار الجذر العصبية المصابة مما يؤكد وجود انزلاق الغضروف بين الفقرتين أو أية كتلة مرضية أخرى.
- **nystagmus t. (= Barany's symptom)** إختِبَارُ الرَّأْرَأَةِ.
- **performance t.** إختِبَارُ النَّأْدِيَةِ. اختبار ذكاء
- يطلب من الشخص فيه إجراء بعض الأعمال بدلاً من إجابة الأسئلة فقط.
- **pointing t. (= Barany's pointing t.)** إختِبَارُ النَّأْشِير.
- **psychological t.** إختِبَارُ نَفْسِي: اختبار سيكولوجي. أحد الاختبارات التي تجرى لفحص تطور الفرد وإنجازاته وشخصيته وذكائه وعملياته الفكرية وما شابه ذلك.
- **psychomotor t.** إختِبَارُ نَفْسِي حَرَكِي. اختبار لتقييم مقدرة الشخص على استلام التعليمات والإرشادات للقيام باستجابات حركية وعادة ما يشمل قياس سرعة استجاباته لها.
- **Queckenstedt's t. (= Queckenstedt sign)** اختبار كويكنشتيد: علامة كويكنشتيد.
- **Romberg's t.** عِلَامَةُ رُومْبِرْغ. علامة للتفريق بين الرنحين المحيطي والمركزي حيث تشاهد زيادة في عدم انتظام كافة الحركات وفي وسع المشية وعدم ثباتها عند غلق عيني المريض في الرنح المحيطي ولا يحصل مثل ذلك في الرنح المخيخي.
- **station t.** إختِبَارُ الوُقُوفِ: إختِبَارُ المَحْطَةِ. اختبار لاضطرابات التنسيق الحركي يجري بوضع المريض في وضع الوقوف المنتصب مع وضع العقبين والأبأخس بالقرب من بعضها، فإذا كان اهتزاز الجسم وترنحه أكثر من الطبيعي فإن ذلك يدل على اضطراب التنسيق.
- **Stein's t.** إختِبَارُ شَتَاين. عدم التمكن من الوقوف على ساق واحدة، ويشاهد ذلك في أمراض التيه.
- **Tensilon t.** إختِبَارُ تَنْسِيلُون. اختبار للوهن العضلي الوبيل يتم بعد إدخال التنسيلون (كلوريد الإيدروفنيوم) فتقل كثيراً علامات المرض التي تظهر على عين المريض (التدلي وشذوذ العضلات الخارجية للعين).
- **Wada t.** إختِبَارُ وَاْدَا. اختبار لفحص السيادة المخية لوظيفة الكلام حيث يحقن الاموباربيتال إلى الشريان السباتي الباطن لتوليد خزل شقي في أطراف الجهة المقابلة. ويولد الحقن في شريان جهة السيادة للكلام حبسة عابرة بينما لا يولد الحقن في الجهة غير السائدة أي خلل لوظيفة الكلام.
- ألم الحُصِيَّة. ألم في الحُصِيَّة.

**tetanic** 1. كُرَازِي 2. مُكَرَّر. منسوب  
أو يتصّف بالكُرَاز أو مولد له.

**tetaniform** كُرَازِي الشَّكْل. شبيه بالكُرَاز  
أو بالتكرّر.

**tetanization** تَكَرِير. عملية تكرير العضلة.

**tetanospasmin** تَتَانُوسَبَازْمِين؛ المَشْنُجُ  
الْكُرَازِي. الجزء السمي العصبي للذيفان الخارجي  
(ذيفان الكُرَاز) الذي تولده المطثية الكُرَازية والذي  
يحصّر النهايات المشبكية في الجهاز العصبي  
المركزي فيولد التشنج العضلي، وهو من أقوى  
السموم المعروفة.

1. كُرَاز 2. تَكَرَّر. 1. داء عدواني  
حاد تولده عصيات المطثية الكُرَازية ويولد ذيفانها  
المشنج الكُرَازي تقلصات عضلية تَكَرَّرية وفُطْر  
المنعكسات وتشنج المزمار والضرز والتشنج  
العضلي العام والتشنج الظهري والتنفسي والنوبات  
والشلل. وهناك نوع معتدل منه وهو الكُرَاز  
الموضعي الذي يولد نفضات وتشنجات في  
العضلات بالقرب من موقع الإصابة وقد ينتشر بعد  
ذلك 2. التكرّر الفيزيولوجي وهو حالة تقلص  
عضلي مستمر من دون انبساط يتولد عن التنبيه  
المستمر للعصب الحركي بتردد سريع جداً لدرجة  
تؤدي إلى اندغام التقلصات الفردية للعضل ولا  
يمكن تفريقها الواحدة عن الأخرى.

**- cephalic t (= cerebral t. = cephalote-**  
**tanus t.)** الكُرَازُ الرَّأْسِي الدُّمَاغِي. نوع نادر من  
الكُرَاز العدواني سيء الانذار الذي يحدث بعد إصابة  
الرأس أو الوجه أو يترافق مع التهاب الأذن الوسطى  
بوجود المطثيات الكُرَازية فيها ويتصف باختلال  
وظائف الأعصاب القحفية خاصة السابع منها وهو  
يؤدي إلى الضرز (تشنج الفك) وقد يبقى موضعياً أو  
ينتشر ليولد كُرَازاً عاماً.

**- cryptogenic t.** الكُرَازُ خَفِي المَنْشَأ. كُرَاز يتولد  
من دون أي جرح أو سبب ظاهر.

**- neonatal t.** الكُرَازُ الْوَلِيدِي. كُرَاز عدواني  
وخيم يحدث خلال الأيام الأولى من حياة الوليد ينتج  
عن التضخيم اللاصحي للحبل السري أو عند ختان  
الولدان الذكور وضعف التمتع الأمومي.

**- physiological t. (= tetanus)** التَكَرَّر  
الفيزيولوجي. التكرّر الوظيفي.

تَكَرَّر. 1. فُطْر استثنائية الأعصاب  
والعضلات بسبب نقص تركيز الكالسيوم المتأين  
خارج الخلية الذي يمكن أن يترافق مع حالات مثل  
نقص وظيفة الدرقية أو نقص الفيتامين والقلء أو  
تناول كميات كبيرة من الأملاح القلوية. وهو  
يتصف بتشنج رسغي قدمي ونفضان عضلي  
ومعص وتشنج الحنجرة وصرير شهيق وفُطْر  
المنعكسات وحركات رقصية الشكل 2. التكرّر  
الفيزيولوجي.

تَكَرَّرٌ مُدِيد؛ تَكَرَّرٌ دَائِم. تقلصات  
تَكَرَّرية مستمرة استجابة للتنبيه بتيار كهربائي مستمر  
وشديد ويحدث ذلك خاصة في العضلات المتنكسة.

**- gastric t.** تَكَرَّرٌ مُعِدِي. نوع وبيل من التكرّر  
ينتج عن مرض المعدة والذي يتصف بصعوبة التنفس  
والتشنج التوتري المؤلم للأطراف

**- hyperventillation t.** تَكَرَّرٌ فُطْر التَّهْوِيَّة.  
تَكَرَّر ينتج عن الشهيق والزفير الشديدين والمستمرين  
لفترة طويلة

**- latent t.** تَكَرَّرٌ كَامِن. تَكَرَّر يظهر عند التنبيه  
بمنبهات كهربائية أو ميكانيكية

**- neonatal t. (= t. of newborn)** تَكَرَّرٌ وَلِيدِي.  
تَكَرَّر بنقص الكالسيوم الذي يحدث في الأيام الأولى من  
حياة الوليد والذي يتصف بالهيجوية والنفضان  
العضلي والعصبية المفرطة والرعاش والاختلاج  
وأحياناً تشنج الحنجرة والتشنج الرسغي القدي.

**- parathyroid t.** التَكَرَّرُ الدُّرَيْقِي. التَكَرَّر بمرض  
الدرقية أو بإزالتها.

**tetraparesis** خَزَلٌ رُبَاعِي. ضعف عضلي  
يصيب الأطراف الأربعة.

**tetraplegia (= quadriplegia)** شَلَلٌ  
رُبَاعِي. شلل يصيب الأطراف الأربعة.

**thalamectomy (= thalamotomy)** قَطْع  
المِهاد؛ بَضْع المِهاد، تَخْرِيب المِهاد.

**thalamencephalon** الدُّمَاغُ المِهادِي.  
قسم الدماغ البيني الذي يضم المهاد والمهاد التالي  
وجنب المهاد.

**thalamocoele** جَوْفُ المِهاد. البطين الثالث  
للدماغ.

**thalamocortical** مِهادِي قَشْرِي. منسوب  
للمهاد ولقشرة المخ.

**thalamolenticular** مَهَادِيّ عَدَسِيّ.

متعلق بالمهاد والنواة العدسية.

**thalamomamillary** مَهَادِيّ حَلَمِيّ. متعلق

بالمهاد والجسمين الحلميين.

**thalamotegmental** مَهَادِيّ سَقِيْفِيّ. متعلق

بالمهاد وبالسقيفة.

**thalamotomy** بَضْعُ المِهَاد. تخريب المهاد

بطريقة الجراحة التجسيمية للتخريب المحدد لمجموعة معينة من خلايا المهاد كطريقة في التفريغ عن الألم أو الرعاش والصمل في داء باركنسون.

**- anterior t.** بَضْعُ المِهَادِ الأَمَامِيّ. تخريب النواة

الامامية للمهاد.

**- dorsomedial t.** بَضْعُ المِهَادِ الظَهْرِيّ الإِنْسِيّ.

تخريب النواة الظهرية الإنسية للمهاد.

**thalamus** المِهَاد. أحد الجسمين البيضويين

الكبيرين المؤلفين بصورة رئيسية من المادة السنجابية ويقع كل واحد منهما في إحدى الجهتين ويكون الجدار الوحشي للبطين الثالث. وينقسم المهاد إلى قسمين رئيسيين ظهري وبطني ويحتوي كل قسم منهما العديد من النوى، وعند استعمال المصطلح «المهاد» فإنه يعني عادة «المهاد الظهري».

**- dorsal t. (= t. dorsalis)** المِهَادُ الظَهْرِيّ.

منطقة القسم الظهري من الدماغ البيني التي تكون معظم الجدار الوحشي للبطين الثالث وتتكون بصورة رئيسية من مادة سنجابية مترافقة مع صفائح من مادة بيضاء وهي تنقسم إلى أقسام أمامية وإنسية ووحشية يحوي كل منها مجموعات من النوى التي تعمل كمحطات ترحيل للدفعات الحسية وللأسقاطات المخيخية والنوى القاعدية إلى قشرة المخ. وأهم المجموعات الرئيسية للنوى المهادية هي الشبكية والامامية والناصفية والإنسية والبصلية وداخل الصفائح والبطنية الوحشية والخلفية.

**- optic t. (= corpus geniculatum late-**

**rale)** المِهَادُ البَصَرِيّ. الجسم الركبي الوحشي.

**- t. ventralis** المِهَادُ البَطْنِيّ. المنطقة البطنية

من الدماغ البيني التي تتوسط بين المهاد الظهري والوطاء وسقيفة الدماغ المتوسط والتي تحوي الجسمين الركبيين الإنسي والوحشي والنوى تحت

المهادية والشبكية والمنطقة الغائرة ونوى الباحة هـ (ساحات فوريل)، وتسمى أيضاً تحت المهاد.

**thanatophobia** رَهَابُ المَوْت. الخوف غير

المسبب من الموت.

**theca** قُرَاب. (ج: قُرَاب). غطاء أو غلاف.

**- t. medullare spinalis** قُرَابُ النُخَاع. الأم

الجافية للنخاع الشوكي.

**- t. vertebralis** قُرَابُ العَمُودِ الفَقَارِيّ. الأم

الجافية للنخاع الشوكي.

**thelalgia** أَلَمُ الحَلَمَةِ. ألم حلمة الثدي.

**therapy** مُعَالَجَةٌ: مُدَاوَاة. معالجة الأمراض

ومداواتها.

**- behavior t.** مُعَالَجَةُ سُلُوكِيَّة. أسلوب علاجي يركز

فيه على سلوك المريض المنظور بدلاً من الصراعات والعمليات اللاشعورية التي يفترض وجودها في حالات السلوك المنحرف، ويتم ذلك من خلال معالجة المتغيرات المحيطة والسلوكية المتعلقة بسلوك معين يؤمل تحويله، وهناك طرق عديدة للقيام بذلك.

**- conditioning t. (= behavior t.)** مُعَالَجَةُ


إِشْرَاطِيَّة. معالجة سلوكية.

**- convulsive t.** مُعَالَجَةُ إِخْتِلَاجِيَّة. معالجة

الأمراض العقلية وخصوصاً الكآبة بإحداث الاختلاجات، والطريقة المستعملة اليوم هي بالصدمات الكهربائية الاختلاجية وقد كانت تستعمل سابقاً بعض الأدوية كالميترازول لإحداث الاختلاجات.

**- electroconvulsive t.** المُعَالَجَةُ بِالتَّخْلِيَج

الكهربائي: المُعَالَجَةُ بِالصَّدْمَةِ الكَهْرَبَائِيَّة. معالجة الاضطرابات النفسية وخصوصاً الكآبة بإحداث الاختلاجات وفقدان الوعي باستعمال تيار كهربائي متناوب ومنخفض الفولطية لتنبية الدماغ خلال فروة الرأس ولفترة جزء من الثانية. وعادة ما يستعمل دواء مرخٍ للعضل لمنع الأذى للعضلات خلال التوبة وعادة ما تدوم الغيبوبة لمدة خمس دقائق بعد الصدمة تتلوها فترة تخليط حاد تدوم لمدة ساعة تقريباً وغالباً ما تتلو ذلك فترة فقد ذاكرة جزئي قد تدوم لعدة أسابيع بعد العلاج. وقد تؤدي هذه الطريقة العلاجية إلى استجابات علاجية جيدة في معظم حالات الكآبة. وقد استعملت هذه الطريقة أيضاً في معالجة بعض حالات الفصام.



#### thalamus

مقطع أفقي للدماغ يبين المهاد وبعض أقسامه الرئيسية الأخرى: (1) النواة المنزلية (2) المحفظة الباطنة (3) النواة العدسية (4) القرن السفلي للبطين الجانبي (5) الضفيرة المشيمية للبطين الجانبي (6) الحصين (7) ذنب النواة المنزلية (8) القرن الخلفي للبطين الجانبي (9) الأجسام الرباعية (10) الجسم الركبي الإنسي (11) الجسم الركبي الوحشي (12) الوسادة (13) الجسم الصنوبري (14) السطر الانتهائي (15) البطين الثالث (16) الكتلة المتوسطة (17) الحبيبة الأمامية للمهاد (18) أعمدة القبو (مقطوعة) (19) الثقب بين البطينات (20) الحاجز الشفاف (21) الجسم الثلثي (مقطوع).

- electroshock t. (= electroconvulsive t.)  
مُعالِجَةٌ بِالصَّعْمَةِ الْكَهْرِبَائِيَّةِ.

- narcosis t. مُعالِجَةٌ تَخْذِيرِيَّةٌ. معالجة بعض حالات القلق الشديد والإنهاك والهياج الوبيل بتنويم المريض لمدة طويلة (18-24 ساعة يومياً لمدة أسبوعين) باستعمال العقاقير المنومة وتستعمل الباربيتورات عادة لذلك وتسمى هذه الطريقة أيضاً معالجة تنويمية.

- psychoanalytic t. (= psychoanalysis)  
تَحْلِيلٌ نَفْسِيٌّ.

- shock t. (= convulsive t.) مُعالِجَةٌ إِخْتِلَاجِيَّةٌ. معالجة بالصدمة.

- sleep t. (= narcosis t.) مُعالِجَةٌ بِالنَّوْمِ. معالجة الأمراض بالإيحاء التنويمية.

thermalgesia حُرَاقٌ؛ إِيْلَامٌ حَرَارِيٌّ. حالة الشعور بالألم عند التنبيه الحراري.

thermalgia (= causalgia) أَلَمٌ حَرَارِيٌّ. حالة الشعور بحس ألم محرق شديد.

thermanalgesia فَقْدُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. عدم الشعور بالألم عند التنبيه بالحرارة أو عدم الحس بالمنبهات الحرارية.

thermanesthesia فَقْدُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. عدم المقدرة على الشعور بحسي الحرارة والبرودة.

thermesthesia حِسُّ الْحَرَارَةِ. المقدرة على الشعور بحسي الحرارة والبرودة.

thermesthesiometer مِقْيَاسُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. آلة لقياس حس الحرارة.

thermhyperesthesia فَزْطُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. فرط حس الحرارة والبرودة.

thermhypesthesia نَقْصُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. نقص الحس السوي للحرارة والبرودة.

thermoaesthesia (= thermesthesia) حِسُّ الْحَرَارَةِ.

thermohyperalgesia فَزْطُ التَّأَلُّمِ بِالْحَرَارَةِ. حالة تتصف بالتألم الشديد عند التنبيه بالحرارة المعتدلة.

thermohyperesthesia فَزْطُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. التحسس المفرط للحرارة والبرودة.

thermohypesthesia نَقْصُ حِسِّ الْحَرَارَةِ. حالة نقص التحسس للحرارة المرتفعة.

thermohypoesthesia (= thermohypesthesia) نَقْصُ حِسِّ الْحَرَارَةِ.

thermoneurosis عُصَابٌ حَرَارِيٌّ. سخونة ناتجة عن منشأ وعائي حركي.

thermoplegia (= heat stroke) شَلْلٌ حَرَارِيٌّ. ضربة الحرارة.

thigmesthesia (= tactile sensibility) حِسُّ اللَّمَسِ.

thigmotaxis اِنْجِذَابٌ لِمَسِيٍّ. توجه الكائن استجابة لحس اللمس أو للتلامس.

thinking تَفَكُّيرٌ. فعالية دماغية فكرية (بعكس الفعالية العاطفية) أو سريان الأفكار والرموز والترابطات التي تولد المدارك والاسباب.

- autistic t. (= autism) اِنْطَوَاءٌ عَلَى الذَّاتِ. تفكير ذاتي مغلق.

- dereistic t. (= dereism) وهل؛ التَفَكُّيرُ التَّخَيُّلِيُّ. تفكير خيالي غير واقعي.

thiopental sodium ثِيُوبَنْتَالُ الصُّوْدِيُومِ. بَارْبِيتُورَاتٌ تستعمل كمخدر عام سريع وقصير الأمد ويعطى قبل المخدرات الأخرى بحقنه داخل الوريد، ويعطى أيضاً كدواء مضاد للاختلاج.

thiopropazate hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيدُ الثِّيُوبِرُوبَازِيتِ. دواء يعطى في علاج الذهان أو لإيقاف الفعالية العضلية اللاإرادية في رقص هنتنغتون ويستعمل عن طريق الفم.

thioridazine hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيدُ الثِّيُورِيدَازِينِ. دواء مهدئ وله تأثير مهدئ ويؤثر على السلوك ويعطى عن طريق الفم.

thiothixene ثِيُوثِيكْسِينٌ. دواء مضاد للذهان ويعطى عن طريق الفم.

thioxanthene ثِيُوزَانْتِينٌ. واحد من مجموعة الأدوية المضادة للذهان.

thiphenamil hydrochloride هِيدُرُوكْلُورِيدُ الثِّيْفِينَامِيلِ. دواء مضاد للفعل

الكولينيني وله فعل قوي مضاد للتشنج ومرخ لتشنجات العضلات الملساء التي تحصل في الاضطرابات المعدية ويعطى عن طريق الفم.

**thoracalgia** ألم في جدار الصدر.

**thoracodynia** وجع في الصدر.

**thought broadcasting** إنتشار الأفكار.

شعور الشخص بأن أفكاره تنتشر إلى محيطه.

**thought insertion** غرز الأفكار. توهم

الشخص بأن أفكار الآخرين تنغرز في عقله.

**thought withdrawal** إزالة الأفكار. توهم

الشخص بأن شخصاً أو شيئاً ما يزيل الأفكار من عقله.

**threshold** عتبة. (ج: عتبات). 1. القيمة

الصغرى التي يولد عندها المنبه مجرد إحساس يدرك أو ليكون ضمن حدود الإدراك 2. الحاجز الفرضي الذي يجب أن يتعداه المنبه ليصل حد الإدراك.

**- absolute t.** عتبة مطلقة. أصغر حد ممكن من التنبيه الذي يتمكن من توليد إحساس ما.

**- t. of consciousness** عتبة الوعي. أوطا حد للتحسس أو حد الوعي الذي يولد عنده المنبه إحساساً يدرك.

**- convulsant t.** عتبة الإختلاج. أصغر كمية من التيار الكهربائي أو من الدواء اللازمة لتوليد الاختلاج في العلاج الاختلاجي.

**- differential t.** العتبة التفرّيقية. نسبة الفرق بين منبهين إلى نصف حاصل جمعهما، وهي الحد الأدنى من الشدة اللازمة للتحسس التمييزي لكي يمكن إدراك الفرق بين شدتهما وتمييزهما عن بعضهما.

**- displacement t.** عتبة الإنزياح. عتبة إدراك انقطاع استمرارية إحدى الحافات أو محيط أحد الأجسام.

**- double point t.** عتبة النقطتين. أصغر مسافة بين نقطتي لمس يتمكن الشخص من إدراكهما منفصلتين عن بعضهما.

**- galvanic t. (= rheobase)** عتبة غلفانية. أصغر شدة من التيار الكهربائي غير محدودة المدة تتمكن من توليد نبضة عضلية.

**- neuron t.** عتبة العصبون. درجة تنبيه العصبون

الكافية لمجرد توليد استثارة ظاهرة منه (كالإحساس أو الحركة).

**- relational t.** العتبة النسبية. النسبة التي يجب أن تكون بين منبهين كي يمكن إدراك الفرق بينهما.

**- resolution t. (= t. of consciousness)** عتبة التمييز؛ عتبة الوعي.

**- sensitivity t. (= stimulus t. = absolute t.)** عتبة الإحساس؛ عتبة الحساسية.

**thrill** هزير. حس الاهتزاز الذي يحسه الفاحص عند جس الجسم.

**thrombosis** خثار. (ج: خثرات). تكوين أو وجود أو تنامي خثرة.

**- cerebral t.** خثار دماغي. خثار احد الاوعية الدماغية الذي يمكن أن يولد احتشاء دماغياً.

**thymoleptic (= antidepressant)** مُعدّل المزاج؛ مُضاد الكآبة؛ مُنْعَش. دواء يحسن المزاج وينعشه في حالات الاضطرابات العاطفية كالكآبة أو الهوس.

**tibialgia** ألم الظنبوب. ألم حرف الظنبوب.

**tic** عَرَّة. (ج: عَرَات). حركة لا إرادية إجبارية نمطية مكررة شبيهة بالحركة القصدية لأنها منسقة وتقوم بها عضلات في حالة تأزرها السوي وهي عادة ما تشمل الوجه والمنكبين.

**- bowing t. (= nodding spasm)** عَرَّة الانحناء؛ عَرَّة الإيماء. تشنج إيمائي أو انحنائي.

**- convulsive t.** عَرَّة إختلاجية. تشنج أقسام الوجه التي يغذيها العصب السابع.

**- degenerative t.** عَرَّة تنكسية. عرة تتراقد مع تنكس الجهاز العصبي المركزي.

**- t. de pensée** عَرَّة عفوية؛ عَرَّة تَغْيِيرِيَّة. عادة التعبير عن أية فكرة تخطر على البال بصورة لا إرادية.

**- diaphragmatic t.** عَرَّة جَبَابِيَّة. حركات الحجاب النفضانية التشنجية اللاإرادية.

**- t. douloureux (= trigeminal neuralgia)** عَرَّة مؤلِّمة. ألم العصب الثلاثي التوائم.

**- facial t.** عَرَّة وَجْهِيَّة. تشنج عضلات الوجه.

- **gesticulatory t.** عَرَّةٌ إِيْمَائِيَّةٌ. عرة تتصف بحركات تشنجية تشبه إيماء الخطيب أو الممثل.

- **laryngeal t.** عَرَّةٌ حَنَجَرِيَّةٌ. عرة تتصف بقذف هوائي خلال المزمار.

- **local t.** عَرَّةٌ مُوَضِّعِيَّةٌ. عرة تصيب منطقة محددة مثل العين.

- **mimic t. (= facial t. = facial spasm)** عَرَّةٌ تَقْلِيدِيَّةٌ، عَرَّةٌ وَجْهِيَّةٌ؛ تَشْنَجٌ وَجْهِيٌّ.

- **motor t.** عَرَّةٌ حَرَكِيَّةٌ. عرة تتصف بحركة تشنجية فقط من دون أي اضطراب عقلي وهي تشمل التشنج الوجهي والدوراني الجفني والحنجري والحجابي وأنواع العرات الأخرى.

- **t. nondouloureux (= myoclonus)** عَرَّةٌ غَيْرٌ مُؤَلِّمَةٌ. رمع عضلي.

- **progressive choreic t.** عَرَّةٌ رَقْصِيَّةٌ مُتَرَقِّئَةٌ. مرض مزمن يبدأ في مقبل العمر ويتصف بتشنجات تصيب عضلات الرقبة في البداية وتنتشر إلى باقي أقسام الجسم مع تقدم المرض وينتهي عادة بالموت.

- **respiratory t. (= diaphragmatic t.)** عَرَّةٌ تَنَفُّسِيَّةٌ.

- **rotatory t. (rotatory spasm)** عَرَّةٌ دَوْرَانِيَّةٌ. تشنج دوراني.

- **saltatory t. (= saltatory spasm)** عَرَّةٌ قَفْزِيَّةٌ. تشنج قفزي.

- **t. de sommeil** عَرَّةٌ النَّوْمِ. حركة الرأس اللاإرادية أثناء النوم.

- **spasmodic t** عَرَّةٌ تَشْنُجِيَّةٌ. حالة تتصف بحركات تشنجية لمجموعة من العضلات تحدث في فترات غير منتظمة.

**tickling** دَغْدَغَةٌ. تنبيه خفيف لأحد أسطح الجسم يولد بعض الاستجابات اللاإرادية كالضحك والحركات الأخرى.

**time, reaction** زَمَنُ الْإِسْتِجَابَةِ. الوقت الذي يمر بين وضع المنبه والاستجابة أو رد الفعل لمولده.

**tingling** نَحْزٌ. حسٌ نخزي الشكل يتسبب عن البرد أو عن ضرب أحد الأعصاب أو نتيجة بعض أمراض الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي.

**tinnitus** طَنِينٌ. ضوضاء في الأذن قرعية أو ضجيجية أو أزيزية أو قلقلية يسمعها المريض وأحياناً يسمعها الآخرون بالقرب منه.

- **t. aurium** طَنِينٌ أُذُنِيٌّ. إحساس شخصي بسماع الضوضاء في الأذن.

- **cerebral t.** طنين دماغي. طنين يحس به الشخص كان في داخل الدماغ وليس من الأذنين.

- **clicking t.** طَنِينٌ قَلْقَلِيٌّ. صوت قلقل يسمع في الأذن في التهاب الأذن الوسطى النزلي المزمن ومن الممكن أن يسمعها الآخرون غير المريض نفسه.

- **Leudet's t.** طَنِينٌ لُوْدِيَّت. صوت قرعقي في الأذن يسمعه المراقبون أيضاً يتولد عن التقلص اللاإرادي لعضلة باطنة ويتطابق مع عرة بعض الياف الفرع الفكي السفلي للعصب الثلاثي التوائم.

- **nervous t.** طَنِينٌ عَصَبِيٌّ. طنين يتولد عن بعض اضطرابات العصب السمعي أو ارتباطاته المركزية.

- **nonvibratory t.** طَنِينٌ لَا اهْتِرَازِيٌّ. طنين يتولد عن تغيرات كيميائية حيوية في الوظائف العصبية السمعية.

- **objective t.** طَنِينٌ مُوَضُّوعِيٌّ. أصوات شاذة أو مرضية تتولد داخل جسم المريض في منطقة الأذن يسمعها الأشخاص الآخرون غير المريض.

- **pulsative t.** طنين نبضي. طنين اهتزازي يحس به بتكرار نظمي يتزامن مع ضربات القلب.

- **vibratory t.** طَنِينٌ اهْتِرَازِيٌّ. طنين ينتج عن انتقال الاهتزازات التي تتولد في مناطق الجسم المجاورة للوقعة إليها.

**titubant** مُتَرَنِّجٌ. الشخص الذي يترنح.

**titubation** تَرَنُّجٌ. مشية ترنحية أو تعثرية مع اهتزاز الجذع والرأس، وتُشاهد عادة في أمراض المخيخ.

- **lingual t. (= stuttering)** تَرَنُّجٌ لُطَقِيٌّ؛ تَأْتَأَةٌ.



**tocophobia** رُهَابُ الْمَخَاضِ. رهاب الولادة.

**tomography** تَصْوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ. تصوير شعاعي لأحد مقاطع الجسم الداخلية.

**tonaphasia** حُبْسَةٌ نَغْمِيَّةٌ؛ حُبْسَةٌ مُوسِيقِيَّةٌ.

- عدم المقدرة على تذكر النغمات الموسيقية.
- 1. تَوْتَرُ 2. نَغْمَة.** 1. درجة الشد أو **tone** التوتر السوية، وفي العضلات هي درجة مقاومتها للتمديد 2. إحدى خواص الصوت.
- نفمة الإحساس؛ نَغْمَة الشُعُور. حالة **- feeling t.** الفكر والشعور الذي يرافق أية فكرة أو عمل.
- tonoclonic** تَوْتَرِيٌّ رَمَعِيٌّ. تشنج يتكون من نقصان العضل الاختلاجي.
- tonsilla cerebelli** لَوَزَة المُخَيخ. كتلة مدورة تكون جزءاً من الفص الذنبى لنصف كرة المخيخ ومتصلة بلهاة الدودة.
- tonsil of cerebellum (= tonsilla cerebelli)** لَوَزَة المُخَيخ.
- tonus** تَوْتَرِيَّة؛ تَوْتَر. التقلص البسيط المستمر للعضلات الذي يساعد العضلات الهيكلية على المحافظة على الوضع وعودة الدم إلى القلب.
- cerebral t.** تَوْتَر مُخَي. توتر العضلات الذي الذي يتولد عند إزالة المخ.
- chemical t.** تَوْتَر كِيمِيَائِي. حالة الفعالية الكيميائية البسيطة والمستمرة في العضلات في حالة راحتها.
- myogenic t.** تَوْتَر عَضَلِي المُنشَأ. تقلص العضلات التوتري الذي يعتمد على بعض خواص العضلات نفسها أو بعض خلاياها العصبية الباطنة.
- neurogenic t.** تَوْتَر عَصَبِي المُنشَأ. تقلص العضلات التوتري الذي ينتج عن التنبيه الذي تستلمه خلال اعصابها الحركية.
- topagnosia** 1. عَمَة تَوَضِيع اللُّمُس. 2. عَمَة لُمُس الأَجْسَام. 1. عدم المقدرة على معرفة موضع اللمس 2. عدم المقدرة على معرفة طبيعية الأشياء الاعتيادية باللمس.
- topagnosis** عَمَة تَوَضِيع اللُّمُس. عدم المقدرة على معرفة موضع اللمس.
- topalgia** أَلَم مُتَوَضِع. ألم متوضع في نقطة واحدة وهو صفة عامة للألم الذي يتولد عن سبب غير عضوي كما هو الحال في الاضطرابات النفسية.
- topectomy** إِسْتِئْصَالٌ مُوَضِعِي. استئصال موضع محدد ومعين من القشرة الجبهية للمخ في معالجة بعض الأمراض النفسية.
- topesthesia** حِسُّ تَوَضِيع اللُّمُس. المقدرة على تعيين موضع حس اللمس.
- topoalgia (= topalgia)** أَلَم مُوَضِع.
- topoanesthesia** عَمَة تَوَضِيع اللُّمُس. عدم المقدرة على معرفة موضع اللمس.
- topodysesthesia** شَذْوُذٌ تَوَضِيع اللُّمُس. شذوذ توضع حس اللمس.
- topognosis (= topesthesia)** حِسُّ تَوَضِيع اللُّمُس.
- toponarcosis** خَذَرٌ مُوَضِعِي.
- topoparesthesia** مَذَلٌ مُوَضِع. مذل متوضع في منطقة محدودة.
- topothermesthesiometer** مَقْيَاسُ الحِسِّ الحَرَارِي. آلة لقياس حس الحرارة الموضعي.
- tormina (= colic)** مَقْص. قُتُور. قلة أو ضعف الاستجابة للمنبهات الاعتيادية.
- torpor** 1. لَوِي 2. إِنْغَتَال. 1. عملية آلية تلوي فيها قوة خارجية أحد الأجسام حول محوره 2. عملية الانغتيال حول المحور.
- torsion** 1. لَوِي 2. إِنْغَتَال. 1. عملية آلية تلوي فيها قوة خارجية أحد الأجسام حول محوره 2. عملية الانغتيال حول المحور.
- negative t.** دَوْرَانٌ سَلْبِي. دوران باتجاه معاكس لدوران عقرب الساعة.
- positive t.** دَوْرَانٌ إِيْجَابِي. دوران باتجاه مسابير لدوران عقرب الساعة.
- torsionometer** مَقْيَاسُ الانْغَتَال. آلة لقياس درجة انغتيال العمود الفقري.
- torticollis (= wryneck)** صَعْرٌ. حالة تقلص عضلات الرقبة تولد لوبها ووضع الرأس في وضع غير طبيعي.
- congenital t.** صَعْرٌ خَلْقِي. صعر ينتج عن إصابة العضلة القصية الترقوية الخشائية في إحدى الجهتين اثناء الولادة وتحويلها إلى حبل ليفي لا يطول مع تنامي الرقبة.
- hysteric t.** صَعْرٌ هِسْتِيرِي. صعر ينتج عن تقفع هستيري.
- intermittent t. (= spasmodic t.)** صَعْرٌ مُنْقَطِع. صعر تشنجي.





**torticollis**

الصعر السباتي: جنف الرقبة مع ميلان الرأس.

- labyrinthine t. صَعَرٌ يَبْهِي. صعر يتولد عن تهيج الاقنية الهلالية على إحدى الجهتين.

- mental t. صَعَرٌ نَفْسِي. نوع من العرة أو التشنج المعتاد الذي يتصف بالتقلص التشنجي لعضلات الرقبة مولداً انحراف الرأس الذي يتوقف عادة عند الاستلقاء أو بالإمكان السيطرة عليه بمجرد الضغط البسيط.

- myogenic t. صَعَرٌ عَضَلِيّ الْفَنَشَا. حالة عابرة تنتج عن تقلص عضلات الرقبة بسبب الروماتزم أو البرد.

- neurogenic t. صَعَرٌ عَصَبِيّ الْفَنَشَا. صعر ينتج عن انضغاط العصب الإضافي أو تهيجه.

- ocular t. صَعَرٌ عَيْنِي. صعر يتولد عن درجة عالية من اللابؤرية أو عن شلل عضلات العين.

- reflex t. صَعَرٌ اِنْعَكَاسِي. صعر ينتج عن التهاب أو تقيح في الرقبة أو تضخم العقد اللمفية أو ورم اللوزتين أو الرقبة أو الحنجرة.

- rheumatoid t. صَعَرٌ رُوماتويدي. صعر ينتج عن الروماتزم وخصوصاً ذلك الذي يصيب العضلة القصية الترقوية الخشائية والعضلات المجاورة لها.

- spasmodic t. صَعَرٌ تَشْنُجِي. صعر ينتج عن التشنج المتقطع لبعض العضلات.

- spurious t. صَعَرٌ كَاذِب. التواء الرقبة أو تبيسها بسبب تسوس الفقرات الرقبية.

- symptomatic t. صَعَرٌ عَرَضِيّ. تبيس الرقبة بسبب الروماتزم.

tortipelvis انفِتَالُ الْخَوْضِ؛ اِتْوَاءُ الْخَوْضِ. خلل التوتر العضلي المشوه للحوض.

tortua اِحْتِضَارٌ؛ عَذَاب.

- t. facies عَذَابُ الْوُجْهِ. تسمية ابن سينا للآلم العصبي لثلاثي التوائم.

touch مَسْ؛ لَمَس. 1. الحس الذي يعرف الشخص ببعض خواص المواد عند تماسها. 2. الجس أو التحري بالأصابع.

toxicophobia رُهَابُ التَّسَمُّم. الخوف غير الناجم عن التسمم.

trabecula تَرَابِيق. (ج: تَرَابِيق). خيط مثبت أو ساند من نسيج ضام وكذلك الخيط الذي يمتد من المحفظة إلى العضو الموجود في داخلها.

- arachnoid trabeculae تَرَابِيقُ الْعَنْكَبُوتِيَّة. خيوط ليفية رقيقة تربط السطح الداخلي للعنكبوتية بالأم الجافية.

tract سَبِيل. (ج: سَبِيل)؛ مَسَلَك. (ج: مَسَالِك). منطقة خصوصاً الطويلة منها أو مجموعة أو حزمة من الالياف العصبية التي لها أصل واحد ووظيفة مشتركة ونهاية واحدة، أو مجموعة من الأعضاء مرتبة على شكل سلسلة تقوم بمجموعها بوظيفة معينة واحدة.

- Bekhterev's t. (= tractus tegmentalis centralis) سَبِيلٌ بِخْتَرِيف. السبيل السقيفي المركزي.

- bulbar t. سَبِيلٌ بَصَلِي. أي من سبل الالياف العصبية للنخاع المستطيل أو (البصلة)

- Burdach's t. (= fasciculus cuneatus medullae spinalis) سَبِيلٌ بُورْدَاخ؛ الْحَزْمَةُ اِلْإِسْفِينِيَّةُ النُّخَاعِيَّةُ الشَّوْكِيَّة.

- central t. of auditory nerve السَبِيلُ الْمَرْكَزِيُّ لِلْعَصَبِ السَّمْعِي. الياف تمر من النوى القوقعية إلى الزيتونة العلوية ثم إلى الفتل الوحشي على الجهتين المماثلة والعكسية ثم إلى الأعلى خلال عضد الاكيمة السفلية إلى الجسم الركبي الإنسي ومنه إلى قشرة التلافيف الصدغية المستعرضة.

- central of cranial nerves السَبِيلُ الْمَرْكَزِيُّ لِأَعْصَابِ الْخَفَافِيَّة. الياف العديد من الاعصاب القحفية التي تمر إلى الأعلى حتى المهاد بالترافق مع الفتل الإنسي.

- central t. of trigeminal nerve السَبِيلُ الْمَرْكَزِيُّ لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَائِم. حزمة بارزة تقريباً من الياف من العصب ثلاثي التوائم تمر إلى الأعلى حتى المهاد على الجهة الظهرية من الفتل الإنسي.

- cerebellorubrospinal t. السَبِيلُ الْمُخَيَخِي الْحَمْرَائِي النُّخَاعِي. الياف تمر من النواة المسننة للمخيخ للنواة الحمراء على الجهة الأخرى ومنها إلى النخاع الشوكي.

- cerebellospinal t. السَبِيلُ الْمُخَيَخِي النُّخَاعِي. الحزمة المعقوفة للمخيخ التي تمر من النواة الأوجية إلى النخاع الرقبى.

- cerebellotegmental t. of bulb  
(= fastigiolobular t.) السَّبِيلُ الْمُخَيَّضُ  
السَّقْفِيُّ لِلْبَصْلَةِ. السَّبِيلُ الْأَوْجِي البَصْلِي.
- comma t. of Schultze (= fasciculus  
interfascicularis) السَّبِيلُ الضَّمِي لِشَوْلْتَزْ:  
الْحُرْمَةُ بَيْنَ الْحُرَمِ.
- conarhophyseal t. السَّبِيلُ الصَّنُوبَرِيُّ  
النُّخَامِيُّ. جزء من تجويف دماغ الجنين يربط الجسم  
الصنوبري مع الغدة النخامية.
- cornucommissural t. السَّبِيلُ الْقَرْنِيُّ  
الصُّوَارِي. الألياف عصبية في القسم الأمامي من  
العمود الفقري للنخاع الشوكي تمتد خلال المنطقتين  
العجزية والقطنية.
- corticocerebellar t's. (= corticopontile  
t's.) السَّبِيلُ الْقَشْرِيَّةُ الْمُخَيَّضَةُ.
- corticorubral t. السَّبِيلُ الْقَشْرِيُّ الْحُمْرَاوِيُّ.  
الألياف عصبية تمر من قشرة المخ إلى النواة الحمراء.
- corticospinal t. of medulla oblongata  
(= fasciculus pyramidalis) السَّبِيلُ الْقَشْرِيُّ  
النُّخَاعِيُّ لِلْبَصْلَةِ. الحزمة الهرمية.
- fastigiolobular t's. السَّبِيلُ الْأَوْجِيَّةُ الْبَصْلِيَّةُ.  
حزم من الألياف عصبية صادرة تمر من النواة البرحاء  
إلى البصلة (النخاع المستطيل).
- geniculocalcarine t. (= radiatio  
optica) السَّبِيلُ الرَّكْبِيُّ الْمِهْمَازِيُّ. الشع البصري.
- Goll's t. (= fasciculus gracilis  
medullae spinalis) سَبِيلُ غُول. الحزمة  
الناحلة النخاعية الشوكية.
- Gower's t. (= tractus spino-  
cerebellaris ventralis) سَبِيلُ غَاوَر. السَّبِيلُ  
النخاعي المخيخي البطني.
- Helweg's t. (= tractus olivospinalis)  
سَبِيلُ هِلْفَغ. السَّبِيلُ الزَيْتُونِي النخاعي.
- Intermediolateral t. (= columna  
intermediolateralis medullae spinalis)  
السَّبِيلُ الْمُتَوَسِّطُ الْوَحْشِيِّ. العمود الوحشي للنخاع.
- Internuncial t. السَّبِيلُ بَيْنَ النَّوَى: السَّبِيلُ بَيْنَ  
الْعُكْزَيْنِ. السَّبِيلُ الموصل بين نواتين أو مركزين.
- Intersegmental t's. of spinal cord السَّبِيلُ

بَيْنَ شَذَفِ النُّخَاعِ. الحزم المخصوصة للنخاع  
الشوكي.

- Lissauer's t. (= tractus dorsolateralis)  
سَبِيلُ لِيْسَاوَر.
- Lowenthal's t. (= tractus tectospinalis)  
سَبِيلُ لَوْفَنْتَال: السَّبِيلُ السَّقْفِي النخاعي.
- Maissiat's t. (= tractus illiotibialis) سَبِيلُ  
مَيْسِيَات: السَّبِيلُ الْحَرْقُفِيُّ الظَنْبُوبِيِّ.
- mamillopeduncular t. السَّبِيلُ الْحَلْمِيُّ  
السُّوَيْقِيُّ. سَبِيلُ عَصَبِي من الجسم الحلمي إلى نوى  
في الحفرة بين السويقتين.
- Marchi's t. (= tractus tectospinalis)  
سَبِيلُ مَارْشِي: السَّبِيلُ السَّقْفِي النخاعي.
- Meynert's t. (= tractus habenulo  
interpeduncularis) سَبِيلُ مَيْنَرْت: السَّبِيلُ  
العناني بين السويقات.
- Monakow's t. (= tractus rubrospinalis)  
سَبِيلُ مُونَاكُوف: السَّبِيلُ الحمرراوي النخاعي.
- motor t. سَبِيلُ حَرَكِي. أية حزمة من الألياف  
العصبية التي تنقل دفعات عصبية حركية من الجهاز  
العصبي الحركي إلى العضلات.
- peduncular t., transverse السَّبِيلُ السُّوَيْقِيُّ  
الْمُسْتَقَرِّض. شريط صغير من الألياف العصبية يمر  
من عضد الأكمة السفلية إلى التلم الإنسي لساق  
الدماغ.
- pyramidal t. (= pyramidal t. of medulla  
oblongata) السَّبِيلُ الْهَرَمِيُّ (لِلْبَصْلَةِ). السَّبِيلُ  
الهرمي للنخاع المستطيل. مجموعتان من الألياف  
العصبية (القشرية النووية والقشرية النخاعية) تبدآن  
بصورة رئيسية من المناطق الحسية الحركية لقشرة  
المخ وتنزلان إلى المحفظة الباطنة والسويقة المخية  
والجسر والبصلة (النخاع المستطيل). وتتشابك  
الألياف القشرية النووية مع النوى الحركية على طول  
جذع الدماغ. ثم تعبر معظم الألياف القشرية النخاعية  
في التصالب الهرمي ثم تنزل في النخاع الشوكي  
كالسبيل القشري النخاعي الوحشي وتكون معظم  
الألياف غير العابرة السبيل القشري النخاعي البطني.  
وتنتهي الألياف السبيليين بالتشابك مع العصبونات  
الحركية والبينية. ومن الناحية التطورية يعتبر السبيل  
الهرمي سبيلاً حديثاً وأكثر تطوراً في الإنسان، وهو

- يوفر سيطرة قشرية مخية على الحركات الحذقة الماهرة الدقيقة لليد والأصابع وحركات النطق، ويسمى أيضاً السبيل القشري النخاعي للبصلة.
- **rubroreticular t.** السبيلُ الحُمْرَاوِي الشَّبَكِيّ. ألياف عصبية تمر من النواة الحمراء إلى التكوين الشبكي للجسر والبصلة.
- **sensory t.** سَبِيلُ حِسِّيّ. ألياف حزمة من الألياف العصبية تنقل دفعات حسية من المستقبلات المحيطة إلى الجهاز العصبي المركزي.
- **spinothalamocervical t.** السبيلُ النُخَاعِي الرّقَبِيّ المِهَادِيّ. سبيل يصعد من دون تعابر في القسم الظهري من الحبل الوحشي إلى النواة الرقبية الوحشية والذي يترحل في المهاد عن طريق الفتليل الإنسي على الجهة المعاكسة.
- **Spitzka's t. (= Spitzka's-Lissauer's t. = tractus dorsolateralis)** سَبِيلُ سَبِيحَتْرَا؛ السبيل الظهري الوحشي.
- **strionigral t.** السبيلُ المُخَطَّطِي السُّودَاوِيّ. حزمة من الألياف العصبية تمر من الجسم المخطط إلى المادة السوداء.
- **tectocerebellar t.** السبيلُ السَّقْفِيّ المُخَيخيّ. حزمة ألياف عصبية تمر من سقف الدماغ المتوسط إلى المخيخ.
- **tegmental t.** السبيلُ السَّقْفِيّ. حزمة ألياف عصبية في السقفة خلف نواة الجسم المنحرف الخلفية ويعتقد أنها تربطها مع الدماغ المتوسط.
- **thalamo-occipital t. (= radiatio optica)** السبيلُ المِهَادِيّ القَذَالِيّ؛ الشعُ البصري.
- **thalamo-olivary t.** السبيلُ المِهَادِيّ الرِّيتُونِيّ. حزمة ألياف عصبية تنزل من المهاد إلى النواة الزيتونية.
- **tuberohypophyseal t.** السبيلُ الأَخْذَوِيّ النُخَاعِيّ. ألياف عصبية تبدأ من خلايا النواة القمعية ونوى المنطقة النخامية المتوسطة التي يعتقد أنها تكون الطريق العصبي الإفرازي المرتبط بالسيطرة العصبية على الفعاليات الإفرازية للفص الأمامي للغدة النخامية.
- **vestibulocerebellar t.** السبيلُ الدِّهْلِيْزِيّ المُخَيخيّ. ألياف القسم الدهليزي للعصب الثامن التي تمر إلى قشرة المخيخ.

- **Vicq d'Azyr t. (= fasciculus mamillothalamicus)** سَبِيلُ فَك دَازِير. قَطْعُ السَّبِيل. عملية قطع أو بضع السبيل العصبي.
- **mesencephalic t.** قَطْعُ السَّبِيلِ الدِّمَاغِيّ المَتَوَسِّط. قطع جراحي للسبيل العصبية في الدماغ المتوسط.
- **tractus (= tract)** سَبِيل. (ج: سُبُل). مصطلح يطلق غالباً على حزمة من الألياف عصبية أو مجموعة منها لها نفس البداية والنهاية وتخدم نفس الوظيفة.
- **t. bulbotreticulospinalis** السبيلُ البَصْلِيّ الشَّبَكِيّ النُخَاعِيّ. مجموعة من الألياف العصبية في الفتليل الوحشي للنخاع الشوكي تنحدر محاورها من الخلايا العصبية في البصلة (النخاع المستطيل).
- **t. cerebellorubralis** السبيلُ المُخَيخيّ الحُمْرَاوِيّ. ألياف عصبية تبدأ بصورة رئيسية من النواة المسننة للمخيخ وتمر إلى النواة الحمراء على الجهة المعاكسة خلال السويق المخيخي العلوي وتترحل الدفعات منها إلى التكوين الشبكي والنخاع الشوكي.
- **t. cerebellothalamicus** السبيلُ المُخَيخيّ المِهَادِيّ.
- **t. corticohypothalamicus** السبيلُ القَشْرِيّ الوِطَائيّ. مجموعة منتشرة من الألياف العصبية التي تبدأ من أقسام مختلفة من الفص الجبهي وتنتشر بصورة مباشرة إلى الوطاء.
- **t. corticonuclearis** السبيلُ القَشْرِيّ النُّوَوِيّ. السبيل الليفي العصبي المكون من الألياف القشرية النووية للسبيل الهرمي الذي يبدأ من قشرة المخ وينزل في المحفظة الباطنة ويتشابك في مختلف النوى الحركية في الدماغ المتوسط والجسر والبصلة (النخاع المستطيل).
- **t. corticospinalis anterior (= t. corticospinalis ventralis)** السبيلُ القَشْرِيّ النُخَاعِيّ الأمامي.
- **t. corticospinalis lateralis** السبيلُ القَشْرِيّ النُخَاعِيّ الوحشي. مجموعة من الألياف العصبية في الحبل الوحشي من النخاع الشوكي تبدأ من قشرة المخ وتسمى أيضاً السبيل الهرمي الوحشي.

- t. corticospinalis ventralis** السَّبِيلُ القَشْرِيُّ النُّخَاعِي البَطْنِي. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل البطني من النخاع تبدأ من قشرة المخ، وتسمى أيضاً السبيل الهرمي الامامي.
- t. dentatohthalmicus** السَّبِيلُ المُسَنَّنِي المِهَادِي. الياف عصبية تبدأ بصورة رئيسية من النواة المسننة للمخيخ وتمر إلى النواة البطنية الوحشية للمهاد المعاكس خلال السويق المخيخية العلوية ثم تترحل الدفاعات إلى الفص الجبهي، وتسمى أيضاً السبيل المخيخي المهادي.
- t. dorsolateralis** السَّبِيلُ الظَّهْرِي الوَحْشِي. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع الشوكي على الجهة الظهرية للعمود الظهري وتتكون جزئياً من الياف حسيّ الألم والحرارة والتي تدخل النخاع الشوكي ثم تسير لمسافة بضعة شذفات في السبيل الظهري الوحشي ومن ثم تتشابك في العمود الظهري.
- t. frontopontinus** السَّبِيلُ الجَبْهِي الجَسْرِي. سبيل الالياف العصبية الذي يتكون من الالياف الجبهية الجسرية في الفص الجبهي من نصف كرة المخ ويمتد لينتهي في النوى الجسرية.
- t. habenulo- interpeduncularis** السَّبِيلُ العِنَانِي بَيْن السُّوَيْقَتَيْن. حزمة من الالياف العصبية تبدأ من نوى العنان وتمتد بالاتجاه الراسي البطني إلى النواة بين السويقتين لتتفرع في التكوين الشبكي للدماغ المتوسط.
- t. hypothalamohypophysialis** السَّبِيلُ الوِطَائِي النُّخَاعِي. الالياف العصبية التي تكون السبل الصادرة من الوطاء والتي تبدأ من نوياتها وتنتهي في مستويات البارزة الناصفية والقمع والفص الخلفي للنخامية وتشتمل على عدة مجموعات من الالياف العصبية.
- t. mesencephalicus nervi trigeminalis** السَّبِيلُ الدُّمَاعِي المَتَوَسِّطُ لِلْعَصَبِ الثَّلَاثِي التَّوَاتِم. الياف حسية للعصب الثلاثي التوائم الداخل والتي تستمر راسياً على طول الجهة الإنسية للسويق المخيخي العلوي وتوجد أجسام خلاياها في نواة السبيل الدماغي المتوسط الذي يرافقها.
- t. olfactorius** السَّبِيلُ الشَّمِّي. شريط مثلث ضيق يوجد في التلم الشمي للفص الجبهي والذي يبدأ من البصلة الشمية ويمتد خلفاً لينتهي بانقسامه في

السطرين الشميين الإنسي والوحشي وينتهي السطر الوحشي منهما في القشرة الشمية الأولية.

- t. olivocerebellaris** السَّبِيلُ الزَيْتُونِي المَخِيخِي. سبيل الياف عصبية تبدأ من الزيتونة ويعبر إلى الجهة المقابلة ليتقب الزيتونة الثانية ويدخل المخيخ خلال السويق السفلي.
- t. olivocohlearis** السَّبِيلُ الزَيْتُونِي الفُوقَعِي. الياف عصبية تمتد من نواة الزيتونة العلوية وتنتهي عند الخلايا الشعرية في العضو الحلزوني للقوقعة.
- t. olivospinalis** السَّبِيلُ الزَيْتُونِي النُّخَاعِي. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي تشاهد في مقطع النخاع الشوكي كمنطقة مثلثة وهي تنزل من النواة الزيتونية إلى الشذفات الرقبية العلوية.
- t. opticus** السَّبِيلُ البَصَرِي. السبيل الذي يبدأ من التصالبة البصرية ويمر إلى الخلف حول السويق المخي وينقسم إلى الجذرين الوحشي والانسي اللذين ينتهيان في الاكيمة العلوية والجسم الركبي الوحشي على التوالي.
- t. paraventriculohypophysialis** السَّبِيلُ جَنِيْب المِهَادِي النُّخَاعِي. الياف السبيل الوطائي النخاعي التي تبدأ في النواة جنيب البطني في الوطاء والتي ينتهي بعضها في القمع ويصل بعضها الآخر إلى الفص الخلفي للغدة النخامية حيث تخزن فيه موادها الإفرازية كالأوسيتوسين قبل تحريرها إلى الدورة الدموية.
- t. pontoreticulospinalis** السَّبِيلُ الجَسْرِي الشَبَكِي النُّخَاعِي. مجموعة من الالياف العصبية الشبكية النخاعية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من المنطقة الجسرية البصلية.
- t. pyramidalis (= fasciculus pyramidalis medullae oblongata)** السَّبِيلُ الهرْمِي. الحزمة الهرمية البصلية.
- t. pyramidalis anterior (= t. corticospinalis ventralis)** السَّبِيلُ الهرْمِي الأَمَامِي. السبيل القشري النخاعي البطني.
- t. pyramidalis lateralis (= t. corticospinalis lateralis)** السَّبِيلُ الهرْمِي الوَحْشِي. السبل القشري النخاعي الوحشي.
- t. reticulospinalis (= t. reticulospinalis anterior)** السَّبِيلُ الشَبَكِي النُّخَاعِي. مجموعة

من الالياف العصبية تبدأ على الأكثر من التكوين الشبكي للجسر والبصلة وبصورة رئيسية على نفس الجهة ثم تهبط في الحبلين الامامي والوحشي إلى معظم مستويات النخاع الشوكي.

**- t. rubrospinalis** السبيلُ الحُمُرَاوِي النُخَاعِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي من النخاع تبدأ من الخلايا الكبيرة للنواة الحمراء في الدماغ المتوسط.

**- t. solitarius medullae oblongatae** السبيلُ البَصَلِيّ المُفْرَد. سبيل نازل في البصلة (النخاع المستطيل) بالجهة البطنية الوحشية للقسم الذنبى للبلطين الرابع بالقرب من النواة الظهرية لنواة العصبين المبهم واللساني البلعومي ويضم أليافاً حشوية أولية واردة من الأعصاب الوجهي والمبهم واللساني البلعومي.

**- t. spinalis nervi trigeminalis** السبيلُ النُخَاعِيّ الثَلَاثِي التَوَاقُم. سبيل نازل للعصب الثلاثي القوائم يمتد من مستوى دخول جذوره الحسية إلى الجسر حتى الشدافات الرقبية العلوية للنخاع. هو يقع بالجهة الوحشية لنواة السبيل النخاعي للعصب الثلاثي القوائم حيث تتشابك فيه أليافه ويحمل هذا السبيل بصورة رئيسية دفعات حسي الألم والحرارة من الوجه.

**- t. spinocerebellaris anterior (= t. spino- cerebellaris ventralis)** السبيلُ النُخَاعِيّ المُخَيَّخِي الأَمَامِي.

**- t. spinocerebellaris posterior (= t. spino- cerebellaris dorsalis)** السبيلُ النُخَاعِيّ المُخَيَّخِي الخَلْفِيّ؛ السبيلُ النُخَاعِيّ المُخَيَّخِي الظَهْرِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من العمود الصدري والتي تنشطها النهايات الجلدية والعضلية والوترية والمفصالية وهي تصعد إلى المخيخ عن طريق القسم الظهري للحبل الوحشي ثم خلال السويق المخيخي السفلي.

**- t. spinocerebellaris ventralis** السبيلُ النُخَاعِيّ المُخَيَّخِي البَطْنِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ على الأكثر من المادة السنجابية في الجهة المعاكسة والتي تنشطها النهايات العصبية الجلدية والعضلية والوترية

والمفصالية وتصعد إلى المخيخ عن طريق القسم الامامي من الحبل الوحشي ومن ثم خلال السويق المخيخي العلوي.

**- t. spino- olivaris** السبيلُ النُخَاعِيّ الزَيْتُونِيّ. سبيل ألياف عصبية صاعدة في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من الأعمدة السنجابية الظهرية للنخاع وتصعد إلى النواة الزيتونية.

**- t. spinoreticularis** السبيلُ النُخَاعِيّ الشَبَكِيّ. سبيل ألياف عصبية صاعدة في الحبل الوحشي للنخاع تصعد إلى التكوين الشبكي لجذع الدماغ.

**- t. spinotectalis** السبيلُ النُخَاعِيّ السَقْفِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع ومعظمها ألياف عابرة من أصلها وتصعد إلى الأكيمنتين العلوية والسفلية وتحمل دفعات حسية جسمية.

**- t. spinothalamicus anterior (= t. spinothalamicus ventralis)** السبيلُ النُخَاعِيّ المِهَادِيّ الأَمَامِيّ.

**- t. spinothalamicus lateralis** السبيلُ النُخَاعِيّ المِهَادِيّ الوَحْشِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الوحشي للنخاع تبدأ من المادة السنجابية في الجهة المعاكسة وتنشط بحسي الألم والحرارة وتصعد إلى المهاد مع الفتل الوحشي في جذع الدماغ.

**- t. spinothalamicus ventralis** السبيلُ النُخَاعِيّ المِهَادِيّ البَطْنِيّ. مجموعة من الالياف العصبية في الحبل الامامي للنخاع متواصلة مع السبيل النخاعي المهادي الوحشي وتتبع من المادة السنجابية في الجهة المعاكسة حاملة دفعات تنشط باللمس الخفيف وتصعد إلى المهاد وترافق الفتل الإنسي في جذع الدماغ.

**- t. supraopticohypophysialis** السبيلُ فَوْق البَصَرِيّ النُخَاعِيّ. ألياف السبيل الوطائي النخاعي التي تبدأ من النواة فوق البصرية للمهاد وينزل بعضها إلى القمع ويصل بعضها الآخر إلى الفص الخلفي للغدة النخامية حيث تخزن فيه موادها الإفرازية مثل الهرمون مضاد التبول قبل تحريره إلى الدورة الدموية.

**- t. tectobulbaris** السبيلُ السَقْفِيّ البَصَلِيّ. ألياف عصبية تبدأ غالباً من الأكمة العلوية وتهبط إلى

- الحافة السفلية للجسر وتنتهي في نوى جذع الدماغ وفي التكوين الشبكي.
- **t. tectospinalis** السَّبِيلُ السَّقْفِيّ النُّخَاعِيّ. مجموعة من الألياف العصبية وغالباً ما تكون متصالية تبدأ بصورة رئيسية من الاكيمة العلوية وتهبط إلى النخاع الرقبي حيث تتوضع في الحبل البطني.
- **t. tegmentalis centralis** السَّبِيلُ السَّقْفِيّ المَرْكَزِيّ. سبيل الألياف عصبية يبدأ من سقيفة الدماغ المتوسط والمادة السنجابية حول المسال والنواة الحمراء ويهبط في السقيفة والتكوين الشبكي لينتهي في المعقد الزيتوني السفلي، كما يحوي هذا السبيل الأليافاً صاعدة من التكوين الشبكي، ويسمى أيضاً سبيل بختريف.
- **t. triangularis (= t. olivospinalis)** السَّبِيلُ المثلث. السبيل الزيتوني النخاعي.
- **t. vestibulospinalis** السَّبِيلُ الدهليزيّ النُّخَاعِيّ. ألياف عصبية تبدأ من النواة الدهليزية الوحشية وتهبط من دون تعابر بصورة رئيسية في القسم البطني للحبل الوحشي خلال معظم مستويات النخاع الشوكي كما يوجد بعض منها في الشدقات الذنبية للنخاع في الحبل البطني وقد يوجد أكثر من سبيل واحد من هذه السبل في نخاع الإنسان.
- trait** خَلَّةٌ (ج: خَلَالٌ). أية صفة وراثية أو نمط سلوكي مميز.
- tramadol hydrochloride** هِيْدُرُوكُلُورِيْدُ التَرَامَادُول. دواء مسكن.
- trance** غَيْبِيَّةٌ. حالة تغير الوعي تتصف بحدّة الإدراك البُورِي وقلة الإدراك المحيطي وهي حالة شبيهة بالنوم مع قلة الفعالية وضعف الوعي.
- **alcoholic t.** غَيْبِيَّةٌ كُحُولِيَّةٌ. حالة جمدة تتولد عن فرط تناول الكحول وإذا كانت الكمية المتناولة كبيرة فيمكن أن تولد خللاً دورانياً مع الاختناق بسبب خمود الجهاز العصبي المركزي. كما تهبط الفعاليات الحيوية إلى حد متدنٍ ويصبح من الصعب إيقاظ المريض.
- **hypnotic t.** غَيْبِيَّةٌ تَنَوِيْمِيَّةٌ. حالة غيبوبة تولد بالتنويم.
- tranquilizer** مُهْدِئٌ. دواء يهدئ مع تأثير ملطف.

- مُهْدِئٌ** major t. (= antipsychotic agent) كبير. عامل مضاد الذهان.
- مُهْدِئٌ** minor t. (= antianxiety agent) صغير. عامل مضاد القلق.
- transcortical** عبر القشرية. ما يربط قسمين مختلفين من قشرة المخ أو ما يعتمد على مرض السبل التي تربط أقساماً مختلفة من قشرة المخ.
- transdural** عبر الجافية. خلال أو عبر الأم الجافية.
- transmission** 1. إِنْتِقَالٌ؛ سِرَايَة 2. مُرُوقٌ. 1. مرور أو انتقال الدفعات العصبية من عصبون لآخر أو انتقال الأمراض من شخص لآخر 2. مرور الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.
- **duplex t.** إِنْتِقَالٌ بالاتجاهين. انتقال الدفعات العصبية باتجاهين على طول العصب.
- **ephaptic t.** إِنْتِقَالٌ تماسي؛ إِنْتِقَالٌ مَلْعَسِيّ. انتقال الدفعات العصبية عبر التماس بدلاً من الانتقال المشبكي.
- **neurochemical t.** إِنْتِقَالٌ عَصْبِيّ كِيْمِيَاثِيّ. انتقال الدفعات العصبية عبر الاتصال المشبكي بواسطة المادة الكيميائية الناقلة.
- **neurohumoral t. (= neurochemical t.)** إِنْتِقَالٌ عَصْبِيّ هُزْمُونِيّ.
- **neuromuscular t.** إِنْتِقَالٌ عَصْبِيّ عَضَلِيّ. انتقال بتوسط كيميائي لجهد الفعل من العصب إلى العضل خلال الاتصال العصبي العضلي.
- **synaptic t.** الإِنْتِقَالُ المَشْبَكِيّ. توصيل الدفعات العصبية من عصبون لآخر أو إلى ليف عضلي أو إلى غدة عبر المشبك.
- trauma** رَضْحٌ. (ج: رَضُوحٌ). جرح أو إصابة سواء كانت عضوية أو نفسية.
- **psychic t.** رَضْحٌ نَفْسِيّ. صدمة عاطفية تولد اضطراباً عاطفياً أو نفسانياً.
- traumasthenia (= traumatic neurosthenia)** وَهْنٌ عَصْبِيّ رَضْحِيّ.
- trebenzomine hydrochloride** هِيْدُرُوكُلُورِيْدُ التَرِبِنْزومِين. دواء مضاد للكآبة.

**tremble** إِرْتَعَشَ؛ رُعَاش.

**tremens** إِرْتَعَاشِيٌّ. يتصف بالارتعاش أو الحركات الاهتزازية أو الرعاش أو يترافق معها.

**tremograph** مِخْطَاطُ الرُّعَاش. جهاز لتسجيل الرعاش.

**tremor** رُعَاش. ارتعاش أو اهتزاز لا إرادي.

- **action t.** رُعَاشُ الْحَرَكَةِ. حركات اهتزازية نظمية لا إرادية عند القيام بحركة إرادية للأطراف الممدودة مثلاً عند الكتابة أو عند رفع قدح ويمكن أن يكون ارتعاشاً في الصوت أو الأقسام الأخرى من الجسم.

- **coarse t.** رُعَاشٌ غَلِيظٌ. رعاش تكون حركاته بطيئة نسبياً.

- **continuous t.** رُعَاشٌ مُتَوَاصِلٌ. رعاش مستمر كما يحدث في الشلل الرعشي.

- **epileptoid t.** رُعَاشٌ شَبِيهِ الصَّرَع. تشنج رمعي مع الرعاش.

- **essential t.** رُعَاشٌ أَسَاسِيٌّ. رعاش وراثي غامض المنشأ يبدأ في مختلف الأعمار وعادة حوالي سن الخمسين من العمر ويبدأ بحركات دقيقة سريعة تختلف عن الرعاش الباركنسوني في اليدين ثم ارتعاش الساعدين واللسان والراس والساقين والجذع ويزداد سوءاً بالعوامل العاطفية ويشد بالحركات الإرادية ويتحسن وقتياً بالكحول.

- **familial t. (= essential t.)** الرُّعَاشُ العَائِلِيٌّ.

- **fibrillary t.** رُعَاشٌ لَيْبِقِيٌّ. ارتعاش نظمي دقيق بسبب التقلص المتناوب لمختلف اللييفات العضلية وهو الرجفان.

- **fine t.** رُعَاشٌ رَقِيقٌ. رعاش تكون اهتزازته سريعة ودقيقة.

- **forced t.** رُعَاشٌ قَسْرِيٌّ. حركات اهتزازية تستمر بعد الحركة الإرادية بسبب التنبيه المتقطع للمراكز العصبية.

- **hereditary essential t. (= essential t.)** رُعَاشٌ أَسَاسِيٌّ وَرَاثِيٌّ.

- **Hunt's t.** رُعَاشٌ هَنْت. الرعاش الذي يرافق كل حركة إرادية والذي يشاهد في إصابات المخيخ.

- **Intention t.** رُعَاشٌ قَصْدِيٌّ. رعاش يتولد أو يشد عند القيام بحركة إرادية منسقة.

- **Intermittent t.** رُعَاشٌ مُتَقَطِعٌ. رعاش يشاهد في الفالج (الشلل الشقي) أو عند محاولة القيام بحركة إرادية.

- **kinetic t.** رُعَاشٌ حَرَكِيٌّ. رعاش يحدث في أحد الأطراف عند القيام بحركة إرادية.

- **t. linguae** رُعَاشٌ لِسَانِيٌّ. رجفان اللسان الذي يشاهد في الكحولية والحمى التيفية والخرف الشللي.

- **motofacient t.** رُعَاشُ الْحَرَكَةِ. الرعاش الذي يساهم في حركة العضلة.

- **t. opiophagorum** رُعَاشٌ مُدْمِنِي الْأَفْيُون. رعاش المصابين بإدمان الأفيون.

- **passive t. (= rest t.)** رُعَاشٌ لَا فَاعِلٍ؛ رُعَاشُ الرَّاحَةِ. الرعاش الذي يظهر عندما يكون المريض مرتاحاً ومن دون حركة.

- **persistent t.** رُعَاشٌ مُسْتَدِيمٌ؛ رُعَاشٌ مُثَابِرٌ. الرعاش الذي يحدث للمريض سواء كان مرتاحاً أو قائماً بحركة إرادية أو غيرها.

- **t. potatorum (= delirium tremens)** رُعَاشٌ مُدْمِنِي الْخَمَرِ؛ هَذْيَانٌ إِرْتَعَاشِيٌّ.

- **rest t.** رُعَاشُ الرَّاحَةِ. رعاش يحدث في الطرف المرتخي والمسنود كالذي يحدث في الباركنسونية.

- **senile t.** رُعَاشٌ شَيْخُوخِيٌّ. رعاش يحدث للشيوخ عند تقدمهم في السن.

- **static t.** رُعَاشٌ سَكُونِيٌّ. رعاش يحدث عند محاولة وضع أحد الأطراف في وضع ثابت معين.

- **striocerebellar t.** رُعَاشٌ مُخْطَاطِيٌّ مُخَيَخِيٌّ. رعاش مشترك من الرعاشين المخططي والمخيخي وعادة ما يكون بسبب تنكس الجهاز العصبي المركزي المنتشر.

- **vollitional t.** رُعَاشٌ إِرَادِيٌّ. رعاش كل أقسام الجسم عند القيام بحركة إرادية يحدث في التصلب المتعدد.

**tremulous** 1. رُعَاشِيٌّ 2. رَاعِشٌ. مهتز أو مرتجف أو مرتعش.

**trend** تَرْعَةٌ. رغبة أو توجه لأحد الاتجاهات أو المسارات.

1. قَلَقٌ عَصَبِيٌّ 2. إِرْتَعَاشٌ. 1. قلق عصبي ورهاب 2. ارتعاش اهتزازي.



**treppe** التجميع؛ تدرُّج. ظاهرة زيادة شدة التقلص العضلي تدريجياً بتكرار التنبيه.

**triad of skeletal muscle** مُثَلَّثُ العَضَلَةِ الهَيْكَلِيَّة. زوج من الصهريجيين الانتهايين المقابلين للنيبب الثاني الذي يجري عرضياً عبر الليفية العضلية.

**triangle, Wernicke's** مُثَلَّثُ فيرنِيكَا. الباحة داخل الذراع الخلفي على المحفظة الداخلية حيث يتلامس فيها الشع البصري الذي يردها من الجسم الركبتي الوحشي مع الشعين السمعي والحسي الجسدي.

**tribadism** سِحَاق. 1. سحاق يقلد فيه الجماع الطبيعي بين الجنسين المختلفين 2. استعمال الأنثى لقضيب اصطناعي للقيام بعملية جنسية 3. احتكاك الأعضاء الجنسية بين اثنتين.

**trichesthesia (= trichoesthesia)** حِسُّ اللمس الشَّعْرِي؛ الحِسُّ الشَّعْرِي.

**trichoanesthesia** خَدَرٌ شَّعْرِي. فقدان الحس الشعري.

**trichoesthesia** الحِسُّ الشَّعْرِي. الحس الذي يتولد عند لمس شعر الجلد.

**trichoesthesiometer** مِقْيَاسُ الحِسِّ الشَّعْرِي. جهاز كهربائي يقيس الحس الشعري.

**trichomania (= trichotillomania)** هَوَسُ التَّنْف.

**trichotillomania** هَوَسُ التَّنْف. هوس الشخص لتنف شعر رأسه إجبارياً.

**triclofos sodium** صُودِيُوم تَرَايْكُلُوفُوس. دواء منوم ويستعمل أيضاً عند التنويم قبل إجراء التخطيط الكهربائي للدماغ.

**trifacial** الثَّلَاثِيّ التَّوَائِم. يستعمل للدلالة على العصب القحفي الخامس الثلاثي التوائم.

**trifluoperazine hydrochloride** هِيْدُرُوكْلُورِيْدُ التَّرَايْسُوبَرَازين. دواء مضاد للذهان يستعمل عن طريق الفم أو بالزرق في العضلات.

**trifluoperidol** تَرَايْفْلُوبِرِيْدُول. دواء مهدئ يستعمل في معالجة الهوس والغصام.

**triflupromazine** دواء مضاد للذهان يستعمل عن طريق الفم.

**trigeminal** الثَّلَاثِيّ التَّوَائِم. يستعمل للدلالة على العصب القحفي الخامس.

**trigone** مُثَلَّث. باحة مثلثة.

**trigonum (= trigone)** مُثَلَّث. (ج: مُثَلَّثَات). اسم عام لباحة أو شكل ثلاثي الزوايا والأطراف.

**- t. cerebrale (= fornix cerebri)** مُثَلَّثُ المَخ. قَبو المَخ

**- t. collaterale ventriculi lateralis** المُثَلَّثُ الجَانِبِيّ لِلْبُطَيْنِ الجَانِبِيّ. الباحة المثلثة في قاع البطين الجانبي بين القرنين المتباعدين القذالي والصدغي.

**- t. collaterale ventriculi quarti (= t. nervi vagi)** المُثَلَّثُ الجَانِبِيّ لِلْبُطَيْنِ الرَّابِع. مثلث العصب المبهم.

**- t. habenulae** مُثَلَّثُ العِنَان. باحة صغيرة منخسفة على الناحية الظهرية الانسية من القسم الخلفي للمهاد والتي تحوي نوى العنان وتعين الصوار العناني.

**- t. habenularis (= t. habenulae)** مُثَلَّثُ العِنَان.

**- t. hypoglossale (= t. nervi hypoglossi)** مُثَلَّثُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ.

**- t. interpedunculare (= fossa interpedunculare)** الحُفْرَةُ بَيْنَ السُّوَيْقَتَيْنِ.

**- t. lemnisci** مُثَلَّثُ الفَتِيل. مثلث صغير محدد على جهة البرزخ وعلى الجهة الوحشية للأكمة السفلية يحده من الأسفل السويق المخيخي العلوي ومن الجهة الظهرية الإنسية عضد الأكمة السفلية ومن الجهة البطنية الوحشية التلم الوحشي للدماغ المتوسط.

**- t. nervi hypoglossi** مُثَلَّثُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ. النهاية السفلية المستدقة لبارزة الحفرة المعينية مباشرة على الجهة السطحية لنواة تحت اللساني.

**- t. nervi vagi** مُثَلَّثُ العَصَبِ المُبْهِم. باحة في قاع البطين الرابع مباشرة على الجهة الوحشية لمثلث

العصب تحت اللساني وتقع تحته النواة الظهرية للعصب المبهم.

- t. olfactorium المثلث الشمي. باحة المادة المثقبة الامامية بين السطرين الشميين الإنسي والوحشي المتباعدين ويحدها خلفياً الشريط المائل.

- t. pontocerebellare المثلث الجسري المخيخي. الانخساف الزاوي بين الحافة السفلية للجسر والسويق المخيخي السفلي وندفة المخيخ.

- t. vagale (= t. vagi = t. nervi vagi) مثلث العصب المبهم.

### trihexyphenidyl hydrochloride

هيدروكلوريد التراهيكسي فينيديل. دواء يستعمل كمضاد للباركنسونية وله فعل شبيه بالأتروبين.

trimipramine ترايمبرامين. دواء مضاد للكآبة.

trineural ثلاثي الأعصاب. منسوب إلى ثلاثة أعصاب أو يحويها.

triplegia شلل ثلاثي. شلل ثلاثة أطراف.

trismus (= lockjaw) ضَرْز. اضطراب حركي للعصب الثلاثي التوائم يتصف بتشنج عضلات المضغ بصورة خاصة مع صعوبة فتح الفم وهي أعراض أولية مميزة لمرض الكزاز.

trisomy ثَلَاثُ صِبْغِي. وجود ثلاثة صبغيات في أحد مواضع الخلية بدلاً من صبغيتين مما يولد أحد الأمراض الجينية.

tristimania (= melancholia) السوداوية.

tromomania (= delirium tremens) هَذْيَانُ إِرْتِعَاشِي.

trophoneurosis عَصَابُ إِغْتِذَائِي. أي مرض عصبي وظيفي ينتج عن نقص التغذية الناتج عن عيب عصبي أو بسبب نقص التغذية العصبية لأحد أقسام الجسم.

- facial t. (= facial hemiatrophy) عصاب اغتذائي وجهي؛ ضُمُورٌ وَجْهِي شَقِي.

- lingual t. عَصَابُ إِغْتِذَائِي لِسَانِي. ضمور لساني شقي مترقي.

- muscular t. عَصَابُ إِغْتِذَائِي عَضَلِي. تغير تغذوي في الأنسجة العضلية بسبب اعتلال عصبي فيها.

- t. of Romberg (= facial hemiatrophy) ضُمُورٌ وَجْهِي شَقِي.

trophonucleus (= macronucleus) نَوَاةٌ كَبِيرَةٌ.

truncus جذع. (ج: جذوع). الجزء الرئيسي من الجسم الذي يتصل به الرأس والأطراف أو هو جزء رئيسي قصير وغير مقسم من عصب أو شريان أو قناة أو وعاء لمفي.

- t. corporis callosi جذع الجسم الثفني. القسم المركزي الرئيسي من الجسم الثفني المميز عن شريطه ومتقاره.

- t. encephalicus (= brainstem) جذع الدماغ. جزء الدماغ الشبيه بالجذع الذي يوصل نصفي كرة المخ بالنخاع الشوكي ويتكون من الجسر والبصلة (النخاع المستطيل) والدماغ المتوسط ويعتبر البعض الدماغ البيني جزءاً من جذع الدماغ.

- t. inferior plexus brachialis الجذع السفلي للضفيرة العضدية. جذع الضفيرة العضدية الذي يتكون من الفروع البطنية للعصبين الرقبين الثامن والصدري الأول ويمكن أن يبدأ منه العصب الصدري الإنسي ويصبح فرعه الامامي الحبل الإنسي للضفيرة ويساعد فرعه الخلفي في تكوين حبلها الخلفي وهو جذع عصبي حركي وحسي عام.

- t. lumbosacralis الجذع القطني العجزي. جذع يتكون من اتحاد القسم السفلي من الفرع البطني للعصب القطني الرابع مع الفرع البطني للعصب القطني الخامس.

- t. medius plexus brachialis الجذع المتوسط للضفيرة العضدية. جذع يتكون من الفرع البطني للعصب الرقبى السابع ويساعد قسمه الامامي، الذي يعطي الأعصاب الصدرية الوحشية، في تكوين الحبل الوحشي للضفيرة، ويساعد قسمه الخلفي في تكوين الحبل الخلفي لها وهو عصب حركي وحسي عام.

- t. nervi accessori جذع العصب الإضافي. الجذع العصبي الذي يتكون من الجذور القحفية والنخاعية للعصب الإضافي والذي ينقسم إلى الفرعين الانتهايين الظاهر والباطن.

- t. nervi spinalis جذع العصب النخاعي.

الجذع القصير جداً الذي يتكون من الجذور الظهرية والبطنية للعصب النخاعي.

#### - trunci plexus brachialis جَذْعُ الضَّفِيرَةِ

العَضْدِيَّة. الجذوع الثلاثة (العلوي والسفلي) للضفيرة العضدية التي تنبع من الفروع البطنية للأعصاب الرقبية السفلية الأربعة والعصب الصدري الأول بالقرب من الحافة الوحشية للعضلة الأخمعية الأمامية والتي تستمر إلى الجهة الوحشية السفلية فوق وخلف الشريان تحت الترقوة. وبالقرب من الترقوة ومن ثم ينقسم كل جذع إلى قسمين بطني وظهري ويتحد القسمان البطنيان للجزعين العلوي والإنسي ليكونا الحزمة الوحشية ويكون قسم الجذع السفلي الحزمة الإنسية ليكونا الحزمة الوحشية ويكون قسم الجذع السفلي الحزمة الإنسية للضفيرة وتكون الأقسام الظهرية للجذوع الثلاثة الحزمة الخلفية للضفيرة.

#### - t. superior plexus brachialis الجَذْعُ

الْعُلَوِيُّ لِلضَّفِيرَةِ العَضْدِيَّة. جذع الضفيرة العضدية الذي يتكون من الفروع البطنية للعصبين الرقبين الخامس والسادس. ويساعد قسمه الأمامي في تكوين الحبل الوحشي للضفيرة كما يساعد قسمه الخلفي في تكوين الحبل الخلفي ويعطي فروعاً إلى العصبين فوق الكتفي وتحت الترقوي وهو عصب حركي وحسي عام.

#### - t. sympathicus (= t. sympathicus)

الجَذْعُ الْوُدِّي. حبلان عصبيان طويلا واحد على كل جهة من جهتي العمود الفقري ويمتدان من قاعدة القحف حتى العنق. ويحوي كل حبل منهما عقداً ودية رقبية وصدرية قطنية وعجزية ومرتبطة ببعضها بخيوط بينية. وتستلم هذه العقد الياًفاً قبل عقدية من الجذور البطنية الصدرية والقطنية العلوية عن طريق الفروع الاتصالية كما تعطي فروعاً إلى الضفائر أمام الفقارية وإلى الأحشاء والأوعية الدموية المجاورة.

#### - t. vagalis anterior الجَذْعُ الْأَمَامِيُّ لِلْمُبْهَم.

جذع (أو جذوع) عصبي يتكون من الياف من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر تتجمع من القسم الأمامي من الضفيرة المريئية ومن ثم تنزل خلال الفتحة المريئية في الحجاب الحاجز لتغذي فروعاً للسطح الأمامي للمعدة.

#### - t. vagalis posterior الجَذْعُ الْخَلْفِيُّ لِلْمُبْهَم.

جذع (أو جذوع) عصبية يتكون من الياف من العصبين المبهمين الأيمن والأيسر التي تتجمع من القسم الخلفي

للضفيرة المريئية ومن ثم تنزل خلال الفتحة المريئية للحجاب لتغذي فروعاً للسطح الخلفي للمعدة.

#### trunk (= truncus) جَذْع.

حَدْبَةٌ. (ج: حَدَبَات). 1. بنية ناشرة tuber أو تورم 2. الآفة الأساسية للتصلب الحدبي التي تتصف بكونها آفة دماغية ورمية عابية عقدية عدسية الشكل وشاحية وصلية وقد تتكلس أحياناً وتتولد غالباً في نصفي كرة المخ والمخيخ والبصلة والنخاع.

#### - t. anterior hypothalami (= t. cinereum)

حَدْبَةُ الْوِطَاءِ الْأَمَامِيَّة. الحدية الرمادية.

#### - t. cinereum

الْحَدْبَةُ الرَّمَادِيَّة. طبقة من

المادة السنجابية وهي قسم من الوطاء وتكون جزءاً من قاع البطين الثالث وتقع أمام وبين الجسمين الحليميين وتندمج في الأمام في القمع.

#### tuberculum

حَدْبِيَّة. (ج: حَدَبِيَّات). حدة

أو عقيدة أو بارزة صغيرة.

#### - t. anterior thalami

حَدْبِيَّةُ الْمَهَادِ الْأَمَامِيَّة.

تضخم واضح على السطح الظهري للقسم الراسي للمهاد والذي يحوي مجموعة النوى الأمامية للمهاد.

#### - t. cinereum (= 1. t. trigeminale 2. tuber

cinereum) 1. حَدْبِيَّةُ الثَّلَاثِي التَّوَامِ

2. الحَدْبَةُ الرَّمَادِيَّة.

#### - t. cuneatum

الْحَدْبِيَّةُ الْإِسْفِينِيَّة. تضخم على

الحزمة الإسفينية للبصلة يقع مباشرة على الجهة الوحشية للحدبية الناحلة وتكونه النواة الإسفينية التي تقع تحتها مباشرة.

#### - t. gracilis

حَدْبِيَّةُ الْفَاحِلَةِ. تضخم النواة

الناحلة في البصلة مكوناً الحافة السفلية الوحشية للبطين الرابع وتكونه النواة الناحلة التي تقع تحته.

#### - t. hypoglossi (= trigonum nervi

hypoglossi) حَدْبِيَّةٌ تَحْتَ اللِّسَانِي؛ مُثَلَّثٌ

العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِ.


#### - t. posterius thalami (= pulvinar

الْحَدْبِيَّةُ الْخَلْفِيَّةُ لِلْمَهَادِ؛ وَسَادَةُ الْمَهَادِ. thalami)

#### - t. trigeminale

حَدْبِيَّةُ الثَّلَاثِي التَّوَامِ. مرتفع

في القسم الذنبي من السطح الخلفي للبصلة يقع بين الحزمة الإسفينية وجذور العصب الإضافي ويتكون من السبيل النخاعي النازل للعصب ثلاثي التوائم والسويق المخيخي الذنبي (السفلي)، ويسمى أيضاً الحدبية السنجابية أو حدبية رولاندو.



#### truncus sympathicus

الجهة اليسرى من المنصف بعد إزالة جدار الصدر والرئة يبين أعصابه وأوعيته والجذع الودي: (1) الترقوة والعضلة تحت الترقوة (2) الوريد والشريان الإبطيان (3) الضلع الأولي (4) الشريان تحت الترقوة والعصب المبهم والشريان السباتي الأصلي (5) العصب الحجابي والوريد العضدي الرأسي (6) الضفيرة الأبهريّة والقلبيّة والعقدة (7) الضفيرة الرئوية الأمامية (8) التوتة (9) القصبة الرئويّة اليسرى والشريان والأوردة الرئوية (10) التامور اللبني (11) العصب الحجابي والشريان والوريد التاموريان (12) الجنبّة الضلعيّة (13) الرذب الضلعي المنصفي (14) الجنبّة المنصفيّة (15) عقد لمفيّة (16) الحجاب والجنبّة الحجابيّة (17) الجنبّة الضلعيّة (18) الجذع الودي والعقد الودية الصدريّة (19) الوريد والشريان الوربيان والعصب الوربي (20) العصب الحشوي الكبير (21) الفرع الودي الموصل والشريان والوريد الوربيان الخلفيان (22) الأهر الصدري والضفيرة الأبهريّة الصدريّة (23) المريء والعصب المبهم والضفيرة الرئوية الخلفيّة (24) الوريد الإضافي (25) العصب الحنجري الراجع (26) المريء والقناة الصدريّة (27) الأعصاب القلبيّة (الودية واللاودية) (28) الجزء تحت الترقوي للضفيرة العضديّة.

- tuberositas (= tuberosity)** أَخْدَوِيَّة. (ج: أَخَادِيْب). بارزة أو مرتفع.
- tubocurarine** تُوْبُوْكُوْرَارِين. المادة الأساسية للكوراري.
- t. chloride** كلوريدُ التُوْبُوْكُوْرَارِين. عامل محصر للتوصيل العصبي ويستعمل بحقنه للوريد لإرخاء العضلات الهيكلية في الجراحة أو الكزاز أو التكرز أو العلاج بالصدمات أو لتشخيص الوهن العضلي الوبيل في بعض الحالات.
- tween-brain (= diencephalon)** الدُمَاعُ البَيِّنِي.
- twitch** نَفْضَةٌ. استجابة تقلصية قصيرة للعضلة الهيكلية تولدها رشقه وأبل من الدفعات العصبية في العصب الحركي الذي يغذيها.
- twitching** نَفْضَانٌ. تقلص عضلي مفرد أو سلسلة من التقلصات العضلية.
- fascicular t.** نَفْضَانٌ حُرْمِي. تقلصات قصيرة لمجموعات كبيرة من حزم الألياف العضلية.
- fibrillar t.** نَفْضَانٌ لُيْنَفِي. تقلصات قصيرة متكررة تشمل عضلات الوجه.
- Trousseau's t.**
- type** نَمَط. (ج: أَنْمَاط). الصفة العامة أو السائدة لآية حالة مرضية أو شخص أو مادة أو أي شيء آخر.
- Dejerine t. (= amyotrophic lateral sclerosis)** نَمَطُ دِيَجِيرِين. تصلب وحشي ضموري.
- Dejerine-Landozy t. (= Landozy-Dejerine dystrophy)** نَمَطُ دِيَجِيرِين لَانْدُوْزِي. حثل لاندوزي ديجيرين.
- Duchenne's t. (= pseudohypertrophic muscular dystrophy)** نَمَطُ دُوْشِين. حثل عضلي ضخامي كاذب.
- Erb- Zimmerlin t.** نَمَطُ إِرْب - زِيْمَرْلِن. النمط الكتفي الطفلي للحثل العضلي الأولي.
- Fazio- Londe t.** نَمَطُ فَاْزِيُو - لُونْدَة. النمط البصلي الوجهي للضمور العضلي النخاعي الطفلي العائلي المترقي.
- Hutchison's t.** نَمَطُ هِتْشِسُون. ورم الأرومة العصبية مع النفاث القحفية.
- kalmuck t. (= Down's syndrome)** نَمَطُ كَالْمُوك. متلازمة داون.
- Kertschmer t's.** أَنْمَاطُ كِرِيْشْمِر. أنماط البنية المتناسبة مع الشخصية أو النزعات المزاجية للشخص مثل البنيات الواهنة والرياضية والثدية (مختلة التنسج) والغليظة وما شاكل ذلك.
- leg t.** النَمَطُ السَّاقِي. الضمور العضلي الوراثي المترقي.
- Leichtenstern (= hemorrhagic encephalitis)** نَمَطُ لِيْشْتَنْشْتِيرِن. التهاب الدماغ النزفي.
- Levi- Lorain t. (= hypophysial infantilism)** نَمَطُ لِيْفِي لُوْرِيَان. طفالة نخامية.
- Leyden- Mobius t. (= limb- girdle muscular dystrophy)** نَمَطُ لِيْدِن - مُوْبِيُوس. حثل عضلي حزامي - طرفي.
- Lorain t. (= hypophysial infantilism)** نَمَطُ لُوْرَان. طفالة نخامية.
- Putnam's t.** نَمَطُ بُوْتْنَام. التنكس الشوكي المشترك دون الحاد للنخاع الشوكي.
- pyknic t.** النَمَطُ الْغَلِيْظ. نمط بنيوي يتصف بجسم مدور ووجنات كبيرة ومنكبين واسعين ورأس عريض ورقبة قصيرة.
- Remak's t. (= Remak's paralysis)** نَمَطُ رِيْمَاك؛ شلل رِيْمَاك. شلل يصيب باسقاط الأصابع.
- scapulohumeral t.** نَمَطُ كَتْفِي عَضْدِي. ضمور عضلي نخاعي مترق يبدأ في المنكبين.
- Tooth t.** نَمَطُ تُوْث. ضمور عضلي (شطوي) اعتلالي عصبي مترق.
- typhlolexia (= alexia)** تَعْدُرُ الْقِرَاءَة.

# U

**ulalgia (= gingivalgia)** أَلَمُ اللِّثَةِ.

**ulegyria** تَنَدُّبُ التَّلَافِيْفِ. حالة تكون فيها تلافيف المخ ضيقة ومشوهة بالندبات التي تتولد من آفات تولدت أثناء الحياة الجنينية أو في مقتبل الطفولة.

**uncinate** شِصْصِيّ. متعلق بالتلفيف الشِصْصِيّ أو مؤثر فيه مثل الصرع الشِصْصِيّ.

**unconscious** 1. فَاقِدُ الوَعْيِ 2. الأَشْغُور. 1. غير حساس ولا يتمكن من الاستجابة للمنبهات الحسية أو تكوين إحساسات شخصية 2. قسم العقل الذي لا يصله الإدراك الواعي بسهولة بالطرق الاعتيادية ولكن من الممكن إظهار وجوده بالأعراض التي يولدها كالأحلام أو تحت تأثير بعض العقاقير، وهو أحد أنظمة فرويد للعقل الباطن. الأَشْغُور الجَمَاعِيّ. حسب نظرية - collective u. يونغ، هو اللاشعور المشاع نظرياً بين كل البشر.

**uncotomy** بَضْعُ الشَّصْصِ. توليد آفة محددة في الشخص في معالجة بعض حالات الذهان.

**uncus** الشَّصْصِ. النهاية الأمامية المعقوفة إنسياً للتلفيف حول الحصين.

- u. corporis شِصْصُ الْفِقْرَةِ. بروز شِصْصِيّ الشكل على طرفي السطح العلوي للفقرات العنقية الثالثة حتى السابعة.

**unmedullated** عَدِيمُ المِيَالِين. لا يحوي غمد نخاعيني كوصف لليف العصبي عديم الميالين.

**unmyelinated (= unmedullated)** عَدِيمُ المِيَالِين

**unrest (= restlessness)** تَمَلُّلٌ؛ عِلَزٌ.

**unstriated** غير مُخَطَّط؛ أَمْلَس. من دون خطوط كوصف للعضلات الملساء.

**uraniscolalia** نَخِيف. عيب كلامي يتسبب عن الحنك المشقوق.

**uranoplegia (= palatoplegia)** شَلْلُ الحَنَكِ.

**urodynia** وَجَعُ التَّبَوُّل. الألم الذي يصاحب التبول.

**urophobia** رُهَابُ التَّبَوُّل. التخوف من التبول من دون سبب.

**uterodynia** وَجَعُ رَجَمِيّ. ألم الرحم.

**uveomeningitis** التَّهَابُ العَنَبِيَّة والسَّحَايَا. اضطراب يتصف بآفة العنبية يترافق مع علامات سحائية.

**uveomeningoencephalitis** التَّهَاب العَنَبِيَّة والسَّحَايَا والدُّمَاغ. التهاب العنبية المترافق مع التهاب السحايا والدماغ.

# V

**vagotomy** قَطْعُ الْمُنبَهَم. قطع قطعة صغيرة من العصب المبهم.

**vaginodynia (= colpodynia)** وَجَعُ الْمَهْل. ألم في المهبل.

**vagoaccessorius** الْعَصَبُ الْمُنبَهَمُ الْإِضَافِي. العصب المبهم والجذور القحفية للعصب الإضافي والتي تعتبر مع بعضها عصباً واحداً.

**vagoglossopharyngeal** مُبْهَمِي لِسَانِي. متعلق بالعصبين المبهم واللساني البلعومي.

**vagolysis** تَحْرِيزُ الْمُنبَهَم. إتلاف العصب المبهم جراحياً.

**vagolytic (= parasympatholytic)** حَالُ الْمُنبَهَم. له تأثير يشبه ذلك الذي يتولد عن قطع الدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

**vogomimetic** مُحَاكِ الْمُنبَهَم. له تأثير مشابه لذلك الذي يتولد عن تنبيه العصب المبهم.

**vogosplanchnic (= vagosympathetic)** مُبْهَمِي وَدِّي. متعلق بالتعصيب المبهمي والودي.

**vagosympathetic** مُبْهَمِي حَشَوِي؛ مُبْهَمِي وَدِّي. متعلق بالتعصيب المبهمي والودي.

**vagotomy** قَطْعُ الْمُنبَهَم. قطع الدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

**- bilateral v.** قَطْعُ الْمُنبَهَمِينَ. قطع المبهمين الأيمن والأيسر.

**- highly selective v.** الْبَالِغُ الْإِنْتِقَاءُ الْقَطْعُ لِمُنْبَهَم. قطع اليااف المبهم التي تجهز الغدد المعوية مفرزة الحمض فقط مع الاحتفاظ بتلك التي تغذي الفار والفروع الكبدية والبطنية.

**- medical v.** الْقَطْعُ الدَوَائِي لِلْمُنْبَهَم. قطع الدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم وذلك باستعمال أدوية مناسبة وهذا هو إحصار المبهم.

**- parietal cell v.** قَطْعُ مُبْهَمِ الْخَلَايَا الْجِدَارِيَّة. قطع انتقائي لاليااف العصب المبهم التي تغذي الثلثين الراسيين للمعدة (الباحة الجدارية) ويجري ذلك لمعالجة قرحة الإثنا عشري.

**- selective v.** قَطْعُ الْمُنبَهَمِ الْإِنْتِقَائِي. قطع اليااف العصب المبهم التي تغذي المعدة مع الاحتفاظ بالفروع الكبدية والبطنية.

**- surgical v.** قَطْعُ الْمُنبَهَمِ الْجِرَاحِي. قطع العصب المبهم بالوسائل الجراحية.

**- truncal v.** قَطْعُ الْمُنبَهَمِ الْجَذْعِي. القطع الجراحي لجذعي المبهمين البطنيين الرئيسيين عند خروجهما من الفرجة المريئية.

**vagotonia** غَلَبَةُ الْمُنبَهَم؛ تَوَثُّرُ الْمُنبَهَم. فرط استثنائية العصب المبهم وهي حالة يسود فيها العصب المبهم في وظائف الجسم العامة وتتصف بعدم الاستقرار الوعائي الحركي الشديد والإمساك والتعرق والتشنجات الحركية اللاإرادية مع الألم.

**vagotony (= vagotonia)** غَلَبَةُ الْمُنبَهَم.

**vagotropic** مُوَجَّةٌ لِلْمُنْبَهَم. ما له تأثير على العصب المبهم.

**vagotropism** أَلْفَةُ الْمُنبَهَم؛ تَوَجُّهُ مُبْهَمِي. ألفة الدواء أو السم للعصب المبهم.

**vagus** الْمُنبَهَم. العصب القحفي العاشر.

**vagusstoff** مَادَّةُ الْمُنبَهَم. مادة تفرزها نهايات العصب المبهم تثبط فعالية القلب وهي مشابهة للاسيتيل كولين.

**vallecula** أَخْدُود. انخساف أو ودة.

**- v. cerebelli** أَخْدُودُ الْمُخَيِّخ. الانخساف الطولاني  
على السطح السفلي للمخيخ بين نصفي كرتيه حيث  
يستقر النخاع المستطيل.

**- v. Sylvii (= fossa lateralis cerebri)**  
أَخْدُودُ سِيلْفِي. الحفرة المخية الوحشية.

**vasalgia** أَلَمٌ وَعَائِي. ألم الأوعية.

**vasoneuropathy** إِغْتِلَالٌ وَعَائِيٌّ عَصَبِيٌّ.  
عيب وعائي وعصبي مشترك، وتنتج الآفة عن فعلين  
وعائي وعصبي مترامين أو بتفاعل الجهازين مع  
بعضهما.

**vasoneurosis (= angioneuropathy)**  
عُصَابٌ وَعَائِيٌّ؛ إِغْتِلَالٌ وَعَائِيٌّ عَصَبِيٌّ.

**vasopressin** فَاَرْوَبْرِيسِين. 1. أحد الهرمونين  
الذين تولدهما الخلايا العصبية في نوى الوطاء  
والذي يحفظ في الفص الخلفي للنخامية (النخامية  
العصبية) وينبه هذا الهرمون النسيج العضلي  
للشعيرات والشريينات ويرفع ضغط الدم كما أنه  
ينبه تقلص عضلات الأمعاء ويزيد من حركاتها  
التمعجية وله كذلك تأثير تقلصي على الرحم. ولهذا  
الهرمون تأثير نوعي على الخلايا البطانية للنبيبات  
البولية القصوية إذ إنه يحفز إعادة امتصاص الماء  
منها من دون المذابات مما يزيد من تركيز البول  
ويخفف تركيز مصل الدم. وتنظم أسمولية بلازما  
الدم إفراز هذا الهرمون 2. مستحضر صناعي لهذا  
الهرمون يستعمل في معالجة البواله التقهه الحادة  
أو المزمنة كمضاد للتبول. كما يستعمل كمضيق  
للأوعية في حالات النزف بتنبية العضلات الملساء  
للأوعية.

**vein (= vena)** وَرِيد. وعاء ينتقل الدم فيه  
من مختلف أعضاء الجسم ليعود إلى القلب.

**velum** شِرَاع. غطاء أو حجاب أو شبهه بالحجاب.

**- v. interpositum cerebri (= tela  
choroidea ventriculi tertii)** الشِرَاع  
الدِّمَاغِيّ الْمُفَحَّم. النسيجة المشيمية للبطين الثالث.

**- v. medullare anterius (= v. medullare  
rostralis)** الشِرَاعُ البَصْلِيّ الأَمَامِيّ؛ الشِرَاع  
البَصْلِيّ العلوي. الشِرَاع البَصْلِيّ المنقاري.

**- v. medullare - caudale** الشِرَاعُ البَصْلِيّ

الدَّنْبِيّ؛ الشِرَاع البَصْلِيّ السُّفْلِيّ. إحدى الطبقتين  
الرقيقتين من المادة البيضاء التي تقع على طرفي  
عُقيدة الدودة وتكون طبقتها الباطنة الجدار السفلي  
للردب الظهري الوحشي للبطين الرابع وتستمر على  
الجانبين مع السويقة الندفية والشريطة وتندغم على  
الجهة البطنية مع الصغيرة المشيمية.

**- v. medullare rostralis** الشِرَاعُ البَصْلِيّ  
المنقاريّ. طبقة رقيقة من المادة البيضاء تكون سقف  
القسم القحفي من البطين الرابع وتمتد من الصفيحة  
السقفية من الأمام إلى الخلف وبين  
السويقتين المخيخيتين القحفيّتين.

**- v. transversum** طِيَّة الشِرَاعِ المُسْتَعْرِض. طية  
مستعرضة من النسيجة المشيمائية تعلم الحدود بين  
الدماغ البيني والدماغ الانتهازي في دماغ الجنين.

**vena (= vein)** وَرِيد. (ج: أَوْرَدَة).

**- v. anastomatica inferior** الْوَرِيدُ التَّفَاغُرِيُّ  
السُّفْلِيّ. وريد يوصل الوريد الدماغي السطحي  
الوسطي مع الجيب المستعرض.

**- v. anastomatica superior** الْوَرِيدُ التَّفَاغُرِيُّ  
الْعُلَوِيّ. وريد يوصل الوريد الدماغي السطحي  
الوسطي مع الجيب السهمي العلوي.

**- venae anteriores cerebri** الْأَوْرَدَةُ الدِّمَاغِيَّةُ  
الْأَمَامِيَّةُ. أوردة ترافق الشريان الدماغي الأمامي  
وتتصل بالوريد القاعدي.


**- v. anterior septi pellucidi** الْوَرِيدُ الْأَمَامِيّ  
لِلْحَاجِزِ الشَّفَاف. وريد ينزح الحاجز الشفاف الأمامي  
إلى الوريد السريري المخطط.

**- v. basalis** الْوَرِيدُ الْقَاعِدِيّ. وريد يبدأ من  
المادة المثقبة الأمامية ويمر إلى الخلف حول سويق  
المخيخ ويصب في الوريد الدماغي الباطن.

**- venae cerebelli** الْأَوْرَدَةُ الْمُخَيِّخِيَّةُ. الأوردة  
التي توجد على سطح المخيخ، فالتى تبدأ من السطح  
العلوي تصب في الجيب المستقيم وفي الوريد الدماغي  
الأكبر أو إلى الجيبين الصخري المستعرض والعلوي،  
أما تلك التي تبدأ من السطح السفلي فإنها تصب في  
الجيوب المستعرض والسيني والصخري السفلي أو  
في الجيب القذالي.


**- venae cerebri** الْأَوْرَدَةُ الْمُخَيِّخَةُ. أوردة تنزح  
سطوح نصفي كرة المخ أو مناطقيها الداخلية تنقسم  
إلى مجموعتين سطحية وعميقة.





#### venae cerebri

منظر تشريحي لداخل المخ منظوراً من الأعلى يظهر بعض أورده: (1) الشق بين نصفي كرة المخ (2) الجسم الثفني (3) الحاجز الشفاف (4) وريد الحاجز الشفاف (5) رأس النواة العنقبة (6) أعمدة القبو (7) الوريد المهادي المخطط (8) الوريد المشيموي (9) الضفيرة المشيموية للبطين الجانبي الأيمن (10) النسيجة المشيموية للبطين الثالث (11) الوريد المخي الباطن (12) الوريد القاعدي (13) الوريد المخي الكبير (14) الجيب السهمي السفلي (15) الجيب المستقيم (16) خيمة المخ (17) الجيب المستعرض (18) الجيب السهمي العلوي.



venae, cerebri

منظر تشريحي لداخل المخ منظوراً من الأسفل يظهر بعض أوعيته: (1) الوريد المخي الأمامي (2) الوريد المخي الوسطي العميق (3) الوريد المخي الوسطي السطحي (4) الوريد القاعدي (5) الشريان المشيموي الأمامي (6) الشريان المشيموي الخلفي (7) الوريد المخي الباطن (8) الوريد المخي الكبير (9) شريط الجسم النخني (10) الوريد الفقاري الصغير.

- **v. choroidea inferior** **الْوَرِيدُ الْمَشِيمَانِيُّ السُّفْلِيُّ**. وريد ينزح الصغيرة المشيمائية السفلية إلى الوريد القاعدي.
- **v. choroidea superior** **الْوَرِيدُ الْمَشِيمَانِيُّ الْعُلَوِيُّ**. الوريد الذي يجري على طول الصغيرة المشيمائية وينزحها والحصين والقبو والجسم الثفني ثم يتحد مع الوريد المهادي المخططي ليكونا الوريد المخي الباطن.
- **v. comitans nervi hypoglossi** **الْوَرِيدُ الْمُزَافِقُ لِتَحْتِ اللِّسَانِيِّ**. وريد يتكون من اتحاد الوريد اللساني العميق والوريد تحت اللساني ويرافق العصب تحت اللساني ويفرغ في الوريد الوجهي أو اللساني أو الوداجي الباطن.
- **v. dorsalis corporis callosi** **الْوَرِيدُ الظَّهْرِيُّ لِلْجِسْمِ الثَّقْنِيِّ**. وريد ينزح السطح العلوي للجسم الثفني إلى الوريد الدماغى الأكبر.
- **v. emissaria** **وَرِيدٌ مَشْبَرِيٌّ**. أحد الأوردة الصغيرة الخالية من الصمامات والتي تمر خلال ثقب القحف وتوصل الجيوب الوريدية للجافية مع أوردة فروة الرأس أو مع الأوردة العميقة تحت قاعدة القحف.
- **v. emissaria condylaris** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ اللَّقْمِيّ**. وريد صغير يجري خلال القناة اللقمية للقحف ويربط الجيب السيني مع الوريد الفقري أو الوداجي الباطن.
- **v. emissaria mastoidea** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْخَشَائِيّ**. وريد صغير يمر خلال الثقب الخشائية للقحف ويربط الجيب السيني مع الجيب القذالي أو مع الوريد الأذني الخلفي.
- **v. emissaria occipitalis** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْقَذَالِيّ**. وريد صغير يوجد أحياناً ويجري خلال ثقب صغيرة في البارزة القذالية للقحف ويربط ارتفاع الجيوب مع الوريد القذالي.
- **v. emissaria parietalis** **الْوَرِيدُ الْمَشْبَرِيُّ الْجَدَارِيّ**. وريد صغير يمر خلال الثقب الجدارية للقحف ويربط الجيب السهمي العلوي مع الأوردة الصدغية السطحية.
- **venae frontales** **الأوردة الجَبْهِيَّةُ**. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح قشرة المخ الجبهية.
- **v. gyri olfactorii** **وَرِيدُ التَّلْفِيفِ الشَّمِيِّ**. وريد ينزح التليف الشمي إلى الوريد القاعدي.
- **venae inferiores cerebri** **الأوردة المُخَيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. أوردة سطحية مخية كبيرة نسبياً تتشابه على قاعدة المخ وعلى سطحه السفلي الوحشي وتنزح الأوردة الموجودة على السطح السفلي للفص الجبهي إلى الجيب السهمي السفلي والجيب الكهفي وتنزح الأوردة الموجودة على الفص الصدغي إلى الجيبين الصخري العلوي والمستعرض وتنزح تلك الموجودة على الفص القذالي إلى الجيب السهمي.
- **venae inferiores hemispheri cerebelli** **أوردة نصف كُرَّةِ الْمُخَيخِ**. أوردة تنزح السطح السفلي للمخيخ إلى الجيوب المستعرض والسيني والصخري السفلي أو إلى الجيب القذالي.
- **v. inferior vermis** **وَرِيدُ الدَّوْدَةِ السُّفْلِيّ**. وريد ينزح السطح السفلي للمخيخ وهو يجري على أسفل الدودة ليفرغ في الجيب المستقيم أو أحد الجيبين السيينيين.
- **venae insulares** **أوردة الجَزِيرَةِ**. أوردة تنزح الجزيرة وتتصل بالوريد الدماغى الوسطي العميق.
- **venae Internae cerebri** **الأوردة الدِّمَاغِيَّةُ الْبَاطِنَةُ**. وريدان يبدآن عند الثقب بين البطينين باتحاد الوريدين المهادي المخطط والمشيماني ويسيران إلى الخلف خلال النسيجة المشيمائية وهما يجمعان الدم من النوى القاعدية ثم يتحدان عند ضمادة الجسم الثفني ليكونا الوريد المخي الأكبر.
- **v. magna cerebri** **الْوَرِيدُ الدِّمَاغِيّ الْأَكْبَرُ**. جذع ناصفي قصير يتكون من اتحاد الوريدين المخيين الباطنيين والذي يدور حول ضمادة الجسم الثفني ويصب في الجيب المستقيم أو يستمر كالجيب المستقيم نفسه.
- **v. media profunda cerebri** **الْوَرِيدُ الدِّمَاغِيّ الْوَسْطِيُّ الْعَمِيقُ**. الوريد الذي يرافق الشريان الدماغى الوسطى في قاع التلم الوحشي ويتصل بالوريد القاعدي.
- **venae mediae superficiales cerebri** **الأوردة المُخَيَّةُ السَّطْحِيَّةُ الْوَسْطِيَّةُ**. أوردة تنزح السطح الوحشي للمخ وتتبع الشق المخي الوحشي وتفرغ في الجيب الكهفي.

- **venae medullae oblongatae** **أُورِدَةُ الْبَصَلَةِ**. الأوردة التي تنزح البصلة (النخاع المستطيل) والتي تفرغ في أوردة النخاع الشوكي والجيوب الوريدية للجافية أو تسير على طول الأعصاب القحفية الأربعة الأخيرة إلى الجيب الصخري السفلي أو البصلة العلوية للوريد الوداجي.

- **venae meningaeae** **الأوردة السحائية**. الأوردة المرافقة للشرايين السحائية والتي تنزح الأم الجافية وتتصل بالجوبات الوحشية والتي تصب في الجيوب والأوردة الموضعية.

- **venae meningaeae mediae** **الأوردة السحائية الوسطى**. الأوردة المرافقة للشريان السحائي الوسطي والتي تنتهي في الضفيرة الوريدية الجناحية.

- **venae nuclei caudati** **أوردة النواة المذنبة**. أوردة النواة المذنبة التي تكون جزءاً من الجسم المخطط.

- **venae occipitales** **الأوردة القذالية**. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح القشرة المخية القذالية.

- **venae parietales** **الأوردة الجدارية**. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح القشرة المخية الجدارية.

- **v. petrosa** **الوريد الصخري**. جذع قصير يبدأ من اتحاد أربعة أو خمسة أوردة مخيخية وجسرية مقابل السويق المخيخي الوسطي وينتهي في الجيب الصخري العلوية.

- **venae pontis** **الأوردة الجسرية**. الأوردة التي تنزح الجسر وتفرغ في الوريد القاعدي أو الأوردة المخيخية أو الجيب الوريدي أو الصخري أو الضفيرة الوريدية للثقب البيضوية.

- **v. pontomesencephalica anterior** **الوريد الجسري الدماغى المتوسطى الأمامى**. وريد يقع على الناحيتين العلوية والأمامية للجسر في الخط الوسطي للحفرة بين السويقتين ويتصل من الأعلى مع الوريد القاعدي ومن الأسفل مع الوريد الصخري.

- **v. posterior corporis callosi** **الوريد الخلفى للجسم الثقبى**. وريد ينزح السطح الخلفى للجسم الثقبى إلى الشريان الدماغى الأكبر.

- **v. posterior septi pellucidi** **الوريد الخلفى**

للحاجز الشفاف. وريد ينزح الحاجز الشفاف الخلفى إلى الوريد المهادى المخططى العلوى.

- **v. precentralis cerebelli** **الوريد المخيخى** **أمام المركزى**. وريد يبدأ في الشق المخيخي أمام المركزى ويمر أمام وفوق القنة وينتهي في الوريد الدماغى الأكبر.

- **venae prefrontales** **الأوردة أمام الجبهية**. الأوردة المخية السطحية العلوية التي تنزح قشرة المخ أمام الجبهة.

- **venae profundae cerebri** **الأوردة المخية العميقة**. الأوردة التي تنزح المناطق الداخلية لنصفي كرة المخ.

- **v. recessus lateralis ventriculi quarti** **وريد الردب الوحشى للبطين الرابع**. وريد صغير يبدأ من لوحة المخيخ ويمر في الردب الوحشى للبطين الرابع وينتهي في الوريد الصدغى.

- **venae spinales anteriores et posteriores** **الأوردة النخاعية الأمامية والخلفية**. أوردة تنزح النخاع الشوكي إلى الضفائر الوريدية الفقارية الباطنة وتكون ضفائر ملتوية في الأم الحنون وهي تتكون من وريدين طولانيين ناصفيين أحدهما أمام الشق الناصف الأمامي والثاني خلف الحاجز الناصف الخلفى للنخاع الشوكي ومن وريدين أماميين وحشيين يجريان خلف الجذور العصبية البطنية ومن وريدين خلفيين وحشيين يجريان خلف الجذور العصبية الظهرية.

- **venae spinales externae anteriores** **الأوردة النخاعية الوحشية الأمامية**. أوردة صغيرة طولانية تنزح الدم من القسم الأمامي للأم الحنون للنخاع الشوكي.

- **venae spinales externae posteriores** **الأوردة النخاعية الوحشية الخلفية**. أوردة صغيرة طولانية تنزح الدم من القسم الخلفى للأم الحنون للنخاع الشوكي.

- **venae spinales internae** **الأوردة النخاعية الباطنة**. أوردة دقيقة تنزح الدم من داخل النخاع الشوكي.

- **venae striatae (= venae thalamo-striatae inferiores)** **الأوردة المخططة: الأوردة المهادية المخططة السفلية**.

- **venae superficiales cerebri** **أُورْدَةُ الْمُخِّ السُّطْحِيَّةِ**. الأوردة التي تنزح الدم من سطح نصفي كرة المخ وتشمل الأوردة المخية السطحية العلوية والوسطى والسفلى وروافدها.

- **venae superiores cerebri** **الأُورْدَةُ الْمُخِّيَّةُ الْعُلْوِيَّةُ**. الأوردة المخية السطحية الثانية أو الإثنا عشر (أمام الجبهية والجبهية والجدارية والقذالية) التي تنزح السطوح العلوية والوحشية والإنسية للمخ باتجاه الشق المخي الطولاني حيث تفتح في الجيب السهمي العلوي.

- **venae superiores hemispheri cerebelli** **الأُورْدَةُ الْعُلْوِيَّةُ لِنِصْفِي كُرَةِ الْمُخْنِخِ**. أوردة تنزح السطوح العلوية لنصفي كرة المخيخ وتفرغها في الجيوب المستعرضة أو الصخرية العلوية.

- **v. superior vermis** **الْوَرِيدُ الْعُلْوِيُّ لِلدُّوْدَةِ**. وريد ينزح السطح العلوي للمخيخ ويجري إلى الامام وإلى الجهة الإنسية عبر الدودة العلوية ليفرغ في الجيب المستقيم أو الوريد الدماغى الأكبر.

- **venae thalamostriatae inferiores** **الأُورْدَةُ الْمِهَادِيَّةُ الْمُخَطَّطِيَّةُ السُّفْلِيَّةُ**. أوردة تمر خلال المادة المثقبة الامامية وتتصل بالوريدين المخيين الامامي والوسطى ليكونا الوريد القاعدي.

- **v. thalamostriata superior** **الْوَرِيدُ الْمِهَادِيَّ الْمُخَطَّطِيَّ الْعُلْوِيَّ**. وريد يجمع الدم من الجسم المخطط والمهاد ويتصل بالوريد المشيماني ليكونا الوريد المخي الباطن.

- **venae trunci encephalici** **أُورْدَةُ جَذَعِ الدِّمَاغِ**. أوردة تنزح جذع الدماغ وتصب في الوريد القاعدي أو الدماغى الأكبر.

- **v. unci** **وَرِيدُ الشَّصْنِ**. وريد ينزح الشصن إلى الوريد الدماغى السفلى على نفس الجهة.

- **v. ventricularis inferior** **الْوَرِيدُ الْبُطِينِيَّ السُّفْلِيَّ**. وريد ينزح الفص الصدغى إلى الوريد القاعدي.

**بُطِينٌ**. (ج: بُطِينَاتُ). تجويف صغير **ventricle** كالتجاويف التي توجد في الدماغ أو القلب.

- **v's. of the brain** **بُطِينَاتُ الدِّمَاغِ**. بطينات داخل الدماغ ممتلئة بالسائل الدماغى النخاعي وتشمل البطينين الجانبيين والبطين الثالث والرابع وهي مبطنة بالبطانة العصبية وتغلّف في بعض المناطق

بالاتمدادات الوعائية من الأم الحنون لتكون الضفائر المشيمانية. أما تجويف الحاجز الشفاف الذي يسمى أحياناً بطيناً فهو ليس بالبطين الصحيح.

- **first v. of cerebrum (= ventriculus lateralis cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِّي الْأَوَّلُ: البُطِينُ الْمُخِي الْجَانِبِي**.

- **fourth v. of cerebrum (= ventriculus quartus cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِّي الرَّابِعُ**.

- **lateral v. of cerebrum (= ventriculus lateralis cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِّي الْجَانِبِي**.

- **second v. of cerebrum (= ventriculus lateralis cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِّي الثَّانِي: البُطِينُ الْمُخِي الْجَانِبِي**.

- **v. of Sylvius (= cavitas septi pellucidi)** **تَجْوِيفُ الْحَاجِزِ الشَّافِافِ**.

- **terminal v. of spinal cord (= ventriculus terminalis medullaris)** **البُطِينُ النُّخَاعِي الْإِنْتِهَائِي**.


- **third v. of cerebrum (= ventriculus tertius cerebri)** **البُطِينُ الْمُخِّي الثَّالِثُ**.

- **Vieussen's v. (= cavitas septi pellucidi)** **بُطِينُ فيوس: تَجْوِيفُ الْحَاجِزِ الشَّافِافِ**.

**بُطِينٌ**. (ج: بُطِينَاتُ). **ventriculus (= ventricle)**.


- **v. dexter cerebri** **البُطِينُ الْمُخِّي الْأَيْمَنُ**. البطين الجانبى لنصف كرة المخ الأيمن.

- **v. lateralis cerebri** **البُطِينُ الْمُخِّي الْجَانِبِي**. التجويف الذي يوجد في كل من نصفي كرة المخ الذي يتطور من الأنبوب العصبي الجنيني ويتألف من الجزء المركزي وثلاثة قرون - الجبهي (الامامي) والصدغى (السفلى) والقذالي (القذالي) في الفصوص الجبهية والصدغية والقذالية على التوالي ويفصل الحاجز الشفاف البطينين الجانبيين عن بعضهما ويتصل كل منهما بالبطين الثالث عبر الثقبة بين البطينين التي تتصل خلالها أيضاً الضفيرة المشيمانية للبطين الجانبى من ضفيرة البطين الثالث كما يجري خلالها السائل الدماغى النخاعي الذي يتولد في البطين الجانبى.



ventricles of the brain

مقطع في الدماغ يظهر التوسع المفرط للبطينين الجانبيين والبطين الثالث.



ventricles of the brain

مقطع جبهى في الدماغ يبين بطيناته الثلاثة (الجانبى والثالث) والفتحات الموصلة لها والمسار الدماغى.

**- v. quartus cerebri** البَطِينُ الْمُخِيُّ الرَّابِعُ.

تجوف غير منتظم الشكل في الدماغ المؤخر بين البصلة والجسر والمسال من الأمام والمخيخ من الخلف. وهو متواصل مع القناة المركزية للنخاع من الأسفل ومع المسال المخي من الأعلى ومن خلال فتحاته الجانبية والناصية مع الحيز تحت العنكبوتية.

**- v. sinister cerebri** البَطِينُ الْمُخِيُّ الْأَيْسَرُ.

البطين المخي الجانبي في النصف الأيسر لكرة المخ.

**- v. terminalis medullae spinalis** البَطِينُ

النَّخَاعِي الْإِنْتِهَائِي. توسع كيسوي الشكل للقناة المركزية للنخاع ضمن المخروط النخاعي.

**- v. tertius cerebri** البَطِينُ الْمُخِيُّ الثَّالِثُ.

فلح ضيق تحت الجسم الثفني ضمن الدماغ: تبنيني بين المهادين ويتكون قاعه من الوطاء وجداره الأمامي من الصفيحة الانتهازية وسقفه من البطانة العصبية ويتصل بالبطينين الجانبيين خلال الثقبين بين البطينين ومع البطين الرابع خلال المسال المخي.

**verbomania (= logorrhea)** هَوَسُ الثَّرَثَرَةِ.

**vermis** دُوْدَة. دودة أو بنية دودية الشكل.

وعادة ما يطلق على دودة المخيخ.

**- v. cerebelli** دُوْدَةُ الْمُخَيِّخِ. القسم الضيق

الناصفي من المخيخ بين نصفي كرتيه الجانبيين ويمتد جزؤه العلوي أو القحفي من اللسين إلى ورقة الدودة ويمتد جزؤه السفلي أو الذنبي من الحدة الدودية إلى العقيدة.

**vertex** قَمَّةُ؛ قَمَّةُ الرَّأْسِ. القمة أو الذروة

أو قَمَّةُ الرَّأْسِ أو تاجه.

**vertiginous** 1. دُوَارِي 2. مُصَابٌ بِالدُّوَارِ.

منسوب للدوار أو مصاب به.

**vertigo** دُوَار. انخداع حركي، شعور الشخص

بدوران العالم الخارجي من حوله (الدوار الموضوعي) أو دورانه هو نفسه في محيطه (الدوار الشخصاني). وقد يستعمل المصطلح خطأ لوصف كل أنواع الدوام. وقد يتولد الدوار عن أمراض الأذن الوسطى أو عن اضطرابات المراكز الدهليزية أو بعلل في آفات سبل الجهاز العصبي المركزي.

**- v. ab aure lauso (= Meniere's disease)**

دوار أذني المنشأ.

**- v. ab stomacho laeso (= stomachal v.)**

دُوَارٌ مَعِدِيّ المنشأ.

**- alternobaric v.** دُوَارٌ اخْتِلَافِ الضَّغْطِ. دوار

دوراني حقيقي عابر يصيب أحياناً الأشخاص المعرضين لتغير الضغط (كالطيارين) عند تعرضهم لتغير كبير وسريع في الضغط الجوي.

**- angiopathic v.** دُوَارٌ الْإِغْتِلَالِ الْوَعَائِي. دوار

ينتج عن تصلب الشرياني لوعية الدماغ.

**- apoplectic v. (= scotodinla)** دُوَارٌ سَكْتِي؛

دُوَامٌ عُقْمِي.

**- arteriosclerotic v. (= angiopathic v.)**

دُوَارٌ الْإِغْتِلَالِ الْوَعَائِي.

**- auditory v. (= aural v. = Meniere's**

**disease)** دُوَارٌ أُذْنِي. داء مينير.

**- benign paroxysmal positional**

**(or postural) v.** دُوَارٌ وَضْعِيْ إِنْتِبَاطِي حَمِيد.

دوار معاود مع رآة يحدث عند وضع الرأس في بعض الأوضاع ولا يترافق ذلك عادة مع آفات الجهاز العصبي المركزي.

**- cardiac v.** دُوَارٌ قَلْبِي. دوار ينتج عن بعض

أمراض القلب المزمنة.

**- cardiovascular v.** دُوَارٌ قَلْبِي وَعَائِي. دوار

يتولد عن تصلب الأوعية الدموية والقلب.

**- central v.** دُوَارٌ مَرْكَزِي. دوار ينتج عن

مرض في الجهاز العصبي المركزي.

**- cerebral v.** دُوَارٌ دِمَاعِي. دوار ينتج عن مرض

دماغي.

**- disabling positional v.** دُوَارٌ وَضْعِيْ مُعَوِّق.

دوار مستمر أو خلل التوازن مع الغثيان في الوضع القائم من دون أي اضطراب سمعي أو فقدان الوظائف الدهليزية.

**- encephalic v.** دُوَارٌ دِمَاعِي. حس حركة

الأنسجة داخل القحف كان الدماغ يدور على نفسه.

**- endemic paralytic v. (= vestibular**

**neuronitis disease)** دُوَارٌ شَلَلِيٌّ مُتَوَطِّن؛

التهاب العصبون الدهليزي. مرض الأعصاب والمراكز العصبية الذي يصيب الفلاحين وعمال الأسطبلات ويتصف بالآلام والخلل والدوار والتدلي والتشنج العضلي.



- **epidemic v.** دَوَّارٌ وَبَائِيٌّ. حالة وبائية تتصف بصورة رئيسية بالدوار مع بعض الغثيان والقيء.
- **epileptic v.** دَوَّارٌ صَرْعِيٌّ. الدوار الذي يسبق أو يتلو نوبة الصرع.
- **essential v.** دَوَّارٌ إِسْأَسِيٌّ. دوار وعادة ما يكون شديداً ولكن من دون سبب معروف وقد يكون مسبباً عن آفة أو مرض لأحد المراكز العصبية.
- **galvanic (= voltaic v.)** دَوَّارٌ غَلْفَانِيٌّ.
- **gastric v.** دَوَّارٌ مَعِدِيّ المنشا. دوار يترافق مع مرض المعدة أو اضطرابها.
- **height v.** دَوَّارٌ المُرْتَفَعَات. دوام (وليس دواراً حقيقياً) يُحَسُّ به عند النظر إلى الأسفل من أحد المرتفعات.
- **horizontal v.** دَوَّارٌ إِسْتَلْقَانِيٌّ. دوار يتولد عند استلقاء الشخص.
- **hysterical v.** دَوَّارٌ هِسْتِيرِيٌّ. دوار يترافق مع الأعراض الهستيرية.
- **labyrinthine v.** دَوَّارٌ تَبْهِيٌّ. دوار ينتج عن مرض تيه الأذن أو اضطرابه.
- **laryngeal v. (= tussive syncope)** دَوَّارٌ حَنْجَرِيٌّ. غَشْيٌ سعالِيٌّ.
- **lateral v.** دَوَّارٌ جَانِبِيٌّ. الدوار الذي يحدث عند المرور بجانب صف طويل من الأعمدة أو القضبان القائمة في سياج مثلاً.
- **lithemic v.** دَوَّارٌ التَّحْصِي؛ دَوَّارٌ زِيَادَةُ حَمُضِ اليُورِيك. دوار يترافق مع النقرس أو زيادة حمض اليوريك بالدم.
- **mechanical v.** دَوَّارٌ آليٌّ. دوار يتولد عن دوران الجسم المستمر لفترة طويلة أو اهتزازه المتواصل كما يحصل في دوار البحر.
- **neurasthenic v.** دَوَّارٌ الوهن العَصْبِيّ. حس دوازي شخصي يترافق مع الوهن العصبي.
- **nocturnal v.** دَوَّارٌ لَيْلِيٌّ. حس بالسقوط عندما يحاول الشخص النوم.
- **objective v.** دَوَّارٌ موضوعي. دوار بحس الشخص فيه بأن الأشياء تدور من حوله.
- **ocular v.** دَوَّارٌ بَصْرِيٌّ. دوار ينتج عن مرض العين وخصوصاً شلل عضلاتها أو عدم توازن حركاتها.
- **organic v.** دَوَّارٌ عُضْوِيٌّ. دوار يتولد عن مرض تبهي دماغي أو عن التابس الظهري.
- **paralysing v. (= Gerlier's disease)** دَوَّارٌ شَلْلِيٌّ.
- **peripheral v. (= vestibular v.)** دَوَّارٌ مُحِيطِيٌّ. دوار دهليزي.
- **positional v. (= postural v.)** دَوَّارٌ وَضْعِيٌّ. دوار يترافق مع وضع معين للرأس في الفضاء أو تغيير وضعه في محيطه.
- **pressure v. (= alternobaric v.)** دَوَّارٌ ضَغْطِيٌّ.
- **primary v.** دَوَّارٌ أَوَّلِيٌّ. دوار يتولد عن التنبيه مثلاً بمرض فعال في الجهاز الدهليزي للأذن ولا علاقة له بحركات الجسم.
- **residual v.** دَوَّارٌ مُعَالِيٌّ. دوار يترافق مع الحركة وينتج عن قصور أو غياب الأعضاء العصبية الحسية الدهليزية ويحصل في أحد المستويات الحركية فقط.
- **rider's v. (= motion sickness)** دَوَّارٌ الحَرَكَةِ. داء الحركة.
- **rotary v. (= rotatory v.)** دَوَّارٌ دَوَّرَانِيٌّ. دوار يشعر فيه المصاب بدوران حقيقي.
- **sham- movement v.** دَوَّارٌ الحَرَكَاتِ الكَاذِبَةِ. دوار يتصف بإحساس كاذب بوجود أشياء تدور حول جسمه.
- **special sense v.** دَوَّارٌ الحِسِّ الخَاص. دوار أذني أو بصري.
- **stomachal v.** دَوَّارٌ مَعِدِيٌّ. دوار يترافق مع اضطرابات الجهاز الهضمي.
- **subjective v.** دَوَّارٌ شَخْصَانِيٌّ. دوار يشعر فيه الشخص بأنه يدور حول نفسه.
- **systematic v. (= rotary v.)** دَوَّارٌ جَهَازِيٌّ. دوار دوراني.
- **tenebrie v. (= scotodinia)** دَوَّارٌ العَمَةِ البصرية؛ دَوَّارٌ عُتْمِيٌّ.
- **toxemic v. (= toxic v.)** دَوَّارٌ تَسَمُّمِيٌّ. دوار يتسبب عن التسمم أو الكحولية أو اليوريمية أو بزيادة حمض اليوريك بالدم.

- vertical v. دَوَّارٌ عَمُودِيّ. دوار ينتج عن النظر للأعلى أو للأسفل إلى جسم بعيد.

- vestibular v. دَوَّارٌ دَهْلِيْزِيّ. دوار يتسبب عن اضطرابات المراكز الدهليزية أو طرقها العصبية المركزية.

- villous v. دَوَّارٌ زَغِيْبِيّ؛ دَوَّارٌ كَبِيْدِيّ المنشأ. دوار يتولد عن اضطرابات الكبد الوظيفية.

- voltaic v. (= galvanic v.) دَوَّارٌ غَلْفَانِيّ. انثناء الرأس نحو المنكب على جهة القطب الموجب عند وضع تيار غلفاني على الألياف الدهليزية للعصب الثامن.

vesicle حُوَيْصَلَة. (ج: حُوَيْصَلَات). كيس صغير يحوي سائلاً.

- brain v's. الحُوَيْصَلَاتُ الدُّمَاغِيَّة. الأقسام الخمسة من الأنبوب العصبي المغلق في الجنين المتنامي والتي تشمل بالترتيب القحفي الذنبي الدماغ الانتهاشي، الدماغ البيني، الدماغ المتوسط، الدماغ التالي فالدماغ البصلي.

- brain v's., primary الحُوَيْصَلَاتُ الدُّمَاغِيَّة. الأولى. الأقسام الثانوية الأولية للأنبوب العصبي والتي تشمل الدماغ المقدم والدماغ المتوسط والدماغ المؤخر.

- brain v's. secondary الحُوَيْصَلَاتُ الدُّمَاغِيَّة. الثانوية. الحويصلات الدماغية الأربع التي تتكون من تخصص الدماغ المقدم (الدماغ الانتهاشي والدماغ البيني) والدماغ المؤخر (الدماغ التالي والدماغ البصلي) في ادوار التطور الجنيني المتأخرة.

- cephalic v's (= cerebral v's. = brain v's.) الحُوَيْصَلَاتُ الدُّمَاغِيَّة.

- encephalic v's. (= brain v's.) الحُوَيْصَلَاتُ الدُّمَاغِيَّة.

- synaptic v's. الحُوَيْصَلَاتُ المَشْبِكِيَّة. عدد كبير من بنيات مستديرة دقيقة في الأقدام الانتهاشية للعصبونات يعتقد أنها تحمل مواداً هرمونية انتقالية.

vestibulocerebellum (= archeo-cerebellum) المَخْنِجُ الدهليزي؛ المَخْنِجُ البِدَائِيّ.

vigilambulism سَيْرٌ يَقْظِيّ. سير تلقائي شبيه بالسير النومي ولكنه يحدث أثناء اليقظة.

1. سَهَادَة. 2. تَبَقُّظ. vigilance

vigor استِنشَاط؛ حَيَوِيَّة. مجموعة خواص مميزة للكائن الحي تعبر عن نفسها بالنمو السريع والخصوبة العالية والتلقيح والحجم الكبير والعمر الطويل.

- hybrid v. (= heterosis) حَيَوِيَّةُ الأَنْسَال. الحالة التي يظهر فيها النسل الأول حيوية أكثر من أبويه في نموه وديمومته وخصوبته وحيويته، ويعزى ذلك إلى سيادة الأليلات الأفضل.

vinbarbital فَنْبَارِبِيْتَال. باربيتورات متوسطة الفعل تستعمل كمسكن ومنوم عن طريق الفم.

vincamine فِنْكَامِين. دواء يستعمل لتحسين القدرة الفكرية للمرضى المصابين باضطرابات دماغية وعائية.

1. رُجُولِيّ 2. فَحْل. 1. خاص بالرجال virile أو بجنس الذكر 2. يملك صفات ذكرية خصوصاً في مقدرته على الجماع.

virilence تَرَاجُل. تنامي الصفات الجنسية الذكرية الثانوية لدى الأنثى.

virilia (= organa genitalia masculina) الجِهَازُ التَّنَاسُلِي الذَكَرِي؛ الأَعْضَاءُ التَّنَاسُلِيَّة الذَكَرِيَّة

virilism (= masculinity) إِسْتِرْجَال؛ ذُكُورَة. تنامي الصفات الذكرية الجسدية والميزات العقلية الذكرية لدى الأنثى.

- adrenal v. إِسْتِرْجَالٌ كُظْرِيّ. استرجال يتولد بسبب قصور توليد هرمون الاندروجين من قشرة الكظر ويتصف بظهور الصفات الذكرية الكاملة لدى البنت أو المرأة أو الولد قبل سن البلوغ.

1. رُجُولِيَّة 2. فَحُولَة. امتلاك رجل virility أو ذكر للصفات الجنسية الأولية.

virilization تَرْجِيل؛ تَرَاجُل؛ تَذْكِير. تحريض أو تطوير الصفات الجنسية الذكرية الثانوية في الأنثى وخاصة تحريض تضخم البظر وشعر الوجه والجسم وتطور خط نمو الشعر في الجبين الشبيه بذلك الذي ينمو فيه عند الذكور وتنبه إفراز وتكاثر الغدد الزهمية (وعادة مع الغُد) وتضخم الصوت.

- viripotent** نَاضِجُ الرُّجُولَةِ. صفة للمذكر تدل على نضوجه الجنسي.
- viscera** أَخْشَاء. جمع حشوي.
- visceral** حَشَوِيّ. منسوب للحشوي.
- visceralgia** أَلَمٌ حَشَوِيّ. ألم في الأحشاء أو في أحد أعضاء الجسم.
- viscerimotor** حَرَكِيّ حَشَوِيّ. ينقل دفعات حركية للحشوي.
- visceromotor** حَرَكِيّ حَشَوِيّ. ما يقوم بالحركات الرئيسية للحشوي أو ينقل دفعات حركية لها.
- visceroparietal** حَشَوِيّ جِدَارِيّ. متعلق بالأحشاء وبجدار البطن.
- viscerosensory** جِسْمِيّ حَشَوِيّ. متعلق بالحس الحشوي.
- visceroskeletal** حَشَوِيّ هَيْكَلِيّ. متعلق بالهيكل الحشوي.
- viscerosomatic** حَشَوِيّ جِسْمِيّ. متعلق بالأحشاء والجسد.
- viscerotomy** بَضْعُ الحَشَويّ. بضع أحد الأحشاء وخصوصاً قطع جزء من الكبد بعد الموت.
- viscerotonia** رَخَاءُ الغَيْش. نمط مزاجي يتصف بحب الراحة الجسدية والاختلاط الاجتماعي والانفتاح للآخرين واحتمالهم ومجايلتهم.
- vision** رُؤْيَاة؛ إِبْصَار. الحس الخاص وهو الحس بالمرئيات بالنظر إليها.
- visuognosis** إدْرَاكٌ إِبْصَارِيّ. إدراك الانطباعات البصرية وتفهمها.
- visuopsychic** إِبْصَارِيّ نَفْسِيّ. باحة قشرة المخ المختصة في تقييم الانطباعات البصرية.
- visusensory** جِسْمِيّ إِبْصَارِيّ. متعلق بإدراك المنبهات التي تولد الانطباعات البصرية.
- volition** إِرَادَة. العمل أو القدرة الإرادية.
- volley** رَشَقَة. تعاقب نظمي من النفضان العضلي الذي يحفز صناعياً أو مجموعة من الدفعات العصبية التي تتولد عن منبه واحد.
- antidromic v.** رَشَقَة مُعَاكِسَة المُسَيِّرَة. التهيج المعاكس الذي يسير نحو المركز خلال الجذر الأمامي في قوس المنعكس.
- voluntary** إِرَادِيّ. ما ينجز حسب إرادة الشخص.
- vomiting** قِيء. القذف الشديد لمحتويات المعدة خلال الفم.
- cerebral v.** قِيءٌ دِمَاعِيّ. قِيءٌ تلقائي من دون أي غثيان يشاهد غالباً في أمراض داخل القحف.
- hysterical v.** قِيءٌ هِسْتِيرِيّ. قِيءٌ يترافق مع نوبة هستيرية.
- nervous v.** قِيءٌ عَصَبِيّ. قِيءٌ يظهر كعرض للعصاب المعدي.

**wakefulness** سَهَادَة؛ يَقِظَة. حالة تتصف بعدم الرغبة أو المقدرة على النوم.

**مَوْجَة.** اضطراب تذبذبي منسق  
**wave** يظهر فيه القسم المتحرك ذبذبات مزدوجة.

**- alpha w's.** **مَوَاجَاتُ الْفَأ.** موجات دماغية  
في المخطط الكهربائي للدماغ لها تردد 8-13 في  
الثانية وهي موجات نمطية للشخص اليقظ وفي حالة  
راحة فكرية وجسدية تامة وتولد بصورة خاصة في  
المنطقة القذالية.

**- beta w's.** **مَوْجَاتٌ بِيَتَا.** موجات دماغية في المخطط الكهربائي للدماغ لها تردد 14-30 في الثانية وهي موجات نمطية عند الفعالية الشديدة للجهاز العصبي وتحدث بصورة خاصة في المنطقتين الجدارية والجبية.

**مَوْجَاتٌ دِماغِيَّةٌ.** تتوج الجهود الكهربائية في الدماغ كما تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ ومنها موجات ألفا وبيتا وديلتا وثيتا ومنهم من يصف ثلاثة أنواع من الموجات الدماغية (أ) السلاسل والتي تناسب موجات ألفا (ب) مغازل سلاسل قصيرة ذات تردد 14 موجة في الثانية (ج) موجات عشوائية وهي موجات غير منتظمة وليس لها تردد معين وتظهر في بداية النوم.

**مَوْجَةُ التَّقْلُصِ.** موجة تقدم  
التقلص في العضلة من نقطة تنبيهها أو المخطط  
الساكن. لموجة تقلص العضلة.

**- delta w's. مُوجَّات دِلْتَا.** موجات دماغية تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ ذات تردد اقل من 3.5 في الثانية وهي نمطية في النوم العميق وفي الولدان وفي بعض اضطرابات الدماغ.

- electroencephalographic w's. (= brain w's.)      مَوْجَاتُ التَّخْطِيطِ الْكَهْرِبَائِي لِلدِّمَاغِ.

**مَوَاجَاتُ إِرْب.** تموجات تظهر في العضلة - Erb's w's. عند تنبيهها يعنیه كهربائي مستمر ومعتدل الشدة وتُشاهد أحياناً في تَأَثُّر العَضَل الِوِلَادِي.

مَوْجَةُ الْإِثَارَةِ. موجة كهربائية - excitation w.  
تجرى في العضلة مباشرة قبل تقلصها.

**- theta w's.** **مَوَاجَاتٌ ثِيَابًا.** موجات دماغية تظهر في المخطط الكهربائي للدماغ ذات تردد 4-7 موجات في الثانية وتظهر بصورة خاصة في الأطفال وكذلك في البالغين خلال فترات الكرب العاطفي.

**winking** رَفَّة. فتح العين واغلاقها  
بسرعة وخاصة إحدى العينين فقط.

رَفَّةٌ فُكِّيَّةٌ. حركات غلق العين اللاإرادية  
التي تترافق أحيانا مع حركات الفك.

1. انزعزال، 2. إمتناع، 3. عزَل؛ سَحَب. withdrawal

1. الابتعاد المرضي عن العلاقات الشخصية مع الآخرين وعن الاتصالات الاجتماعية الذي يمكن أن يحصل في الفصام وفي الاكتئاب أو الاضطرابات الفصامانية أو الاجتئاب الفصاماني 2. متلازمة دماغية عضوية تتلو الامتناع عن تناول مادة نوعية معينة أو التقليل من تناول تلك المادة الفعالة نفسياً وبناتظام وبالكميات التي تولد تأثيرها النفسي السمي الخاص وهناك متلازمات الامتناع عن تناول الكحول أو الامفيتامين أو الأفيون أو الكوكايين أو النيكوتين وما شاكل ذلك من العقاقير المخدرة 3. سحب القضب من المهبل قبل القذف.

**wristdrop** تَدَلِّي الرُّسْغ. حالة تتولد عن شلل العضلات الباسطة لليد وللأصابع.

**wryneck (= torticollis)** صَفَرٌ

# X

**xanthochromia** اصْفَرَّار. أي تلون أصفر في الجلد أو في السائل الدماغي النخاعي أو في غيرهما.

**Xanthoma** وَرَمٌ اصْفَرٌّ. ورم يتكون من خلايا رغوية مشبعة بالشحم وتحوي جيلة شحمية. وَرَمٌ اصْفَرٌّ قَحْفِيّ **x. - craniohypophyseal** نخامي. ترسبات استرات الكولستيرول في العظام القحفية حول النخامي.

**xanthomatosis** داء الأورام الصُّفْرِ المنتشرة. داء خزن الشحم وهو مرض وراثي ذو صفة

جسدية متنحية ويتصف بالورام والصفراء في الأوتار وفي المادة البيضاء للدماغ والرتتين مع التشنج والرنح والخزل الهرمي والتخلف العقلي والخرف والساد المبكر والتصلب العصيدي. وهو يترافق مع ارتفاع مستوى الكولستيرول وغيوب تركيب الصفراء مع ترسب الكولستيرول في الجهاز العصبي المركزي وميالين الأعصاب المحيطة، وتحوي آفات المرض الكولستيرول والكولستيرول منزوع الهيدروجين.

**xiphodynia** وَجَعُ الرِّهَابَةِ. وجع في ناتئ الرهابة.

# Y

**Yawning** تَنَآؤُب. شهيق عميق لا إرادي مع  
فتح الفم وعادة ما يترافق مع بسط الأطراف  
والجسم.

# Z

zona (= 1.zone 2.herpès zoster)

1. مَنَاطِقَة. (ج: مَنَاطِق) 2. هَرَبِس نِطَاقِي. منطقة محددة وذات حدود أو صفات خاصة مميزة 2. الهربس النطاقي.

- z. ganglionaris المِنَاطِقَة العَقْدِيَّة. كتلة من نسيج عقدي توجد على القسم القوقي من العصب الثامن.

- z. incerta المِنَاطِقَة المُبْهَمَة. طبقة ضيقة من المادة السنجابية تمتد على طول معظم الدماغ البيني على الجهة البطنية من المهاد ومفصولة عنه بالحزمة المهادية وتتواصل على الجهة الوحشية مع النواة الشبكية للمهاد.

- z. ophthalmica (= herpès zoster ophthalmica) الهربس النِطَاقِي العَيْنِي.

- z. rolandica المِنَاطِقَة الرُّولَانْدِيَّة. المنطقة الحركية لقشرة المخ.

zone مَنَاطِقَة. (ج: مَنَاطِق). منطقة محددة ومحوطة مع خواص معينة ومميزة.

- dolorogenic z. (= trigger z.) مَنَاطِقَة مُؤَلِّدَة لِلْأَلَم.

- dorsal z. of His مَنَاطِقَة هِيس الظَّهْرِيَّة. التثخن العلوي الأصغر للنخاع الشوكي الجنيني الذي يبرز إلى القناة المركزية للنخاع.

- epileptogenic z. (= epileptogenous z.) مَنَاطِقَة مُؤَلِّدَة الصَّرَع. منطقة صغيرة في الدماغ يؤدي تنبيهها إلى حدوث نوبة صرعية.

- His z's. مَنَاطِقُ هِيس. أربعة تثخّنات تجري على طول النخاع الشوكي في الجنين.

- hyperesthetic z. مَنَاطِقَة مُفْرِطَة الحِس.

منطقة على سطح الجسم تتصف بالتحسس الشاذ.

- hysterogenic z. (= hysterogenous z.)

منطقة الهستيريا؛ مَنَاطِقَة مُؤَلِّدَة الهِسْتِيرِيَا. منطقة في الجسم يؤدي الضغط عليها إلى توليد نوبة هستيرية.

- language z. مَنَاطِقَة اللُّغَة. مصطلح عام يدل على كل مناطق قشرة المخ المتخصصة في وظيفة اللغة وهي عادة في نصف كرة المخ السائد.

- Lissauer's marginal z. (= tractus dorsolateralis) مَنَاطِقَة لِيَسَاوَر الهَامِشِيَّة. السبيل الظهري الوحشي.

- motor z. المِنَاطِقَة الحَرَكيَّة. منطقة في قشرة المخ يؤدي تنبيهها إلى تقلص العضلات الإرادية.

- neutral z. of His مَنَاطِقَة هِيس المُحَايِذَة. تثخن في القسم الظهري لنخاع الجنين يبرز إلى قناته المركزية.

- Rolando's z. (= primary somatomotor area) مَنَاطِقَة رُولَانْدُو. المنطقة الحركية الجسدية في قشرة المخ.

- z. of round nuclei مَنَاطِقَة النُّوى المُدَوَّرَة. شريط عريض من الخلايا الشمعية ذات النوى المدورة توجد في الطبقة المخاطية الشمعية.

- trigger z. (= dolorogenic z.) مَنَاطِقَة زَنَائِيَّة. منطقة مولدة للألم يؤدي تنبيهها إلى الشعور بالألم أو إلى نوبة ألم عصبي.

- Westphal's z. مَنَاطِقَة وَيِسْتَفَال. منطقة في العمود السنجابي الظهري للنخاع الشوكي في المنطقة القطنية ويقال إنها تحوي الألياف الصادرة المختصة بالمنعكس الرضعي.

zonesthesia حِسُ التَمَنُّط. حس بوجود

تضيق في إحدى المناطق كأنه مولد بحزام أو نطاق حولها.

**zoophilia** 1. حب الحيوانات  
2. شذوذ جنسي يتصف بالجماع مع الحيوانات أو بالقيام بالعمليات الجنسية الأخرى معها.

**zoophilic** اليفُ الحيوانات؛ ولُوعُ بالحيوانات.

**zoophilism (= zoophilia)** الُوعُ بالحيوانات.

**- erotic z.** ولُغُ شُبَقِي بالحيوانات؛ شُبُقُ مُغَارَلة الحيوانات. اللذة التي يتمتع بها الشخص عند تدليل الحيوانات أو مغارلتها.

**zoophobia** رُهابُ الحَيَوَانَات. الخوف غير المسبَّب من الحيوانات.

**zoosadism** سادِيَّةُ نَحْو الحَيَوَانَات. السادية الموجهة ضد الحيوانات.

**zoster (= herpes zoster)** الهربس النطاقي.

**zoxazolamine** زُوكسازُولَامِين. دواء يستعمل كمرحُ للعضلات الهيكلية ومدر لحمض اليوريك في النقرس.

**zygoma** 1. الناتئ الوجهي الصدغي  
2. القوس الوجنية 3. العظم الوجني.



## مسرد عربي - إنكليزي

(1)

nostalgia	ألمية	agony; tortua	احتضار
anabolism	ابتناء	injection	احتقان
-acu	إبري (سابقة)	encephalemia	احتقان الدماغ
vision	إبصار	oneirogmus	احتلام
pseudopsia	إبصار كاذب	gibbous; kyphotic	أحدب
strephosymbolia	إبصار مقلوب	tuberositas; tuberosity	أحدوية
visuopsychic	إبصاري نفسي	cingula	أحزمة
anociassociation	إبطال التدايعات المؤذية	sensation; sensibility	احساس
alalic; deaf-mute	أبكم	pseudogeusesthesia	احساس ذوقي كاذب
imbecile	أبله	kakesthesia	احساس شاذ
lead	اتجاه	chromesthesia	احساس لوني
atropinism	اثروبيينية	viscera	أحشاء
intercourse	اتصال	block; blocking	إحصار
consensual	اتفاقي	anodal block	إحصار مصعدي
anaclisis	اتكال	adjustment	إحكام
anaclisis	اتكال أمومي	fantasy; phantasia; phantasy	أحلام اليقظة
encephalotomy	اتلاف الدماغ	erythromelalgia	احمرار الأطراف المؤلم
compulsion	إجبار	nutatation	أحناء الرأس
obligate; obligatory	إجباري	cryptophthalmos	اختباء العين
rumination	اجترار	test	اختبار
avoidance	اجتناب	exencephalia	اختراج الدماغ
anaphrodisia	إجفار	biopsy	اختزاع
stress	إجهاد	neurobiologist	اختصاصي البيولوجيا العصبية
monaminergic	أحادي اميني الفعل	ablepharia	اختفاء العين
monosynaptic	أحادي التشابك	convulsion	اختلاج
monosexual	أحادي الجنس	convulsive	اختلاجي
mononeural	أحادي العصب	derangement	اختلال
mononeuric	أحادي العصبون	dysprosody	اختلال التصويت
monaxon	أحادي المحوار	disequilibrium	اختلال التوازن
frustration	أحباط	paratonia	اختلال التوتر
aphasiac; aphasic	أحبس	disesthesia	اختلال حسي
retention	احتباس	derangement	اختلال عقلي
infarction	احتشاء	parafunction	اختلال الوظيفة
microinfarct	احتشاء صغري	facultative	اختياري
		groove; vallecule	أخدود
		dumb; mute	أخرس

acromion	أخرم	defatigation	ارهاق
conception	إخصاب	spongioblast	أرومة إسفنجية
ethical	أخلاقي	ependymoblast	أرومة البطانة العصبية
ethics	أخلاقيات	glioblast	أرومة الدبقية
plantar	أخمصي	neuroblast	أرومة عصبية
ethics	آداب	myoblast; sarcoblast	أرومة عضلية
comprehension; conception; esthesia	إدراك	myofibroblast	أرومة الليفة العضلية
visuognosis	ادراك إبصاري	melanoblast	أرومة ملانية
nociperception	ادراك الأذى	astroblast	أرومة نجمية
alterperception	ادراك تلوي	medulloblast	أرومة نخاعية
cheiromesthesia	ادراك حركة اليد	myeloblast	أرومة النخوية
cryptesthesia	ادراك الخفايا	obliteration	إزالة
chronognosis	ادراك الزمن	depolarization	إزالة الاستقطاب
apperception	ادراك شعوري	deconditioning	إزالة الإشرط
lalognosis	ادراك الكلام	deconditioning	إزالة التكيف
symbolia	ادراك لمسي	disinhibition	إزالة التثبيط
preperception	ادراك مسبق	desensitization	إزالة التحسس
barognosis	ادراك الوزن	spasmolysis	إزالة التشنج
percipient	ادراكي	denervation	إزالة التعصيب
gnosis; perceptivity	ادراكي	defibrillation	إزالة الرجفان
apperceptive	ادراكي شعوري	disectomy	إزالة القرص
adrenergic	ادريناليني الفعل	demyelination	إزالة الميالين
anamnesis	إدكار	dicephaly	ازدواج الرأس
addiction	إدمان	diplopia	ازدواج الرؤية
opiomania; opiumism	إدمان أفيون	diphallia	ازدواج القضيب
narcolism	إدمان المخدرات	amphotony	ازدواجية التوتر العصبي
neuroderm	أديم عصبي	amphithymia	ازدواجية المزاج
neuroectoderm	أديم عصبي ظاهر	paranoiac	أزور
masculation; masculinization	إذكاز	paraphrenia	أزورار
otic; aural	أذني	essential	أساسي
volition	إرادة	radiectomy	استئصال الجذر
voluntary	إرادي	laminectomy	استئصال الصفيحة
commotio; concussion	ارتجاج	pinelectomy	استئصال الصنوبري
feedback	ارتجاع	plexectomy	استئصال الضفيرة
fasciculation	ارتجاج حزمي	choroidectomy	استئصال الضفيرة المشيمية
chaliasia	ارتخاء	angioneurectomy	استئصال عصبي وعائي
rebound	ارتداد	ganglionectomy	استئصال العقدة
projection	ارتسام	stelletomy	استئصال العقدة النجمية
infiltration	ارتشاح	gangliosympathectomy	استئصال العقدة الودية
eclampsia	ارتعاج	ophthalmectomy	استئصال العين
slows; tremens; trepidation	ارتعاش	myringectomy	استئصال غشاء الطبل
orgasm	إرجاز	lobectomy	استئصال الفص
allergic	أرجي	chemothalamectomy	استئصال كيميائي للمهاد
allergy	أرجية	topectomy	استئصال موضعي
neuroallergy	أرجية عصبية	medullectomy	استئصال النخاع
relaxation	إرخاء	hypophysectomy; pituitectomy	استئصال النخامية
infiltration	ارشاح	hemilaminectomy	استئصال نصف الصفيحة الفقرية
agrypnia; hyposomnia; insomnia	أرق	hemispherectomy	استئصال نصف الكرة

myomectomy	استئصال الورم العضلي	normalization	إسواء
precognition	استباق الحوادث	isotonic	إسوي التوتر
clairvoyance; cryptesthesia	استبصار	isopotential	إسوي الجهد
asemia	استبهام	isometric	إسوي الطول
homeostasis	استتباب	choline acetylase	استيلاز كولين
excitation	استثارة	acetylcholine	استيل كولين
excitatory	استثاري	paroxysm	اشتداد
excitability	استثارية	sexuality	اشتواء الجنس
reaction; response	استجابة	heterosexuality	اشتواء المغاير
lengthening reaction	استجابة التطويل	homoeoticism	اشتواء المعائل
operant	استجابة ذاتية	conditioning	إشراط
myobradia	استجابة عضلية بطيئة	operant	إشراط فعال
exterofection	استجابة للمنبهات الخارجية	radiation	إشعاع
interofection	استجابة للمنبهات الداخلية	injury	إصابة
excerebration	استخراج الدماغ	liminal	أصغري
intellectualization	استذهال	xanthochromia	اصفرار
virilism	استرجال	deaf; dull	أصم
pneumoventriculi	استرواح البطينات	accessory	إضافي
pneumocephalus	استرواح الرأس	ambidexter	أضبط
pneumocrania; pneumoencephalos	استرواح القحف	disorder; disturbance	اضطراب
passivism	استسلام سلبي	heterotrophia	اضطراب التغذية
rage	استشادة	kinesia; kinetosis	اضطراب حركي المنشأ
olfactism	استشمام	parosphresia	اضطراب الشم
process	استطالة	parareflexia	اضطراب المنعكسات
dolichocephalia	استطالة الرأس	hypsarhythmia	اضطراب النظم المفرد
aptitude	استعداد	dysomnia	اضطراب النوم
exhibitionism	استعراض	parasomnia	اضطراب نومي
cognition; identification; noesis	استعراف	kakergasia; merergasia	اضطراب وظيفي
cognitive; noetic	استعرافي	tabescent; tabification	اضمحلال
anergia; anergy	استعطال	ataraxia	اطمئنان
photoreception	استقبال الضوء	reinnervation	إعادة التعصيب
chemoreception	استقبال كيميائي	sociopathy	اعتلال اجتماعي
exploration	استقصاء	acropathy	اعتلال الأطراف
exploratory	استقصائي	polyneuropathy	اعتلال الأعصاب
metabolism	استقلاب	leukoencephalopathy; leukoencephaly	اعتلال بيضاء الدماغ
sensorimetalabolism	استقلاب حسي	leukomyelopathy	اعتلال بيضاء النخاع
clinostatism; decubitus	استلقاء	pachymeningopathy	اعتلال الجافية
masturbation	استعناء	radiculopathy	اعتلال الجذور العصبية
vigor	استنشاد	radiculoneuropathy	اعتلال الجذور والأعصاب
cholinesterase	استيراز الكولين	polyradiculoneuropathy	اعتلال الجذور والأعصاب والنخاع
dysphylaxia	استيقاظ مبكر	radiculomyelopathy	اعتلال الجذور والنق الفقري
aid, first	إسعاف أولي	craniopathy	اعتلال الجمجمة
axospongium	إسفنجة المحوار	encephalosis	اعتلال الدماغ
neurospogium	إسفنج عصبي	meningoencephalopathy	اعتلال الدماغ والسحايا
myelospongium	إسفنج نخاعي	meningoencephalomyelopathy	اعتلال الدماغ والسحايا والنخاع
cuneus	إسفنج		
projection	إسقاط	cerebroopathy; cerebrosis; encephalopathy	اعتلال دماغي
sclatic	أسكي	encephalomyelopathy	اعتلال دماغي نخاعي

encephalomyeloradiculopathy	اعتلال دماغي نخاعي جذري	rachylisis	افتكاك سيساثي
encephalomyeloneuropathy	اعتلال دماغي نخاعي عصبي	neurolysis	افتكاك العصب
cephalopathy	اعتلال الرأس	cerebration	افتهام
meningopathy	اعتلال السحايا	neurosecretion	إفراز عصبي
leptomeningopathy	اعتلال السحايا الرقيقة	catharsis	إفراغ المكبوت
polioencephalopathy;	اعتلال سنجابية الدماغ	opium	أفيون
poliomyelopathy		opiate	أفيوني
poliomyelopathy	اعتلال سنجابية النخاع	suggestion	اقتراح
rachipathy	اعتلال سيساثي	conjugal	اقتراضي
echopathy	اعتلال صدائي	cingulectomy	اقتطاع التليفين الحزاميين
pinealopathy	اعتلال الصنوبرية	neuropodia	أقدام عصبية
plexopathy	اعتلال الضفيرة	ischemia	إقفار
neurocristopathy	اعتلال عرقي عصبي	myoischemia	إقفار عضلي
neuronosis	اعتلال عصبي	depression	اكتئاب
mononeuropathy	اعتلال عصبي أحادي	dysthymia	اكتئاب جزئي
neuroglycopenia	اعتلال عصبي بنقص السكر	crispation	اكتزاز
neuroencephalomyelopathy	اعتلال عصبي دماغي نخاعي	oxytocin	أكسيتوسين
neuroarthropathy	اعتلال عصبي مفصلي	geophagia; geophagism	أكل التراب
neuropsychopathy	اعتلال عصبي نفسي	corona	إكليل
angioneuropathy	اعتلال عصبي وعائي	colliculus	أكيمة
polymyopathy	اعتلال العضلات	dolores	آلام
myocardopathy	اعتلال عضلة القلب	ego	الأنَا
myonosis; myopathy	اعتلال عضلي	spondylosyndesis	النحام الفقار
neuroretinopathy	اعتلال القرص البصري والشبكية	adhesio interthalamica	الالتصاق بين المهادين
logopathy	اعتلال كلامي	ankylocheilia	التصاق الشفتين
arthropathy	اعتلال مفصلي	mysynizesis	التصاق العضل
myelinopathy	اعتلال مياليني	ankyloglossia	التصاق اللسان
myeloradiculopathy	اعتلال النخاع والجذور	inflammation	التهاب
myelo-opticneuropathy	اعتلال النخاع والعصب البصري	polyneuritis	التهاب الأعصاب
myelopathy	اعتلال نخاعي	neuroamebiasis	التهاب الأعصاب الأميبي
psychopathy	اعتلال نفسي	pseudoneuritis	التهاب الأعصاب الكاذب
sympathicopathy	اعتلال ودي	enteroneuritis	التهاب الأعصاب المعوية
vasoneuropathy; vasoneurosis	اعتلال وعائي عصبي	neuromyositis	التهاب الأعصاب والعضل
neuropathic	اعتلالي عصبي	polyneuromyositis	التهاب الأعصاب والعضلات
dependence	اعتماد	neuromyelitis	التهاب الأعصاب والنخاع
claudicant; claudicatory	اعرج	endarteritis	التهاب بطانة الشريان
sinistral; sinistromanual	اعسر	ependymitis	التهاب البطانة العصبية
sinistropedal	أعسر القدم	endocranitis	التهاب بطانة القحف
neural	أعصابي	leukencephalitis; leukoencephalitis	التهاب بيضاء الدماغ
virilia	الأعضاء التناسلية الذكرية	leukomyelitis	التهاب بيضاء نخاع
hemianopic	أعمى شقي	endolabyrinthitis	التهاب التيه الغشائي
arthrogryposis	اعوجاج المفصل	pachymeningitis; perimeningitis	التهاب الجافية
fainting; stun	إغماء	pachyleptomeningitis	التهاب الجافية والحنون
lesion	آفة	radiculitis	التهاب الجذر
hemileision	آفة شقية	polyradiculitis	التهاب الجذور
dissociation	افتراق	polyneuroradiculitis;	التهاب الجذور والأعصاب
ideation	افتكار	radiculoneuritis	
ideational	افتكاري	polyradiculoneuritis	التهاب الجذور والأعصاب والنخاع

radiculoganglionitis	التهاب الجذور والعقد	myitis; myositis	التهاب العضل
neurodermatitis	التهاب الجلد العصبي	polymyositis	التهاب العضلات
funiculitis	التهاب الحبل	myochochorditis	التهاب عضلات الحبال
neuropapillitis	التهاب الحليمة العصبية	stethomyositis	التهاب عضلات الصدر
meningitis; pia-arachnitis;	التهاب الحنون والعنكبوتية	myocelitis	التهاب عضل البطن
piarachnitis		monomyositis	التهاب العضلة الأحادي
paraphrenitis	التهاب حوالي الحجاب	myocarditis	التهاب عضلة القلب
cephalitis; cerebritis	التهاب الدماغ	myofascitis	التهاب العضلة واللفافة
otocerebritis; otoencephalitis	التهاب الدماغ الأذني المنشأ	myometritis	التهاب عضل الرحم
panencephalitis	التهاب الدماغ الشامل	myocellulitis	التهاب العضل والهلال
mesencephalitis	التهاب الدماغ المتوسط	inomyositis	التهاب عضلي ليفي
herpesencephalitis	التهاب الدماغ الهريسي	myotenositis	التهاب عضلي وتري
encephaloradiculitis	التهاب الدماغ والجذور	ganglionitis	التهاب العقدة
meningocephalitis;	التهاب الدماغ والسحايا	neuroganglitis	التهاب العقدة العصبية
encephalomeningitis; meningocerebritis		uveomeningoencephalitis	التهاب العينية والسحايا والدماغ
encephalomyocarditis	التهاب الدماغ والعضل والقلب	arachnitis; arachnoiditis	التهاب العنكبوتية
encephalomyelitis; myeloencephalitis	التهاب الدماغ والنخاع	basiarachnitis	التهاب العنكبوتية القاعدية
encephalomyeloradiculitis;	التهاب الدماغ والنخاع والجذور	myringitis	التهاب غشاء الطبل
encephalomyeloradiculoneuritis		perineuritis	التهاب غمد الحزمة العصبية
meningitides; meningitis	التهاب السحايا	myofibrositis	التهاب غمد العضل
leptomeningitis	التهاب السحايا الرقيقة	endoneuritis; neurilemmitis	التهاب غمد الليف العصبي
hydromeningitis	التهاب السحايا الموهي	ramitis	التهاب الفرع
perimyelitis	التهاب السحايا النخاعية	spondylitis	التهاب الفقار
meningoradiculitis	التهاب السحايا والجذور	cranitis	التهاب القحف
cerebromeningitis	التهاب السحايا والدماغ	psoriasis	التهاب القطنية
chorioomeningitis	التهاب السحايا والمشيميات	periencephalitis	التهاب محيط الدماغ
meningomyeloradiculitis	التهاب السحايا والنخاع والجذور	cerebellitis	التهاب المخيخ
meningomyeloencephalitis	التهاب السحايا والنخاع والدماغ	acrostealgia	التهاب نواتات الاطراف المؤلم
meningo-osteophlebitis	التهاب السمحاق وأوردة العظم	myelitis; notomyelitis; rachiomyelitis	التهاب النخاع
poliencephalitis; polioencephalitis	التهاب سنجابية الدماغ	syringomyelitis	التهاب النخاع التكفهي
pseudopolyomyelitis	التهاب سنجابية الدماغ الكاذب	hematomyelitis	التهاب النخاع الدموي
polioencephalomeningomyelitis;	التهاب سنجابية	myeloneuritis	التهاب النخاع والأعصاب
poliomyelencephalitis;	الدماغ والنخاع	myeloradiculitis	التهاب النخاع والجذور
poliomyeloencephalitis; poliencephalomyelitis		myelencephalitis	التهاب النخاع والدماغ
poliomyelitis; tephromyelitis	التهاب سنجابية النخاع	myelomeningitis	التهاب النخاع والسحايا
rachitis	التهاب السيساء	hypophysitis	التهاب النخامية
meningoarthritis	التهاب شرايين السحايا	tortipelvis	التواء الحوض
plexitis	التهاب الضفيرة	embolalla	التيات
neuritis	التهاب العصب	affinity	ألفة
mononeuritis	التهاب العصب الأحادي	vagotropism	ألفة المبهم
neuroretinitis	التهاب العصب البصري والشبكية	dolor; pain	الم
neurochoroiditis	التهاب العصب البصري والمشيمة	enteralgia	الم الأمعاء
neurochorioretinitis	التهاب العصب البصري والمشيمية والشبكية	pygalgia	الم الألية
neuritis	التهاب عصبوني	earache	الم الأذن
radioneuritis	التهاب عصبي إشعاعي	otagra; otalgia	الم أنني
neurolabyrinthitis	التهاب عصبي تيهي	eparsalgia	الم الارهاق
		dentalgia	الم الاسنان
		digitalgia	الم الأصابع

costalgia	آلم الأضلاع	myoneuralgia	آلم عصبي عضلي
melalgia	آلم الأطراف	osteoneuralgia	آلم عصبي عظمي
melosalgia	آلم الأطراف السفلية	angioneuralgia	آلم عصبي وعائي
rhinalgia	آلم الأنف	coccyalgia; coccydynia; coccygodynia	آلم العصعص
psychroalgia	آلم البرد	brachialgia	آلم عضدي
precordialgia	آلم البرك	myalgia	آلم العضل
pancrealgia; pancreatalgia	آلم البنكرياس	polymyalgia	آلم العضلات
mittelschmerz	آلم بين الحيضين	melagra	آلم عضلات الأطراف
cryalgia; crymodynia	آلم التبريد	myocelialgia	آلم عضل البطن
mammalgia	آلم الثدي	cinesalgia	آلم العضلة التحركي
radiculalgia	آلم الجذر	myosalgia	آلم عضلي
somatalgia	آلم جسدي	ostealgia	آلم عظمي
diaphragmalgia; phrenalgia; phrenodynia	آلم الحجاب	talalgia	آلم العقب
thermalgia	آلم حراري	opsialgia	آلم العقدة الركبية
kinesalgia; kinesialgia; oxycinesia	آلم الحركة	ophthalmalgia	آلم العين
visceralgia	آلم حشوي	hemiopalgia	آلم عيني شقي
encelialgia	آلم حشوي بطني	ophthalmagra	آلم عيني مفاجيء
thelalgia	آلم الحلمة	antralgia	آلم الغار
laryngalgia	آلم-الحنجرة	adenalgia	آلم الغدة
menalgia	آلم الحيض	dacryadenalgia	آلم الغدة الدمعية
mastoidalgia	آلم الخشاء	cardialgia	آلم الفؤاد
orchidalgia; testalgia	آلم الخصية	meralgia	آلم الفخذ
encephalgia; cephalalgia; cephalgia	آلم الرأس	merocoxalgia	آلم الفخذ والورك
telalgia	آلم رجيع	spondylalgia	آلم الفقرات
metalgia; hysteralgia	آلم الرحم	gnathalgia; gnathodynia	آلم الفك
cervicobrachialgia	آلم رقبي عضدي	stomalgia; stomatalgia; stomatodynia	آلم الفم
gonalgia	آلم الركبة	pedialgia; podalgia	آلم القدم
scelalgia; skelalgia	آلم الساق	mittelschmerz	آلم القراء
odontalgia	آلم السن	iridalgia	آلم القرنية
spinalgia; rachialgia	آلم السيساء	lumbago	آلم القطن
neurodealgia	آلم الشبكية	cardialgia	آلم قلبي
panniculalgia	آلم الشحم الجلدي	colonalgia	آلم القولون
adiposalgia	آلم شحمي	talalgia	آلم الكاحل
agony	آلم شديد	heptalgia	آلم كبدي
arteralgia	آلم شرياني المنشأ	omalgia; omodynia; scapulargia	آلم الكتف
hemalgia; hemialgia	آلم شقي	nephralgia	آلم الكلى
thoracalgia	آلم الصدر	dacryocystalgia	آلم كيس الدمع
peritonealgia	آلم الصفاق	ulalgia	آلم اللثة
plexalgia	آلم ضفيري	glossalgia; glossodynia	آلم اللسان
photalgia; photodynia	آلم ضوئي	epicondylalgia	آلم اللقمة
splenalgia	آلم الطحال	haphalgisia	آلم لمسي
tibialgia	آلم الظنوب	oophoralgia; ovarialgia	آلم المبيض
notalgia; backache; backalgia; dorsalgia	آلم الظهر	topalgia	آلم متوضع
sacralgia	آلم العجز	cystalgia	آلم المثانة
neurodynia	آلم العصب	synalgia; telalgia	آلم محول
prosopalgia	آلم العصب الثلاثي التوائم	dacryocystalgia	آلم الدمع
polyneuralgia; neuralgia	آلم عصبي	esophalgia	آلم المريء
otoneuralgia	آلم عصبي أذني المنشأ	proctalgia; rectalgia	آلم المستقيم

megalgalia	الم مفرط	pronation	انبطاح
arthralgia	الم مفصلي	ectopia	انتباز
scapulodynia	الم المنكب	myectopia	انتباز عضلي
colpalgia	الم المهبل	alertness; attention	انتباه
topoalgia	الم موضع	neurobiotaxis	انتحاء حيائي عصبي
myelalgia	الم النخاع	thought broadcasting	انتشار الأفكار
algopsychalia	الم نفسي	orthostatism	انتصاب الجسم
psychalgia; psychalgia	الم نفسي المنشأ	orthostatic	انتصابي
hypnalgia; nyctalgia	الم نومي	metastasis; transmission	انتقال
bends	الم مربوط الضغط	neurotransmission	انتقال عصبي
teinodynia; tenalgia	الم الوتر	paroxysm	انتياب
faciocephalgia	الم الوجه والرقبة	paroxysmal	انتيابي
ischialgia; ischiodynia	الم الورك	flexion	انثناء
phlebalgia	الم وريدي	lateroflexion	انثناء جانبي
angialgia	الم الوعاء	dorsiflexion	انثناء ظهري
vasalgia	الم وعائي	flexibiltas; flexibility	انثنائية
cheiralgia	الم اليد	stereotaxis; thigmotaxis	انجذاب لمسي
cheiromachialgia; chirobrachialgia	الم اليد والذراع	deviation	انحراف
cheiropodalgia; chiropodalgia	الم اليد والقدم	laterodeviation	انحراف جانبي
neuromechanism	الآلية عصبية	retrodeviation	انحراف خلفي
zoophilic	اليف الحيوانات	myocytolysis	انحلال الخلايا العضلية
cephalotropic	اليف الدماغ	myolysis; rhabdomyolysis	انحلال العضل
polioencephalotropic	اليف سنجابية الدماغ	myocardiolysis	انحلال عضلة القلب
neuronotropic	اليف العصبونات	spondylolysis	انحلال الفقرات
sympathicotropic	اليف الودي	myelinolysis	انحلال الميالين
allele	أليل	myelolysis	انحلال النخاع
dura mater; pachymeninx	الأم الجافية	rachiocampsis	انحناء السيساء
pia; pia mater	الأم الحنون	illusion	انخداع
meningina	الأم الحنون والعنكبوتية	illusional	انخداعي
aneurysm	أم الدم	depression	انخساف
pretectal	أمام السقف	impulsion; propulsion	اندفاع
rostral	أمامي	appetitive	اندفاعي
ampulla	أمبولة	dysphoria	انزعاج
withdrawl	امتناع	spondylolisthesis	انزلاق الفقار
aphagia algera	امتناع المي عن الطعام	myectopia	انزياح العضلة
aphgia	امتناع عن الطعام	nicotinism	اتسمام نيكوتيني
optimal	أمثل	lateropulsion	اتسحاق جانبي
optimum	الأمثل	diastematocrania	انشطار القحف
anagoge; anagogy	أمثلة النفس	diastematomyelia	انشطار النخاع
neuropathogenesis	إمراض عصبية	autosynnoia	انشغال بالذات
neuropathogenicity	إمراضية عصبية	schizogynia	انشقاق التلافيف
leptocephalic	أفق الرأس	schizocephalia	انشقاق الرأس
unstriated	أملس	rachischisis	انشقاق السيساء
superego	الآنا العليا	mesorachischisis	انشقاق السيساء الجزئي
egotropic; idiotropic; introvert	أناني	hemirachischisis	انشقاق السيساء الشقي
egoism	أنانية	spondyloschisis	انشقاق الفقار
egocentric	أناني التركيز	cranioschisis	انشقاق القحف
extroversion	انبساط نفسي	craniorachischisis	انشقاق القحف والسيساء

myeloschisis	انشقاق النخاع	emotion	انفعال
merorachischsis	انشقاق النخاع الجزئي	emotional	انفعالي
holorachischsis	انشقاق النخاع الكامل	nasal	انفي
insenescence	انشياخ	hyposensitization	انقاص التحسس
embolism	انصمام	iniencephaly	انقذال الدماغ
compression	انضغاط	anhidrosis	انقطاع التعرق
encephalothlipsis	انضغاط الدماغ	conversion	انقلاب
engram; impression	انطباع	denial	إنكار
autism	انطواء على الذات	enkephalinergeric	انكيفاليني الفعل
autistic; introvert	انطوائي	exhaustion; lassitude	انهاك
autism	انطوائية	axonotmesis	انهتاك المحوار
anodynia	انعدام الألم	collapse	انهيار
agyria; lissencephalia	انعدام التلافيف	diathesis	اهبة
athymia	انعدام التوتة	ament	اهيل
asexuality	انعدام الجنس	orientation	اهتداء
acorea	انعدام الحدقة	involution	أوب
anaphia; anaphia	انعدام حس اللمس	oedipism	أوديبية
anencephalia	انعدام الدماغ	aura	أورة
arthinencephalia	انعدام الدماغ الشمي	aural	أوري
pantanencephaly	انعدام الدماغ في الجنين	menopause	إياس
amyelencephalia	انعدام الدماغ والنخاع	menopausal	إياسي
ageusia; ageusia	انعدام الذائقة	suggestion	إيحاء
acephalia	انعدام الرأس	autosuggestion; self suggestion	إيحاء ذاتي
acephalobrachia	انعدام الرأس والذراعين	sympathism	إيحائية
deranencephalia	انعدام الرأس والعنق	conductance	إيصالية
acephalopodia	انعدام الرأس والقدمين	orgasm	إيفاف
acephalochiria	انعدام الرأس واليدين	algogenesis; tenderness	إيلام
anodmia	انعدام الشم	dyspragia	إيلام الإداء
anepithymia; inappetence	انعدام الشهية	thermalgesia	إيلام حراري
athymia	انعدام العاطفة	carotidynia	إيلام سباتي
aphakia	انعدام العدسة	gesture	إيماءة
inoccipitia	انعدام الفص القذالي	dextropedal	أيمن القدم
aniridia	انعدام القرزحية	dextromanual	أيمن اليد
notancephalia	انعدام مؤخر الرأس		
inappetence	انعدام المبادرة		
hemicephalia	انعدام المخ		(ب)
notanencephalia	انعدام المخيخ	hypophysiportal	بابي نخامي
amyelia	انعدام النخاع	dorsad	باتجاه الظهر
withdrawal	انعزال	neuropathology	باطولوجيا عصبية
nutation	انغاض	area	باحة
hemiation	انفتاق	parapsychology	باراسيكولوجيا
distortion; torsion	انقتال	barbital	باربيتال
tortipelvis	انقتال الحوض	eminence; eminentia	بارزة
diaschisis	انفراق عصبي	parkinsonian	باركنسوني
ablatio retinae	انفصال الشبكية	parkinsonism	باركنسونية
myodiastasis	انفصال العضلة	hemiparkinsonism	باركنسونية شقية
schizokinesis	انفصام الاستجابات	sthenia	باس
schizotonia	انفصام التوتر	ambilateral; bilateral	الجانبيين



binocular	بالعينين	uncotomy	بضع الشص
aphrodisia	باه	neurotomy	بضع العصب
aphrodisiac	باهي	splanchnicotomy	بضع العصب الحشوي
neuropeptide	ببتيد عصبي	lobotomy	بضع الفص
neurography	بحث عصبي	leucotomy; leukotomy	بضع الفص الجبهي
coprolalia; coprophrasia	بذاء	thalamectomy; thalamotomy	بضع المهاد
end-feet	براعم انتهائية	cordotomy; myelotomy	بضع النخاع
exencephalia; exencephaly	برانية الدماغ	myototomy	بضع وتر العضلة
exencephalous	براني الدماغ	myomotomy	بضع الورم العضلي
fastigium	برحاء	hypothalamotomy	بضع الوطاء
isthmus	برزخ	bradyesthesia	بطء الإدراك
bud	برعم	myobradia	بطء الإستجابة العضلية
dysphoria	برم	bradyphrasia	بطء التلفظ
frigidity	برودة	bradyteleocinesia	بطء التنسيق الحركي
hillock	بروز	bradycinesia	بطء الحركة
prostaglandin	بروستغلندين	bradylexia	بطء القراءة
procaine	بروكاين	bradylogia; bradyphemia	بطء الكلام
beriberi	بري بري	bradyglossia	بطء النطق
puncture	بزل	putamen	بطانة
encephalopuncture	بزل الدماغ	endyma; ependyma	بطانة عصبية
cephalocentesis	بزل الرأس	endocranium	بطانة القحف
craniopuncture	بزل القحف	abdomen	بطن
rachicentesis	بزل قطني	rostral	بطني
tapetum	بساط	ventricle; ventriculus	بطين
extension	بسط	postganglionic	بعد العقدة
oscillopsia	بصر مذبذب	asitia	بغض الطعام
optical	بصري	macula; spot; tache	بقعة
optics	بصريات	maculocerebral	بقعي دماغي
opticociasmatic; optochiasmtic	بصري تصالبي	diaphemetric	بقياس حس اللمس
opticopupillary	بصري حدقي	alalia	بكامة
opticociliary	بصري هديبي	alalia cophica; deaf-mutism	بكم
bulb; bulbus	البصلة	audimutitas	بكم سميع
bulbopontine	بصلي جسري	hypothymia	بلادة الانفعالات
pseudobulbar	بصلي كاذب	hyponoia	بلادة عقلية
fingerprint	بصمة	gliophagia	بلعمة الدبق
insight	بصيرة	myophagism	بلعمة عضلية
cingulotomy; cingulumotomy	بضع التلفيفين الحزاميين	odynophagia	بلع مؤلم
foraminotomy	بضع الثقبة	aerophagia	بلع الهواء
rhizotomy	بضع الجذور	neuronophage	بلعم العصبونات
chordotomy	بضع الحبل	myophage	بلعم العضل
viscerotomy	بضع الحشى	axophage	بلعم المحوار
cerebrotomy; encephalotomy	بضع الدماغ	pellagra	بلغرة
mesencephalotomy	بضع الدماغ المتوسط	imbecility	بله
cephalotomy	بضع الرأس	puberty	بلوغ
stereoccephalotomy	بضع الرأس المجسم	ephebogenesis	بلوغية
rachiotomy; spondylotomy	بضع السيساء	dull	بليد
pallidotomy	بضع الشاحبة	hypoaffective	بليد العاطفة
pallidoanatomy	بضع الشاحبة والعروة	anesthetic	بنج

ipsilateral	بنفس الجانب	saccade	تتبع
constitution; habitus	بنية	saccadic	تتبعية
constitutional	بنويي	oscitation; yawning	تثاؤب
nocturia; nycturia	بول ليلي	inhibition	تثبيط
focus	بؤرة	perencephaly	ثقب الدماغ
nidus	بؤرة مرضية	trisomy	ثلاث صبغي
nidal	بؤرية مرضية	ego-syntonic	تجانس الذات
positron	بوزترون	regeneration	تجدد
enuresis	بول الفراش	neuragenesis; neurotization	تجدد الأعصاب
environment	بيئة	eructatio nervosa	تجشؤ عصبي
pyrrocaïne	بيروكائين	prosocele; prosocoele	تحويل الدماغ المقدم
flush	بيغ	granulation	تحيب
phenylketonuria	بيلة الفينيل كيتون	subdural	تحت الجافية
interpial	بين طبقتي الحنون	subpial	تحت الحنون
internode	بين العقدتين	subthalamus	تحت المهاد
interictal	بين النوبات	locomotion; motility; mobility	تحرك
neurobiology	بيولوجيا عصبية	autokinesis	تحرك إرادي

## (ت)

erratic	تائه	distortion	تحويل
tabes	تابيس	mobilization	تحريك
taboparalysis; taboparesis	تابيس شللي	fasciculation	تحزم
pseudotabes	تابيس كاذب	sensibility	تحسس
tabetic	تابيسي	dysesthesia	تحسس شاذ
battarismus; mogilalia; psellism; stuttering	تأثاة	metallesthesia	تحسس الفلزات
dysphemia	تأثاة نفسية المنشأ	sensibilization	تحسيس
myotonia	تأثر العضل	neurarchy	تحكم عصبي
pseudomyotonia	تأثر عضلي كاذب	myelinoclasia; myelinolysis	تخلل الميالين
myotonic	تأثري عضلي	analysis	تحليل
noci-influence	تأثير مؤذ	narcoanalysis	تحليل تخديري
corona	تاج	hypnoanalysis	تحليل تنويمي
body rocking	تارجح الجسم	graphoanalysis	تحليل الشخصية من الكتابة
synergism	تآزر	psychoanalysis; psychoanalysis	تحليل نفسي
synergetic	تآزري	afterloading	تحميل تلوي
synergy	تآزرية	dysphoria	تحوز
algnesia; algesia	تالم	conversion	تحويل
introspection	تأمل الباطن	hyposympathicotonus	تخاذل الودي
bradyecia	تباطؤ السمع	dactylophasia	تخاطب إصبعي
heteresthesia	تباين الحس	telepathy	تخاطر
depersonalization	تبديد الشخصية	narcosis; narcotism	تخدر
metonymy	تبديل الكلمات	encephalonarcosis	تخدر دماغي المنشأ
prolepsis	تبكير الانتياب	electronarcosis	تخدر كهربوي
obtusio	تبلد الحس	anesthesia; narcosis	تخدير
bradyphrenia	تبلد الذهن	monoanesthesia	تخدير أحادي
anesthesia	تبنيج	neuroleptanesthesia	تخدير تسكينوي
cryoanesthesia	تبنيج قري	hypnoanesthesia	تخدير تنويمي
bedwetting	التبول في الفراش	rhizanesthesia	تخدير جذري

pseudonarcotism	تخدير كاذب	mating	تزاوج
rachianalgesia	تخدير نخاعي	tectocephaly; cymbocephalia	تزورق الرأس
phlebanesthesia	تخدير وريدي	acceleration	تسارع
narcotic	تخديري	isopotential	تساوي الجهد
thalamectomy	تخريب المهاد	tachyphagia	تسرع الأكل
confabulation; fabrication	تخريف	tachyphrenia	تسرع التفكير
echoencephalography	تخطيط صدى الدماغ	tachypragia	تسرع العمل
myography	تخطيط العضل	tachylalia	تسرع الكلام
electroretinography	تخطيط كهربية الشبكية	tachyphrasia	تسرع النطق
electroneuromyography	تخطيط كهربية العضلة	clinocephalism; clinocephaly; tapeinocephaly	تسطح الرأس
	المكهربة العصب	platybasia	تسطح القاعدة
radioencephalography	تخطيط لاسلكي للدماغ	platycrania	تسطيح القحف
decompression	تخفيف الضغط	sphenocephaly	تسفن الرأس
retardation	تخلف	alganesthesia; analgesia	تسكين
feeble-mindedness; hypophrenia; oligophrenia	تخلف عقلي	paranalgesia	تسكين الأطراف السفلية
confusion	تخليط	amnalgesia	تسكين انساني
confusional	تخليطي	ataralgesia; neuroleptanalgesia	تسكين تطميني
dyspepsia	تخمة	audionalgesia	تسكين سمعي
phantasy; fantasy	تخيل	hemianalgesia	تسكين شقي
association	تداعي	cryoanalgesia	تسكين قري
noctissociation	تداعي الإصابة	electroanalgesia	تسكين كهربائي
treppe	تدرج	lathyrism	تسمم بالجلبان
drop	تدلي	neuronymy	تسمية عصبية
wristdrop	تدلي الرسغ	myonymy	تسمية العضلات
spondyloptosis	تدلي الفقار	acrocephalia; hypsicephaly; oxycephalia;	تسمن الرأس
glossoptosis	تدلي اللسان	oxycephaly; stenocephaly	
encephalization	تدمغ	synapsis	تشابك
hematomyelia; myelapoplexy; myelorrhagia	تدمي النخاع	appersonification	تشخيص
oscillation	تذبذب	empathy	تشاعر
recall	تذكر	arborization	تشجر
cryptannesia; cryptomnesia	تذكر الخفايا	neurodiagnosis	تشخيص عصبي
palinmnesis	تذكر القديم	psychodiagnosis	تشخيص نفسي
recall	تذكير	neuroanatomy	تشریح عصبي
hemigeusia	تذوق نصفي	formation	تشكل
association; coherence	ترابط	myelinization	تشكل الميالين
synreflexia	ترابط المنعكسات	formation	تشكيل
virilence; virilization	تراجل	spasm; spasmus	تشنج
summation	تراكم	dactylospasm	تشنج الإصبع
trabecula	تربيب	orthotonus	تشنج انتصابي
neurotagma	ترتيب عصبي	protospasm	تشنج أولي
neurotransducer	ترجم عصبي	pharyngism; pharyngismus	تشنج البلعوم
sedation	تركين	arthrogryposis	تشنج تكززوي
clonism	ترمع	laryngismus; laryngospasm	تشنج الحنجرة
staggers; titubation	ترنح	cantus galli	تشنج الحنجرة الصريري
hypsochinesis	ترنح خلفي قياسي	anesthetospasm	تشنج خدري
graphocatharsis	ترويح بالكتابة	gyrospasm	تشنج دوراني
antitoxin	ترياق	retrocollis	تشنج الرقبة المنكفي
synchronism	تزامن	clonospasm	تشنج رمعي

hemispasm	تشنج شقي	epidurography	تصوير فوق الجافية
opisthotonos	تشنج ظهري	periencephalography	تصوير محيط الدماغ
neurospasm	تشنج عصبي	tomography	تصوير مقطعي
myospasm	تشنج عضلي	neurotomography	تصوير مقطعي عصبي
myotonus; paramyotonus	تشنج عضلي توتري	myelography	تصوير النخاع
palms	تشنج قفزي	pneumomyelography	تصوير النخاع الغازي
graphospasm	تشنج الكتف	control	تضبط
logospasm	تشنج الكلام	neurosarcocleisis	تضمين عصلي للعصب
glossospasm	تشنج اللسان	stenocortaphia	تضييق الصدغ
paraspasm	تشنج متناظر	craniostenosis	تضييق القحف
cystospasm	تشنج المثانة	lemostenosis	تضييق المريء
entasia	تشنج مُضَيِّق	constriction	تضييق
idiospasm	تشنج موضِع	iatric	طبيبي
algospasm	تشنج مؤلم	iatrogenic	طبيبي المنشأ
myelospasm	تشنج نخاعي	development	تطور
prosopospasm	تشنج الوجه	mnemonics	تطوير الذاكرة
spasmodic; spastic	تشنجي	fatigue	تعب
cheirospasm	تشنج اليد	expression	تعبير
abnormality; deformity; dysmorphosis; malformation	تشوه	acceleration	تسجيل
polydyspondylism	تشوه الفقرات المتعدد	polyalgnesia	تعدد التالم
senescence	تشيخ	polyesthesia; polysensitivity	تعدد التحسس
decussation	تصالب	microgynia; micropolygyria	تعدد التلافيف الصغرية
chiasm; chiasma	تصالبة	apraxia; parectropia	تعذر الاداء
conduct	تصرف	hemipraxis	تعذر الاداء الشقي
cyclocephaly; cyclopia	تصقلب الرأس	neurapraxis	تعذر الاداء العصبي
sclerosis	تصلب	achalasia	تعذر الارتخاء
cerebrosclerosis; encephalosclerosis	تصلب دماغي	adiaphoria	تعذر الاستجابة
neuroclerosis	تصلب عصبي	parasomnia	تعذر الاستجابية
atherosclerosis	تصلب عصيدي	amimia	تعذر الإيماء
mysclerosis	تصلب عضلي	asynergy	تعذر التآزر
craniosclerosis	تصلب القحف	alexithymia	تعذر التعبير العاطفي
myelosclerosis	تصلب النخاع	adiadochocinesia; adiadochokinesia	تعذر تناوب الحركات
acrosclerosis	تصلب النهايات	akathisia; cathisophobia	تعذر الجلوس
mannerism	تصنع	akinesia; akinesis	تعذر الحركة
phonation	تصويت	akinesia algera	تعذر الحركة الالمي
angiography	تصوير الاوعية	akinesia amnestica	تعذر الحركة النساوي
pneumoventriculography	تصوير البطينات الغازي	acalculia	تعذر الحساب
scanography	تصوير تقريسي	acoria	تعذر الشبع
peridurography	تصوير حول الجافية	acrasia	تعذر ضبط النفس
perimyelography	تصوير حول النخاع	akatamathesia	تعذر الفهم
encephalography	تصوير الدماغ	akatanoesis	تعذر فهم الذات
pneumencephalography	تصوير الدماغ الغازي	alexia; aphemesthesia; typhlolexia	تعذر القراءة
pneumoencephalomyelography	تصوير الدماغ والنخاع الغازي	aphonogelia	تعذر القهقهة
acrocephalography	تصوير سنام الرأس	agraphia	تعذر الكتابة
neuroroentgenography	تصوير شعاعي عصبي	abasia	تعذر المشي
cisternography	تصوير الصهريج	anarthria	تعذر النطق
pneumography	تصوير غازي	ananastasia; astasia	تعذر الوقوف
		ephidrosis	تعرق

diaphoresis	تعرق غزير	psychocatharsis	تفريغ فكري
reinforcement	تعزير	psychocatharsis	تفريغ نفسي
innervation	تعصيب	oneiroscopy	تفسير الأحلام
organization	تعضي	activation	تفعيل
deafferentation	تعطيل الوارد	telergy	تفعيل بعادي
craniosynostosis	تعظم الدروز الباكر	decomposition	تفكك
craniosstosis	تعظم الدروز الخلقي	intellectualization; thinking	تفكير
sarcostosis	تعظم العضل	miosis; myosis	تقبض الحدقة
mentation	تعقل	progression	تقدم
learning	تعلم	progressive	تقدمي
hypnopedi	تعلم نومي	dosage	تقدير الجرعات
abeyance	تعلق	occipitalization	تقلد
insenescence	تعمير	etat vermoulu	تقرح سطح الدماغ
handicap	تعوق	myogelosis	تقس عضلي
retardation	تعويق	decortication	تقشير
identification	تعيين الهوية	hemidecortication	تقشير نصف المخ
neurotrophic	تغذوي عصبي	sectio	تقطيعة
myotrophic	تغذوي عضلي	contracture	تقفع
biofeedback	تغذية حيوية راجعة	acrocontracture	تقفع الطرف
feedback	تغذية راجعة	acromyotonia	تقفع نهايات الأطراف
neurotrophy	تغذية عصبية	pessimum	تقلص ثلوي
feed-forward	تغذية مسيرة	myoseism	تقلص عضلي نقضي
myotrophy	تغذي العضل	anodal closure contraction	تقلص الفلق المصعدي
alienation	تغرب	anodal opening contraction	تقلص الفتح المصعدي
dendrite; dendron; neurodendrite; neurodendron	تغصن	electrocontractility	تقلصية كهربية
dendric; dendritic	تغصني	lability	تقلقل
hypnolepsy; narcolepsy	تغفيق	empathy	تقمص عاطفي
sympatheticotonia; sympathicotonia	تغلب الودي	psychotechnics	تقنيات نفسية
poikilothermy	تغير الحرارة	hematomyelopore	تقني الخاخ النزفي
paraphonia	تغير الصوت	emprosthotos	تقوس امامي
poikilothymia	تغير المزاج	catabolism	تقويض
clouding	تغييم	maturation	تقيح
obnubilation	تغييم الوعي	encephalopyosis	تقيح الدماغ
dissociation	تفارق	spondylopyosis	تقيح الفقار
ego-dystonic	تفارق الذات	integration	تكامل
reaction	تفاعل	gliomatosis	تكثر الدبق
anisopia	تفاوت الإبصار	aggregation	تكسس
anisometropia	تفاوت الانكسار	palikinesia	تكرارية الحركة
anisoaccommodation	تفاوت التكيف	palingraphia	تكرارية الكتابة
anisocoria	تفاوت الحدقتين	palinphrasia	تكرارية الكلام
aniseikonia	تفاوت الصورتين	catalogia	تكرارية اللفظ
neurocladism; odogenesis	تفرع عصبي	tetanus; tetany	تكزز
neuromodulation	تفريغ عصبي	pseudotetanus	تكزز كاذب
scanning	تفريس	tetanzation	تكزير
scan	تفريسة	risus	تكشيرة
scintiscan	تفريسة ومضانية	sardonic	تكشيرة تشنجية
discharge	تفريغ	sleep talking; somniloquism	تكلم نومي
afterdischarge	تفريغ ثلوي	agitallalia; agitophasia	تكلم هرولي

cavitation; porosis	تكهف	myomalacia	تلين العضل
syringobulbia	تكهف البصلة	spondylomalacia	تلين الفقار
pontobulbia	تكهف البصلة والجسر	craniomalacia	تلين القحف
syringopontia	تكهف الجسر	myelomalacia	تلين النخاع
porencephaly; syringoencephalia	تكهف الدماغ	malinering; pathomimesis; pathomimia;	تعارض
porencephalitis	تكهف الدماغ الالتهابي	pathomimicry	
syringoencephalomyelia	تكهف الدماغ والنخاع	mussitation	تمتمة
syringomyelus	تكهف قناة النخاع	psychodrama	تمثيل نفسي
syringomyelia	تكهف النخاع	myotasis	تمدد العضل
gestalt	تكون إدراكي	extension	تمديد
neurogenesis	تكون العصب	neurectasia	تمديد العصب
neurulation	تكون العصبية	laceration	تمزق
myelination	تكون الميالين	neurotmesis	تمزق الأعصاب
myelinogeny	تكون الميالين العصبي	neuragmia	تمزق الجذع العصبي
myelination	تكون النخاعين	myorrhesis	تمزق العضل
myomagenesis	تكون الورم العضلي	endoneurolysis	تمشيط ألياف العصب
gestaltism	تكونية إدراكية	hersage	تمشيط العصب
reaction-formation	تكوين الاستجابة	restlessness; unrest	تلمل
accommodation	تكيف	myokymia; neuromyotonia	تموج عضلي
conditioning	تكييف	discrimination	تمييز
bathmotropism	تكييف الاستثارية	coordination	تناسق
disintegration	تلاشي	dissonance	تناقض
adaptation	تلازم	myelogeny	تناضح الميالين
scopophilia	تلاذد جنسي بالمراقبة	antipathy	تناكر
pyrolagnia	تلاذد جنسي بالنيران	development	تنامي
psycholagny	تلاذد جنسي نفسي	myelogenesis	تنامي الجهاز العصبي
choreophrasia	تلفظ رقصي	psychogenesis	تنامي نفسي
idioglossia	تلفظ معيب	diadochokinesia	تناوبية الحركات
convclution; gyrus	تلفيف	olfactism	تنبه شمعي
microgyrus	تلفيف صغير	stimulation	تنبيه
fabrication	تلفيق	myelinogenesis	تنخع
automatic; spontaneous	تلقائي	ulegyria	تندب التلافيف
automatism; telergy	تلقائية	coordination	تنسيق
biofeedkack	تلقيم حيوي راجع	activation	تنشيط
lag	تلكؤ	remotivation	تنشيط الحوافز
groove; streak; sulcus	تم	encephaloscopy	تنظير الدماغ
stain	تلون	retinoscopy	تنظير الشبكية
afterloaded	تلوية التحميل	ophthalmoscopy	تنظير العين
staining	تلوين	funduscopy	تنظير قاع العين
myofibrosis	تليف عضلي	cranoscopy	تنظير القحف
neuromalacia; neuromalakia	تلين الأعصاب	craniotonomoscopy	تنظير القحف التسمعي
softening	تلين بفقر الدم	organization; regulation	تنظيم
cerebromalacia; encephalodialysis;	تلين الدماغ	abreaction	تنفيس
encephalomalacia; necrencephalus		autocatharsis	تنفيس ذاتي
meningomalacia	تلين السحايا	degeneration	تنكس
tephromalacia	تلين السنجابية	myodemia	تنكس شمعي عضلي
		myocerosis; myokerosis	تنكس عضلي شمعي
		myeleterosis	تنكس النخاع

heredodegeneration	تنكس وراثي	disorientation	توهان
degenerative	تنكسي	chronotaxaxis	توهان زمني
degeneracy	تنكسية	delusion	توهم
fornication; numbness	تمل	autosomatognosis	توهم بقاء المبتور
narcohypnia	تمل الاستيقاظ	necromimesis	توهم الموت
acroparesthesia	تمل الأطراف المؤلم	current	تيار
hypnosis; hypnotization	تنويم	aftercurrent	تيار تلوي
hypnotism; mesmerism	تنويم إيحائي	facilitation	تيسير
narcohypnosis	تنويم تخديري	arousal; vigilance	تيقظ
autohypnosis	تنويم الذات	labyrinth	تبه
idlihypnotism	تنويم ذاتي		
parahypnosis	تنويم شاذ		
electrosleep	تنويم كهربى	mecystasis	ثبات التوتر
laceration	تهتك	homeothermy	ثبات الحرارة
sedation	تهدئة	metrostasis	ثبات الطول
psychosedation	تهدئة نفسية	pachycephalia	ثخن الرأس
cytoarchitecture	تهندس خلوي	baryphonia	ثخن الصوت
irritation	تهيج	pachycephalic	ثخين الرأس
arousal	تهيج جنسي	dysplasia	ثدن
meningism; meningismus	تهيج سحائي	mastoid	ثديي
Irritation	تهيج	rhinorrhea	ثر أنفي
sympathy	تواد	catalogia; lalorrhea; logorrhea	ثرثرة
equilibrium	توازن	meningorrhea	ثر سحائي
dactylology	تواصل بإشارات اليد	graphorrhea	ثر كتابي
tension; tone; tonus	توتر	clavus hystericus	ثفن هستيري
orthotonos	توتر انتصابي	callosal	ثفني
myotone	توتر عضلي	puncture	ثقب
anelectrotonus	توتر مصعدي	foramen	الثقبة
catelectrotonus	توتر مهبطي	helicotrema	ثقب القوقعة
holotonia	توترية شاملة	barylalia	ثقل التلفظ
tonoclonic	توتري رمعي	bradyacusia	ثقل السمع
apprehension	توجس	baryglossia	ثقل الكلام
neurotropism; neurotropy	توجه عصبي	bradyarthria; bradylalia; bradyphasia	ثقل النطق
stereotropism	توجه لمسي	trineural	ثلاثي الأعصاب
vagotropism	توجه مبهمي	trifacial; trigeminal	ثلاثي التوائم
dromotropism	توجيه التوصيل	incisura; notch	ثلعة
blush	تورّد	lallation	ثمعة
oncoma	تورم	bicoronal	ثنائي الإكليل
mydriasis	توسع الحدقة	dualism	ثنائية
cheirognosis	توسم اليد	bisexuality	ثنائية الصفات الجنسية
craniography	توصيف القحف	ambisexual; ambosexual; bisexual	ثنائي صفات جنسية
conduction	توصيل	dualism	ثنوية
localization	توضع	flexion; flexion	ثني
lateroposition	توضع جانبي	dactylocampsodynia	ثني الأصابع المؤلم
heterotopia	توضع مغاير	flexure; fold; plica	ثنية
myogenesis	تولد عضلي		
algogenesis	توليد الألم		
erotogenesis	توليد الشبق		

dura	جافية	dermoid	جلداني
catatonia	جامود	psychocutaneous	جلدي نفسي
laterality	جانبية	coition; copulation; coitus	جماع
delinquent	جانيح	esthetic	جمالي
spongioplasm	جيلة إسفنجية	cranium; skull	الجمجمة
neuropasm	جيلة عصبية	catalepsy; cataplexi	جمدة
axoplasm	جيلة المحوار	cataplectic	جمدي
forehead	جبهة	cataleptiform	جمدي الشكل
exophthalmos; proptosis	جحوظ	summation	جمع
ophthalmocoele; ophthalmoptosis	جحوظ العين	system	جملة
parietal	جداري	ala	الجناح
leprosy	جذام	sexuality	جنسانية
radix; root	جذر	psychosexual	جنسي نفسي
radiculomedullary	جذري نخاعي	scoliosis	جنف
truncus; trunk	الجدع	kyphoscoliosis	جنف حدابي
brainstem	جذع الدماغ	rachioscoliosis	جنف السيساء
neurosurgeon	جراح الاعصاب	homosexual	جنوسي
surgery	جراحة	homoeroticism; homosexuality	جنوسية
neurosurgery	جراحة الاعصاب	insanity; lunacy; madness	جنون
microneurosurgery	جراحة الاعصاب المجهرية	paraneural	جنيب العصب
stereotaxy	جراحة توضعية	system; systema	جهاز
cryosurgery	جراحة قرية	sympathicus	الجهاز العصبي الودي
psychosurgery	جراحة نفسية	orthosympathetic	الجهاز الودي
dose; dosis	جرعة	potential	جهد
pars	جزء	afterpotential	جهد تلاوي
insula	الجزيرة	neuropotential	جهد عصبي
somatic	جسدي	action potential	جهد الفعل
somaticovisceral	جسدي حشري	lacuna	الجوية
somatopsychic	جسدي نفسياني	carina	جؤجؤ
pons	الجسر	cavitas; cavity	الجوف
pons- oblongata	الجسر والبصلة	pseudocoele; pseudocoele	جوف الحاجز الشفاف
pontile; pontine	جسري	encephalocoele	جوف الدماغ
pontobulbar; pontomedullary	جسري بصلي	encephalocoele	جوف القحف
pontomesencephalic	جسري دماغي متوسطي	thalamococle	جوف المهاد
pontopeduncular	جسري سويقي	principle	جوهر
pontocerebellar	جسري مخيخي	sinus	جيب
body; corpus	جسم		
corpora bigemina	الجسمان التوأمين		
callosum	الجسم الثفني	barrier	حائل
epiphysis cerebri	الجسم الصنوبري	blood-brainbarrier	حائل دموي دماغي
neurosoma; perikaryon	جسم العصبون	septum	حاجز
striatum	الجسم المخطط	acute	حاد
neostriatum	الجسم المخطط الحديث	accident	حادثة
antibody	جسم مضاد	hypermnestic	حاد الذاكرة
corpuscle; corpusculum	جسيم	sense	حاسة
gliosome	جسيم دقيقي	quotient	حاصل
neurosoma	جسيم عصبي	intelligencequotient	حاصل الذكاء
neurodermatitis	جلاد عصبي	margo	حافة

(ح)



motive	حافز	leiodystonia	حثل العضلات الملساء
state; status	حالة	myodystrophy	حثل عضلي
etadysmyelinique	حالة اختلال تكون الميالين	leukodystrophy	حثل المادة البيضاء
spasmodysant	حَالُ التشنج	facioscapulothoracodystrophy	حثل وجهي كتفي عضدي
pinealism	حالة صنوبرية	diaphragmasellae	حجاب السرج
myautonomy	حالة عضلية ذاتية	phrenic	حجابي
pituitarism	حالة نخامية	orbit	حجاج
neurocytolysin	حَالُ الخلايا العصبية	orbitotemporal	حجاجي صدغي
neurolysin; neurolytic	حَالُ العصب	cranioclasty; craniotomy	حج القحف
cholinolytic	حَالُ الكولين	kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosis	حداب
parasympatholytic	حَالُ لاودي	gibbus; tuber	حدبة
nicotinolytic	حَالُ النيكوتين	hypermnnesia	حدة الذاكرة
sympathicolytic; sympatholytic	حَالُ الودي	hypergeusethesia; hypergeusia	حدة الذوق
pedophilia	حب الأطفال	hyperacusis	حدة السمع
claustromania	حب الانغلاق	juvenile	حدث
aphasia	حبسة	process	حدث
logamnesia	حبسة إدراكية	declive	حدرة
lethologica	حبسة اسمية	liminal	حذي
asyndesis	حبسة الترابط	clava; tuberculum	حديثة
dysnomia; paranomia; paraphasia;	حبسة التسمية	clava	حديثة النواة الناحلة
paraphrasia		myothermic	حراري عضلي
aphthongia	حبسة تصويتية	causalgia; thermalgesia	حُرَاق
logaphasia	حبسة تعبيرية	mobility	حراك
ataxaphasia; ataxiaphasia	حبسة تكوين الجمل	cinclisis	حركات ترددية سريعة
aphrasia	حبسة الجمل	movement	حركة
alliteration	حبسة جناسية	aftermovement	حركة تلوينة
asemasia	حبسة دلالية	nervimotion	حركة عصبية التنبيه
jargonaphasia	حبسة راطنة	ideomotion	حركة فكرية التحفيز
logokoposis	حبسة سمعية	synkinesia; synkinesis	حركة مترابطة
aculalia; agrammaphasia	حبسة عبارية	allokinesia; allokinesis	حركة مرآتية
logasthenia	حبسة الفهم	centrocinesia; kentrokinesis	حركة مركزية التنبيه
alexia	حبسة القراءة	motor	حركي
logagraphia	حبسة كتابية	optokinetic	حركي بصري
logagnosia; paraphemia	حبسة كلامية	archeokinetic	حركية بدائية
agrammatism; agrammatologia	حبسة لغوية	neokinetic	حركية حديثة
asyllabia	حبسة المقاطع	sensomobility	حركية حسية
tonaphasia	حبسة موسيقية	psychokinesis	حركية نفسية
agrammatica; agrammatism	حبسة نحوية	psychokinesia	حركية نفسية المنشأ
acataphasia	حبسة نطقية	viscerimotor	حركي حشوي
tonaphasia	حبسة نغمية	oculocephalogyric	حركي رأسي بصري
gerophilia	حب الشيوخ	ideokinetic; ideomotor	حركي فكري التحفيز
cord; funiculus	حبل	paleokinetic	حركي قديم
cephalochord	حبل ظهري رأسي	algiomotor	حركي مؤلم
granulation	حببية	deprivation	حرمان
determinism	حتمية	cingulum	حزام
dystrophy	حثل	bundle; fascicle; fasciculus	حزمة
poliodystrophy; poliodystrophy	حثل السنجابية	fascicular	حزمي
hemidystrophy	حثل شقي	esthesia; sensation; sensibility	حس

optesthesia	حس الإبصار	baresthesia; baryesthesia	حس الوزن
graphesthesia	حس الأخطيط	esthetic; esthetic; sensory	حسي
sensible; sensitive	حساس	visuosensory	حسي إبصاري
rachisensible	حساس للتخدير النخاعي	sensorimotor	حسي حركي
pressoreceptive; pressosensitive	حساس للضغط	myotactic	حسي عضلي عميق
sensibility; sensitivity	حساسية	psychosensory	حسي نفسي
rachisensibility	حساسية للتخدير النخاعي	sensorivascular	حسي وعائي
cenesthesiopathy	حس الاعتلال	visceral	حشوي
algesthesia; algesthesia	حس الألم	visceroparietal	حشوي جداري
pallesthesia; palmaresthesia	حس اللمس	viscerosomatic	حشوي جسدي
psychroesthesia	حس البرد	visceroskeletal	حشوي هيكلية
telesthesia	حس بعادي	cannabis; marijuana	حشيش
acanthesthesia	حس التشوك	encephalolith	حصاة الدماغ
macroesthesia	حس تضخيمي	blockade	حصار
dedolation	حس التكم	hippocampus	الحصين
afterimpression; altersensation	حس تلوي	fossa	حفرة
zonesthesia	حس التمنطق	field	حقل
topesthesia; topognosis	حس توضيع اللمس	injection	حقن
somesthesia; somesthesia	حس الجسد	itching	حكة
thermesthesia; thermoesthesia	حس الحرارة	herpes	حلا
isothermognosis	حس حراري إسوي	spasmodic	حلّ التشنج
graphokinesia	حس حركات الكتابة	neurolysis	حلّ العصب
glossokinesia	حس حركة اللسان	dream	حلم
kinesthesia; kinesthesia	حس حركي	papilla	حلمة
splanchnesthesia; viscerosensory	حس حشوي	papilla	حليمة
anacesthesia	حس الحوم	neurothele	حليمة عصبية
gargalesia	حس الدغغة	fever	حمى
panesthesia	حس شامل	rubrothalamic	حمراوي مهادي
trichesthesia; trichesthesia	حس شعري	rubrospinal	حمراوي نخاعي
osmesthesia; rhinesthesia	حس الشم	gaze	حملقة
baresthesia; pieesthesia	حس الضغط	talipes	حنف
pseudophotoesthesia	حس ضوئي كاذب	clubfoot	حنف القدم
synchiria	حس عيوري	clubhand	حنف اليد
myesthesia	حس عضلي	pial	حنون
simesthesia	حس عظمي	pia-glia	الحنون الدبقية
bathesthesia; bathesthesia; proprioception	حس عميق	pia-arachnoid	الحنون العنكبوتية
paleosensation	حس قديم	limbic	حوفي
pseudesthesia; pseudoesthesia	حس كاذب	perimedullary	خَوَل البصلة
graphesthesia	حس الكتابة على الجلد	pericallosal	حول الثفني
pselaphesia; thigmesthesia	حس اللمس	peridural	حول الجافية
psychochromesthesia	حس لوني نفسي	perigial	حول الدبقي
cenesthesia	حس مشترك	pericephalic	حول الرأس
synesthesialgia	حس مشترك مؤلم	perineural	حول العصب
arthresthesia	حس مفصلي	anisophoria	خَوَل متفاوت
allochiria	حس مقابل للتوضع	periaxonal	خَوَل المحوار
synesthesia	حس مواكب	periaqueductal	خَوَل المسال
allesthesia; alloesthesia; alloesthesia	حس نازح	vesicle	حويصلة
pseudopolymelia	حس النهايات الكاذب	space	حين



dysautonomia	خلل التلقائية	astrocyte	خلية نجمية
dysergia	خلل التناسق الحركي	pituicyte	خلية نخامية
dyssymmetry	خلل التناظر	fimbria	خمل
myelateia	خلل تنامي النخاع	depression	خمود
disdiadochokinesia;	خلل تناوبية الحركات	apathism; apathy	خمول
dysdiadochokinesia		hermaphrodite; intersex	خنثى
dysplasia	خلل التنسج	rhinolalia	خنخنة
encephalodysplasia	خلل تنسج الدماغ	gynandria; gynandrim; hermaphroditism	خنوثة
myeloradiculodysplasia	خلل تنسج النخاع والجذور	enophthalmos	خوص
myelodysplasia	خلل التنسج النخاعي	fear	خوف
disequilibrium	خلل التوازن	suture	خيطة
dystonia	خلل التوتر	phantasm	خيال
dysmyotonia; myodystonia	خلل التوتر العضلي	frustration	خيبة
dystopia	خلل التوضع	filament; filum; suture	خيظ
dyschiasia	خلل توضع الإحساس	neurofilament	خيظ عصبي
dyschiria	خلل توضع المنبه	myofilament	خيظ عضلي
dyskinesia	خلل الحركة	tentorium	خيمة
dyscalculia	خلل الحسابية		
dysmnasia	خلل الذاكرة		
dysgeusia	خلل الذوق	disease; sickness	داء
dysraphia	خلل الرفاء	xanthomatosis	داء الأورام الصفرة المنتشرة
dysacusia	خلل السمع	paramyotonia	داء التشنج العضلي التوتري
dysosmia	خلل الشم	sarcoidosis	داء ساركويد
dysorexia	خلل الشهية	gargoylism	داء عديد السكريد المخاطي
paraphora	خلل عقلي	hydrophobia	داء الكلب
dystectia	خلل غلق السقف	paralyssa	داء الكلب الشللي
dysanagnosia; dyslexia	خلل القراءة	cysticercosis	داء الكيساتيات المعدنية
dysmetria	خلل القياس	meningococcosis	داء المكورات السحائية
dysgraphia	خلل الكتابة	analgesia; panaris	داحس مخدر
dysphasia	خلل الكلام	intradural	داخل الجافية
dysaphia	خلل اللمس	interoceptive	دلخلي الاستقبال
dysgnosia	خلل معرفي	interofective	داخلي التنبيه
dyslogia	خلل المنطق	circuit	دارة
dysreflexia	خلل المنعكسات	motivation; motive	دافع
allolalia; dyslalia; dysphrasia; lalopathy	خلل النطق	circle	دائرة
dysrhythmia	خلل النظم	gliosis	دُباق
dysfunction; malfunction	خلل وظيفي	microgliomatosis	دباق صفري
cell; cellula	خلية	telogia	دبق انتهائي
spongocyte	خلية اسفنجية	microglia	دبق صفري
ependymocyte	خلية البطانة العصبية	glia; neuroglia	دبق عصبي
microgliocyte	خلية دقيقة	macroglia	دبق عصبي كبدي
microgliocyte	خلية دقيقة صفرية	myoglia; sarcoglia	دبق عضلي
gliocyte; gliocyte; neurogliocyte	خلية دقيقة عصبية	inoglia	دبق ليفي
meningocyte	خلية سحائية	astroglia	دبق النجميات
myophage	خلية عائية عضلية	oligodendroglia; oligoglia	دبقيات قليلة التغصن
neurocyte	خلية عصبية	mesoglia	دبقية صفرية
myocyte	خلية عضلية	mesoglia	دبقية قليلة التغصن
amacrine cell	خلية لا محوارية	neuroglial	دبقي عصبي

(د)

empyema	دبيلة	cycle	دورة
sutura	درز	cycloid; cyclothymic	دوروي المزاج
decibel	دسيبل	periodic	دوري
licking	دغدغة	subconscious	دون الشعور
impulse	دفعة	myodynamics	ديناميكا العضلات
ejaculation	دقق	psychodynamics	ديناميكا نفسية
epicritic	دقيق التعيين	neurodynamic	ديناميكي عصبي
brain; cerebrum; encephalon	دماغ		
encephalosis	دُمَاج	(ذ)	
endbrain; telencephalon	دماغ انتهائي	autistic	ذاتوي
cerebroid; encephaloid	دماغاني	autism	ذاتوية
marrowbrain; metepencephalon;	دماغ بصلي	autonomic	ذاتي
myelencephalon		idiotropic	ذاتي التركيز
betweenbrain; diencephalon; tween-brain	دماغ بيني	idiotrophic	ذاتي التغذية
alterbrain; epecephalon; metapsyche;	دماغ تال	memory	ذاكرة
metencephalon		mnemic; mnemonic	ذاكري
neencephalon; neoencephalon	دماغ حديث	narcose	ذاهل
nosebrain; rhinencephalon	دماغ شمعي	oscillation	ذبذبة
oligoencephalon	دماغ صغير	tabification	ذبول
megalancephalon	دماغ ضخم	fastigium	ذروة البطنين
ophthalmencephalon	دماغ عيني	terror	ذعر
paleencephalon; paleoencephalon	دماغ قديم	mental	ذقني
hindbrain	دماغ مؤخر	intelligence	ذكاء
mesencephal; mesocephalon; midbrain	دماغ متوسط	masculinity	ذكورة
forebrain; proencephalon; prosencephalon	دماغ مقدم	cauda	ذنب
thalamencephalon	دماغ مهادي	neuropsychosis; psychosis	ذهان
cerebral; encephalic	دماغي	psychoses	ذهانات
myelencephalospinal	دماغي بصلي نخاعي	alopsychosis	ذهان إدراكي
cerebromacular	دماغي بقعي	pharmacopsychosis	ذهان الادوية
cerebromeningeal	دماغي سحائي	paraphrenia	ذهان تخيلي
cerebriform	دماغي الشكل	somatopsychosis	ذهان جسدي
cerebrocardiac	دماغي قلبي	parergasia	ذهان فصامي
mesencephalohypophyseal	دماغي متوسطي نخامي	pseudopsychosis	ذهان كاذب
cerebromedullary; cerebrorachidian;	دماغي نخاعي	paranoia	ذهان كبريائي
cerebrospinal; encephalorachidian; encephalospinal		pathopsychosis	ذهان مرضي
plagiocephaly	دنج	psychotic	ذهاني
cachexia	دنف	psychedelic	ذهاني الاعراض
drug	دواء	psychedelic; psychodelic	ذهاني التأثير
psychopharmacology	الدوائيات النفسانية	intellect	ذهن
vertigo	دوار	apsychosis; stupor	ذهول
vertiginous	دواري	dicephalous	ذو رأسين
neurovaricose	دوالي عصبية	ganglionated	ذو عقد
dizziness; giddiness	دوام	binocular	ذو عينيّتين
scotodinia	دوام عتمي	gustation; taste	ذوق
dizziness; giddiness	دوخة	bipolar	ذو قطبين
vermis	دودة	pseudogeusesthesia	ذوق كاذب
period	دور	parageusia	ذوق كرميه
oculogyration	دوران العقلة	gustatism	ذوق محرض

pseudogeusia	ذوق مغلوط	flaccid; pia	رخو
phantogeusia	ذوق وهمي	recess; recessus	ردب
gustatory	ذوقي	culdesac	ردبة
neurotoxin	ذيفان عصبي	reaction	ردّ الفعل
		carpopedal	رسمفي قدمي
		maturity	رشد
		volley	رشقة
		lead	رصاص
kakosmia	رائحة كريهة	neurogram	رصيد الخبرة العصبية
duraplasty	راب الجافية	contusion	رض
heteroganglionic	رابط العقد	trauma	رضح
neuroplasty	راب العصب	neurotrauma; neurotrosis	رضح عصبي
myoplasty	راب عضلي	patella	رضفة
myotendonoplasty	راب عضلي وتري	tremble; tremor	رعاش
myringoplasty	راب غشاء الطبل	hemitremor	رعاش شقي
cranioplasty	راب القحف	amyostasia	رعاش العضل
internode	راجبة	tremulous	رعاشي
recurrent	راجع	pavor; terror	رعب
collateral	رادف	rigor; shiver	رعدة
nystagmus; nystaxis; talantropia	رأارة	sunstroke	رعن
pseudonystagmus	رأارة الوضع الأخير	nosophilia	رغبة بالمرض
nystagmic	رأري	aphrodisia; libido	رغبة جنسية
caput	رأس	raphe	رفاء
scaphocephaly; tectocephaly	رأس زورقي	palpebration	رف الأجفان
plagiocephaly	رأس وارب	winking	رفة
cephalic	راسي	ciliosis; nictation; nictitation	رف الجفن
cephalad	راسيا	meningeorrhaphy	رفو السحايا
cephalocaudal	راسي ذنبي	neurorrhaphy; neurosuture	رفو العصب
tremulous	راعش	myorrhaphy; myosuture	رفو العضل
lancinating	رامح	myocardiorrhaphy	رفو عضلة القلب
code	راموز	collum; neck	رقبة
vision	رؤية	cervical	رقبي
aftervision	رؤية تلوية	chorea	رقص
chromatopsia	رؤية ملونة	monochorea	رقص أحادي
aprosody; hypoprosody	رتابة الكلام	choreoid	رقصاني
dysarthria	رتبة	hemichorea	رقص شقي
mogiathria	رتة عضلية المنشأ	pseudochorea	رقص كاذب
atresia	رتق	chorea; choreatic; choreic	رقصي
recurrence	رجعة	choreiform	رقصي الشكل
meningorecurrence	رجعة سحائية	choreoathetosis	رقصي كنعي
contrecoup	رجع الضربة	genu; knee	ركبة
fibrillation	رجفان	geniculum	ركيبة
retrograde	رجوعي	symbolism	رمزية
virile	رجولي	nictation; saccade	رمش
virility	رجولية	saccadic	رمشية
viscerotonia	رخاء العيش	clonus	رمع
flaccidity	رخاوة	polymyoclonus	رمع العضلات
rachitis	رخد	myoclonia; myoclonus	رمع عضلي
rachitic	رخدي		

myospasia; paramyoclonus	رمع عضلي متعدد	genophobia	رهاب الجنس
ankleclonus	رمع الكاحل	acarophobia	رهاب الحلم
pseudoclonus	رمع كاذب	zoophobia	رهاب الحيوانات
logclonia; logoklony	رمع الكلام	amychophobia	رهاب الخدش
clonic	رمعي	hematophobia	رهاب الدم
clonicotonic	رمعي توتري	atephobia	رهاب الدمار
acervulus	رمل الدماغ	androphobia	رهاب الذكور
amyotaxia; ataxia; ataxy	رنح	brontophobia	رهاب الرعد
dystaxia	رنح جزئي	phobophobia	رهاب الرهاب
proximoataxia	رنح دان	anemophobia	رهاب الريح
hemiataxia	رنح شقي	chronophobia	رهاب الزمن
ataxiophemia; ataxophemia	رنح عضلات النطق	syphilophobia	رهاب الزهري
diataxia	رنح مزدوج	anthophobia	رهاب الزهور
psychataxia	رنح نفسي	herpetophobia	رهاب الزواحف
heredoataxia	رنح وراثي	agoraphobia; agyophobia	رهاب الساح
ataxiodynamia; ataxodynamia	رنح وراثي	carcinomatophobia; carcinophobia	رهاب السرطان
atactic; ataxic	رنحي	cleptophobia	رهاب السرقة
atactiform	رنحي الشكل	climacophobia	رهاب السلالم
ataxiamnesic	رنحي نسائي	onomatophobia	رهاب سماع الكلمات
phobia	رهاب	basiphobia; basophobia	رهاب السير
erythrophobia	رهاب الأحمر	panophobia; panphobia; pantophobia	رهاب شامل
pharmacophobia	رهاب الأدوية	dipsophobia	رهاب الشراب
ochlophobia	رهاب الازدحام	demonophobia	رهاب الشياطين
odontophobia	رهاب الأسنان	gerophobia	رهاب الشيخوخة
radiophobia	رهاب الإشعاع	gerophobia	رهاب الشيخوخة
phonophobia	رهاب الأصوات	astraphobia	رهاب الصواعق
ataxiophobia; ataxophobia	رهاب الاضطراب	acousticophobia	رهاب الصوت
pedophobia	رهاب الأطفال	phengophobia; photophobia	رهاب الضوء
phagophobia; sitophobia	رهاب الأكل	cibophobia	رهاب الطعام
carriophobia	رهاب أكل اللحم	achluophobia; noctiphobia; nyctophobia;	رهاب الظلام
alophobia	رهاب الألم	scotophobia	
coprostasophobia	رهاب الإمساك	dromophobia	رهاب العبور
cherophobia	رهاب الانشراح	amaxophobia	رهاب الغرائب
claustrophobia; cleisiophobia; clithrophobia	رهاب الانغلاق	erotophobia	رهاب العشق
autophobia	رهاب الانفراد	bathophobia	رهاب العمق
coprophobia	رهاب البراز	ergasiophobia	رهاب العمل
paraphobia	رهاب بسيط	arachnophobia; arachnophobia	رهاب العناكب
parthenophobia	رهاب البنات	amathophobia	رهاب الغبار
urophobia	رهاب التبول	ballistophobia	رهاب القذائف
toxicophobia	رهاب التسمم	automyophobia; mysophobia	رهاب القذارة
dysmorphophobia	رهاب التشوه	ankylophobia	رهاب القسط
scopophobia	رهاب التعرض	graphophobia	رهاب الكتابة
nudophobia	رهاب التعري	dipsophobia	رهاب الكحول
ideophobia	رهاب التفكير	mythophobia	رهاب الكذب
mythophobia	رهاب التهويل	cynophobia	رهاب الكلاب
dermatophobia	رهاب الجلد	lalophobia	رهاب الكلام
kathisophobia	رهاب الجلوس	lyssophobia	رهاب الكلب
coitophobia	رهاب الجماع	aphephobia; haphephobia; algophobia	رهاب اللمس

aquaphobia; hydrophobia	رهاب الماء	somnambulist	سائر نومي
polyphobia	رهاب متعدد	neurolymph	سائل دماغي نخاعي
anthrophobia	رهاب المجتمعات	field	ساحة
tocophobia	رهاب المخاض	sadist	سادى
acrophobia	رهاب المرتفعات	sadism	سادية
nosophobia; pathophobia	رهاب المرض	sadomasochism	سادية مازوخية
aichmophobia	رهاب المستدقات	necrosadism	سادية الموتى
cremnophobia	رهاب المهاري	zoosadism	سادية نحو الحيوانات
thanatophobia	رهاب الموت	sarcoma	ساركومة
necrophobia	رهاب الميت	gliosarcoma; spongioblastoma;	ساركومة دبقية
astrophobia	رهاب النجوم	spongiocytoma	
gynophobia	رهاب النساء	neurosarcoma	ساركومة عصبية
hypnophobia	رهاب النوم	rhabdomyosarcoma	ساركومة العضل المخطط
pyrophobia	رهاب النيران	myosarcoma	ساركومة عضلية
aelurophobia; ailurophobia; elurophobia;	رهاب الهررة	leiomyosarcoma	ساركومة عضلية لمساء
galeophobia		crus	ساق
aerophobia	رهاب الهواء	neurotoxic	سام للعصب
eremophobia	رهاب الوحدة	myelinotoxic	سام للنخاعين
asthenophobia	رهاب الوهن	index	سبابة
photaugiaphobia	رهاب الوهيج	coma; exanimation	سبات
phobic	رهابي	narcoma	سبات تخدري
mantle	ريطة	agrypnocoma	سبات شهري
		comatose	سباتي
		hypnolepsy; narcolepsy	سبح
		pathway; tract; tractus	سبيل
		sodomy	سَبَّة
		sodomist	سَبِّه
		meninx	سحاة
		leptomeninx	سحاة رقيقة
		meningeal	سحائي
		meningoradicular	سحائي جذري
		meningocortical	سحائي قشري
		meningogenic	سحائي المنشأ
		meningorachidian	سحائي نخاعي
		myelophthisis	سحاف النخاع
		lesbianism; sapphism; tribadism	سحاق
		lesbian	سحاقية
		meninges	سحايا
		leptomeninges	سحايا رقيقة
		complexion	سحنة
		facies	سحنة
		indifference	سدر
		sodomist	سدومي
		sodomy	سدومية
		stroma	سدى
		myostroma	سدى العضل
		transmission	سراية
		navel	سُرَّة

(ز)

aberrant	زائغ
angle	زاوية
hirsutism	زيب
knob	زر
grafting	زرع الطعم
ballism	زفن
hemiballism	زفن شقي
chronaxie; chronaxy	زمنة
syphilis	زهري
neurosyphilis	زهري عصبي
myelosityphilis	زهري نخاعي
afterdepolarization	زوال الاستقطاب التلوي
desynchronization	زوال التزامن
myelinoclasia	زوال النخاعين
paranoia	زور
paranoid	زوراني
navicular	زورقي
olive	الزيتونة
olivopontocerebellar	زيتوني جسري مخيخي
aberration	زيغ

(س)

dominant	سائد
ambulant; ambulatory	سائر



ephippium; sellaturcica	سرج تركي	dystopia	سوء التوضع
encephaloid	سرطانة نخاعية	araphia	سوء الرفاء
cephaloma	سرطانة نخاعينية	normality	سواء
apokamnosis	سرعة التعب	orthophony	سواء النطق
stria	سطر	eupraxia	سوائية الاداء
amuck	سعار القتل	eugnosia	سوائية الإدراك
marasmus	سفل	eukinesia	سوائية الحركة
marasmatic	سفلي	eusitia	سوائية الشهية
scala	السقالة	eunoia	سوائية العقل
sickness	سقام	eusthenia	سوائية القوة
tectum	سقف	atrabiliary	سوداوي
tectospinal	سقفي نخاعي	melancholia; tristimania	سوداوية
tegmen	سقيف	hypomelancholia	سوداوية خفيفة
tegmenum	سقيفة	acedia	سوداوية خمولة
apoplexy; stroke	سكتة	nigrostriatal	سوداوي مخططي
pseudoapoplexy	سكتة كاذبة	exacerbation	سورة
apoplectic	سكتي	normal	سوي
drunkenness	سُكر	eupractic; eupraxis	سوي الاداء
sanity	سلامة العقل	eugnostic	سوي الإدراك
passivity	سلبية	orthodromic	سوي التوصيل
incontinence; incontinentia; overflow	سلس	eukinetic	سوي الحركة
enuresis	سلس البول	normergic	سوي العمل
chain	سلسلة	peduncle; stalk	سويقة
behavior	سلوك	caudexcerebri	سويقة المخ
behaviorism	سلوكية	pontibrachium	سويقة مخيخة متوسطة
neurobehavioral	سلوكي عصبي	orthochromatic	سوي اللون
sarcoplast	سليفة عضلية	dominance	سيادة
sympathogonia	سليفة ودية	ambulation	سير
clairaudience	سماع غيبي	noctambulation; sleepwalking;	سير نومي
sympathin	سمبائين	somnambulance; somnambulation; somnambulism	سيرنوميني الفعل
stigma	سمة	serotonergic	سيرير
pericranium	سمحاق القحف	ambulatory	سير يقظي
hearing	سمع	vigilambulism	سيرير نومي
psychoauditory	سمعي نفسي	noctambulic	السياساء
adiposity; obesity	سمنة	rachis; spine	سيساسي
neurotoxicity	سميّة عصبية	rachial; rachidial; rachidian	سيكلوباربيتال
myelinotoxicity	سميّة ميالينية	cyclobarbitol	سيكوباتولوجيا
age	سن	psychopathology	
cinereal	سنجابي		
ectocinerea	سنجابية خارجية		
Incus	السندان		
egersis; vigilance; wakefulness	سهاد	abnormal; acatastatic; deviant; erratic	شاذ
ahypnosis	سهار	gangliolytic; ganglionoplegic	شال عقدي
sagittal	سهمي	prominentia	شامخة
dystrophoneurosis	سوء التغذية العصابي	phantom	شبحي
dyscephaly	سوء تكون الجمجمة	satiety	شبع
maladjustment	سوء التلاؤم	eroticism; erotism; gynecomania; gynephilia;	شبق
maldevelopment	سوء التنامي	lagnesis; lagnosis; libido; satyriasis; satyromania	

(ش)

algolagnia	شبق المي	uncinate	شصي
alloeroticism; alloerotism	شبق خلافي	ecstasy	شطح
autoeroticism	شبق ذاتي	radiation	شع
psycholagny	شبق نفسي	hirsutism	شعرانية
erotic	شبعي	consciousness; esthesia	شعور
net; network	شبكة	amblyopia; diplopia	شفع
optomeninx	شبكة	fissure	شق
neuralgiform	شبيه الألم العصبي	postcentralis	شق خلف المركزي
tabetiform	شبيه التابس	hemicrania; megrim; migraine	شقيقة
myotonoid	شبيه التاطر العضلي	form	شكل
parapoplexy	شبيهة السكتة	alveushippocampi	شكوة الحصين
hypnoid	شبيه التنويم	palsy; paralysis	شلل
nystagmoid	شبيه الرأفة	monoplegia	شلل أحادي
apoplectiform	شبيه السكتة	acroparalysis	شلل الأطراف
paraplegiform	شبيه الشلل السفلي	pharyngoplegia	شلل البلعوم
neuroid	شبيه العصب	triplegia	شلل ثلاثي
myoid	شبيه العضل	phrenoplegia	شلل الحجاب
schizophreniform	شبيه الفصام	thermoplegia	شلل حراري
curariform	شبيه الكوراري	akinesia	شلل الحركة
arboromedullarisvermis;	شجرة الحياة المخيخية	laryngoplegia	شلل الحنجرة
arborvitaeacerebelli		palatoplegia; uranoplegia	شلل الحنك
adiposis; adiposity	شحامة	cephaloplegia	شلل الرأس
adiposidolorosa	شحامة مؤلمة	quadriplegia; tetraplegia	شلل رباعي
adiposogenital	شحامي تناسلي	paraplegia	شلل سفلي
myelocone	شحم مياليني	pseudoparaplegia	شلل سفلي كاذب
subjective	شخصاني	pamphlegia; panplegia	شلل شامل
personality	شخصية	hemiparalysis; hemiplegia	شلل شقي
hyperarousal	شدة اليقظة	hemiparaplegia	شلل شقي سفلي
cranioclasia	شدخ القحف	abepithymia	شلل الضفيرة الشمسية
neurotony	شد العصب	neuroparalysis	شلل عصبي
segmentum	شدقة	stethoparalysis	شلل عضلات الصدر
neurosegmental	شدقي عصبي	myoparalysis; myoplegia	شلل عضلي
abnormality; acatastasia; anomaly	شدوذ	monomyoplegia	شلل عضلي أحادي
topodyesthesia	شدوذ توضع للمس	ophthalmoplegia	شلل العين
paraphilia; parasexuality	شدوذ جنسي	indoparalysis; indoplegia	شلل القزحية
parorexia; pica	شدوذ الشهية	pseudoparalysis; pseudoplegia	شلل كاذب
abalienation	شدوذ عقلي	logoplegia	شلل كلامي
parapsia	شدوذ للمس	glossoplegia	شلل اللسان
fugue	شراد	polyplegia	شلل متعدد
velum	شراع	cystoplegia	شلل المثانة
anality	شرجية	iemoparalysis	شلل المعريء
distraction	شردود	diplegia	شلل مزدوج
paramnesia	شردود الذاكرة	myeloplegia	شلل نخاعي
absentmindedness	شردود الذهن	laloplegia	شلل النطق
distractibility	شردودية	psychoplegia	شلل نفسي
arteria; artery	شريان	facioplegia; prosopoplegia	شلل الوجه
band	شريط	prosopodiplegia	شلل الوجه والطرف السفلي
uncus	شص	paraplectic; paraplegic	شللي سفلي

sympatheticoparalytic	شللي ودي	petitmal	صرع صغير
olfaction	شم	pyknoepilepsy	صرع غيبوبي
euphoretic	شيق	grandmal; haut-mal	صرع كبير
euphoria	شيق	epileptic	صرعي
euphoriant; euphoric	شيق	epileptiform; epileptoid	صرعي الشكل
olfactism	شم لا شمعي التنبيه	bruxism; clenching; odontoprisis	صريف الأسنان
heterosomia	شم مغاير	torticollis; wryneck	صعر
olfactory	شمي	retrocollis	صعر خلفي
spasticity	شجاج	nanomelia	صعر الأطراف
myospasms	شجاج عضلي	nanocormia	صعر الجذع
spastic	شجاجي	nanocormia	صعر الجسم
spasmophilia	شنج	micrencephalia; microencephaly	صعر الدماغ
spasmphilic	شنج	microcephalia; nanocephaly	صعر رأس
alloeroticism	شهوانية الغير	hydromicrocephaly	صعر الرأس الموهي
appetite	شهية	microcrania	صعر القحف
epicranium	الشواة	micromyelia	صعر النخاع
spina; spine	شوكة	microcephalous	صغير الرأس
malformation	شوه	lamella	صفاحة
progeria	شياخ	lamina	صفيحة
geratic; senility; senium	شيخوخة	end-flake; endplate	صفيحة انتهائية
senile	شيخوخي	spine	صلب
		alogia; anandia; aphemia; mutism	صمات
		akinetismutism	صمات تعذر الحركة
		nyctaphonia	صمات ليلي
		nyctophonia	صمات نهاري
		neurocrine	صماوي عصبي
		embolus	صمة
		rigidity; rigor	ضمل
		earwax	صملاخ
		deafness	صمم
		hemianacusia	صمم أحادي
		hemianacusia	صمم شقي
		presbyacusia; presbycusis	صمم شيخوخي
		pineal	صنوبري
		cistern	صهريج
		cisternamagna	صهريج كبير
		postcisterna	صهريج مخيخي نخاعي بصلي
		commissure	صوار
		psalterium	صوار القبو
		apastia	صوام
		myocrismus	صوت العضلة
		acoustic	صوتي
		image	صورة
		pneumoangiogram	صورة الأوعية الغازية
		afterimage; aftervision	صورة تلوينة
		peridurogram	صورة حول الجافية
		encephalogram	صورة الدماغ
		positrocephalogram	صورة الدماغ البوزتروني

## (ص)

efferent; efferential	صادر		
cerebrifugal	صادر من الدماغ		
corticifugal; corticoefferent	صادر من القشرة		
cerebellifugal; cerebellofugal	صادر من المخيخ		
matutinal	صباحي		
chromosome	صبغي		
petropharyngeus	صخرية بلعومية		
echokinesis; echomatism; echomimia;	صداء حركي		
echopraxia			
echographia	صداء كتابي		
echolalia; echophrasia	صداء لفظي		
cephalalgia; cephalgia; cephalodynia; headache	صداع		
metopodynia	صداع جبهي		
hemicrania	صداع نصفي		
temporal	صدغي		
shock	صدمة		
electroplexy; electroshock	صدمة كهربية		
conflict	صراع		
cry	صرخة		
epilepsia; epilepsy	صرع		
epileptoid	صرعاني		
jacksonianepilepsy	صرع جاكسوني		
hemiepilepsy	صرع شقي		

pneumoencephalogram	صورة الدماغ الغازية	hyposthenic	ضعيف
cephalogram	صورة الرأس المقاسية	plexus	صفيرة
myelogram	صورة النخاع	metaplexus	صفيرة البطين الرابع
		neuroplexus	صفيرة عصبية
		plexal	صفيري
		parabulia	ضلال الإرادة
		rib	ضلع
		costacervicalis	ضلع رقبية
		pervert	ضلول
		spleniumofcorpuscallosum	ضمادة الجسم الثفني
		endoneural	ضمن العصب
		atrophy	ضمور
		encephalatrophy	ضمور الدماغ
		neurodeatrophia	ضمور الشبكية
		hemiatrophy	ضمور شقي
		neuronatrophy	ضمور العصبونات
		neuratrophia; neuratrophy; neurophthisis;	ضمور عصبي
		amyotrophy	
		myatrophy; myoatrophy; myophagism	ضمور عضلي
		ophthalmatrophia	ضمور العين
		craniotabes	ضمور القحف
		amyelotrophy; myelatrophy	ضمور النخاع
		prosopodysmorphia	ضمور الوجه الشقي
		anagoge	ضمير
		amenorrhea	ضهي
		stenobregmatic	ضيق الهامة
			(لهج)
		accident	طارء
		set	طاقم
		aseptic	طاهر
		neurotology	طب الأذن العصبي
		neuro-otology; otoneurology	طب الأعصاب الأذنية
		neuriatry	طب الأعصاب السريري
		neuro-ophthalmology	طب الأعصاب العينية
		neurologia; neurology	طب الجهاز العصبي
		geriatrics	طب الشيوخ
		layer; stratum	طبقة
		psychiatrics; psychiatry	طب نفسي
		orthopsychiatry	طب نفسي إسوائي
		psychogeriatrics	طب نفسي شيخوخي
		neuropsychiatry	طب نفسي عصبي
		chemopsychiatry	طب نفسي كيميائي
		neurologist	طبيب الأعصاب
		psychiatrist	طبيب نفسياني
		natural; normal	طبيعي
		pattern	طرّاز
		blinking	طرّف
	(ض)		
distress	ضائقة		
neuratrophic	ضامر الأعصاب		
laughter	ضحك		
gelasmus	ضحك هستيري		
enlargement	ضخامة		
macrogyria; pachygyria	ضخامة التلافيف		
macrogenitosomia	ضخامة تناسلية جسدية		
encephalaxe; macrencephalia;	ضخامة الدماغ		
macroencephaly; megalencephaly			
macrocephalia; macrocephaly;	ضخامة الرأس		
megacephaly; megaloecephaly			
cephalonia	ضخامة الرأس والدماغ		
schwannosis	ضخامة شفانية		
myohypertrophia; myopachynsis	ضخامة عضلية		
schwannitis	ضخامة غمد شفان		
pseudohypertrophy	ضخامة كاذبة		
myelaxe	ضخامة النخاع		
acromegaly	ضخامة النهايات		
macrocephalous; megaloecephalic	ضخم الرأس		
antibody	ضد		
coup; stroke	ضربة		
sunstroke	ضربة الشمس		
essential	ضروري		
lockjaw; trismus	ضزز		
antitrismus	ضزز عكسي		
debility; hyposthenia	ضعف		
hypoboulia	ضعف الإرادة		
hyporeflexia	ضعف الانعكاسية		
hypophonia	ضعف التصويت		
hyposphresia	ضعف التنشُّ الجسمي		
dysesthesia	ضعف الحس		
dyserethesia	ضعف الحساسية		
apselaphesia; hypopselaphesia	ضعف حس اللمس		
cathæresis	ضعف دوائي المنشأ		
amblygeusia	ضعف الذائقة		
hypomnesia	ضعف الذاكرة		
hypogeusia	ضعف الذوق		
hyposexuality	ضعف الرغبة الجنسية		
hypacusia; hypacusis; hypoacusis	ضعف السمع		
hyposmia	ضعف الشم		
neurotonia	ضعف القوة العصبية		
amblyaphia	ضعف اللمس		

limb	طَرْف	anoia; idiocy	عته
process	طريقة	disability	عجز
graft	طُعم	acatamathesia	عجز إدراكي
taste	طُعم	aprosexia	عجز التركيز
acidtaste	طُعم حامض	acatamathesia	عجز لغوي
autograft	طُعم ذاتي	hydatid	عداري
allograft	طُعم متلي	lenticular	عدسي
catathymia	طفیان العوامل النفسية	lenticulostriate	عدسي مخططلي
infantilism	طفالة	lenticulo-optic; lenticulothalamic	عدسي مهادي
alterpains	طلق تلوي	lability	عدم الاستقرار
precoma	طلیعة السبات	subconsciousness	عدم اكتمال الوعي
obliteration	طمس	holoprosencephaly	عدم انشطار الدماغ المقدم
tinnitus	طنین	agenesia; agenesis	عدم التخلُّق
flexibility	طواعية	neuronagenesis	عدم تكون العصبونات
craniotopography	طوبوغرافية القحف	imbalance	عدم التوازن
dolichocephalic; mecocephalic	طويل الرأس	clumsiness	عدم الرشاقة
dolichocranial	طويل القحف	inadequacy	عدم الكفاية
fold	طية	alethia	عدم النسيان
flexible	طيع	nihilism	عدمية

## (ظ)

phenomenon	ظاهرة	meningococcemia	عدوى الدم بالسحائيات
backache; backalgia	ظُهار	multisynaptic; polysynaptic	عديد التشابكات
neurepithellum; neuroepithelium	ظهارة عصبية	aneurogenic	عديم التحصيب
neuroepithelial	ظهاري عصبي	lissencephalic	عديم التلافيف
dorsum	ظهر	incallosal	عديم الثفني
dorsal; dorsalis	ظهري	apesthetic	عديم الحواس

## (ع)

claustrum	عائق	amyelic; amyelonic	عديم النخاع
claustral	عائقي	amyelonic	عديم النقي
familial	عائلي	tortua	عذاب
neurophage	عائية عصبونية	precognition	عرافة
myelophage	عائية ميالينية	tic	عرة
habit	عادة	krauomania	عرة نظمية
episode	عارضة	claudication	عرج
emotion	عاطفة	pseudoclaudication	عرج كاذب
affective; emotional	عاطفي	claudicatory	عرجي
affectivity	عاطفية	symptom	عرض
anergic	عاطل	acromegaly	عرطلة
sane	عاقل		
agent	عامل		
transdural	عبر الجافية		
transcortical	عبر القشرة		
limen; threshold	عتبة		
scotoma	عتمة		

crest; crista	عرف	neure; neurocyte; neuron; neurone	عَصْبُون
gnosis	عرفانية	interneuron	عصبون بيني
cognition	عرفة	motoneuron	عصبون حركي
sciatica	عرق النسا	dynamoneure	عصبون حركي نخاعي
ansa; loop	عروة	esthesioneure	عصبون حسي
platycephalic	عريض الرأس	myoneure	عصبون عضلي
withdrawal	عزل	ganglioneure	عصبون عقدي
thoughtwithdrawal	عزل الأفكار	interneuron; internuncial	عصبون متوسط
sinistrality	عسر	neuronal; neuronic	عصبوني
dysantigraphia	عسر الانتساخ	nerval; nervous; neural	عصبي
aphagopraxia	عسر البلع	neurotropic	عصبي الالفة
dysgrammatism	عسر ترتيب الكلام	neurovegetative	عصبي إنباتي
mogiphonia	عسر التصويت	neuroepidermal	عصبي بشروي
dyschesia	عسر التغوط	pathetic	عصبي بكري
barbaralalia	عسر التلفظ الأجنبي	nervousness	عصبية
dyspareunia	عسر الجماع	neurocutaneous	عصبي جلدي
copodyskinesia	عسر الحركة الكلبي	neuromotor	عصبي حركي
menalgia	عسر الحيض	neurosensory; sensorineural	عصبي حسي
dysbasia	عسر الخطو	neurosplanchic	عصبي حشوي
dysdipsia	عسر الشرب	neuroclonic	عصبي رمعي
dyskoimesis	عسر النوم	neuromeningeal	عصبي سحائي
dyspepsia	عسر الهضم	neuroendocrine	عصبي صماوي
dysstasia; dystasia	عسر الوقوف	neurepithelial	عصبي ظهاري
sinistrality	عسروية	nervimuscular; neuromuscular; neuromyic	عصبي عضلي
yctalopia	عشاوة	neurgic	عصبي الفعل
autophilia	عشق الذات	neurocranial	عصبي قحفي
nyctalopia	عشى	neurocardiac	عصبي قلبي
rod	عصا	neuronephric	عصبي كلوي
meroergasia; neuronosis; neurosis; neuroticism	نُصاب	neuroeffector	عصبي مستفعل
neuroses	عصابات	neurovegetative	عصبي مستقل
acroneurosis	عصاب الأطراف	neurogastric	عصبي معدي
trophoneurosis	عصاب اغتذائي	neurenteric; neuroenteric	عصبي معوي
dystrophoneurosis	عصاب حثي	neurogenous	عصبي المنشأ
thermoneurosis	عصاب حراري	neuropsychic	عصبي نفسي
kinesioneurosis	عصاب حركي	neuroskeletal	عصبي هيكل
esthesioneurosis; esthesionosis	عصاب حسي	neurotendinous	عصبي وتر
panneurosis	عصاب شامل	neurovascular	عصبي وعائي
neurophonia	عصاب صراخي	expression	عصر
aerasthenia; aeroneurosis	عصاب الطيارين	neurula	المُصْبِيبة
pathoneurosis	عصاب مرضي	atheroma	عصيدة
vasoneurosis	عصاب وعائي	brachium	عضد
neurotic	عصابي	brachial	عضدي
angioneurotic	عصابي وعائي	myoid	عضلاني
nerve; nervus	عصب	muscle	عضلة
neuroid	عصباني	petrosalpingostaphylinus;	العضلة الرافعة لشرائح الفك
nonus	عصب تحت اللسان	petrostaphylinus	
neuromyon	عصب عضلي	myometrium	عضل الرحم
oculomotorius	العصب المحرك للعين	odaxesmus	عض اللسان

algiomuscular	عضلي ألمي	personology	علم الشخصية
myoidism	عضلية	gereology; gerontology	علم الشيخوخة
idiomuscular	عضلي تلقائي	neuroendocrinology	علم الصمغويات العصبية
sensorimascular	عضلي حسي	myology	علم العضل
myoneural	عضلي عصبي	biopsychology	علم النفس البيولوجي
myocardiac; myocardial	عضلي قلبي	pathopsychology	علم النفس المرضي
myovascular	عضلي وعائي	neuroscience	علوم عصبية
organ; organon	عضو	rostral	علوي
end-organ	عضو انتهائي	age	عمر
odaxetic	عضوض	gigantism	عملقة
polydipsia	عطاش	operation	عملية
hydrodipsia	عطش للماء	agnea; agnosia	عمه
inactivate	عطّل	fingeragnosia	عمه إصبعي
lability	عطوبية	acroagnosia	عمه الأطراف
os	عظم	asomatognosia	عمه أقسام الجسم
zygoma	عظم وجني	astereognosis; stereoaesthesia	عمه التجسيم
spontaneous	عفوي	simultagnosia	عمه التكامل
drug	عقار	simultanagnosia	عمه التكامل البصري
ganglion; node; tangle	عقدة	atopognosia; atopognosis	عمه توضيح الإحساس
neuroganglion	عقدة عصبية	topagnosia; topoanesthesia	عمه توضيح اللمس
pseudoganglion	عقدة كاذبة	bodyagnosia	عمه الجسم
ganglionic; nodal	عقدي	athalposis	عمه الدفء
ganglioform	عقدي الشكل	apsychognosia	عمه الذات
intellect; mind	عقل	tasteblindness	عمه الذوق
anarithria	عقلة	asymbolia	عمه الرموز
mental; phrenic	عقلي	amorphognosia; amorphosynthesis	عمه الشكل
mentality	عقلية	anosognosia	عمه العاغة
infecundity	عقم	ahylognosia	عمه اللمس
nodule; nodulus	عقيدة	amusia	عمه الموسيقى
aseptic	عقيم	derealization	عمه الواقع
adversive	عكسي الالتفاف	prosopagnosia	عمه الوجوه
cerebrospinant	علاج دماغي نخاعي	abarognosis; baragnosis	عمه الوزن
iatric	علاجي	autotopagnosia	عمه وضع الجسم
iatrogenic	علاجي المنشأ	column	عمود
sign	علامة	rachis	عمود فقاري
affection	علة	spine	عمود فقري
unrest	عز	blindness	عمى
psychology	علم النفس	hemichromatopsia	عمى الألوان الشقي
neuropharmacology	علم أدوية الجهاز العصبي	hemianopia; hemianopsia; hemiopia;	عمى شقي
neuropsychopharmacology	علم الأدوية النفسية	hemiscotosis	
neuroradiology	علم الأشعة العصبية	agent	عميل
paleoneurology	علم أعصاب المتحجرات	habenula	عنان
algology	علم الآلام	cervix; neck	عنق
biocybernetics	علم التحكم الحيوي	cervical	عنقي
kinesiology	علم الحركة	arachnoid	عنكبوتي
neurobiology	علم الحياة العصبية	arachnoid	العنكبوتية
neurocytology	علم الخلايا العصبية	arachnopia	العنكبوتية الحنونة
cerebrology; encephalology	علم الدماغ	remyelination	عودة تشكل الميالين





hypergnosis	فرط الإدراك	hypermetria	فرط القياس
overstrain	فرط الإرهاق	hemihypermetria	فرط القياس الشقي
surexcitation	فرط الاستثارة	hyperactivity; hyperergasia	فرط النشاط
hyperprosexia	فرط الاستفراق	hyperdynamia	فرط النشاط العضلي
hyperpolarization	فرط الاستقطاب	hyperphrenia	فرط النشاط العقلي
alterhyperpolarization	فرط الاستقطاب التلوي	hypersomnia	فرط النوم
hypercenesthesia	فرط الانشراح	hypererethism; hyperirritability	فرط الهيجية
hyperreflexia	فرط الانعكاسية	hypertarachia	فرط هيجية الجهاز العصبي
hypermimia	فرط الإيماء	hypersomnolence	فرط الوسن
hyperalgesia; hyperalgia; hyperpathia	فرط التالم	hypergenitalism	فرط وظيفة الغدة التناسلية
thermhyperalgesia	فرط التالم بالحرارة	ramus	فرع
hypermotility	فرط التحرك	pavor; terror	فزع
hypersensitivity	فرط التحسس	cacogeusia	فساد الذوق
hyperthermalgesia	فرط التحسس الحراري	cacosmia	فساد الشم
ephidrosis	فرط التعرق	lobe; lobus	فص
hemihyperidrosis	فرط التعرق الشقي	schizophrenia	فصام
hyperostosis	فرط التعظم	oneirophrenia	فصام احلامي
hemicaniosis	فرط تعظم نصف القحف	hebephrenia	فصام ساذج
hyperhedonia	فرط التلذذ	schizoaffective	فصامي عاطفي
hypermyotrophy	فرط التنامي العضلي	decerebration	فصل المخ
hypertonia	فرط التوتر	decerebellation	فصل المخيخ
hemihypertonia; hemitonia	فرط التوتر الشقي	lobule; lobulus	فصيص
hypermyotonia	فرط التوتر العضلي	space	فضاء
hypersympathicotonus	فرط التوتر الودي	instinct	فطرة
hypersthenia	فرط التوترية	instinctive	قطري
hypersexuality	فرط الجنسية	active	فقال
hyperkinesia	فرط الحراك	act; action	فعل
acrocinesis; acrokinesia; hyperanacinesia;	فرط الحركة	alteraction	فعل تلوي
hypercinesis		cerebrostomy	فغر الدماغ
hyperesthesia	فرط الحس	spondylosis	فقار
hypersensitivity; supersensitivity	فرط الحساسية	spondylous	فقاري
cryesthesia	فرط حساسية البرد	aboulia; abulia	فقد الإرادة
hyperthermesthesia	فرط الحساسية الحرارية	para-analgesia	فقدان حس الألم أسفل الجسم
hypercryalgesia	فرط الحساسية للبرد	apallesthesia; palmanesthesia	فقدان حس الامتزاز
algesia	فرط حس الألم	arhigosis	فقدان حس البرد
caumesthesia; thermhyperesthesia;	فرط حس الحرارة	cryanesthesia	فقدان حس البرودة
thermhyperesthesia		hemithermoanesthesia	فقدان حس الحرارة الشقي
hypergeusia	فرط حس الذوق	gargalanesthesia	فقدان حس الدغدة
hemihyperesthesia	فرط الحس الشقي	amyoeesthesia	فقدان الحس العضلي
hyperosmia; hyperosphresia	فرط حس الشم	bathyanesthesia	فقدان الحس العميق
bathyhyperesthesia	فرط الحس العميق	paramusia	فقدان الحس الموسيقي
hyperaphia	فرط حس اللس	anesthecinesia	فقدان الحس والحركة
hyperorexia	فرط الشهية	hemiageusia	فقدان الذوق الشقي
natremia	فرط صوديوم الدم	merosmia	فقدان الشم الجزئي
hyperenergia	فرط الطاقة	anorexia	فقدان الشهية للطعام
hyperaffectivity	فرط العاطفية	hemiasynergia; hemidysergia	فقد التأزر الشقي
hyperpraxia	فرط الفعالية العقلية	anomia	فقد التسمية
hypergenitalism; hypergonadism	فرط القندية	palanesthesia	فقد حس الامتزاز

ardanesthesia; thermalgia;	فقد حس الحرارة	base; basis	قاعدة
thermanesthesia		basioccipital	قاعدتي قذالي
akinesia	فقد حس الحركة	fundusoculi	قاع العين
hemianosmia	فقد حس الشم الشقي	act; law	قانون
acoenesthesia	فقد حس العافية	allornonelaw	قانون الكل أو العدم
acenesthesia	فقد حس الوجود	calvaria	قبعة
amnesia	فقد الذاكرة	presynaptic	قبل تشابكي
aphonia	فقد الصوت	pregenital	قبل تناسلي
anarithmia	فقد مقدرة العد	preganglionic	قبل العقدة
areflexia	فقد المنعكسات	fornix	قبو
jaw	فك	euthanasia	قتل المرحمة
intellect	فكر	cranium; skull	قحف
idea	فكرة	otocranium	قحف أذني
noematic; noetic	فكري	neurocranium	قحف عصبي
ideomuscular	فكري عضلي	cranial	قحفي
ideogenetic	فكري المنشأ	craniosacral	قحفي عجزى
neurolisis	فك العصب	pes	قدم
electroneurolisis	فك العصب كهربياً	flatfoot	قدم رخاء
cleft	فلج	footdrop	قدم ساقطة
os	فم	neuropodium	قدم عصبية
hebephrenia	فند	footdrop	قدم مندلية
atlas	الفهقة	clawfoot	قدم مخلبية
atlantoaxial	فهقي محوري	ballism	قذائفية
apprehension; comprehension	فهم	occiput	قذال
hiccough; hiccup; spasmolygmus	فواق	occipital	قذالي
neuróvirulence	فوعة عصبية	occipitalis	قذالية
epidural	فوق الجافية	occipitofrontal	قذالي جبهي
epipial	فوق الحنون	occipitoparietal	قذالي جداري
episinal	فوق العمود الفقري	occipitomastoid	قذالي خشائي
epineural	فوق القوس العصبية	occipitomenal	قذالي ذقني
episinal	فوق النخاع	occipitocervical	قذالي رقبتي
poliovirus	فيروس السنجابية	occipitotemporal	قذالي صدغي
neurovirus	فيروس عصبي	occipitoatlaid	قذالي فهقي
physostigmine	فيزوستغمين	occipitobasilar	قذالي قاعدي
psychophysics	فيزياء نفسية	occipitoaxoid	قذالي محوري
neurophysiology	فيزيولوجيا الجهاز العصبي	occipitothalamic	قذالي مهاري
esthesiophysiology	فيزيولوجيا الحواس	occipitobregmatic	قذالي هامى
cerebrophysiology	فيزيولوجيا الدماغ	occipitofacial	قذالي وجهي
electrophysiology	فيزيولوجيا كهربية	theca	قرباب
psychophysiology	فيزيولوجيا نفسية	neurokeratin	قراتين عصبي
		rheobase	قرارة التيار
		disc; discus; disk	قرص
suggestible	قابل الإيحاء	comu; horn	قرن
flexible	قابل الثني	comea	قرنية
suggestibility	قابلية الإيحاء	dwarfism; nanism; nanosoma; nanosomia	قزامة
autosuggestibility	قابلية الإيحاء الذاتي	nanomelia	قزامة الأطراف
hypoactive	قاصر النشاط	spondylosis	قسط فقاري
distal; distalis	قاصى	portio	قسم

priapism	قسوح	tractotomy	قطع السبيل
encephalomere	قسيم دماغي	pallidectomy	قطع الشاحبة
polioneuromere	قسيم سنجابي نخاعي	pallidoansection	قطع الشاحبة والعروة
neuromere	قسيم عصبي	laminotomy	قطع الصفيحة
hodoneuromere	قسيم عصبي جنيني	enervation; neurectomy	قطع العصب
myomere; sarcomere	قسيم عضلي	phrenicectomy; phreniconeurectomy	قطع العصب الحجابي
myelomere	قسيم نخاعي	phrenicotomy	
cortex	قشرة	splanchnicectomy	قطع العصب الحشوي
archaeocortex	قشرة بدائية	myomectomy; myotomy	قطع العضل
isocortex; neocortex	قشرة حديثة	myectomy	قطع العضلة
putamen	قشرة عدسية	ramicotomy; ramisection; ramisectomy	قطع الفروع
allocortex	قشرة عريضة	craniectomy	قطع القحف
phronema	قشرة عقلية	vagotomy; vagotomy	قطع المبهم
palaeocortex; paleocortex; paleopallium	قشرة قديمة	craniamphitomy	قطع محاط القحف
pallium	قشرة المخ	cryothalamectomy	قطع المهاد القري
cortical	قشري	hemicraniectomy; hemicraniotomy	قطع نصف القحف
corticobulbar	قشري بصلي	hemicorticectomy	قطع نصف كرة المخ
corticopontine	قشري جسري	pyramidotomy	قطع الهرم
corticodiencephalic	قشري دماغي بيني	sympathectomy; sympathicectomy	قطع الودي
psychocortical	قشري عقلي	sedentary	قعدة
corticocerebral; pallial	قشري مخي	lordosis	قعرس
shivër	قشعريرة	sedentary	قعيدة
brachybasia	قصر الخطوية	saltation	قفز
brachycephalla	قصر الرأس	saltatory	قفزي
inadequacy	قصور	hypomyotonia	قلة التوتر العضلي
amyoplasia	قصور التعضل	aphotesthesia	قلة حس الضوء
hypothymism	قصور التوتة	aliquorrhea	قلة السائل الدماغي النخاعي
hyposympathicotonus	قصور التوتر الودي	oligoposia	قلة الشرب
hypothyroidism	قصور الدرقية	oligodipsia	قلة العطش
hypoadrenocorticism	قصور قشرة الكظر	acatalepsy	قلة الفهم
hypometria	قصور القياس	anorexia	قلة الهيوجية
hypoadrenalism	قصور الكظر	odontectomy	قلع السن
hypopituitarism	قصور النخامية	neurexeresis	قلع العصب
panhypopituitarism	قصور النخامية الشامل	phrenicoexeresis	قلع العصب الحجابي
hypofunction	قصور وظيفي	ophthalmectomy	قلع العين
apsychia	قصور الوعي	anxiety	قلق
onychophagia	قضم الأظفار	anxious; restlessness	قلق
cheliophagia	قضم الشفة	pananxiety	قلق شامل
tentum	قضب	trepidation	قلق عصبي
diphallous	قضب مزدوج	alysmus	قلق المرض
lumbago	قطان	contractile	قلوص
polus	قطب	contractility	قلوصية
drop	قطرة	myotility	قلوصية العضل
sectio	قطع	indolent	قليل الإيلام
segment; segmentum	قطعة	oligosynaptic	قليل التشابكات
gyrectomy	قطع التفيف	acataleptic	قليل الفهم
radiculotomy; radisectomy	قطع الجذر	acathisia; akathisia; cathisophobia; kathisophobia	قماص
cordotomy	قطع الحبل الصوتي	vertex	قمة الرأس

infundibulum	قمع	pneumatocele	قبلة هواشة
canal; canalis; channel; duct; ductus	قناة		
neurocanal	قناة فقرية	(ك)	
syringocoele	قناة النخاع المركزية	organism	كائن حي
culmen	قنة	nightmare; oneirodynia; paroniria	كابوس
canaliculus	قنية	ankle	كاحل
anorexia	قهم	latent; potential	كامن
anorexianervosa	قهم عصابي	caliculus	كؤيسة
psychonomy	قوانين نفسية	pronation	كب
arc	قوس	suppression	كبت
zygoma	قوس وجنية	anticathexias	كبت الأفكار
cochlea	قوقعة	hepatolenticular	كبدي عدسي
emesis; vomiting	قيء	agitographia	كتابة هرولية
lead	قياد	myeloblastosis	كثرة الأرومات النخوية
dolorimetry	قياس الألم	polygyria	كثرة التلافيف
algiesimetry	قياس التألم	polymicrogyria	كثرة التلافيف الصغيرة
palpatometry	قياس الجس	pleocytosis	كثرة خلايا السائل الدماغي النخاعي
craniometry	قياس الجمجمة	myomelanosis	كثرة الميلانين العضلي
diaphemetry	قياس حس اللمس	astrocytosis	كثرة النجميات
audiometry	قياس السمع	myelema	كثرة النقويات
sthenometry	قياس النشاط	myelocythemia; myelocytosis; myelosis	كثرة النقويات بالدم
psychodometry; psychometries; psychometry	قياس نفسي	alcoholism	كحولية
orthostatism	قيام الجسم	aggregate	كداسة
orthostatic	قيامي	osmodysphoria	كراهية الرائحة
encephalomyelocele	قبلة الدماغ والنخاع والسحايا	stress	كرب
encephalocele	قبلة دماغية	globuspallidus; pallidum	الكرة الشاحبة
notencephalocele	قبلة دماغية خلفية	libido	كرع
derencephalocele	قبلة دماغية رقبية	misanthropia	كره البشر
encephalomeningocele;	قبلة دماغية سحائية	misogamy	كره الزواج
meningoencephalocele		misogyny	كره النساء
hydrencephalomeningocele	قبلة دماغية سحائية مائية	pallidal	كروي شاحب
pseudocephalocele	قبلة دماغية كاذبة	corpuscle	كرية
encephalocystocele;	قبلة دماغية كيسية	tetanus	كزاز
hydrencephalocele; hydrocephalocele;		tetanic	كزازي
hydroencephalocele		tetaniform	كزازي الشكل
cephalohematocele	قبلة دموية رأسية	fracture	كسر
cephalocele	قبلة رأسية	amiculumolivare	كسوة الزيتون
meningocele	قبلة سحائية	anaplasia	كشم
syringomeningocele	قبلة سحائية تكهفية	radioulmar	كعبري زندي
craniomeningocele	قبلة سحائية قحفية	radiomuscular	كعبري عضلي
meningomyelocele	قبلة سحائية نخاعية	speech	كلام
myocele	قبلة عضلية	embolalia; embololalia	كلام انصمامي
pneumatorrhachis	قبلة غازية فقارية	paralogism	كلام خاطيء
pneumatoccephalus	قبلة غازية قحفية	schizophasia	كلام فصامي
craniocoele	قبلة قحفية	heterolalia; heterophasia; heterophemia	كلام مغاير
myelocystomeningocele	قبلة ميالينية سحائية	cynocephalic	كلبي الرأس
syringomyelocele	قبلة النخاع التكهفية	dull	كليل
myelocele; syringocele	قبلة نخاعية	perfectionism	كمالية

amaurosis	كمنة	medulla	لب
athetosis	كنج	neuropil	لبد عصبي
hippus	كنج الحدقة	ataxiophemia; palilalia	لجلة
hemiathetosis	كنج شقي	fallation	لجلة الاطفال
athetotic	كنعي	canthus	لحاظ
neuroelectricity	كهربائية عصبية	lingula	لسين
isoelectric	كهرساوي	tache	لطفة
kwashiorkor	كواشركور	idiolalia	لغة ذاتية
curarization	كوررة	psycholinguistics	لغويات نفسية
kuru	كورو	bradyarthria; bradyalia; bradyphasia	لف
cholesterol	كولستيرول	neurovaccine; neurovariola	لقاح عصبي
cholinoceptive	كولينني الاستقبال	globushystericus	لقعة هستيرية
cholinergic	كولينني الفعل	ephapse; tactor	لماس
neurochitin	كيتين عصبي	ephaptic	لماسي
cyst	كيسة	taction; tactus; touch	لمس
dermoid	كيسة جلدانية	tactile; tactual	لمسي
myelocyst	كيسة ميالينية	endolymph	لمف الباطن
neurochemistry	كيمياء عصبية	homoeroticism	لواط
psychochemistry	كيمياء نفسية	amygdala; tonsil	لوزة

## (J)

apraxia	لا ادائية	tonsillacerbelli	لوزة المخيخ
involuntary	لا إرادي	psychochrome	لون نفسي
astigmatism	لا بؤرية	torsion	لوي
asynergy	لا تآزرية	plaque	لوحة
asynchronism; asynchrony	لا تزامن	aptitude	لياقة
anhedonia	لا تلذذ	fibra; fibre	ليف
incoordination	لا تناسق	neurofiber; neurofibra	ليف عصبي
asymmetry	لا تناظر	pia	لين
asexual	لا جنسي	fibril	ليف
hemianecephaly	لا دماغية شقية	myofibril; sarcostyle	ليف عضلية
akoria	لا شبيعية	neurofibril	ليف عصبي

## (M)

unconscious	لا شعور	aqueous	مائي
infrapsychic	لا شعوري	psychoactive; psychotropic	مؤثر نفسي
apalytic	لا شللي	occiput	مؤخر الرأس
anilingus	لاعق الشرج	matter; substance; substantia	مادة
irreversible	لا عكوس	cinerea	مادة السنجابية
irreversibility	لا عكسية	intercalatum; nigra	المادة السوداء
alemmal	لا غمدي	vagusstoff	مادة المبهم
passive	لا فاعل	noxious	مؤذ
apathy	لا مبالاة	masochist	مازوخي
agranular	لا محبب	algophilla; algophily; masochism	مازوخية
insensible	لا محسوس	craniophore	ماسك القحف
decompensation	لا معاوضة	moron	مافون
parasympathetic	لاودي	mimmatlon	ماماة
		anticoagulant	مانع التخثر

antihypnotic	مانع النوم	perineurial	متعلق بفقد الحزمة العصبية
antihysterjc	مانع الهستيريا	centrencephalic	متعلق بمركز الدماغ
asylum	مارى	dendric; dendriform; dendritic	متفصن
olivifugal	مبتعد عن الزيتونة	insheathed	متفعد
pallidofugal	مبتعد عن الشاحبة	poikilothermic	متغير الحرارة
axofugal	مبتعد عن المحوار	ceptor	متقبل
myologia	مبحث العضل	neuroceptor	متقبل عصبي
principle	مبدأ	intermittent	متقطع
encephalotome	مبضع الدماغ	auxotonic	متقلص ضد المقاومة
cephalotome	مبضع الرأس	ambivert	متكافئ المزاج
rachiotome	مبضع السيساء	meningococci	المتكورات السحائية
neurotome	مبضع العصب	syndrome	متلازمة
myotome	مبضع العضل	phakomatosis	متلازمة عدسية
leukotome	مبضع الفص الجبهي	malingerer	متمارض
analgia	مبطل الألم	degenerate	متنكس
abducens	مبغذ	neurodegenerative	متنكس عصبي
abductor	مبغدة	compatible	متوافق
proleptic	مبكر الانتياب	anagogic; ideal	مثالي
vagus	مبهم	bladder	مثانة
vagoaccessorius	مبهم إضافي	abaptiston	مثقب لا مخترق
vaguglossopharyngeal	مبهمي لسانى بلعومي	trigon; trigonum	مثث
vagosplanchnic; vagosympathetic	مبهمي ودي	flexor	مثنية
poliomyeliticidal	مبيد فيروس التهاب سنجابية النخاع	excitant	مثير
synergetic	متآزر	odaxetic	مثير الحك
innate	متأصل	confrontation	مجاهبة
tabetic	متبوس	necrophilia; necrophily	مجامعة الميت
homogenous	متجانس	juxtaspinal	مجاور السيساء
myelopetal	متجه للنخاع	parafalx	مجاور المنجل
olivipetal	متجه نحو الزيتونة	abient	مجتنب العنبه
autokinetic	متحرك إراديا	abstract	مجرد
anagogic	متدين	palpable	مجسوس
remittent	متردد	anterotic	مجفر
progressive	مترق	anaphrodisiac	مجفرة
titubant	مترنح	system	مجموع
floppy	مترهل	set	مجموعة
isoelectric	متساوي التكهرب	insane; lunatic	مجنون
ambisexual	متصلب الجنسين	essential	مجهول السبب
polyesthetic	متعدد الإحساسات	mimesis; mimosi	محاكاة
polysensory	متعدد التحسس	neuromimesis	محاكاة فستيرية عصبية
polyneural	متعدد التعصيب	mimetic; mimic	محاكي
monesthetic	متعلق بإحدى الحواس	psychosomimetic; psychotomimetic	محاكي الذهان
neuralgic	متعلق بالألم العصبي	neuromimetic	محاكي الفعل العصبي
electroconvulsive	متعلق بالتخليج الكهربى	curareimimetic	محاكي الفعل الكوراري
metapsychology:	متعلق بالنخاع التالي والنخاع	cholinomimetic	محاكي الكولين
metencephalospinal		parasympathomimetic	محاكي اللاودي
neuromatous	متعلق بالورم العصبي	vagomimetic	محاكي المبهم
akineti	متعلق بتعذر الحركة	sympatheticomimetic; sympatheticomimetic	محاكي الودي
abasic	متعلق بتعذر المشي	androphile	محب البشر

cranioclast; craniotome	محجاج	psychogram	مخطط الشخصية
encephalitogen	محدث التهاب الدماغ	echoencephalogram	مخطط صدى الدماغ
epileptogenic	محدث الصرع	myogram	مخطط العضل
clivus	محدّر	myocardiogram	مخطط عضلة القلب
motofacient; mover	محرك	paleostriatum	مخطط قديم
oculomotor	محرك العين	electroencephalogram	مخطط كهربية الدماغ
cephalomotor	محرك للرأس	electronystagmogram	مخطط كهربية הראة
fasciculated	محزّم	electro-oculogram	مخطط كهربية العين
perceptorium; sensorium	محسّ	electrocorticogram	مخطط كهربية القشرة
sensible	محسوس	electrospinogram	مخطط كهربية النخاع
blocker	مُحصّر	psychogram	مخطط نفسي
adrenolytic	محصر الأدرينالين	strionigral	مخططي أسودي
capsula; capsule	محفظة	convulsant; convulsivant	مخلج
analyst	محلّل	depressant	مخمد
psychoanalyst	محلّل نفسي	depressomotor	مخمد الحركة
oneirogenic	محلّم	psychodysleptic	مخمد نفسي
obliteration	محو	cerebral	مخي
axon; neuraxis; neuraxon; neurite	محوار	cerebropontile	مخي جسري
axodendritic	محواري تفصني	cerebellum; epencephalon; opisthencephalon	مخيخ
axosomatic	محواري جسدي	archaeocerebellum	مخيخ بدائي
axoaxonic	محواري محواري	neocerebellum	مخيخ حديث
axis	محور	vestibulocerebellum	مخيخ دهليزي
neuraxis	محور عصبي	palaeocerebellum; paleocerebellum	مخيخ قديم
peripheral	محيطي	cerebellar	مخيخي
peripherocentral	محيطي مركزي	cerebellopontine; cerebellopontile	مخيخي جسري
cerebrum	مخ	cerebellorubral	مخيخي حمراوي
deranged	مختل	cerebellorubrospinal	مخيخي حمراوي نخاعي
noncomposmentis	مختل العقل	cerebello-olivary	مخيخي زيتوني
narcotic; stupefactive	مخدر	cerebellospinal	مخيخي نخاعي
neuroleptanesthetic	مخدر تطميني	paracerebellar	مخيخي وحشي
pseudonarcotic	مخدر كاذب	fantasy; phantasia; phantasy	مخيلة
narcostimulant	مخدر منبه	cerebrocerebellar	مخي مخيخي
polioclastic	مخرب السنجابية	sinistrocerebral	مخي يساري
cone	مخروط	therapy	مداواة
conus	مخروط النخاع	percept; percipient	مدرك
tremograph	مخطاط الرعاش	photoperceptive	مدرك للضوء
ataxiagraph	مخطاط الرنح	gradient	مدروج
echoencephalograph	مخطاط صدى الدماغ	knismogenic	مدغذغ
myograph	مخطاط العضل	addict	مدمن
myocardiograph	مخطاط عضلة القلب	morphinist	مدمن المورفين
reflexograph	مخطاط المنعكسات	taste	مذاق
myeloscintogram	مخطاط ومضائي نخاعي	aftertaste	مذاق تلوي
striatum	مخطط	pseudogeusia	مذاق كاذب
archistriatum	مخطط بدائي	masculine	مذكّر
radioencephalogram	مخطط الدماغ الإشعاعي	paresthesia	مذل
nystagmograph	مخطط הראة	monoparesthesia	مذل أحادي
ataxiagram	مخطط الرنح	acroparesthesia	مذل الأطراف
audiogram	مخطط السمع	hemiparesthesia	مذل شقي

paraesthesia; paralgia	مذل مؤلم	proprioceptor	مستقبلة الحس العميق
topoparesthesia	مذل موضعي	osmoceptor; osmoreceptor	مستقبلة الراححة
caudatolenticular	مذنبى عدسي	baroceptor; baroreceptor; pressoreceptor	مستقبلة الضغط
stupeficient; stupefactive	مذهل	photoreceptor	مستقبلة ضوئية
bitter	مر	epithelioceptor	مستقبلة ظاهرية
hypochondria; hypochondriasis	مراق	myoceptor; myoreceptor	مستقبلة عضلية
control	مراقبة	cholinoceptor	مستقبلة كولينية
adolescence	مراهقة	chemoceptor; chemoreceptor	مستقبلة كيميائية
amyostalic	مرتعض العضل	tangoceptor	مستقبل تلامسي
relaxant	مرخ	peripheroceptor	مستقبلة محيطية
lissive	مرخ إسوائي	somatoceptor	مستقبل جسدي
rachigraph	مرسام السيساء	motoceptor	مستقبل حركي
disease; illness; malady; sickness	مرض	proprioceptive	مستقبل حسي عميق
neuropathology	مرضيات عصبية	interoceptor	مستقبل داخلي
cubitus; elbow	المرفق	paraganglion	مستقبل
complex	مركب	autonomic	مستقل
center, centre	مركز	supine	مستلق
sensorium	مركز حسي	level	مستوى
egotropic	مركزي الذات	noematachograph	مسجل سرعة التفكير
calmative; sedative	مركن	electrode	مسرى كهربوي
temperantia	مركنات	homalocephalus	مسطح الرأس
mood; temperament	مزاج	sphenocephalus	مسنن الرأس
synchronous	مزامن	alleviant; analgesic; anodyne; antalgic; antalgic	مسكن
obex	مزلاج	neuroleptanalgesic	مسكن تطميني
spasmolysant	مزيل التشنج	pathway	مسلك
anxiolytic	مزيل القلق	incontinent	مسلوس
touch	مس	myophone	مسماع العضل
accessory	مساعدة	mesmerism	مسمرية
aqueduct	مسال	neuropore	مسمة عصبي
porencephalia	مسامية الدماغ	myelopore	مسمة نخاعي
dromic	مساير	acrocephalic; oxycephalic; stenocephalous	مسنن الرأس
cryoprobe	مسبار قري	dentatothalamic	مسنني مهادي
comatose; soporous	مسيوت	association	مشاركة
narcoleptic	مسيوخ	synapse	مشبك
allergen	مستأرج	cranioclast	مشداخ
antalgic	مستبعد الألم	radiatio	مشع
oblongata	مستطيل	paralytogenic; paralyzer	مشل
exhibitionist	مستعري	paralytic	مشلول
effector	مستفعل	paraplectic; paraplegic	مشلول الأسفل
ceptor	مستقبل	subparalytic	مشلول جزئياً
nociceptive	مستقبل الألم	prosopoplegic	مشلول الوجه
teleceptor; teloreceptor	مستقبل بعادي	euphorogenic	مشمق
receptor	مستقبلة	spasmogen	مشنج
nociceptor	مستقبلة الآلام	tetanospasmin	مشنج كزازي
mechanoreceptor	مستقبلة آلية	gait	مشية
dendriceptor	مستقبلة التغصن	festination	مشية تسارعية
proximoceptor	مستقبلة تلامسية	marcheapetitspas	مشية الخطوات القصيرة
osmoceptor; osmoreceptor	مستقبلة التناضح	chorial	مشيمائي



choroid	مشيمية	orthotherapy	معالجة تقويمية
vertiginous	مصاب بالدوار	cryotherapy; frigotherapy	معالجة قارية
apractic	مصاب بتعذر الاداء	electrotherapy	معالجة كهربية
sphincter	مصرة	psychotherapeutics; psychotherapy	معالجة نفسية
epileptogenic	مصرع	negativism	معاندة
anode	مصعد	expressive; iter	معبر
cyclocephalus	مصلقلب الرأس	antisocial	معقل اجتماعيا
anticonvulsant	مضاد الاختلاج	cacesthenic	معقل الحواس
antidepressant	مضاد الاكتئاب	neuromyopathic	معقل عصبي عضلي
antineuritic	مضاد التهاب العصب	psychopath	معقل النفس
antineuralgic	مضاد الالم العصبي	idiot	معتوه
antiparkinsonian	مضاد الباركنسونية	idio-imbecile	معتوه ابله
antipsychomotor	مضاد التحراك النفساني	thymoleptic	معقل المزاج
antispastic	مضاد التشنج	gnosis	معرفة
contrastimulant	مضاد التنبيه	acrognesia	معرفة الاطراف
antibiotic	مضاد حيوي	stereognosis	معرفة التجسيم
antinarcotic	مضاد الخدار	autognosis	معرفة الذات
antipsychotic	مضاد الذهان	cramp	معص
antineurotoxin	مضاد ذيفان العصب	complex; gangliated	معقد
antifibrillatory	مضاد الرجفان	aseptic	معقم
antiapoplectic	مضاد السكتة	myeloarchitecture	معمارية السبل الميالينية
antiparalytic	مضاد الشلل	myoarchitectonic	معماري عضلي
anticephalgic	مضاد الصداع	amyous	معوز العضل
antiepileptic	مضاد الصرع	parencephalous	معيب الدماغ
antiadrenergic	مضاد الفعل الادرينالييني	nutrient	مغذي
anticholinergic	مضاد الفعل الكولينيني	insertion	مغرز
antianxiety	مضاد القلق	spindle	مغزل
antiemetic	مضاد القيء	tormina	مفص
thymoleptic	مضاد الكآبة	mongolism	مفولية
anteptialtic	مضاد الكايوس	anastomosis	مفاغرة
neuroleptic	مضاد للذهان	neuroanastomosis	مفاغرة عصبية
antiparasymphathomimetic	مضاد محاكي اللاودي	hypersensitive	مفرط الإحساس
antihallucinatory	مضاد الهلاس	acrocnetic	مفرط الحركة
antisymphathetic	مضاد الودي	hyperesthetic	مفرط الحس
antasthenic	مضاد الوهن	hyperpragic	مفرط النشاط العقلي
hypostheniant	مضعف	lethral	مفقد الذاكرة
neurokinet	مطرقة العصب	concept; conception	مفهوم
neurotony	مط العصب	distad	مقاصي
absolute	مطلق	nocifensor	مقاوم الاذى
ataractic	مطمئن	gegenhalten	مقاومة التحريك
antidromic	معاكس المسيرة	antikinesis	مقاومة التدوير
therapy	معالجة	rachiresistance	مقاومة سيسانية
clinothrapy	معالجة بالاستلقاء	rachiresistant	مقاوم سيساني
hypnothrapy	معالجة بالتنويم	drug-fast; drug-resistant	مقاوم للدواء
kinesiatrics; kinesiotherapy; kinetotherapy	معالجة بالحركة	myotic	مقبض الحدة
bibliotherapy	معالجة بالكتب	aula	مقدم البطين الثالث
musicotherapy	معالجة بالموسيقى	preanesthesia; prenarcois; preanesthetic	مقدمة التخدير
crenothrapy	معالجة بالمياه المعدنية	preictal	مقدمة السكتة

prefrontal	مقدم جبهي	tetanic	مكثّر
metopon	مقدم جبهي مقطب	athetotic	مكتع
foreconscious	مقدم الوعي	neurogenic	مكوّن العصب
pilomotor	مققة الشعر	myelinogenetic	مكوّن الميالين
arrectorpile	مققة الشعرة	bathmotropic	مكيف الاستجابة
leptocephaly	مقق الرأس	malaria	ملاريا
emetic	مقيء	mesaxon	ملتصق غشائي المحوار
dolorimeter	مقياس الألم	commissure	ملتقى
torsionometer	مقياس الانفتال	encephalitic	ملتهب الدماغ
algessimeter; algessimeter; algometer	مقياس التالم	neuritic	ملتهب العصب
anesthesimeter	مقياس التبيخ	abstract	ملخص
myokinesimeter	مقياس التقلص العضلي	palliate; palliative	ملطف
myotonometer	مقياس التوتر العضلي	abirritant	ملطف التهيج
craniometer	مقياس الجمجمة	forceps	ملقط
potentiometer	مقياس الجهد	faculty	مَلَكَة
kinesimeter; kinesiometer	مقياس الحركة	ephapse	ملمس
sensimeter	مقياس الحس	stain	ملوّن
biothesiometer	مقياس حس الاهتزاز	myotatic	ممدّد العضل
thermesthesiometer	مقياس حس الحرارة	hypochondriac	ممرّوق
topothermesthesiometer	مقياس الحس الحراري	demoniac	ممسوس
kinesi-esthesiometer;	مقياس الحس الحركي	lethal	مميت
kinesesthesiometer		adient	مناحي المنبه
kinesimeter; kinesiometer	مقياس الحس السطحي	neuroimmunology	مناعة عصبية
trichoesesthesiometer	مقياس الحس الشعري	neuroimmunologic	مناعي عصبي
piesimeter	مقياس حس الضغط	dream	منام
esthesiometer	مقياس حس اللمس	antagonist	مناهضة
anesthesimeter	مقياس الخدر	stimulator	منبّه
ataxiometer	مقياس الرنح	extrovert	منبسط النفس
algessichronometer	مقياس زمن التالم	stimulant; stimulus	منبّه
chronomyometer	مقياس الزمنة العضلية	contrastimulus	منبّه المضاد
noematlachometer	مقياس سرعة التفكير	psychostimulant	منبّه نفسي
audiometer	مقياس السمع	adequatestimulus	منبّه واف
rachimeter	مقياس السيساء	alert	منبّه
olfactometer	مقياس الشم	disseminated	منتثر
liminometer	مقياس العتبة	adient	منجذب للمنبّه
myometer	مقياس عضلي	falx	المنجل
myosthenometer	مقياس قوة العضل	gradient	منحدر
myodynamometer	مقياس قوة العضلات	deviant; invert; pervert	منحرف
tactometer	مقياس اللمس	curve	منحني
reflexometer	مقياس المنعكسات	nares; nostril	المنخر
sthenometer	مقياس النشاط	nares	المنخران
psychodometer; psychometer	مقياس نفسي	depressed	منخسف
odynometer	مقياس الوجع	depressed	منخفض
depressant; depressive	مكثّب	index	منسب
control	مكافحة	mood-congruent	منسجم مع المزاج
depressed	مكتئّب	activator; energizer	منشط
acquired	مكتسب	neurotonic	منشط عصبي
aversive	مكره	zona; zone	منطقة

tachistoscope	منظار تومضي	coconscious	مواكب للشعور
encephaloscope	منظار الدماغ	death	موت
oscilloscope	منظار الذبذبة	wave	موجة
retinoscope	منظار الشبكية	neurophilic; neurotropic	موجة للعصب
myoscope	منظار العضل	vagotropic	موجة للمبهم
ophthalmoscope	منظار العين	sympathicotropic	موجة الودي
organization	منظمة	morphism	مورفينية
analeptic; exhilarant; thymoleptic	منعش	innate	موروث
psychoanaleptic	منعش نفسي	junction	موصل
reflex	منعكس	locus	موضع
idioreflex	منعكس ذاتي الإحداث	canthus	موق
stellreflex	منعكس وضعي	agrypnod; agrypnotic	موقف
denarcotize	منع المخدر	attitude	موقف
aversive	منفر	algesiogenic	مولد الألم
rostrum	منقار	esthesiogenic; sensigenous	مولد الحس
rostral	منقاري	oscillator	مولد الذبذبات
degenerative	منكس	psychotogenic	مولد الذهان
myotrophic	منحي العضل	paralytogenic	مولد الشلل
hypnagogic; hypnagogue; hypnogenic;	منوم	epileptogenic	مولد الصرع
hypnogenous; hypnotic; soporiferous; soporific		neurotogenic	مولد العصاب
narcoleptic	منوم انتيابي	neurogen	مولد العصب
thalamus	مهاد	reflexogenic; reflexogenous	مولد المنعكس
subthalamus	مهاد بطني	algetic; dolorific; dolorigenic	مؤلم
metathalamus	مهاد تال	hydranencephaly	موه انعدام المخ
neothalamus	مهاد حديث	hydrencephalus; hydrocephalus	موه الرأس
epithalamus	مهاد فوق	scaphohydrocephaly	موه الرأس الزورقي
paleothalamus	مهاد قديم	pseudohydrocephalus	موه الرأس الكاذب
thalamomamillary	مهادي حلمي	hydranencephaly	موه الرأس اللامخي
thalamotegmental	مهادي سقيفي	rachiochysis	موه السيساء
thalamolenticular	مهادي عدسي	neurasthenic	موهون عصبي
thalamocortical	مهادي قشري	myelin	ميالين
cathode	مهبط	medullated	مياليني
temperantia	مهذئات	field	ميدان
ataractic; tranquilizer	مهديء	groove	ميزابة
psychosedative	مهديء نفسي	craniograph	ميصاف القحف
hysteric	مهستر	myosin	ميوزين
hallucinogen	مهلوس	myoglobulin	ميوغلوبلين
calcar	مهماز	myoglobin; myohemoglobin	ميوغلوبين
calcaravis	مهماز الطير	myolin	ميولين
calcarine	مهمازي		
maniac; maniacal	مهوس		
megalomaniac; grandiose	مهوس بالعظمة	episode	ناثبة
irritant	مهيج	centrifugal	ناذب
psychogogic	مهيج نفسي	myelofugal	ناذب الخاع
epithalamus	مهيد	process	ناتيء
gangrene	موات	paraphysis	ناتيء جانبي
neurocommunications	مواصلات عصبية	monticulus cerebelli	ناتيء مخيخي
bestiality	مواقعة البهائم	zygoma	ناتيء وجهي صدغي

(ن)

regio	ناحية	prehypophysis	نخامية أمامية
descendens	نازل	posthypophysis	نخامية خلفية
fistula	ناسور	neurohypophysis	نخامية عصبية
mature	ناضج	adenohypophysis	نخامية غدية
viripotent	ناضج الرجولة	hypophysiotropic	نخامي التوجه
pacemaker	ناظمة	neurohypophyseal	نخامي عصبي
neuropacemaker	ناظمة عصبية	necrosis	نخر
appetate	ناظم الشهية	myonecrosis	نخر عضلي
fenestra	نافذة	myelinosis	نخر مياليني
chill; rigor	نافض	tingling	نخز
bedsore	ناقبة	uraniscolalia	نخيف
hypophysioprivic	ناقص الإفراز النخامي	cicatrix	ندبة
hyposensitive	ناقص التحسس	flocculus	ندفة
hypoergic; hyporeactive	ناقص التفاعلية	paraflocculus	ندفة إضافية
atelocephalous	ناقص تكون الرأس	narcissistic	نرجسي
hypotonic	ناقص التوتر	autophilia; narcism	نرجسية
hypokinetic	ناقص الحراك	agony	نزع
hypoesthetic	ناقص الحس	set; trend	نزعة
myeloclast	ناقضة الميالين	cerebrotonia	نزعة فكرية
cholineacetyltransferase	ناقلة الأسيتيل كولين	enervation	نزاع العصب
esthesodic	ناقل الحس	hemorrhage; staxis	نزف
kinesodic	ناقل الدفعات الحركية	encephalorrhagia; hematoencephalon	نزف دماغي
neuromitor; neurotransmitter	ناقل عصبي	meningorrhagia	نزف سحائي
sensiferous	ناقل للحس	conation	نزوع
nunnation	نأانة	amnesia	نساوة
agonist	ناهضة	ecmnesia	نساوة الجديد
rod	نبت	acousmatamnesia	نساوة صوتية
neurotubule	نبيب عصبي	chemansea	نساوة علاجية
myotubule	نبيب عضلي	anterogradeamnesia	نساوة اللاحق
ozostomia	نتانة النفس	amnemonic; amnesic; amnesic; lethral	نساوي
discharge	نحيج	sciatica	النسي
neurad	نحو العصب	tela	نسيجة
distad	نحو القاصي	amyloidosis	نشاء
craniad	نحو القحف	sthenia	نشاط
axopetal	نحو المحوار	neurosthenia	نشاط عصبي
medulla	نخاع	activate	نشط
medullary; myeloid	نخاعي	development	نشوء
spinocollicular	نخاعي أكيمي	amyloid	نشواني
spinobulbar	نخاعي بصلي	active	نشط
propriospinal	نخاعية عميقة	hemiseptum	نصف الحاجز
spinotectal	نخاعي سقفي	hemisphere	نصف الكرة
spinocortical	نخاعي قشري	hemicerebrum	نصف كرة المخ
spinocerebellar	نخاعي مخيخي	hemilateral	نصفي جانبي
myelin	نخاعين	maturation	نضج
medullated; myelinated; myelinic	نخاعيني	mature; maturity	نضج
hypophyseal; pituitary	نخامي	monophasia	نطق احادي
prehypophyseal	نخامي أمامي	idiologism	نطق ذاتي المعاني
hypophysis; pituitarium; pituitary	نخامية	angophrasia	نطق منقطع

staccato	نطق مفكك	thermhypesthesia; thermohypesthesia	نقص حس الحرارة
regulation; system	نظام	thermohypoesthesia	
rhythm	نظم	hypoequilibrium	نقص حس الدوار والتوازن
biorhythm	نظم حيوي	hemihypesthesia; hemihypoesthesia	نقص الحس الشقي
paraepilepsy	نظير الصرع	bathyhypesthesia; bathyhypoesthesia	نقص الحس العميق
paracoxalgia	نظير الورك	meroencephaly	نقص الدماغ الجزئي
drowsiness	نعاس	oxyachresia	نقص غلوكوز الدماغ
hypnosia	نعاس مستحكم	hypodynamia	نقص القوة
tone	نفمة	hypopotentia	نقص القوى
physocephaly	نفاخ الرأس	hemihypometria	نقص القياس الشقي
psyche	نفس	hypergia; hypoergasia	نقص النشاط
mental; psychiatric; psychic; psychologic;	نفسي	medullary	نقوي
psychological		myelocyte	نقوية
psychosocial	نفسي اجتماعي	myeloid	نقياني
mentality	نفسية	hilum	نقير
psychosomatic	نفسي جسمي	atelocephalous	نقيص الرأس
psychomotor	نفسي حركي	metastasis	نقيلة
biopsychic	نفسي حيوي	appersonification	نكران الذات
autopsychic	نفسي ذاتي	type	نمط
psychoneural	نفسي عصبي	phenotype	نمط ظاهري
twitching	نفضان	homotype	نمط مراتي
myopalmus	نفضان عضلي	stereotypy	نمطية
malleation	نفضان اليد	formication	نملان
jerk; twitch	نفضة	diurnal	نهاري
anklejerk	نفضة الكاحل	acoria	نهام
canal; canalis	نفق	ending; terminatio	نهاية
canaliculus	نفق	peripheromittor	نهاية تنبيهية محيطية
atelencephalia; ateloencephalia	نفاص الدماغ	tactor	نهاية حسية لمسية
atelocephaly	نفاص الرأس	neuroterminal; teleneuron	نهاية عصبية
atelomyelia	نفاص النخاع	mittor	نهاية منبهة
craniotrypsis	نقب القحف	nihilism	نهلستية
fovea	نقرة	akoria; polyphagia	نهم
hypopraxia	نقص الأدائية	nidus; nucleus	نواة
hyposynergia	نقص التآزرية	trophonucleus	نواة كبرية
hyposensitivity	نقص التحسس	dentatum	نواة مسننة
neuroinidia	نقص التغذية العصبية	lethargy	نوام
hypoergy	نقص التفاعلية	crisis; fit; seizure	نوبة
atelocephaly	نقص تكون الرأس	rachisagra	نوبة سيسائية
atelomyelia	نقص تكون النخاع	paralepsy; psycholepsy	نوبة نفسية
hypotonia	نقص التوتر	ictal	نوبي
hemihypotonia	نقص التوتر الشقي	norepinephrine	نورابينفرين
hypocnesia; hypokinesia	نقص الحراك	noradrenergic	نورادريناليني الفعل
hypanakinesia; hypomotility	نقص الحركة	hypnotize	نؤم
hypesthesia; hypoeesthesia	نقص الحس	sleep	نوم
hypalgesia; hypoalgesia	نقص حس الألم	hypnolepsy; narcolepsy	نوم انتيابي
hemihypalgesia	نقص حس الألم الشقي	hypnic	نومي
hypopallessthesia; pallhypesthesia	نقص حس الامتزاز	narcoleptic	نومي انتيابي
		end-nuclei	نوى انتهائية
		somnolence; somnolentia	نيومة

(هـ)

dormant	هاجع	cheromania	هوس الانشراح
margin	هامش	agromania	هوس الانفراد
amentia; anoia	هبل	coprolalomania	هوس البذاء
attack	هجمة	coprophilia	هوس البراز
remission	هدأة	dromomania	هوس التجوال
ciliary	هديبي	ponomania	هوس الترحال
allophasia; logomania; logorrhea; onomatopoesis;	هذر	onomatomania	هوس ترديد الكلمات
paralogism		ecdysiasm; nudomania	هوس التعري
allophasia; delirium; ideophrenia	هذيان	pleonexia	هوس التملك
tromomania	هذيان ارتعاشي	mythomania	هوس التهويل
subdelirium	هذيان بسيط	verbomania	هوس الثثرة
hysteria	هراع	arithmomania	هوس الحساب
herpes	هريس	hypomania	هوس خفيف
herpeszoster; zoster	هريس نطاقي	choreomania	هوس رقصي
phreniclasia; phrenicotripsy	هرس العصب الحجابي	hydrargyromania	هوس زئبقي المنشا
sympathicotripsy	هرس الودي	syphilomania	هوس زهري
pyramid; pyramis; senium	هرم	peotillomania	هوس سحب الفضيب
neurohormone	هرمون عصبي	cleptomania; kleptomania	هوس السرقة
graphocatharsis	هرور كتابي	ecomania	هوس السيادة العائلية
festination	هرولة	erotomania	هوس شبيقي
oxylalia	هرولة الكلام	dipsomania	هوس الشرب
thrill	هرير	hydrodipsomania	هوس شرب الماء
emaciation	هزال	cacodemonomania; demonomania	هوس الشياطين
orgasm	هزة الجماع	bruxomnia	هوس الصريف
hysteric	هستييري	micromania	هوس الصفارة
hysteria	هستيريا	opsomania	هوس الطعام
hysteroepilepsy	هستيديا صرعية	grandiosity; megalomania	هوس العظمة
hysterics	هستيرية	ablutomania	هوس الغسل
drop	هطول	aphrodisiomania	هوس الفلحة
hallucinosis	هلاس	graphomania	هوس الكتابة
hallucination	هلس	bibliomania	هوس الكتب
acoasma	هلس سمعي	alcoholomania; methomania	هوس الكحول
hallucinative; hallucinatory	هلسي	mythomania	هوس الكذب
panic	هلع	amenomania	هوس مرحي
hallucination	هلوسة	nosomania	هوس المرض
pseudohallucination	هلوسة كاذبة	hypermania	هوس مفرط
hormone	هورمون	trichomania	هوس النتف
mania	هوس	pyromania	هوس النيران
nostomania	هوس الإبابة	ailurophilia; galeophilia	هوس الهررة
monomania	هوس أحادي	phrenetic	هوسي
sophomania	هوس إدعاء الحكمة	manic-depressive	هوسي اكتئابي
pharmacophilia	هوس الادوية	identity	هوية
clinomania	هوس الاستلقاء	agitation	هياج
phagomania; sitomania	هوس الاكل	neuroskeleton	هيكل داخلي
necromania	هوس الاموات	myohematin	هيماتين عضلي
egomania	هوس الانانية	erethism; irritable	هيوج
		irritability	هيوجية
		myoplasm; sarcoplasm	ميولى عضلية

## (و)

afferent	وارد	parorexia; pica	وحم
cerebripetal	وارد للدماغ	neuronevus	رجمة عصبية
corticopetal; corticoafferent	وارد للقشرة	puncture	وخز
cerebellipetal	وارد للمخيخ	acupuncture	وخز إبري
subconscious	واع جزئيا	electroacupuncture	وخز إبري كهربائي
conscious	واعي	sympathetic; sympathetic	ودي
atonic	واني	sympathism	ودية
adynamic	واهن	sympathoadrenal	ودي كظري
neurasthenic	واهن الأعصاب	papilledema	وذمة الحليمية البصرية
amyasthenic	واهن العضل	pseudopapilledema	وذمة الحليمية البصرية الكاذبة
microsthenic	واهن العضلات	cephaledema	وذمة الرأس
epidemic	وباء	myoedema; myoidema	وذمة عضلية
epidemic	وبائي	myxedema	وذمة مخاطية
affect	وجدان	heredity; inheritance	وراثية
acrotrophodinia	وجع الأطراف الاغتذائي	hereditary	وراثي
odynophagia; odynphagia	وجع البلع	coxalgia; coxodynia	وراك
pharyngodynia	وجع البلعوم	myeloblastomatosis	ورام أرومة النقوية
urodynia	وجع التبول	neurogliomatosis; neurogliosis	ورام دقيقي عصبي
mastodynia; mazodynia	وجع الثدي	meningiomas	ورام سحائي
pleurodynia	وجع الجنبية	neurolipomatosis	ورام شحمي عصبي
allodynia	وجع خلالي	neuromatosis	ورام عصبي
cephalodynia	وجع الرأس	myomatosis	ورام عضلي
hysterodynia; metrodynia	وجع الرحم	neurolymphomatosis	ورام لمفي عصبي
uterodynia	وجع رحمي	neurofibromatosis	ورام ليفي عصبي
cervicodynia	وجع الرقبة	myelocytomatosis	ورام النقويات
xiphodynia	وجع الزهابة	folium	ورقة
rachiodynia	وجع سيشائي	sciatic	وركي
proctodynia	وجع الشرج	neoplasm; oncoma	ورم
thoracodynia	وجع الصدر	ependymoblastoma	ورم أرومة البطانة العصبية
splenodynia	وجع الطحال	neuroblastoma	ورم الأرومة العصبية
achillodynia	وجع العرقوب	ganglioneuroblastoma	ورم الأرومة العصبية العقدية
myodynia	وجع عضلي	myoblastoma; myoblastomyoma	ورم الأرومة العضلية
osteocope; osteodynia	وجع عظمي	fibroblastoma	ورم الأرومة الليفية
antrodynia	وجع الفار	astroblastoma	ورم الأرومة النجمية
cricoidynia	وجع الغضروف الحلقي	medulloblastoma	ورم الأرومة النخاعية
spondylodynia	وجع الفقار	myeloblastoma	ورم الأرومة النقوية
cardiodynia	وجع قلبي	sympathicoblastoma; sympathicogonioma; sympathogonioma	ورم الأرومة الودية
arthrodynia	وجع المفصل	spongioblastoma	ورم أرومي إسفنجي
arthroneuralgia	وجع مفصلي	glioblastoma	ورم أرومي دقيقي
vaginodynia	وجع المهبل	pinealoblastoma; pineoblastoma	ورم أرومي صنوبري
acrodynia	وجع النهايات	esthesioneuroblastoma	ورم أرومي عصبي حسي
tenodynia	وجع الوتر	meningofibroblastoma	ورم أرومي ليفي
facies	وجه	xanthoma	ورم أصفر
epinephrinemia	وجود الأبينفرين بالدم	ependymocytoma; ependymoma	ورم البطانة العصبية
myeloblastemia	وجود الأرومات النقوية بالدم	chordoma	ورم حبلتي
alcoholemia	وجود الكحول في الدم	neurocytoma; neuroepithelioma	ورم الخلايا العصبية

myocytoma	ورم الخلايا العضلية	myelocytoma	ورم النقيويات
gliocytoma; glioma; neurospongioma	ورم دقيقي	vein; vena	وريد
mesoglioma	ورم الدبقيات الصغيرة	emissarium	وريد مشعري
oligodendroblastoma;	ورم الدبقيات القليلات التنفسن	pulvinar	وسادة
oligodendroglioma		milieu	وسط
glioneuroma; neurogliocytoma	ورم دقيقي عصبي	midfrontal	وسط الجبهة
ganglioglioma	ورم دقيقي عقدي	milieueterieur	وسط خارجي
fibroglioma	ورم دقيقي ليفي	milieuinterieur	وسط داخلي
cerebroma; encephaloma	ورم الدماغ	lethargy; somnolence; somnolentia	وسن
hematoma	ورم دموي	cataphora	وسن متقطع
cephalohematoma	ورم دموي رأسي	obsession	وسواس
meningematoma; meninghematoma	ورم دموي سحائي	obsessive	وسواسي
meningeoma; meningioma; meningoma	ورم سحائي	anancastic; obsessive-compulsive	وسواسي قسري
leptomeningioma	ورم سحائي رقيق	operculum	وصاد
meningothelioma	ورم سحائي ظهاري	position	وضع
neurilemmoma; neurilemoma;	ورم شفاني	attitude; habitus; posture	وضعة
schwannoglioma; schwannoma		postural	وضعي
pinealocytoma; pinealoma; pinealoma;	ورم صنوبري	hypothalamus	وطاء
pineocytoma		hypothalamic	وطائي
neurocytoma; neuroepithelioma	ورم ظهاري عصبي	palinopsia	وظوب الرؤية
medulloepithelioma	ورم ظهاري نخاعي	algiovascular	وعائي ألمي
phakoma	ورم عداسي	cerebrovascular	وعائي دماغي
neuroma	ورم عصبي	meningovascular	وعائي سحائي
gangliocytoma; ganglioglioneuroma;	ورم عصبي عقدي	cerebrovascular	وعائي مخي
ganglioma; ganglioneuroma		malaise	وعكة
pseudoneuroma	ورم عصبي كاذب	awareness; consciousness	وعي
leiomyoma	ورم العضلات الملساء	oneirism	وعي أحلامي
myoma	ورم عضلي	subconsciousness	وعي جزئي
myolipoma	ورم عضلي شحمي	selfconsciousness	وعي الذات
myoschwannoma	ورم عضلي شفاني	anacusia; anakusia	وقر
myxomyoma	ورم عضلي مخاطي	zoophilia; zoophilism	الولع بالحيوانات
rhabdomyoma	ورم عضلي مخطط	nyctophilia; scotophilia	الولع بالليل
adenoma	ورم غدي	mysophilia	ولع القذارة
neurilemmoma; neurolemmoma	ورم غمد الليف العصبي	alcoholophilia	ولع الكحول
craniopharyngioma	ورم قحفي بلعومي	zoophilic	ولوع بالحيوانات
infundibuloma	ورم القمع	myatonia	وناء عضلي
pseudotumor	ورم كاذب	tonia; atonicity; atony	ونى
fibroneuroma; neurofibroma	ورم ليفي عصبي	amytonia	ونى عضلي
ganglioneurofibroma	ورم ليفي عصبي عقدي	collapse	وهط
myofibroma	ورم ليفي عضلي	derism	وهل
paranglioma	ورم المستقيمات	derism; derism; phantasm	وهم
melanoma	ورم ملاني	adynamia; asthenia; hyposthenia	وهن
melanoblastoma	ورم ملاني خبيث	neurotrophasthenia	وهن التغذية العصبية
meningoblastoma	ورم ملاني سحائي	somasthenia; somatasthenia	وهن جسدي
melanoameloblastoma	ورم مينائي ملاني	minuthesis	وهن حسي
astrocytoma; astroma	ورم النجميات	skelasthenia	وهن الساق
neuroastrocytoma	ورم نجمي عصبي	phonasthenia	وهن الصوت
myeloma	ورم نقوي	aerasthenia	وهن الطيارين



neurasthenia	وهن عصبي	fontanelle	يافوخ
otoneurasthenia	وهن عصبي أذني المنشأ	hand	يد
traumasthenia	وهن عصبي رضحي	clawhand	يد مخلبية
hemineurasthenia	وهن عصبي شقي	handedness	يدوية
leioasthenia	وهن العضلات الملساء	masculinize	يذكر
amyasthenia; amyosthenia; myasthenia;	وهن عضلي	kernicterus	يرقان نووي
myoasthenia; myoneurasthenia		sinistral	يساري
hemiamyosthenia	وهن عضلي شقي	excitable	يستثار
neuromyasthenia	وهن عضلي عصبي	bradypragia	بطء العمل
cataphrenia	وهن عقلي	adolescence	يفع
ergasthenia	وهن العمل	juvenile	يفعي
myelasthenia	وهن النخاع	alert	يقظ
psychasthenia	وهن نفسي	alertness; wakefulness	يقظة
miopragia	وهن وتلفي	subwaking	يقظة جزئية
		invert	يقلب
		dextrocerebral	يمينية المخ
	(ي)		
juvenile	يافع		

المعاجم الأكاديمية المتخصصة




# معجم طب الأعصاب

منتدى إقرأ الشقافى

www.iqra-ahiamontada.com

انكليزي - عربي

الاسناد الدكتور صادق الهلالي



أكاديميا

مَنْظَرُ الصَّحْتِ الْعَالَمِيَّةِ  
الكتب لافتيه شرق المتوسط